





30786/B/1

JUSSIEU



This book was in Calcutta 1820
















75825  
ANTONII LAURENTII DE JUSSIEU

REGI A CONSILIIS ET SECRETIS, DOCTORIS MEDICI  
PARISIENSIS, REGIÆ SCIENTIARUM ACADEMIÆ REGIÆQUE  
SOCIETATIS MEDICÆ PARISIENSIS, NECNON ACADEMIARUM UPSAL.  
MATRIT. LUGD. SOCH, ET IN HORTO REGIO PARIS.  
BOTANICES PROFESSORIS.

# GENERA PLANTARUM

SECUNDUM

ORDINES NATURALES

DISPOSITA,

JUXTA METHODUM IN HORTO REGIO PARISIENSI  
EXARATAM, ANNO M. DCC. LXXIV.



PARISIIS,

Apud Viduam HERISSANT, Typographum, viâ novâ  
B. M. sub signo Crucis Aureæ.

Et THEOPHILUM BARROIS, ad ripam Augustinianorum;







QUANTÆ sit molis scientiam diutissimè arbitrariam & deviam ad verum revocare propositum, patebit ex institutâ in plantis generum ordinumque hodiernâ distributione, quæ licèt accuratiùs elaborata, iteratis sensim perficienda est Botanicorum præsentium ac futurorum observationibus ac meditationibus. Systematica prævaluerat semper doctrina expeditior, & subindè methodi naturalis fuerat prætermissa difficilior disquisitio. Nunc autem sub quindecim novæ ordinationis classibus, non systematico more omninò circumscriptis, sed juxtâ Naturæ legem mutuò connexis militant centeni ordines, singuli plura complectentes genera, alii verè naturales, alii recognoscendi. Omnium dispositio mutua nunc genuina affinitatibus rectè famulatur, nunc iisdem minùs obtemperat, non legum naturalium sed pravæ earum interpretationis vitio. Tentanda igitur pluriès caracterum æstimatio, undè certior eruetur generum ordinationo tum universalis tum partialis, ab hodiernâ certè dispar, Autore nullatenùs refragante. Id enim satis erit ipsi, si reaseratis Naturæ legibus Botánicos plures à systematicâ scientiâ avertens, eos ad naturalem adduxerit.

Benè multa Linnæanis addidit genera, tum à diversis Autoribus jam promulgata, tum quædam ipsi propria, tum plura nova quæ in itinere botanico detexit ac instituit indefessus peregrinator Commerfonius.

Hic patiens laboris & acer ingenio, Botanices & scientiæ Zoologicæ peritissimus novarumque appetens rerum, imperante Ludovico XV & Buginvillæo duce, annis 1767 & 1768 oras lustravit Brasilienses, Bonarienses, Magellanicas, & insulas Otahiti, novam Britanniam, Bouro, Javam, Rodericam aliasque adjacentes. Intermisâ dein navigatione substitit per quinquennium in insulâ Mauritianâ cujus ut & Borbonicæ vicinioris integram suscepit Phytologiam atque Zoologiam, & bis intereâ Madagascariam adiit, plantas & animantia in triplici insulâ collegit, descripsit atque delineari curavit, favente ac promovente D. Poivre meritissimo coloniæ præfecto qui ipsum hospitio



exceperat sumptibus quibuscumque solutum. Plurima ex ejusdem peregrinatione & assiduo labore speranda fuit utilitas ; sed post optimi in Galliam reducis præfetti discessum , successori invisus , tædio gravi & inveterato morbo & protractis exhaustus vigiliis , mox occubuit anno 1773 , nondum dispositâ generali inventorum ordinatione. Ipsius collectanea Regio jussu Parisios advecta , in Historiæ naturalis Musæo servantur ; pleraque tamen in trajectu evanescere subducta manuscripta ut & plantæ Otahitienses. Hodierni operis Autori commissa fuit herbarii Commersoniani tria circiter specierum distinctarum millia complectentis cura , & ex reliquis descriptionibus aut sæpius ex siccis plantis excerpfit characteres generum plus quàm sexaginta quæ in ordinum serie suo quæque loco disponuntur , donec opportuno tempore numerosæ prodeant ejusdem novæ species tacito elaboratæ.

Operi adduntur quædam genera Dombeyi Peruviana , ea nempe quæ antè missa Autori ipse communicavit. Cætera novissima ac Botanicis summè desideranda in posterum à Dombeyo aut ab altero editore promulgabuntur.

Non prætermittuntur etiam Forskalii , Forsteri & Aubletii genera , plurima in Linnæi systemate omissa , quædam fortè ulteriori recognitione delenda & adjicienda consinibus ; undè rudia licet , nondum mutantur horum nomina.

Genera ac synonyma ab invicem & à subsequente characterum enumeratione distinguuntur stellulâ interpositâ , & singulis additur Autorum nomen usu typographico decurtatum , primâ tantum prolatâ syllabâ , ut Dillenii , Halleri , Brownæi &c. , aut unicâ nominis frequentius recursantis primâ litterâ superstite , ut Tournefortii , Linnæi , Vaillantii , Plumerii ( Pl. ) , Linnæi filii Suppl. ( LS. ) &c. Indicantur etiam depromptæ ex Autoris Musæo , tum icones Plumerii à Burmanno non promulgatæ , tum Camelli icones Luxonenses delineatæ non æri incisæ , cujus descriptiones in Raii hist. vol. 3 consignantur.

Dùm autem hodierna in publico propè versatur generum series , plurima in diversis regionibus recens eminent & quædam Autorum nomine jam celebria parantur opera , scientiæ promovendæ certò profutura & novissimis ditata generibus , quæ in præsentī deficientia alteram ejus editionem perseveranter recudendam quasi præsagiunt. Omnibus dedita Botanicis hæc ideo latinè conscribitur , in opere tamen distincto gallicè posthac exhibenda plurimis optantibus indigenis.



---

*EXTRAIT des Registres de l'Académie Royale des Sciences,  
du premier Juillet 1789.*

Nous Commissaires, avons examiné, par ordre de l'Académie, un Ouvrage latin de M. de Jussieu sur la Botanique, intitulé : *Genera Plantarum secundum ordines naturales disposita juxta methodum in Horto Regio Parisiensi exaratam*, &c.

Cet ouvrage présente la suite de tous les genres de plantes connus, disposés par ordres naturels ou familles selon une méthode particulière à l'Auteur.

Dans une introduction qui précède l'ouvrage, M. de Jussieu établit les principes d'après lesquels il croit que ses ordres doivent être formés & disposés entr'eux. Après des définitions générales & préliminaires sur l'histoire naturelle, sur la nature des corps qui sont l'objet de ses recherches, sur la distinction des corps organisés & de ceux qui ne le sont pas, sur la différence des sciences qui s'occupent de ces corps, l'Auteur observe que celle des corps organisés consiste principalement dans l'étude de leur organisation, des fonctions qui en résultent & des différences qu'elle présente dans chaque être organisé, soit animal, soit végétal. Il en résulte, pour le Botaniste, la nécessité de connoître d'une part tous les organes dont les plantes sont munies, & de l'autre toutes les modifications de chaque organe, c'est-à-dire, tous les caractères qui distinguent les plantes.

Pour parvenir à cette connoissance, M. de Jussieu rappelle d'abord, d'une manière abrégée, les diverses parties des plantes, leur structure & leurs fonctions; il parle ensuite de leurs différences, & énonce successivement celles de chaque organe en définissant les termes qui expriment chaque différence, & dont on retrouve la série dans plusieurs ouvrages de Botanique. Les caractères résultans de la manière d'être des organes, sont considérés ici selon le nombre & la nature des organes mêmes, selon leurs divers degrés de constance ou de variation & selon les rapports qu'ils ont entr'eux dans une même plante.

L'assemblage & la succession constante des individus semblables ou conformes dans tous leurs caractères, constitue l'espèce proprement dite, qui est le premier objet de la science. M. de Jussieu ayant



ainsi défini l'espèce, expose les principes admis & successivement changés par les Auteurs, sur la réunion des espèces en genres, & des genres en classes; les progrès successifs de la science dans cette partie; les travaux des principaux Auteurs, & sur-tout de Tournefort & de Linné; enfin, l'utilité des réformes introduites par ce dernier dans la nomenclature & la description. Dans le nombre des systèmes imaginés pour classer les plantes, ceux des deux Botanistes déjà cités & qui tiennent le premier rang, sont les seuls analysés dans cet Ouvrage. M. de Jussieu, après avoir pesé leurs avantages & leurs inconveniens, dit que toutes les distributions systématiques utiles pour l'étude & pour nommer plus aisément les plantes, ne peuvent éviter des défauts réels, & qu'elles ne sont point la vraie science puisqu'elles ne font connoître qu'une partie de l'organisation. Il en conclut que ces distributions systématiques ne doivent être regardées que comme des tables raisonnées dans lesquelles les plantes sont disposées arbitrairement & suivant des signes de convention propres à les faire aisément reconnoître, en attendant qu'on puisse leur assigner leur véritable lieu dans l'ordre de la Nature qu'il regarde comme le seul digne de faire l'objet de la science, le seul qui la constitue véritablement.

Les Botanistes les plus instruits ont reconnu l'existence des rapports naturels, l'importance de leurs recherches & l'avantage résultant d'une distribution qui présenteroit tous les végétaux dans l'ordre de ces rapports. Parmi les Auteurs qui ont fait, avec le plus de succès des recherches en ce genre, M. de Jussieu cite Linné qui a donné des *Fragmens* ou ordres naturels, mais sans leur assigner aucun caractère; Bernard de Jussieu son oncle, qui a établi une suite d'ordres naturels au Jardin Royal de Trianon; & M. Adanson qui a publié depuis long-temps un Ouvrage intitulé *Familles des Plantes*.

Ensuite M. de Jussieu, rappelant les comparaisons faites de la disposition naturelle des végétaux avec une chaîne dont les chaînons sont représentés par des plantes, ou avec une carte géographique dans laquelle chaque être occupe un point fixe, cherche à prouver que si les matériaux de cet ordre sont difficiles à rassembler, les principes qui lui servent de base sont faciles à reconnoître & à fixer. Ains ayant observé que l'espèce est la collection des individus absolument semblables, il a ajouté que; pour suivre la marche de la Nature dans le rapprochement des espèces, il faut joindre celles qui se ressemblent par le plus grand nombre de leurs caractères, & il prouve la vér



de ce principe par l'examen de plusieurs genres très naturels & généralement avoués.

Cette analyse offrant en outre des caractères plus constants & d'autres qui le sont moins , donne lieu à l'énoncé d'un autre principe ; savoir , que les caractères doivent être pesés ou calculés suivant leur valeur relative , de sorte qu'un caractère constant équivaut à plusieurs caractères variables. Ces deux principes réunis forment , selon l'Auteur , la base principale de la méthode naturelle , & donnent la mesure des affinités existantes. Il en fait l'application , non-seulement pour la formation des genres , mais encore pour la réunion de ces mêmes genres en ordres naturels dont il existe pareillement des modèles avoués par les Botanistes.

Ces ordres analysés lui donnent le moyen d'établir une première estimation des caractères qu'il divise en trois classes principales : les premiers sont , selon M. de Jussieu , essentiels , toujours constants , uniformes dans tous les ordres , & tirés d'organes essentiels ; tels sont l'insertion des étamines ou leur disposition relativement au pistil , la situation de la corolle staminifère , & le nombre des lobes ou cotyledons de l'embrion.

Les seconds sont généraux , presque uniformes dans tous les ordres , variables seulement par exception , & tirés d'organes non essentiels ; tels sont la présence ou le défaut soit du calice soit de la corolle non staminifère , la structure de la corolle considérée comme monopétale ou polypétale , la situation relative du calice & du pistil ; enfin la présence ou l'absence ainsi que la nature du *perisperme* qui est un corps particulier environnant l'embrion , que l'on rencontre dans beaucoup de semences , & auquel Grew & M. Gaertner donnent le nom latin d'*albumen*.

Les troisièmes , c'est-à-dire , les caractères de la troisième classe , sont tantôt uniformes , tantôt variables & tirés des organes , soit essentiels , soit non essentiels ; tels sont le calice monophylle ou polyphylle , l'ovaire simple ou multiple , le nombre , la proportion & la connexion des étamines ; le nombre des loges du fruit & sa manière de s'ouvrir , la position des feuilles & des fleurs & d'autres caractères analogues.

M. de Jussieu observe que les genres d'une même famille sont nécessairement conformes dans les premiers caractères , qu'ils le sont généralement dans les seconds , & plus ou moins souvent dans les troisièmes. Ces conséquences & ces principes sont fortifiés par l'exemple



d'une famille naturelle citée, & dont chaque caractère est placé à son rang.

Les ordres doivent être réunis en classes, comme les genres en ordres, dit M. de Jussieu, & l'on conçoit dès-lors que ce sont les caractères essentiels ou toujours uniformes qui peuvent seuls servir à désigner les classes. Il prouve aisément que les racines, les tiges & les feuilles ne donnent aucun de ces caractères; il pense aussi que le calice & même la corolle qui manquent quelquefois, doivent être dans le même cas. Ces caractères ne peuvent donc être fournis que par les organes sexuels qui sont véritablement essentiels, parce qu'ils sont nécessaires pour former la graine, & qu'ils sont conséquemment moins que la graine même dans l'économie végétale. Il en résulte, selon l'Auteur, que c'est nécessairement de la graine que doivent être tirés les premiers caractères. C'est ainsi que M. de Jussieu parvient à prouver que la fameuse distinction des plantes en *Acotyledones*, *Monocotyledones* & *Dicotyledones*, est essentiellement la première dans l'ordre de la Nature. Pour confirmer le fondement de son assertion, il cite l'uniformité de structure de l'embryon végétal dans les ordres connus, &, en quelque sorte, une conformité de cet embryon avec le cœur animal, qui donne également dans les Animaux les premières divisions.

La graine a fourni les premiers caractères : doit-elle donner encore les seconds ? c'est la question que se fait M. de Jussieu ; mais il ne croit pas que les autres caractères soient aussi solides que le premier qu'il emploie, &, en effet, les observations n'ont pas encore prouvé le contraire.

Au défaut de la graine, ce sont les organes sexuels qui doivent fournir les caractères secondaires ; mais ils n'ont séparément aucune valeur, & l'Auteur cherche à prouver que le seul caractère solide qu'on en peut tirer, est celui qu'ils fournissent en commun, & qui est constitué par leur situation respective, c'est-à-dire, par l'insertion des étamines considérée relativement au pistil. En conséquence, M. de Jussieu distingue trois insertions principales : les étamines sont placées au-dessus ou au-dessous du pistil, ou bien elles l'entourent étant attachées au calice. Ces trois insertions, dit l'Auteur, sont essentiellement distinctes entr'elles, & ne se trouvent jamais ensemble dans un même ordre ; elles sont *immédiates* lorsque les étamines tiennent immédiatement aux trois points désignés, & *médiates* lorsque les étamines



sont portées sur la corolle laquelle est insérée elle-même à l'un des trois points ; d'où il suit , selon l'Auteur , d'une part que l'insertion des étamines à la corolle peut quelquefois se réunir & se réunit en effet dans un même ordre avec chacune des trois insertions primitives , & qu'elle suit conséquemment des loix différentes ; d'une autre part que , lorsque la corolle porte les étamines , sa propre insertion devient un caractère essentiel , & que ses trois insertions doivent être & sont absolument distinctes.

Des exemples appuient ces diverses assertions : nous n'en ferons pas l'énumération , & nous nous dispenserons également de développer les conséquences que l'Auteur en tire pour le rapprochement des ordres naturels & leur distribution classique. Il prouve que l'arrangement formé à Trianon par le célèbre Bernard de Jussieu , a pour base la structure de l'embrion & l'insertion des étamines , & que ces deux caractères combinés suffisent pour former , dans les végétaux , sept classes principales suivant lesquelles les ordres de Trianon sont disposés. Cet arrangement , dit l'Auteur , a l'avantage de conserver tous les ordres naturels dans leur intégrité , & de n'admettre comme classiques que des caractères essentiels.

Le desir de multiplier les classes pour faciliter l'étude , a engagé M. de Jussieu à joindre aux caractères premiers & essentiels quelque caractère secondaire & général , & il en trouve un dans la corolle considérée comme monopetale ou polypetale ou nulle. Il fait voir que ce caractère est lié avec celui de l'insertion des étamines , mais qu'il est , malgré cela , sujet à quelques exceptions.

Nous n'entrerons pas dans le détail des moyens que M. de Jussieu emploie pour multiplier les classes à l'aide de ce caractère , sans décomposer les ordres. La méthode qu'il propose a déjà été établie par lui au jardin du Roi en 1774 , & il en a détaillé les principes dans un Mémoire donné à l'Académie la même année. On y retrouve les premières distinctions tirées de l'embrion , & les secondes caractérisées , tantôt par l'insertion des étamines , & tantôt par la corolle. Il observe lui-même que cette méthode , composée de quinze classes , ne peut éviter quelques exceptions , puisqu'elle admet un caractère non essentiel ; mais elles sont , dit l'Auteur , en beaucoup plus petit nombre que dans tous les systèmes qui sont ordinairement fondés sur des caractères de moindre valeur. A ces considérations , l'Auteur fait succéder des réflexions générales sur les avantages d'une méthode natu-



relle ou d'une distribution fondée sur la considération des rapports, avantages qui doivent la faire rechercher sérieusement par tous les Botanistes.

Il n'est pas de système qui n'ait déterminé quelques-uns des rapports connus ; mais tous offrent en même-temps des disparates en plus grand nombre qui les rendent très-défectueux. Linné & M. Adanson, l'un dans ses fragmens, & l'autre dans ses familles, ont fait beaucoup de rapprochemens heureux ; Bernard de Jussieu a de plus lié ses ordres par des caractères primitifs ou de première valeur ; enfin, M. de Jussieu, son neveu, adoptant les mêmes principes, & donnant, dans un Ouvrage complet, une suite de 100 ordres naturels dans lesquels sont contenus 1754 genres, rend en ce point un service important à la science. Chacune de ses classes offre d'abord un caractère général commun à tous les ordres qui la composent, & ensuite des observations qui indiquent, soit l'affinité qui existe entre plusieurs caractères de la classe, soit le principe d'après lesquels les ordres sont distribués, soit les particularités remarquables dans la classe même. Chaque ordre rappelle les caractères des genres qui le composent. Des sections plus ou moins nombreuses servent encore à faire une distribution plus méthodique des genres dans l'ordre. Le caractère de ces genres est simple & en même-temps complet, parce que, laissant de côté les caractères communs déjà énoncés dans la classe, l'ordre & la section, il ne présente que les signes qui servent à distinguer un genre de son voisin & qui sont communs à toutes les espèces du genre, n'oubliant pas dans cette énumération ceux qui peuvent être fournis par les parties étrangères à la fructification. Des observations ajoutées à la fin de chaque ordre, déterminent son degré d'affinité avec l'ordre qui le précède ou celui qui le suit, & offrent des discussions propres à jeter un plus grand jour sur les objets traités, à appuyer le sentiment de l'Auteur sur certains rapports admis, & présente des problèmes & des doutes intéressans à résoudre.

M. de Jussieu a placé à la fin de son travail une suite de cent trente-sept genres disposés suivant une méthode systématique, lesquels n'ont pu être rapportés aux ordres précédens, soit parce qu'ils offrent des caractères différens qui pourroient les faire regarder comme des chefs de familles inconnues, soit parce que l'Auteur ne les ayant pas observé lui-même, les descriptions données lui ont paru insuffisantes pour les réunir à un ordre avec certitude.



Enfin, M. de Jussieu termine son ouvrage par un *Appendix* contenant onze genres oubliés ou publiés dans des ouvrages très-nouveaux, & diverses observations ou additions importantes.

Nous pensons que cet Ouvrage présentant beaucoup de connoissances sur les rapports des plantes, un grand nombre de genres nouveaux & d'observations intéressantes, ne peut être que très-utile au progrès de la science, & qu'il mérite l'approbation de l'Académie & d'être imprimé sous son privilège.

FAIT à l'Académie, le premier Juillet 1789. FOUGEROUX  
DE BONDAROY, DESFONTAINES, DELAMARCK.

*Je certifie le présent Extrait conforme à l'original & au jugement de l'Académie. A Paris, le 3 Juillet 1789.*

Le Marquis DE CONDORCET.





---

*EXTRAIT des Registres de la Société Royale de Médecine.*  
*du 3 Juillet 1789.*

Nous avons été nommés, par la Société de Médecine, MM. Geoffroy, Jeanroy & moi, pour examiner un Ouvrage latin de M. Ant. Laur. de Jussieu notre confrère, intitulé : *Genera Plantarum secundum ordines naturales disposita* &c., & nous avons été chargés d'en rendre compte à la Compagnie.

L'Ouvrage de M. de Jussieu a pour but de réunir tout l'ensemble des Végétaux connus dans un ordre qui, n'interrompant aucune des analogies naturelles par lesquelles les différens individus de ce règne paroissent liés ensemble, les présente au contraire dans une suite tellement continue de nuances & de rapports, que cette chaîne n'ait plus besoin, pour être complète, que de la réunion des plantes que les Naturalistes n'ont point encore découvertes ou observées : c'est ce qu'il appelle la méthode naturelle.

Cette méthode, en la supposant complète, ne présenteroit pas, comme les méthodes artificielles, de grandes interfections, des divisions bien tranchées; mais chaque plante placée entre ses analogues se trouveroit toujours comme en famille, & l'on ne pourroit dire qu'elle commencât ni qu'elle finît une série particulière. Néanmoins on verroit, dans ce grand ensemble, les modifications différentes d'une même organisation former, par des analogies spéciales, des groupes principaux d'espèces presque semblables; ces groupes placés les uns auprès des autres, se toucheroient & se confondroient par les nuances insensibles de leurs dernières espèces, toujours distincts dans leurs centres, mais toujours unis dans leurs extrémités.

L'existence de ces groupes ne peut être révoquée en doute; elle est incontestablement démontrée par ces ressemblances qui non-seulement réunissent plusieurs espèces de plantes dans différens genres, mais qui rassemblent encore, dans un même ordre, plusieurs genres différens d'une manière si évidente que, dans les méthodes artificielles même, les Botanistes ont été quelquefois obligés d'abandonner jusqu'aux caractères principaux de leur classification, pour ne pas éloigner des espèces ou des genres que la Nature elle-même les forçoit de réunir. On en voit des exemples remarquables dans les systèmes de Tournefort & de Linné.



Linné avoit entrevu l'existence de cette méthode naturelle. Il l'avoit cherchée en vain, comme il le dit lui-même, & il ne se laissoit pas d'en réunir les élémens dans ses *Fragmens naturels*. M. Adanson a tâché de parvenir au même but en donnant ses *Familles des Plantes*. Mais Bernard de Jussieu, oncle de l'Auteur de cet Ouvrage, est le premier qui, donnant à son travail une base vraiment philosophique, soit parvenu à poser les fondemens d'un édifice plus solide, préparé long-temps dans le silence ; & ce travail ayant acquis, entre les mains de son élève & de son neveu, un accroissement considérable & un nouveau degré de perfection, paroît aujourd'hui dans l'Ouvrage dont nous allons donner l'idée.

Cet ouvrage qui contient tous les genres de plantes connus, rangés dans un ordre nouveau & sous des classifications nouvelles, est précédé d'une Introduction dans laquelle l'Auteur expose son plan & les principes desquels il est parti.

Il entre en matière par des généralités sur l'Histoire Naturelle & sur la Botanique dans lesquelles nous ne le suivrons pas ici. Il fait ensuite une exposition physique des différentes parties des plantes, de leurs usages, de leur structure & de leur organisation qu'il compare à celle des animaux. Ces détails présentés avec autant de clarté que de précision, soit pour le style, soit pour les idées, perdroient infiniment à être placés dans un extrait.

Nous insisterons cependant sur ce que l'Auteur dit de la corolle dont on a trop méconnu les usages, & sur la définition de laquelle on a bien varié, parce qu'on l'a trop souvent confondue avec le calice.

Le calice, dit M. de Jussieu, (& Linné avoit aussi fait la même observation) est cette enveloppe extérieure de la fleur qui est continue avec l'épiderme de la plante, & qui paroît en être une propagation. Ainsi toute enveloppe qui tient à l'épiderme & qui, par conséquent, a la même origine que l'enveloppe extérieure ou le calice, appartient au calice & n'est point la corolle, quelles que soient sa forme, sa couleur & son étendue.

La corolle, enveloppe intérieure de la fleur, est continue avec le *liber* ou la seconde écorce dont elle est une propagation. Cette seconde écorce donne aussi naissance aux étamines, ou du moins à leurs filets, en sorte que la corolle, ou placée entre ces filets, ou réunie avec eux, ou leur servant de base, souvent prenant des ac-



croissemens & se multipliant à leurs dépens , semble être de même nature , n'en est souvent qu'une appendice , & tombe ordinairement avec eux après la fécondation. Elle paroît destinée à recevoir jusqu'à ce moment comme en dépôt des sucs qui l'abandonnent alors pour se reporter sur le germe fécondé , & hâter son développement & sa perfection. M. de Jussieu définit en conséquence la corolle , *cette enveloppe de la fleur qui , rarement nue & presque toujours recouverte par le calice , est une continuité de la seconde écorce de la plante & non de son épiderme , ne dure point au-delà d'un certain temps , mais tombe ordinairement avec les étamines , entoure ou couronne le fruit , mais ne fait jamais corps avec lui , tire son origine du même point que les étamines & présente le plus souvent ses divisions disposées alternativement avec ces mêmes étamines lorsqu'elles sont en nombre égal.* Quand il se trouve quelque difficulté dans l'observation de ces parties , & quand , dans une fleur munie d'une seule enveloppe , la distinction du calice & de la corolle devient douteuse , alors , dit M. de Jussieu , l'observation des plantes analogues donne la solution du problème. C'est ainsi que l'enveloppe du Narcisse faisant corps avec le fruit , n'ayant point ses divisions alternes avec les étamines , & étant par conséquent un véritable calice , ne permet pas de nommer autrement l'enveloppe de la Jacinte & de toutes les Liliacées qui lui ressemblent.

Cette considération physique de la nature & des usages de la corolle & de son affinité avec les étamines , propre à l'Auteur de cet Ouvrage , eût empêché Tournefort & Linné de tomber dans de grandes erreurs à cet égard. Le premier n'auroit pas appelé corolle dans la Tulipe & la Jacinte , ce qu'il appelloit calice dans le Narcisse & l'Iris. Le dernier n'auroit pas désigné une seule & même partie sous le nom de corolle dans la Rhubarbe , & de calice dans la Patience.

Les autres parties de la plante occupent successivement M. de Jussieu ; il n'en est point qu'il néglige. En effet , c'est de l'ensemble de toute l'organisation que doivent résulter les vrais caractères des différens corps organisés. La Nature a répandu sur toutes leurs parties les nuances qui les distinguent & les unissent ; & comme elle a pris soin de toutes , le Physicien n'en doit oublier aucune.

Mais , en même-temps qu'il porte un œil observateur sur tous les développemens des corps organiques , il doit apprécier la valeur de chacun & les placer suivant l'importance de leurs fonctions ; & comme c'est sur-tout dans la reproduction des êtres que la Nature a



développé toute la richesse de ses moyens , & caché toute la profondeur de ses mystères , aucune partie ne doit prévaloir ni sur l'embryon qui est le produit de cette admirable fonction , ni sur les organes sexuels qui en sont les instrumens.

C'est de ces principes que M. de Jussieu tire les loix qui doivent servir à l'établissement des caractères ; objet d'autant plus important que c'est principalement dans leur choix que réside la différence des méthodes artificielles & de la méthode naturelle. Celle-ci ayant pour but d'augmenter & de perfectionner la science physique , ne néglige aucune des analogies que présente l'organisation des êtres ; celles-là ayant pour objet la commodité des classifications & une connoissance plus facile des espèces , renferment leurs caractères dans un plus petit nombre de parties dont les différentes combinaisons doivent être aisément & promptement saisies par la mémoire.

Nous ne suivrons point l'Auteur dans l'analyse des systèmes de Tournefort & de Linné , & nous allons passer à l'application de ses principes à la recherche de la méthode naturelle. Deux routes doivent , selon lui , nous conduire à la découverte de cette méthode : l'une , par une espèce d'analyse , conduit des observations aux principes ; l'autre , par une méthode synthétique , conduit des principes démontrés à l'établissement des divisions principales qui n'en sont plus que les conséquences.

Dans la première de ces progressions , il faut que l'observateur saisisse les ensembles les plus saillans que la Nature nous laisse appercevoir & qui sont comme les échantillons de l'ordre naturel ; ce sont là ses pas , & c'est en les suivant qu'on peut s'assurer de sa marche.

Il doit commencer par caractériser les espèces , & le premier principe qu'il doit établir , est *que toutes les plantes parfaitement semblables dans toutes leurs parties , & qui se reproduisent toujours sous les mêmes formes , sont autant d'individus qui appartiennent tous à une seule & même espèce*. Comme cette loi n'a rapport qu'à des objets simples & déterminés , elle est nécessairement sûre & invariable.

Les genres sont un assemblage d'espèces analogues entr'elles. Ici ce n'est plus une ressemblance complète qu'on exige ; ce sont des analogies susceptibles de différens degrés de nuances dont les limites ne sont pas déterminées d'une manière aussi précise. Déjà l'on sent que les parties qui composent ces premiers assemblages ont été formées par la Nature pour appartenir à un plus grand ensemble : aussi la



détermination des genres est-elle quelquefois difficile. Leur nombre & leur étendue ont été différemment fixés par chaque Botaniste , & la seule règle exacte qu'on puisse suivre à cet égard , est de ne rassembler , dans un même genre , que les espèces qui se rapprochent par le plus grand nombre de leurs caractères. C'est dans l'examen de quelques genres reconnus comme très-naturels , tels que l'*Aconit* , le *Delphinium* , la *Renoncule* , la *Scabieuse* , le *Geranium* , la *Gentiane* , la *Valeriane* , le *Rosier* &c. , que l'on doit puiser les principales règles qui doivent servir à la formation des autres genres , en distinguant , dans les caractères communs qui rapprochent leurs espèces , ceux qui sont les plus constans de ceux qui le sont moins , observant de plus qu'un caractère uniforme dans un genre ne l'est pas dans un autre , & que dans l'énumération de ces caractères un seul caractère constant a une valeur égale ou supérieure à celle de plusieurs variables.

Ce que les genres sont aux espèces , les ordres ou familles le sont aux genres ; ce sont des assemblages de genres analogues. Plus les analogies sont étendues , moins les caractères sur lesquels elles sont fondées sont nombreux , moins aussi les limites qui les circonscrivent sont apparentes ; aussi la plupart des Botanistes , après avoir fixé la détermination des genres , ont passé aux classifications arbitraires , sans songer aux ensembles intermédiaires dont quelques-uns seulement ont donné des esquisses imparfaites. Néanmoins la nature offre encore aux yeux de l'observateur un grand nombre d'exemples de ces assemblages dans les grandes & remarquables familles des *Graminées* , des *Liliacées* , des *Labiées* , des *Composées* , des *Ombellifères* , des *Crucifères* des *Légumineuses* &c. De l'étude de ces familles , l'observateur peut déduire les règles générales qui doivent servir à en former de pareilles , en analysant les principaux points qui caractérisent leur ressemblance. Plusieurs caractères qui paroissent constans pour les genres , ne sont plus qu'accessoires dans la détermination des familles ou des ordres , & il est encore plus essentiel de déterminer avec précision les différens degrés qui en distinguent l'importance.

M. de Jussieu distingue les caractères constitutifs des ordres en trois degrés.

Les uns qu'il met au premier rang sont constans , uniformes dans tous les ordres (*primarii uniformes*) & essentiels ou tirés d'organes toujours existans. Tels sont l'insertion des étamines ou leur situation relativement au pistil , l'insertion de la corolle lorsqu'elle porte les  
 étamines ;



étamines , enfin le nombre des lobes qui accompagnent l'embryon dans la semence. Jamais ces premiers caractères ne se démentent dans une famille.

Le second rang est composé des caractères que M. de Jussieu appelle presque uniformes (*secundarii subuniformes*) , formés par des organes moins essentiels , savoir la présence ou l'absence du périsperme ou corps qui entoure l'embryon dans la graine , celle du calice ou de la corolle quand celle-ci ne porte pas les étamines , la structure de cette corolle considérée comme monopétale ou polypétale , la situation respective du calice & du pistil , la substance du périsperme. Ce second ordre de caractères est presque général dans les familles & n'est susceptible que d'un petit nombre d'exceptions.

Enfin le troisième rang est formé de caractères que M. de Jussieu appelle demi-uniformes (*tertiarii semiuniformes*) , c'est-à-dire , qui sont tantôt constans , tantôt variables , de quelque organe qu'ils soient tirés. Telles sont les divisions du calice monophylle ou polyphylle , le nombre des germes , le nombre , la proportion mutuelle & la connexion des étamines , le nombre des loges du fruit & la manière dont il s'ouvre , la situation des fleurs & des feuilles , la nature de la tige &c. L'ensemble de ces caractères peut contribuer à former un caractère de famille , mais chacun séparément ne peut servir qu'à déterminer un genre. Outre cela , il y a même entre ces derniers caractères des degrés différens qui leur donnent plus ou moins d'importance ; & en général de l'estimation de ces degrés il résulte que les caractères d'un rang inférieur ont besoin d'être réunis en grand nombre pour former un caractère équivalent à un seul du premier rang.

Ainsi l'on voit que , dans cette analyse , M. de Jussieu ne néglige aucune des ressemblances que les plantes peuvent avoir entr'elles ; que c'est de leur ensemble qu'il déduit les affinités par lesquelles les Végétaux sont unis ; on observe encore que , dans l'importance qu'il attache à ces affinités , il met une valeur proportionnelle d'un côté à la nature des organes qui en fournissent l'observation , de l'autre au nombre d'individus & de genres dans lesquels elles se rencontrent.

C'est parmi les caractères génériques principaux que ce Botaniste a pris les caractères constitutifs des ordres ; c'est aussi parmi les premiers caractères des ordres qu'il prend les caractères constitutifs des classes. Il les tire & de l'embryon & de la disposition respective des étamines & du pistil ou même de la situation de la corolle lorsqu'elle porte les



étamines. Mais de ces deux caractères, celui de l'embryon & celui des infertions, lequel doit l'emporter sur l'autre ? C'est ce que l'Auteur essaie de déterminer en reprenant, dans un ordre différent, les analogies & les faits dont il vient d'exposer l'analyse.

La seconde manière de procéder dans la recherche de l'ordre naturel, est de partir de principes démontrés, & d'en déduire comme conséquences toutes les analogies qui donnent naissance aux différentes classifications dans lesquelles se rangent naturellement toutes les espèces du règne végétal.

Un des principes les plus importants qui aient été établis par l'analyse précédente, c'est que les caractères les plus généraux & les moins variables des plantes sont toujours tirés de leurs organes les plus essentiels, & de la modification la plus importante de ces organes. Un organe dont la forme n'est constante ni dans les genres ni dans les ordres les plus naturels, ne peut jamais être employé pour caractériser les premières divisions. Suivant ce principe, la racine, la tige & les feuilles, souvent dissemblables dans des plantes évidemment analogues, ne donneront jamais de caractères principaux.

C'est donc dans les parties de la fructification qu'il faut les chercher. Or, le calice & la corolle étant des parties accessoirees qui manquent d'ailleurs dans plusieurs plantes, on ne peut pas s'y arrêter pour former un premier caractère.

Les étamines & le pistil formant le complément de la vraie fleur, sont des organes essentiels, puisqu'ils servent ensemble à produire la graine; mais ils se flétrissent après qu'ils ont rempli leurs importantes fonctions, & le germe, ou plutôt l'embryon de la graine pour qui seul tout ce bel appareil est préparé, croît, se développe & mûrit destiné à reproduire une nouvelle plante; par-tout il est l'objet des soins les plus recherchés de la Nature. C'est donc par l'embryon que l'on doit commencer pour établir les caractères principaux sur lesquels sont fondées les premières divisions du règne végétal.

L'embryon ou existe seul & sans être accompagné des lobes séminaux nommés *Cotylédons*, ou il est attaché à un seul lobe, ou enfin il se trouve placé entre deux lobes. De-là une première & grande division des plantes en *Acotylédones*, *Monocotylédones* & *Dicotylédones*, division fondée sur la constante uniformité de ce caractère dans tous les ordres connus.

Les autres parties de la semence, ou n'ont pas été assez généralement & assez scrupuleusement observées, ou fournissent des caractères



sujets à un trop grand nombre d'exceptions, pour donner lieu à des divisions du premier ordre.

Les organes qui, après l'embryon, tiennent le premier rang, sont les étamines & le pistil ; c'est à leur disposition respective que s'arrête M. de Jussieu, parce qu'il observe que ce caractère, quoique négligé par la plupart des Botanistes, est cependant le seul vraiment constant & invariable fourni par ces organes. D'ailleurs, cette manière de les considérer en les réunissant sous un même signe, semble beaucoup mieux convenir à des organes qui, dans l'ordre de la Nature, sont d'une égale importance, ou plutôt ne deviennent importants que par leur réunion. Ce caractère peut être exprimé par celui de la seule insertion des étamines, laquelle suppose toujours la position relative du pistil.

Les étamines sont portées sur le pistil même, ou placées au-dessous de cet organe, ou enfin elles s'insèrent sur le calice qui l'environne. De-là trois ordres de divisions classiques essentiellement distinctes qui sont les *épigynies*, les *hypogynies* & les *perigynies*. Jamais ces insertions ne se confondent dans une même série. Il n'en est pas de même de l'insertion des étamines à la corolle qui se trouve quelquefois réunie dans un même ordre avec chacune des trois précédentes. L'auteur explique cette particularité en observant que la corolle, espèce d'appendice des étamines, doit, dans le cas de cette insertion, être regardée comme un simple support intermédiaire dont l'insertion par cela même détermine celle des étamines ; elle est susceptible d'être divisée de même, peut être confondue avec elle & prise pour elle, & devient alors un caractère essentiel.

De cette disposition il résulte sept classes principales : les Acotyledones n'offrant point des organes sexuels très-distincts & contenant un moindre nombre d'ordres ou de genres, ne forment qu'une seule classe ; c'est la première. Les deux autres divisions partagées selon les trois insertions, donnent les six classes suivantes, & c'est sous cet arrangement que Bernard de Jussieu avoit distribué ses différens ordres ou familles dans le Jardin de Trianon.

Dans ce plan, la division immense des Dicotyledones, quoique partagée en trois classes, se trouvoit encore trop nombreuse pour n'avoir pas besoin d'être subdivisée. Des observations tirées de caractères secondaires, mais dont l'universalité, presque sans exception, les égale à-peu-près à des caractères du premier rang, ont



fourni à M. de Jussieu de nouvelles divisions au moyen desquelles les ordres se trouvent distribués dans des groupes plus uniformes & plus égaux.

Nous avons déjà dit que l'insertion des étamines , dans les trois points principaux de la fleur , avoit lieu soit immédiatement , soit par l'intermède de la corolle , d'où résulte la division des trois insertions en *médiates* & *immédiates*. Une observation presque constante prouve que toute insertion des étamines à la corolle suppose cette corolle monopétale , & toutes les corolles polypétales à très peu près ont leurs pétales distincts des étamines quoique toujours insérées au même point & ayant avec elles une même origine. La corolle monopétale annonce donc presque toujours l'insertion médiate , & la corolle polypétale suppose l'insertion immédiate. De plus , l'insertion peut être immédiate , soit dans des plantes dont les fleurs n'ont point de corolle , soit dans celles dont les fleurs sont chargées de pétales ; ce qui donne lieu à M. de Jussieu de distinguer deux sortes d'insertions immédiates , l'une *immédiate absolue* ou *nécessaire* faute de corolle , l'autre *simplement immédiate* qui annonce l'existence d'une corolle polypétale à laquelle les étamines n'adhèrent pas ordinairement , mais peuvent quelquefois adhérer.

Ces observations fournissent neuf classes principales formées par l'insertion *immédiate nécessaire* , l'insertion *médiate* & l'insertion *simplement immédiate* , ou , ce qui revient au même , par les *Apétales* , les *Monopétales* & les *Polypétales* , subdivisées chacune en *epigynies* , *hypogynies* & *perigynies*. On retrouve donc ici une des grandes divisions de Tournefort prise de la corolle , organe très-sécondaire en lui même , mais qui , par son union avec un organe principal & essentiel dont Tournefort n'avoit pas la connoissance , se trouve passer au premier rang.

On remarque encore que parmi les fleurs monopétales dont la corolle est épigyne ou portée sur le pistil , les unes ont les anthères *distinctes* , & les autres les ont *réunies* en tube ou en gaine. Ce caractère très-sécondaire en lui-même , & moins important dans les autres classes , suffit dans celle-ci pour former une nouvelle subdivision & séparer la série nombreuse des plantes Composées qui ont les anthères réunies , de toutes les autres plantes à fleurs épigynes dont les étamines sont distinctes ; & , au moyen de ce partage d'une des classes principales , M. de Jussieu en ajoute une aux neuf précédemment énoncées dans les Dicotylédones.



Enfin les plantes appelée *diclines*, ou dont les sexes sont essentiellement séparés par la structure même de leurs organes, sans qu'on en puisse accuser soit l'avortement des étamines dans les fleurs femelles, soit celui des pistils dans les fleurs mâles, forment une dernière classe qui appartient encore aux Dicotylédones.

Voici donc, dans les Dicotylédones, onze divisions toutes répondantes à de grands ensembles tracés par la nature & consacrés par la réunion des familles les plus naturelles & les mieux déterminées.

Les trois premières classes contiennent les Apétales ou les fleurs à insertion immédiate nécessaire, divisées en épigynies, périgynies & hypogynies.

Les quatre suivantes renferment les Monopétales ou les fleurs à insertion médiata. Elles sont subdivisées d'après l'insertion de la corolle en hypogynies, périgynies, épigynies à anthères réunies & épigynies à anthères distinctes.

Trois autres classes présentent les plantes polypétales, ou à insertion simplement immédiate, divisées en épigynies, hypogynies & périgynies.

Enfin, tout l'ensemble est terminé par les plantes diclines ou dont les sexes sont placés dans des organes séparés par la nature même de leur structure.

Ces onze classes réunies aux trois des Monocotylédones & à la classe des Acotylédones, en forment en tout quinze parfaitement distinctes & dont aucune, si ce n'est dans quelques exceptions fort rares, n'interrompt la suite des ordres naturels.

C'est dans le cours de l'Ouvrage qu'on peut voir l'enchaînement de ces ordres qui sont au nombre de cent rangés sous les quinze classes dont nous venons de parler, & contenant en tout 1754 genres. Ce nombre de genres n'est pas le complément de ceux que décrit ici M. de Jussieu. Il en place environ 150 autres à la suite de son Ouvrage, & ces genres surnuméraires, ou ne sont pas encore connus suffisamment, ou n'ont point encore d'analogie qui ait permis de les placer au rang des autres. M. de Jussieu n'a cherché à dissimuler rien de ce qui manque à sa méthode, parce que la vérité a seule été sa loi & la Nature son modèle.

C'est dans l'exposition des différens caractères de ces genres, de ces ordres, de ces classes, que l'on peut suivre avec plaisir un observateur exact, fidèle & philosophe.



Chaque division portant en tête son caractère général , est accompagnée de tout ce que les caractères accessoires peuvent offrir d'analogies , de divisions méthodiques , de variétés intéressantes. Chaque classe est exposée de même , & les ordres désignés aussi par un ensemble de caractères toujours placés dans le lieu que leur mérite leur importance mesurée sur leur universalité , sont encore partagés souvent en d'autres sections qui forment comme autant d'ordres secondaires , mais dont le partage est déjà pressenti dans le caractère général.

Deux ordres de notes enrichissent ces descriptions : les unes placées au bas des caractères classiques déterminent l'enchaînement des ordres qui doivent entrer dans chaque classe ; les autres placées à la suite des ordres ou des familles en font observer les nuances , les dégradations & les liaisons avec les précédentes & les voisines. On en voit un exemple intéressant à la fin de la famille des Orties où l'on montre le réceptacle de fleurs fermé sur elles dans le Figuier , s'ouvrir dans l'*Ambora* , s'évaser dans le *Dorstenia* , se renverser dans le *Perebea* , devenir central dans l'*Artocarpus* & le Meurier , s'allonger dans l'Ortie globuleuse , & enfin dans les Orties à grappes s'approcher insensiblement de la forme des Amentacées qui constituent l'ordre suivant.

Outre cela beaucoup d'ordres sont terminés par des genres analogues (*genera affinia*) aux plantes qu'ils contiennent & qui semblent être semés çà & là par la Nature pour remplir les interstices & former des nuances intermédiaires.

La description des genres n'est pas moins soignée , & le caractère générique est suivi d'observations accessoires qui souvent contiennent l'histoire , & pour ainsi dire les mœurs des plantes que renferment le genre. Le *Vallisneria* en est un exemple aussi singulier qu'intéressant.

M. de Jussieu , Médecin & Naturaliste , n'a point oublié que la connoissance des corps de la Nature n'intéresse pas seulement l'homme par la noble curiosité que lui inspire le spectacle des objets qui l'environnent , mais encore par l'influence que ces objets ont sur son existence , sur son bonheur & sur sa conservation. Les Végétaux nous fournissent des alimens & des médicamens ; la substance nutritive préparée dans les organes des Plantes reçoit en elles sa première forme , & un grand nombre de substances médicamenteuses sont le résultat des combinaisons opérées par les instrumens de la végétation. Il semble donc naturel qu'il y ait une liaison entre les propriétés des Végétaux & leur organisation. M. de Jussieu en donne plusieurs exemples dans



son Discours préliminaire, &, au nombre des avantages de la méthode naturelle, il compte celui de réunir souvent des plantes également analogues par leurs vertus & par leurs formes. Cette vertu tonique & stimulante que les anciens ont désignée sous le nom de céphalique, est commune à toutes les Sauges. Les Bugloses possèdent une vertu sédative & diaphorétique que l'on a nommée pectorale. Les *Cochlearia* sont antiscorbutiques; les Euphorbes purgent & les Gargarances sont diurétiques.

Ces analogies ne se bornent pas aux genres. Toutes les Graminées contiennent un périsperme farineux qui forme la base de nos alimens. La vertu antiscorbutique du *Cochlearia* se modifie diversément dans toutes les Crucifères. Les Labiées sont toutes aromatiques & amères, & tantôt douées de principes plus fixes, elles sont principalement stomachiques, tantôt pénétrées d'un principe plus volatil & analogue au camphre, elles agissent jusque sur les nerfs éloignés de l'estomac, & sont alors regardées comme céphaliques. Les vertus des Liliacées, des Légumineuses, des Composées, des Ombellifères, quoique variées entr'elles, sont néanmoins liées par des nuances qui sont souvent apercevoir, dans chaque famille, les modifications d'un même principe. C'est ainsi que tous les ordres parfaits sont unis non-seulement par les liens de leur organisation, mais encore par ceux de leurs propriétés principales. Ceux, au contraire, qui contiennent des espèces ou des genres dont les analogies organiques sont moins complètes, offrent de même, dans leurs propriétés, des disparates plus ou moins considérables; ainsi le *Ficaria* qui n'a rien de nuisible diffère de la Renoncule âcre & caustique, la Fumeterre du Pavot &c.

Les observations que M. de Jussieu fait sur les ordres ou familles, sont encore mêlées quelquefois de remarques utiles & médicales. A la suite des Euphorbes, il en fait une importante; leur périsperme charnu & formant une grande partie de la graine, est doux & sans aucune qualité nuisible; cependant la semence entière purge fortement. C'est dans l'embrion que réside cette vertu purgative. Déjà Sérapion, Bauhin, Hermann, Geoffroy avoient averti de le séparer ainsi que l'enveloppe externe, & avoient remarqué que le reste ou le périsperme étoit infiniment plus doux. Aublet a également observé que le périsperme de l'*Omphalea* & de l'*Hevea* séparé du germe devient un aliment sain. De là cette différence considérable qu'on observe entre l'huile par expression tirée simplement des graines de Ricin & l'huile retirée



des mêmes par le secours du feu : la première est douce & purge doucement ; la seconde est âcre & vénéneuse. La même différence entre les vertus de l'embrion & celles du périsperme a lieu dans beaucoup d'autres plantes. Les graines du Nerprun & du Sapotillier reçoivent de même leur propriété active de l'embrion. Les huiles exprimées de la chair de l'Olive s'altèrent & sont moins douces lorsque le pressoir a brisé son noyau & la graine qu'il contient. On sent aisément l'utilité de toutes ces remarques ; ainsi l'exactitude que l'on met dans l'étude de la Nature , porte avec elle sa récompense , & l'observateur le plus attentif devient en même-temps le plus utile.

Tel est l'ouvrage de M. de Jussieu , écrit d'ailleurs dans un style dans lequel on trouve toute l'élégance que peuvent permettre les expressions techniques inévitables dans ces sortes d'Ouvrages. Nous ajouterons encore à son honneur qu'il a paru moins occupé de sa propre gloire que du soin d'élever un monument à celle d'un oncle également savant , modeste & vertueux. Mais ce monument est double , & , en présentant deux noms à la postérité , il offrira aux savans qui les suivront un grand Ouvrage à continuer & un beau modèle à suivre.

Nous pensons donc que la Société ne peut qu'accorder son approbation au travail de M. de Jussieu , & qu'il doit paroître sous son privilège. Au Louvre , ce 3 Juillet 1789. *Signés*, GEOFFROY, JEANROY , HALLÉ.

La Société de Médecine ayant entendu , dans la séance tenue au Louvre le 3 du présent mois , la lecture du rapport ci-dessus l'a adopté en son entier , ce que je certifie véritable. Ce 6 Juillet 1789.

V I C Q D' A Z Y R , Secrétaire perpétuel.



---

# INTRODUCTIO

## IN HISTORIAM PLANTARUM

**H**ISTORIÆ naturalis nomine designatur scientia quæ Animalium, Vegetantium & Mineralium naturam scrutatur & evolvit. Hæc latè patens, seu corpora singula seorsum exploret, seu simul omnia complectatur, nullos sibi certos constituit fines. Cæteris arctè conjuncta scientiis, modò præmissa facem hæsitantibus præfert, modò præeuntium mutuatur opem quâ graves utilius suscipiat disquisitiones & felicius absolvat. Multiplices corporum formas, insignem in omnibus elementorum connexionem aut organorum perpendit texturam, & diversas telluris areas, diversos emensa tractus, peculiarem ubique typum ac genesim agnoscit. Concordem in singulis speciebus velut in orbe contracto miratur partium structuram & vires amicè conspirantes; deîa audaciori nisu sese attollens, globum ipsum terræ prospicit universum cujus tum diurnæ annuæque conversiones, tum periodica phænomena æquabilem ubique consensum & unicam vim motricem æternâ summi Numinis lege moderatam arguunt. Nimirum variæ corporum partes & omnia in orbe corpora indefinienti aguntur interno motu. Mineralium agitant molem perpetuus elementorum affinium aut adversantium conflictus & consecraria mixtorum veterum solutio novorumque coagmentatio. Innumeræ quæ terram inexhaustâ varietate distinguunt Plantæ, diversis in vegetatione vicibus obnoxia, quotannis renascuntur aut novam induunt frondem. Consimiles in vitæ decursu functiones exercent Animalia, & reciproco solidorum ac fluidorum impetu conservata, nutritione sensim instaurata, successivâ quâdam auræ vitalis transfusione constanter propagantur.

Quæ autem in tam multiplici formarum & fabricarum & actionum & locorum investigatione versatur scientia naturæ contemplatrix, ea non magnifica tantum sed & extensa nimis, ab humano ingenio teneri nequit nisi in plures distribuatur. Natura, vox anceps duplici potissimum sensu accipienda, nunc generalior entium congeriem aut universum telluris significat habitum, nunc



uniufcujusque corporis compagem & existentiae modum specialis exprimit. Hanc sub primo respectu si quis integram sibi fideas audeat capeffere, animos ille grandi detinebit apparatu & splendido illiciet sermone idoneisque verbis; sed sincero rerum naturalium investigatori non sufficit earum compendiosa delibatio aut cognitio inchoata. Ipsi noscenda prius singulorum natura corporum omnibus suis partibus absoluta, quam definiunt præcipuè elementaris compositio & organica fabrica. Indè scientia duplex, elementorum & organorum distinctissima, altera in elementis indolem & numerum & proportionem & mutuam affinitatem computans, altera in organis texturam & numerum & dispositionem & præstantiam & reciprocam actionem metiens. Rejicienda igitur vetus triplicis Regni distinctio, nempe Animantium, Vegetantium & Mineralium, cui rectius substituitur recentior partitio in Regnum organicum & Regnum inorganicum, hinc Mineralia sola, illinc Animantia cum Vegetantibus complectens.

Regna natura.

Inorganicam Mineralium naturam constituit compages elementorum in diversa coëuntium mixta quorum juxtapositione minerale corpus exurgit, adaugetur, perficitur; quibus postea distinctis vicissim destruitur, recentiori nexu in nova concrescens corpora non ipsi coæva sed ex ejusdem detritu facta, distinctissimum ab ente organico infrà definiendo. In examinandâ Mineralium formâ & positione mutuâ subsidet Mineralogia; ulterius procedit Chemia, sejungens analysi corporum principia, horum deprehendens numerum variasque affinitates inter se conferens, & ipsam fecundâ Syntheseos arte naturam æmulans.

A præcedentibus dispar scientia organorum explorans naturam, non in eorum principiis scrutandis incumbit quæ Chemiam spectant, sed in organis formam & contextum & vitæ modum potissimè confectatur. Ens enim organicum ex solidis & fluidis constat partibus reciproco in se invicem agentibus motu, quarum solidæ aliæ dantur *similares* simplicissimæ, aliæ *organicæ* ex similibus factæ, fluidæ verò intrâ solidarum decurrunt vascula aut in earum cellulis consistunt. Illud ex congenere natum, crescit præcedenti conforme, principiis nutritione intus susceptis invalescit, varias ab exortu ad finem patitur vices, foeturam pro-



generat sibi similem ultra persistens, & demum solitâ ætate decursa succidit. Hujus igitur historiam naturamque simul expriment partium organicarum structura & actio, ac subindè cognitio organorum & functionum veram Regni organici scientiam exhibet.

Communis Animantium & Vegetantium vitæ subsistit apparatus, simplicior tamen in Vegetantibus quæ nervis & musculis præcipuè defraudata, non sentiunt nec spontaneum exerunt motum: communis habetur ideò scientia in his & illis organisationem prospiciens & vitam, similitudines aut discrepantias numerans ex conformi aut diverso utriusque modo deductas, & seriem indè constituens naturalem in quâ similia conspirant, dissimilia removentur, ita ut ex hac immutabili entium dispositione certa præsentiat horum affinitas aut alienatio, & cognitis paucis viciniorum cognitio faciliior evadat. Ex dictis Animal est corpus organicum vivens, sentiens & agens; Planta verò corpus organicum vitæ capax, motûs & sensationis expers. Hæc sufficiant de utriusque analogiâ & distinctione: non ultra par est in Animantium disquisitione immorari quæ Zoologis competit; nunc Plantarum historiæ penitus incumbendum, quæ præcipua est suscepti operis ratio.

Plantarum scientia seu *Botanica*, aliàs *Phytologia* dicta, ea est Botanica, quæ Vegetantium naturam inquirat, id est, organorum in ipsis numerum, texturam, actionem, præstantiam, situm mutuum aut proprium, figuram, proportionem & reciprocam discrepantiam determinat, exindè deducens signa plantis distinguendis ac definiendis idonea. Hæc plantarum designatio faciliior summum est hodiernæ propositum scientiæ quæ tota in signis aptioribus & manifestioribus eligendis ac ordinandis incumbit, de cæteris minùs sollicita. Vera autem scientia ex præmissis integræ organisationis studio dedita, non hæret in pauciorum signorum delibatione, sed omnes omnium organorum modos tenetur perpendere, præpositâ eorum structuræ & actionis accuratâ expositione.

Partes plantarum simplicissimæ seu similes *fibræ & utriculi* dictæ, Plantarum in Animantibus eadem, variè coalescunt in textum utricularem, partes & in membranas, in vascula succo nutritio aut succo proprio aut aëre turgida. Ex hisce contextis prodeunt centralis medulla & lignum ambiens & extimus cortex. Perfectiora insuper & majora



ex præcedentium concursu organa componuntur, alia plantæ vitam foventia ut radix & caulis & folium, alia propagandæ speciei necessaria ut flos & fructus, omnia simul in organum generale seu plantam integram coëuntia, quorum structuram & dispositionem & usum præprimis novisse expedit.

*Radix* humi defixa superius in *caulem* producitur: axim<sup>a</sup> utriusque tenet medulla omninò utricularis; strata ambiunt lignea, ex longitudinalibus vasorum & fibrarum fasciculis textu utriculari interposito connexis concreta; superfertur cortex, ex fibris & vasculis & distinctis utriculorum seriebus ferè parallelis laxè intertextus ac quasi reticularis, in radice madens ac succosus, in herbaceo caule membranaceus mollis, in arboreo ficcior & sæpè rimosus. Succum in tellure paratum, crassioribus exutum particulis, chylo animali congenerem, radix, venarum lactearum inflat, exfugit avidè & in caulina defert vasa propellendum altius, copiosum in juniore plantâ, in vetustiore parciolem ratione auctæ solidorum molis & imminuti vasorum diametri. Pars hujus altera intrâ corticem & lignum dejecta concrevit hinc in *alburnum* seu lignum exterius, indè in *librum* seu corticis interius stratum. Altera continuato vasorum tramite viscidiores in utriculis glandulisve dimittit particulas, nunc melleas aut gummosas, nunc resinosas aut acres, & dein ultrâ decurrens per cutis & præcipuè foliorum spiracula fluidiores ejicit. *Folia* quippe duplex vasorum suprà & subtùs per tenues meatus hiantium constituit series, & utrique gemina infertur membrana facillè post macerationem divellenda. Pori suprà positi humorem nimium vi propriâ & attrahente Sole perspiratorium exhalant: undè semper ipsi aut aëri libero obversatur foliorum pagina superior, quam si inverteris retorto petiolo, ad Solem lenta redit. Pori in averso latentes folio & sæpè villis stipati, matutinum aut vespertinum atmospheræ rorem hauriunt, qui in interiora compulsus ad radicem usque detruditur, ejusdem nutritioni famulans. Sic à radice ad

---

<sup>a</sup> Hæc brevis œconomiae vegetalis adumbratio partim extrahitur ex nostrâ thesi pristina in Lyceo medico Parisiensi propugnata anno 1770, cui titulus: *An Œconomiam Animalem inter & Vegetalem analogia?*



folia & à foliis ad radicem perpetuò devehitur succus, Animantium æmulans circulationem & idem tribuens Vegetanti munus. Alternum hujus ascensum & descensum juvant spirales tubi vasis intermixti, tracheis Vermium similes, aëre turgidi per radicis & foliorum meatus admissio qui mutuâ expansione & densatione succum elaborat ut in respiratione animali, & fluentem juvare dicitur.

Prædictæ organorum descriptorum actiones sufficiunt plantis victu reficiendis & vitali earum fovendo motui; aliæ insuper & partes & functiones iisdem multiplicandis & propagandis peculiariter addicuntur. Obiter hîc tantum indicandæ multiplicationis artes Hortulanis notissimæ, tales aut propagines in tellure radicantes, & emissi ex imis caulibus stolones, & furculi insititii, & Alliorum aut Narcissorum bulbilli: generalior sexuum concursu fit propagatio. Dùm enim succus affluens diversas Vegetantis partes nutritio rore alluit, è gemmis expediti *flores* novæ prolis generationi præludunt, exhibentes organa sexualia proprio involucri nunc duplicato nunc rariùs simplici cincta. Exterius involucri *calix* dictum, interno stabilius, continuum cuticulæ pedunculi floralis, sæpiùs ipsi concolor ac ideò virescens, cæteras floris partes complectitur. *Corollæ* in calice interior, libro pedunculi continua, altera involucri species nonnunquam abortiva, sæpè colorata non virens, indivisa aut ex pluribus constans foliolis seu *petalis*, pro flore vulgatiùs habita utpotè manifestior, sexualibus immediatè apponitur organis quæ sunt *Stamina* mascula ambientia & *Pistillum* fœmineum centrale. Stamina corollæ congenita, ipsi coæva & interdum adnexa, simul ex eodem puncto nata simulque post fecundationem decidua, *antheram* seu folliculum gerunt feminali turgentem *polline* & *filamento* sæpè innitentem. Pistilli partes sunt *germen* femininum rudimentis gravidum uteri instar; *stylus* vaginæ similis, ex summo plerumque germine natus, tubulosus sæpè capillaris, interdum nullus; *stigma* in stylo terminale, aut eo deficiente impositum germini, sæpè viscidum & madens. Seu communi tecto, seu diversis habitent sedibus, stamina cum pistillo in idem opus concurrunt. Namque ut primum maturuère, elasticâ vi diffiliunt antheræ & emissum pollen viscido stigmati appingitur, ova secundo imbre proluens.



Illud enim vesiculis constat innumeris, minutissimis ac variè conformatis, quæ dum fluido innatant, huc illuc in illo vagantur, tumescunt, latere dein fissæ materiem emittunt gelatinosam, nebulæ instar irrupentem nec aquæ miscibilem, pro verâ habendam aurâ seminali solâ secundante. Emarcida penso absoluto mox decidunt stamina, decidente simul corollâ quæ vera est staminum appendix præmissumque succi fructuarii diverticulum donec in juniorem fructum utiliùs ille defluat prioris immemor viæ. Tunc *fructus* seu *pericarpium* distenditur & quandoque crassescit utriculis copioso succo turgidis. Concepti in ipso foetus clanculùm crescunt. Succus in idoneum teneræ proli pabulum attenuatus ovula ingreditur & ad debitam molem protrahit. Expleto incremento, dein lymphæ interior in solidam concrevit, non simultaneis ut in viviparâ Animantium classe, sed intra pericarpium alternantibus incrementi & incubationis temporibus. Mox fructus arefcit & dehiscens plerumque matura parit semina receptaculo interiori affixa, interdum in osscâ crustaceâve *nuce* aut *arillo* membranaceo vel coriaceo recondita. Semen duplici sæpiùs membranâ propriâ obvolutum, extùs *hilo* notatur seu umbilico aut vestigio funiculi cujus ope adhæsit receptaculo; intus exhibet *corculum* seu plantæ compendium ex *plumulâ* ascendente, *radiculâ* descendente & *cotyledone* seu lobo laterali simplici aut gemino factum, nunc sæpiùs in semine segrex, nunc instructum *perispermo* seu corpore distincto partim aut penitus ambiente, heterogenio, utili forsàn munimento interiore.

Nec satis est: suū compos semen, novam inchoans vitam, feraci telluris committitur gremio; laxantur tunc meatus, emollitæ finduntur membranulæ, lobi discedunt, & dum subitè expedita succos admittit radícula, crescit intus in caulem assurgens plumula cui suggerunt escam lobi. Vertuntur ii sensim in *folia seminalia* quæ plantulam adversus irruentia quævis protegent ipsique lympham tum propriâ perceptam succione, tum à vegetiori radiculâ mutuatam parant ac colligunt, absque quo debiliior fatisceret. Medullâ enim copiosiori, fibris ferè nullis, tenello instruitur cortice. Sed nova evolvuntur folia, seminalia decidunt; inchoatâ perspiratione augetur radicis succio, affluit humor; fibrarum exoriens fasciculus conoideus medullam à cortice separat ligneumque efformat stratum cujus apici insidet



gemma, fons furculi. Vere novo, mucus quidam organicus, non aquæ miscibilis, corticem inter & lignum medius deponitur, fibrarum exordium constituens. Fibræ in cylindrum aut spiram intortæ, vasculorum infinitam constituunt seriem; novi quotannis fasciculi, nova strata prioribus imponuntur; extensus invalescit cortex; gemmæ terminales ad latera repelluntur in ramulos producendæ; felicius absoluto nutritionis opere amplificata aflurgit planta, luxuriantes pulchrâ fronde ramos emittit, exornatur floribus & fructum maturat spem novæ prolis. Sed molliora sensim terrei principii mixtione vasa indurescunt in fibras compactiores & obturata denegant succis aditum; jam solida fluidis imperant; hæc suspensa sistuntur, illa rigescunt; pressa nimis aboletur medulla; pereunt radices & rami præclusis vasorum fasciculis continui, deciduntque. Mutilati corporis intima penetrat aër; alternâ humiditatis & siccitatis vice utriculos, fibrarum nexum, dissolvit; terreas glutine avulso moleculas diffociat, quæ solutæ in pulverem extenuantur: indè Vegetantium finis.

Hæ sunt variæ plantarum incrementi & decrementi vices, in singulis semper eadem nec unquam pervertendæ. Functiones exponuntur hic delibatæ tantum, sepositis probatoriis Autorum experimentis & diversis eorum systematibus de partium naturâ & evolutione & actione, præteritis etiam nonnullis minoris momenti organis in posterum suo tempore obiter memorandis. Quædam defectu organorum in plantis desunt functiones animales, ut sensuum actio & spontanea mobilitas & digestionis præludium & solida excretio, quibus facilè abstinent perseverante nihilominus vitali motu, & manifesto tantum certi discriminis essentiali signo. Ex dictis sanè concluditur harum organica indoles & cum Animantibus affinitas legumque physicarum jam prolata communio.

Partes autem enumeratæ, licet eadem semper exequantur munia, in plantis discrepant ratione mutui sitûs & numeri & formæ & interioris aut exterioris structuræ & diuturnitatis, quarum differentiæ præcipuæ nunc sigillatim notandæ sunt atque definiendæ, ut iis ritè perspectis plantæ ab invicem facilè & apto verborum delectu dignoscantur.

Partium  
differentiæ



Radix pars plantæ in terram demissa & succos eliciens, quoad situm *perpendicularis* est rectâ descendens, vel *horisontalis* seu *repens* ad latera & transversim protensa, tunc interdum *stolonifera* cauliculos passim emittens. Quoad numerum *simplex* est, aut *ramosa*, aut *fasciculata* ex pluribus arctè fasciculatis constans. Quoad structuram & formam, *fibrosa* est aut *capillacea* radiculis fibrosis aut capillitium æmulantibus, *tuberosa* in subrotundum corpus compacta intus utriculosum & minus fibrosum, *turbinata* crassa obversè conica, aut *fusiformis* oblonga crassa superiùs & inferiùs attenuata, aut *præmorsa* oblonga inferiùs truncata, aut *nodosa* pluriès tumens interstitiis coarctatis. Quoad diuturnitatem, *annua* est quorannis evanida, aut *perennis* diutiùs persistens, *herbacea* mollis aut *lignosa* solidior. Radices quædam parasiticæ arboribus aut parietibus insitæ, quædam aquatiles. Non habendus pro radice *bulbus*, vera caulis squamati aut foliorum basi vaginantium pars infima subterranea plurimùm tumens, squamata aut turbinata, subtus radicans.

Caulis, pars extrâ tellurem emissâ (rarò subnulla), folia & flores fructusque proferens, *nudus* est aut *foliatus*, *integer* simplicissimus aut *simplex* apice ramosus aut *compositus* à basi divisus & cæspitosus, divisuris seu ramis *alternis* passim exortis, aut *oppositis* geminis ex opposito nascentibus, aut *verticillatis* pluribus in orbem oppositis, aut *dichotomis* pluriès bifariâ divisis. Formæ *teres* cylindricus habetur, aut *anceps* oppositè biangularis, aut pro numero angulorum & facierum *triqueter*, *triangularis*, *quadrangularis* . . . , *trigonus*, *tetragonus* . . . , *polygonus*. Superficie *striatus* lineis exaratus, aut *fulcatus* sulcis excavatus, *gleber* omninò lævis, aut *tomentosus* panni instar, aut *villosus* pilis mollibus sparsis, aut *asper* pilis rigidis, aut *scaber* punctis exasperatus, aut mucronibus ex cortice natis *aculeatus*, aut iisdem ex ligno protrusis *spinosus*. Directione *erectus* aut *procumbens* aut *repens*, *flexuosus* per intervalla, aut *scandens* fulcra viciniora, aut circâ eadem *volubilis* spiraliter ascendens *dextrorsum* juxtâ motum Solis vel *sinistrorsum* contrâ Solem, aut *sarmentosus* lignosus repens subnudus. Diuturnitate *herbaceus* annuus, aut lignosus perennis *arbores* maximus, *fruticosus* minor, *suffruticosus* minimus. Hujus insuper nomen in nonnullis distinctum, nempe *truncus* in arbore,



*scapus* in herbis quibusdam radicalis florifer non foliatus, *culmus* in Gramineis fistulosus per intervalla nodosus, *stipes* incrassatus in Fungis, *caudex* radici continuus & quasi conformis cylindricus nudus sub foliorum fasciculo simplici ultrà caulescente in Dra-cænâ, Yuccâ, Agave, Palmis.

Folia perspirationis & inhalationis organa præcipua, sæpiùs existentia, rarò nulla, nunc *petiolata* seu *petiolo* nudo aut rariùs alato infidentia, nunc *sessilia* eodem destituta, basi nuda aut *stipulata* seu stipata membranis squamulisve *stipularum* nomine insignitis, variant præprimis loco, situ, directione, duratione, structurâ simplici aut compositâ & foliatione seu primâ evolutione. Numerosa indè signa distinctionum eruuntur utilia, non hic prolixè recensenda omnia, sed præstantiora tantùm elicienda semotis cæteris accuratiùs alibi memoratis atque definitis. 1°. Folia ratione loci insertionis sunt *radicalia*, *caulina*, *ramea*, *floralia*. 2°. Ratione sitûs proprii aut mutui sunt *amplexicaulia* aut *perfoliata* aut *vaginantia* caulem partim aut omninò basi cingentia aut vaginâ complectentia, *decurrentia* basi utrinque in caulem indè alatum, *alterna* passim absque ordine exorta, *opposita* gemina ex opposito nascentia basibus interdum *connatis*, *verticillata* tria aut plura in orbem opposita, *disticha* secundum duplicem oppositam seriem, plura *fasciculata* aut numerosa densè *conferta*, aut *imbricatim* mutuò incumbentia. 3°. Ratione directionis sunt *erecta*, *horisontalia*, *dependentia*, cauli *appressa* aut *patentia*, *inflexa* aut *reflexa*, *recta* aut *obliqua*. 4°. Ratione durationis sunt *decidua*, *persistentia*, *sempervirentia*. 5°. Ratione structuræ plurima dantur *simplicia* seu suprâ petiolum solitaria non partita: horum forma est *linearis*, *subulata*, *lanceolata*, *hastata*, *sagittata*, *deltoïdea* seu triangula, *rhombæ* seu inæqualiter quadrangula, *cordata*, *obcordata*, *reniformis*, *orbiculata*. Margo est *integer*, *ciliatus*, *spinosus*, *dentatus* dentibus acutis remotis, *ferratus* iisdem proximis, *crenatus* iisdem obtusis, *sinuatus*, *lobatus* lobis acutis aut obtusis sinus distinguuntibus, *palmatus* iisdem in unum punctum confluentibus, *pinnatifidus* oblongus lateribus utrinque pluriès profundè sinuatis & lobatis, *runcinatus* idem ferè lobis acutis retrorsum uncinatis. Apex est *acutus*, *acuminatus*, *obtusus*, *truncatus*, *retusus*, *emarginatus*. Superficies paginae superioris aut inferioris *nitida*, *laevis*, to-



*mentosa*, *lanata*, *viridis* aut *incana*, *hirsuta* seu *pilosa* pilis distinctis, *hispida* fetis rigidis sparsis, *scabra* punctis asperis, *punctata* punctis non prominulis interdum pellucidis, *aculeata* aculeis sparsis, *venosa* venis conspicuis numerosis in reticulum laxum complexis, *rugosa* venarum interstitiis elevatis, *nervosa* nervis à basi ad apicem indivisè excurrentibus, *avenia* aut *enervia* venis aut nervis nullis conspicuis. Expansio fit *plana*, *convexa*, *concava*, *plicata*, *undulata*, *crispa*, *canaliculata*. Substantia est *membranacea* mollis, *coriacea* solidior, *teres* seu cylindrica, *semiteres*, *fistulosa* seu tubulosa, *crassa*, *carnosa*, *triquetra*, *incrassata polymorpha* ut in *Mesembryanthemis*. Folia composita constant pluribus *foliolis* eidem petiolo insidentibus, nempe *conjugata* duobus, *ternata* tribus, *quinata* aut *digitata* quinis aut pluribus ex eodem petioli puncto digitatim exortis, *pedata* eidem petiolo bifido intus digitatim affixa, *impari-pinnata* plura utrinque juxta petiolum communem nata cum impari terminali, *abruptè pinnata* eadem absque impari, *bijuga*, *trijuga*... duo aut tria utrinque in eadem pinnâ. *Decomposita* seu bis composita more præcedentium sunt *bigemina*, *bitermata*, *bipinnata* pinnis pinnulatis. *Supràdecomposita* ter confluentia eodem modo sunt *tergemina*, *triternata*, *tripinnata* pinnis bipinnulatis. *Multipartita* foliolis constant inordinatè numerosis. 6°. Ratione foliationis seu primæ intrâ gemmam aut absque gemmâ evolutionis, propria uniuscujusque junioris folii complicatio est *convoluta* margine lateris unius introflexo alterum spiritaliter circumambiente, *involuta* margine utroque seorsum & spiritaliter introflexo, *revoluta* margine utroque seorsum & spiritaliter retroflexo, *circinalis* apice versùs basim spiritaliter retroflexo, *reclinata* apice versùs basim simpliciter retroflexo, *conduplicata* semel plicata lateribus sibi invicem parallelè approximatis, *plicata* pluribus plicis corrugata. Quoad situm mutuum, folia juniora sunt *convoluta* altero suprâ alterum convoluto, *involuta* aut *revoluta* singulo seorsim involuto aut revoluto, *equitantia* uno conduplicato alterum compar includente, *obvoluta* iisdem conduplicatis alterno margine invicem complexis, *imbricata* iisdem planis sibi invicem incumbentibus.

Expositis summatim præcipuis radicum & caulium & foliorum differentiis, nunc inquirendus in flore & fructu varius dispositionis & structuræ modus. In *inflorescentiâ* seu florum disposi-



rione habenda ratio loci, insertionis, directionis & numeri & mutui situs & partium adjunctarum. 1°. A loco flores sunt *radicales* aut *caulini* aut *ramei* pro parte floriferâ, *terminales* in ramis aut caulis apice, *axillares* in axillâ inter folium & caulem, *suprà* aut *extrâaxillares*, aut absque ordine nascentes seu *sparsi*. 2°. Ab insertione sunt *pedicellati* innascentes *pedicello* seu stipiti proprio, aut *sessiles* pedicello destituti. 3°. A directione erecti aut declinati aut horizontales aut cernui, sæpè proni, rariùs obliqui aut resupinati, quidam Soli perennè obversantes diurnâ pedicelli inflexione. 4°. A numero solitarii habentur aut plures juncti, pedicellis distinctis *fasciculatis*, aut in communem *pedunculum* bi vel triflorum... vel multiflorum confluentibus. 5°. A mutuo situ quidam *verticillati* habentur in orbem amplexicaulem conferti; quidam *capitati* suprà receptaculum commune congesti sessiles, interdum & intrâ calicem communem *aggregati*; alii *spicati* suprà rachim seu pedunculum communem axiformem sparsi sessiles subsessilesve, & quandoque *distichi* seu gemino ordine, aut *secundi* seu unico dispositi, aut *spirales* spicâ in spiram contortâ, aut *amentacei* spicâ densiore molli caudam felinam æmulante & flores apetalos unisexuales infrâ memorandos sustinente; alii *racemosi* spicatis similes sed singuli suprà axim pedicellari pedicellis subæqualibus uni aut paucifloris; alii *corymbosi* à racemosis discrepantes pedicellis infimis sensim longioribus erectis superiores altitudine adæquantibus; alii *paniculati* pedunculis pluriès variè divisis, inæqualiter assurgentibus, diffusis aut coarctatis; alii *umbellati* pedicellis subæqualibus umbellæ instar in idem pedunculi punctum concurrentibus; alii *cymosi* racemis aut corymbis basi in umbellam junctis; quidam demum *spadicei* dicti præcipuè in Palmis & Aroïdeis, à *spadice* seu pedunculo indiviso aut ramoso, spicatim aut paniculatim florifero intrâ *spatham* seu membranam ambientem.

Præterea flores modò nudi sunt, modò sub calice aut ad imum pedicellum *bractea* seu florali squamâ cincti, simplici aut multiplici, laterali aut amplexante, coloratâ aut viridi, persistente aut caducâ, quoad formam & structuram variâ, aliud interdum fortiente nomen. In plurimis Umbelliferis & aliis nonnullis polyphylla pedunculo verticillatim circumposita *involacrum* dicitur;



*glumæ* in Gramineis calicis exterior & conformis, sæpè bivalvis; *spatha* in Liliaceis & spadiceis floribus, basi pedicellum aut pedunculum vaginans & juniusculos flores complectens, simplex hinc fissa aut multipartita.

Floris partes antea memoratæ sunt organa sexualia & eorum integumenta seu Perianthia, hæc calicis & corollæ, illa staminum & pistilli nominibus insignita <sup>a</sup>, quibus singulis sua est dissimilis ac varians structura & dispositio, utraque attentius perpendenda.

Calix, integumentum floris exterius seu *Perianthium* propriè dictum, corticosa pedunculi floralis productio, rarò deficiens, sexibus turandis constitutus, sub pistillo exoritur, nunc eidem partim aut omninò adnascens epidermidis instar, limbo superiore tantum libero *semisuperus* aut *superus* <sup>b</sup>, nunc ab exortu distinctus & discedens *inferus*; mox *caducus* apertò flore, aut cum corollâ posthac *æciduus*, aut ultrà *persistens*; *simplex*, aut *caliculatus* seu *caliculo* cinctus extimo sæpè minore; *pölyphyllus* foliolis constans pluribus distinctis, definitis vel rariùs indefinitis, unico vel gemino vel multiplici ordine dispositis, aut *monophyllus* & tunc *multipartitus* laciniis basi tantum junctis, vel *integer* omninò indivisus, vel basi integer & limbo divisus. Hujus basis brevis aut oblonga aut longissima, *ventricosa* fauce coarctata aut *urccolaris* fauce patens, aut *tubulosa* cylindrica aut *turbinata* obversè conica, aut eadem longior *infundibuliformis* aut planiuscula omninò *patens*. Limbus est connivens aut rectus aut patens aut reflexus, integer

<sup>a</sup> His addit Linnæus *Nectarium* quo nomine designat partes prædictis florum organis interdum additas & structurâ diversissimas, ut sunt glandulæ, setæ, squamulæ, appendices, tubercula, foveæ, sulci, calcaratæ & cornutæ propagines &c. Rejiciendum è scientiâ botanicâ nomen vagum nimis, descriptionibus & caracteribus implicandis idoneum, & revocandæ potiùs ad singula organa partes pro nectario habitæ, nunc proprio tantum nomine appellandæ.

<sup>b</sup> Calix non abit in fructum ut ait Tournefortius, nec ipsi verè superus est referente Linnæo, sed ipsum à basi obtegit integrum simul concretescens (vide Act. Paris. 1773, p. 223). Linnæanum tamen vocabulum Botanicis acceptum hinc admittitur mutatâ tantum definitione.



aut crenatus aut dentatus, aut acutè laciniatus seu *multifidus* aut obtusè *lobatus* numero definito vel indefinito, æqualis aut inæqualis aut interdum irregularis. Altero nomine datur calix in Muscis peculiaris *perichætium* dictus ab eorum calyptrâ diversissimus, in Fungis *volva* membranacea calicis instar fungum juniorem sæpè fovens, in Amentaceis quibusdam *squama* deficientem supplens calicem, in aggregatis floribus calix communis multiflorus.

Corolla, interius tegumen, ex libro pedunculi nata, plerumque colorata, in quibusdam plantis nulla <sup>a</sup>, existens in pluribus, antè fecundationem vicens, posthàc sæpiùs *decidua* cum staminibus, aut rariùs *caluca* ipsis fugacior, aut interdum persistendo *marcescens* & tunc calicinæ potiùs quàm petalinæ indolis particeps, discrepat insuper 1<sup>o</sup>. ratione sitûs, utpotè *perigyna* seu infixa calicî germen ambienti, aut *epigyna* pistillo imposita, aut *hypogyna* sub

<sup>a</sup> Tegumentum floris, dum adest unicum, aliis calix, aliis corolla nuncupatur arbitrariâ lege. Tournefortius in Isagoge p. 72 nodum non solvit incertus ipse, eandem partem in Tulipâ & Hyacintho corollam, in Narcisso & Iride calicem appellans. Statuit tamen pro calice habendum esse cum proprium sit seminis involucrum, pro petalis cum secus accidit, sive brevè pereat sive duret. Linnæus similiter anceps nunc calicem Hellebori pro corollâ & ejusdem petala Ranunculaceis petalis omninò affinia pro nectariis sumit, nunc organum idem dicit corollam in Rheo, calicem in Rumice, posthabitis affinitatum rationibus. Nec feliciores alii fuère in definiendâ corollâ. Si tamen ejus origo & magna cum staminibus cognatio & usus & facilis peractâ fecundatione prolapsio & habitus in pluribus floribus communior attentè perpendantur, tunc corolla definietur illud floris tegumen quod calice cinctum aut rarissimè nudum, pedunculi libro non epidermidi continuum, non persistens sed cum staminibus plerumque deciduum, fructum involvit aut coronat, nunquam cum ipso concreescens, & suas partes cum staminibus numero æqualibus sæpiùs alternans. Hæc conjuncta signa corollam certiùs distinguunt quæ præterea in ambiguis floribus analogiâ congenerum judicatur. Perianthium igitur Narcissi nudum, germi adnatum & lobos non alternans staminibus, verus est calix ipso docente Tournefortio, & idem extat consequenter in Hyacintho aliisque Liliaceis Narcisso conjunctissimis.



eodem inserta; calicinis partibus alternans aut rariùs opposita. 2°. Ratione numeri partium, utpotè *polypetalæ* petalis definitis rariùsve indefinitis, ex ungue & laminâ factis, aut *monopetalæ* eisdem calicis monophylli modos admittens, nunc profundè multipartita, nunc tubo indivisa & limbo definitè vel indefinitè lobata, crenata, dentata, ciliata aut rariùs integra. 3°. Ratione formæ, utpotè *regularis* partibus oppositis conformibus & æqualiter à centrò distantibus, campanam, infundibulum, cylindrum, rotam, crateram, stellam, crucem &c. æmulans; aut *irregularis* inæquali partium oppositarum intervallo & structurâ, *personata* confictam faciem referens, labiata, corniformis, papilionacea, vel polymorpha anomala. 4°. Ratione proportionis, utpotè magna, mediocris, parva, calici & staminibus æqualis aut major minorve. 5°. Ratione coloris multotiès quidem in plurimis varii, sed tenacis in benè multis. 6°. Ratione demùm partium quandoque additarum, quales glandula, fovea, calcar, appendix, squamula, seta &c.

Stamen, masculum Vegetantis organum, constituit anthera propriè dicta, follicularis, foeta polline, nunc sessilis, nunc filamentò stipitata, cujus considerantur 1°. situs seu insertio totius staminis, nunc *perigyni* suprâ calicem aut *epipetali* suprâ corollam, nunc *epigyni* suprâ pistillum aut *hypogyni* sub eodem inserti, nunc affixi disco glanduloso inter pistilli basim & imum calicem exorto; modò calici aut corollæ oppositi aut alterni, modò ab ipsis alienati. 2°. Situs antheræ nunc in apice filamenti erectæ, aut incumbentis seu versatilis utroque sine liberæ aut quasi umbilicatæ, nunc ejusdem lateri adnatæ, ipso interdùm suprâ prominulo. 3°. Structura antheræ extùs rotundæ, ovatæ, oblongæ, sagittatæ, bicornis, bifetæ, arcuatæ, reniformis, didymæ, appendiculatæ &c., intùs sæpè bilocularis, rariùs uni aut multilocularis, plerumque in longum dehiscentis, nonnunquàm apice porosæ aut à basi ad apicem univalvis aut transversim bivalvis. 4°. Structura filamenti sæpè capillaris, interdùm plani, cuneiformis, dentati, hirsuti, squamigeri, glandulosi &c. 5°. Occurrens quandoque partium connexio, nempè antherarum coalitio in unicum corpus tubulosum, filamentorum colligatio in unicum organum annuli vel urceoli vel tubi vel columnæ æmulum, aut in duplicem multi-



plicemve fasciculum antheris duabus vel tribus vel pluribus onustum. 6°. Stamina numerus nunc ab unico ad duodenarium aut supræduodenarium definitus, nunc indefinitus, unde plantæ *monandræ*, *diandræ*, ... *dodecandræ*, *icosandræ*, *polyandræ*. 7°. Filamentorum proportio, tum mutua nempe æqualis aut inæqualis, tum relativè ad partes ambientes quibus æqualia sunt aut longiora *exserta* aut breviora. 8°. Stamina quorundam aut omnium abortus. 9°. Pollen demùm seu vesicula feminalis spiritum continens figurâ in singulis constans, sphæricea, ovata, didyma, angulata, echinata, rotata, &c., spiritu emissio mox deformata & ceream Apibus matériem suppeditans.

Pistillum, seu fœminea pars in flore centralis & receptaculo florali imposita, constat germine, stylo & stigmate. Germen simplex est *monogynum* aut multiplex *polygynum*; nunc *superum* calici infero, nunc cum ipso supero penitus concreescens *inferum*, aut tantummodò basi coalitum *semiinferum*; quandoque impositum disco glanduloso, aut eodem infrâ cinctum, aut glandulâ simili suprâ tectum; sæpius sessile, nonnunquam stipite elevatum; in quibusdam floribus abortivum. Stylus in flore *monostylo* simplex suprâ integer partitusve, aut in *polystylo* multiplex, aut quandoque nullus; plerumque ex germinis apice natus, interdum ex latere, rarius ex basi; deciduus aut persistens; longitudine & directione & crassitie & figurâ varius; rarissimè staminifer. Stigma germi fertili nunquàm deficiens, nunc est sessile ipsi impositum, nunc sæpius summo insidens stylo, simplex aut multiplex, deciduum aut persistens, longitudine & crassitie & formâ pariter varium.

Quatuor enumeratæ partes *completum* simul constituunt florem qui unâ deficiente *incompletus* evadit. Hic modò *apetalus* corollâ, vel *acalicatus* calice denudatur, modò unisexualis *fœmineus* staminibus, aut *masculus* pistillo orbatur, tunc à bisexuali *hermaphrodito* aut à neutro seu eunuchò diversus. Plantæ autem plurimæ dantur *hermaphroditæ* omninò bisexuales in eodem flore; quædam *androgynæ* seu *monoïcæ* floribus masculis & fœmineis distinctis simul instructæ; quædam *dioïcæ* unico sexu præditæ *masculæ* aut *fœmineæ*; pauciores *polygamæ* floribus hermaphroditis & masculis fœmineisve simul commixtis onustæ; nonnullæ *cryptogamæ* sexibus præ tenuitate inconspicuis & minùs notis,



Flores quidam accuratiori culturâ & succo abundantiori luxuriantes sua multiplicant integumenta, nempe rariùs calicem, sæpiùs corollam tum monopetalam tum præcipuè polypetalam, nunc omnibus abortivis staminibus steriles verè *pleni*, nunc quibusdam superstitibus fertiles tantùm *multiplicati*. Indè varietates exurgunt in hortis radiantes florumque studiosis acceptissimæ, sed adulteratâ organisatione à Botanicis despectæ & in scientiâ nullæ, nisi quod frequentiori staminum in corollam conversione maximam organi utriusque analogiam confirment.

Fructus ex maturato germine factus instruitur pericarpio ambiente & semine contento. Pericarpium, idem cum fructu vulgatiùs dicto & quandoque nullum seminibus tunc nudis, simplex est aut multiplex, superum aut inferum aut semiinferum, ejusdem cum germine sitûs & numeri consors. Hujus insuper variat

- 1°. Forma sphaericea, ovata, truncata, turbinata, conoïdea, angulata, compressa, orbicularis, vesicaria, alata, articulata &c.
- 2°. Superficies teres, sinuosa, striata, sulcata, lævis, aspera, tomentosa, villosa, hispida, echinata, spinosa &c.
- 3°. Substantia membranacea, coriacea, ossea, carnosâ, pulposa, succosa.
- 4°. Dehiscencia nunc nulla fructu indiviso; nunc partialis, apice aut latere aut basi, dentibus aut poris; nunc integra, transversa fructu *circumscisso*, valvâ superiore simplici operculiformi; nunc perpendicularis omninò bivalvis, trivalvis, ... multivalvis, interdum elastica.
- 5°. Compositio interior unilocularis, bilocularis, ... multilocularis; *dissépimento* loculos distinguente variè disposito, plerumque perpendiculari aut rariùs transverso, valvis opposito aut parallelo, iisdem continuo aut tantùm applicito, indiviso aut partibili; *columellâ* centrali axiformi interdum existente & à dissépimento distinctâ, sæpiùs nullâ; *receptaculo* seminifero simplici aut multiplici, centrali aut laterali seu parietibus affixo, libero aut ad dissépimentum apposito.
- 6°. Contentorum seminum numerus in singulo loculo unicus aut multiplex, undè fructus aut locus *monospermus*, *dispermus*, .. *oligospermus* seminibus paucis, *polypermus* iisdem numerosis.
- 7°. Præmissorum habitâ ratione nomen fructui varium datur, nempe *capsula* membranacea aut coriacea aut crustacea, *siliqua* capsularis bivalvis futurâ utrâque oppositâ seminiferâ, *legumen* simile futurâ unicâ seminiferâ, *nux* ossea,



ollea, *bacca* succosa aut pulpofa aut carnofa feminibus distinctis facta, *pomum* carnosum solidum capsulam fovens, *drupa* carnofa nuci circumposita, *strobilus* seu *conus* amentaceæ florum dispositioni succedens, plurimis feminibus nucibusve & intermixtis squamis in capitulum seu conum densè confertis constans. 8°. Præterea florale involucrum, pedunculus, calix, pistilli receptaculum, succo interdum turgent fructumque mentiuntur sic vulgò dictum ac verè edulem in Ficu, Cassuvio, Moro, Fragariâ &c.

Semen, ovum vegetabile, futuræ plantæ compendium, nunc nudum & pistilli receptaculo impositum, nunc sæpiùs inclusum pericarpio & receptaculo hujus interiori affixum, sessile aut funiculo umbilicatum aut rupto nexu nidulans in pulpâ, corculo & involucriis propriis constans, discrepat extùs 1°. situ erecto aut declivi aut inverso; 2°. formâ & magnitudine & superficie plurimùm variis; 3°. hylo terminali aut infimo aut laterali, latiore aut angustiore; 4°. arillo seu folliculo extimo facilè solubili, existente aut nullo, monospermo aut rariùs di vel trispermo; 5°. tunicis propriis sæpiùs geminis, quarum interior tenuis, exterior membranacea aut coriacea cartilagineave aut callosa, alata aut marginatâ.

Pars feminis interior præcipua & essentialis, vera plantula, *corculum* dicta, unicâ semper gaudet tum radiculâ tum plumulâ, sed lobo seu cotyledone instruitur sæpè gemino opposito, interdum unico laterali, rariùs nullo conspicuo: indè distinctio feminum *acotyledonum*, *monocotyledonum*, *dicotyledonum*<sup>a</sup>. Radicula extrâ lobos prominula, erecta est aut in lobos inflexa, nunc ascendens fructûs apicem spectans, nunc descendens pedunculo obversa. Lobi sunt tenues aut crassiusculi, plani aut partim vel omninò flexi aut convoluti aut corrugati. Corculum integrum intrâ tunicas solitarium (rarissimè triplex ut in Aurantio) extat; vel stipatur *perispermo*, corpore heterogenio incrassato, farinaceo aut carnosio aut corneo aut lignoso, nunc ipsum

---

<sup>a</sup> Dantur insuper paucissimæ plantæ *Polycotyledones* immerit dictæ, quarum semina duobus instruntur lobis multipartitis ac palmaris verticillum simul mentientibus, ut in Pino infra observatur class. 15. ord. 5. p. 411. 415.



omnino vestiente, nunc partim amplexante aut tantum hinc applicito; vel in ejusdem perispermii majoris foveolâ delitescit.

Enumeratis plantarum partibus cursim addendæ sunt quædam minus essentialia; tum bractæ florales & foliorum stipulæ & spinosæ aut aculeatæ propagines jam prolatae; tum insuper gemmæ seorsum vel simul florales & foliaceæ, plurimis concessæ arboribus & herbis denegatæ; cirrhi spirales indivisi aut ramosi, plantis scandentibus fulcro alligandis utiles; pili pro vasculis excretoriis habiti; succi plantarum colorati lactescentes aut lutei aut sanguinei &c.; glandulæ succis secernendis idoneæ. Non silenda quoque inæqualis seminum germinatio citatior aut tardior, in aliis multò post maturationem facilè peragenda, in aliis ocius necessariò inchoanda, forsàn à statu corculi, nunc absque perispermio magni & valentioris, nunc intrâ perispermum exsuccum tenuissimi mox arefcentis. Non prætermittenda florationis, fructificationis & frondescentiæ tempora in diversis plantis non eadem, in quibusdam brevia ac circumscripta, in aliis protractiora. Memorandæ etiam diurnæ florum nonnullorum explicationes præstitutis horis exequendæ ac simul quoddam Floræ horologium exhibentes; & matutina foliorum in plantis quibusdam expansio quàm vespertina consequitur contractio somnum simulans; & quarundam in aliis partium irritabilitas ulterioribus experimentis illustranda ac comprobanda. Eas tamen non ultrâ juvat partes ac functiones minoris notæ & in usu botanico partim omittas nunc evolvere.

#### Caracteres.

Ex prænuntiatis partium differentiis plerisque exterioribus deducuntur signa distinctionum exteriora quidem, sed interioris structuræ modum exprimentia, quæ *caractèrum* nomine innotescunt, pro certis habenda Vegetantium organisationis & eorum ideò naturæ indiciis. Caractères autem, veri disquisitionum botanicarum fines, plantis dignoscendis ac definiendis necessarii, distinguuntur ratione numeri & præstantiæ & mutuæ affinitatis. Primò quidem simplicissimi caractères seorsum expensi coeunt in compositos ex aliquibus simul junctis, aut ultrâ in generales ex compositis factos, aut demùm in universalem omnes Vegetantis partes & modos complectentem, quo constituitur habitus unicuique plantæ proprius & consequens ejusdem natura exterius



manifesta; undè plantæ habitu simillimæ caractere & naturâ conformes habentur & vice versâ. Præterea in functionum serie quædam cæteris præstant, vegetationem ac propagationem præprimis promoventes, quarum organa ideò primaria & caracteres ipsis proprii aliis jure præficiuntur. Ut tamen in organis primariis partium numerus & forma & proportio aliæque similes causæ ad exercendam functionem præcipuam minùs conferunt, mutabiles ipsâ nihilominùs persistente, sic deducta ex hisce modis signa minùs æstimantur pariter instabilia. Caracteres igitur præstantiâ inæquales pro subjecti organi dignitate & diversarum ejusdem rationum momento ordinatim disponuntur, alii inconstantes seu varii, alii constantiores, alii constantissimi seu essentialiales, in comparandis plantis non indiscriminatim sed ex ordine adhibendi. Horum insuper plures, in eâdem plantâ minimè aut parum cognati, ab invicem plus minùsve discedunt quasi sui juris facti; nonnulli contrà mutuò affines præcipuè in flore aut fructu & ex constantiorum aut essentialium serie deprompti, ita conspirant ac connectuntur ut unus existens alterum semper aut sæpiùs prænuntiet: sic germi infero calix semper monophyllus nascitur, sic flamina corollæ monopetalæ sæpiùs inferuntur, hunc plerumque numero definita. Consensum hunc plura in posterum confirmabunt exempla, patebitque multotiès magna ex ignorum numero, major ex eorum disparilitate percipienda utilitas.

Cogniti caracteres determinandis impenduntur plantis, & eas similes indicant aut dissimiles pro suâ in omnibus majori aut minori consensione. Plantæ cunctis partibus seu caractere universaliter convenientes, ex consimili natæ & similem parituræ, totidem sunt individua simul constituentia *speciem* propriè dictam quæ olim malè designata, nunc rectiùs definitur perennis individuorum similium successio continuatâ generatione renascentium. Hæc entium confociatio & series generatim immutabilis ac perpetua, fortuitò interdum aut humanâ industriâ subvertitur aliquantisper, dum scilicèt ratione loci aut temperiei aut morbi aut culturæ variant individua quædam à primigenio discedentia tribus multiplicatis aut plenis aut mutilatis aut proliferis, foliis variè luxuriantibus aut deformatis, colore immutato, irrepente

Species &  
Varietates.



rubigine aut ustilagine, organis uberiori succorum affluxu ampliatis. Sed eæ *varietates*, in novâ feminum germinatione sibi commissæ, ad primordiale restituto caractere redeunt speciem, cæteris non obstantibus causis & servatâ lege naturali. Nativa autem species, accuratâ definitione certò circumscripta, verum stat fundamentum scientiæ botanicæ quæ in id penitus incumbit, ut omnes planè dignoscat species, universalem earum characterem apprimè calleat, eas invicem conferat affines connectens & discrepantes segregans, & ex speciali cognitione ac collatione generali integram omnium naturæ atque cohærentiæ notitiam consequatur.

Genera.

Ea specierum perfecta nequit comparari cognitio nisi juvandæ memoriæ causâ in fasciculos primùm conglomerentur ratione affinitatis, & posthâc in fasces ex junctis fasciculis compositas. Simpliciores fasciculi *genera* dicti complectuntur nonnullas species plurimis consentientes signis, paucis discrepantes, & ideo caractere non universali sed tantùm generali conformes. Harum generica consociatio certum exigit inter específicos caracteres delectum, non arbitrarium sed solidis innixum principiis, ita ut genus quodlibet species omnes verè congeneres habeat, disparibus nunquam intermixtis.

Nulla fuere priscis in temporibus genericæ hujus constitutionis principia, & indicante tantùm habitu subsimili inexplorato, plantæ sub eodem nomine vagè militabant. Veteres enim plerique, de re medicâ non de botanicâ solliciti, plantarum virtutem non characterem exhibuere in operibus pluriès apparatus interpretatis quorum magna, sed ab hodierno aliena proposito merita hîc recensere supervacaneum est, cum viri aliundè eruditissimi scientiæ nunc elucidandæ nullatenus aut parùm profuerint. Qui tamen eos singulariter novisse ardet, huic consulenda est optima Tournefortii *Isagoge* Autores figillatim enumerans & debitam unicuique laudis partem tribuens. Horum successores ibidem memorati constantiorem in describendis plantis dedere operam sed principiorum defectu & ignotis quibusdam præcipuis organo mancas sæpius descriptiones & pravas semper distributiones e locis aut qualitatibus aut structurâ aut habitu malè perceptas tradiderunt, utili tamen specierum cognitarum indicatione



& quâdam designatione & historiâ & Veterum synonymiâ summè commendandi.

Intereâ nullis adstricta legibus fluctuans obmutuit scientia, donec intellexerint Botanici eam in characterum investigatione, in genericâ specierum connexionem, in ulteriori generum ordinatione præprimis versari, & in conficiendis generibus aut ordinibus quosdam præ cæteris adhibendos esse characteres. Non hæc tamen doctrina confestim invaluit. Gesnerus prior edixit signa deduci jure præcipua ex fructificatione, annuentibus postea Cæsalpino & Columnâ. Principium illud aliquandiù neglectum restituit Morisonius, admisere Râius & Rivinus & coætanei, omninò illustravit his recentior Tournefortius. Perpenfis enim diversis plantarum partibus genericas in flore & fructu notas certò confidere asseruit, indèque sua exstruxit omnia genera, alia nempe primi ordinis solâ fructificatione designata, alia secundi ordinis in quibus aliud præter conformem fructificationis structuram designationi additur. Promulgatam legem & numerofo generum sæpè naturalium conventu stabilitam admisit postera Botanicorum cohors paucis exceptis.

Tournefortius in characterum & organorum floralium enumeratione pistilli partes & stamina despexerat pro vasculis excretoriis habita <sup>a</sup>, licèt jam antea de plantarum sexu à Veteribus præsenso aliquid protulissent Camerarius, Cæsalpinus, Grewius & Malpighius. Ineunte præsentis ævo (1702) Burckardus in epistolâ ad Leibnitzium sexualium organorum structuram & usum fusè exposuit; varias deîn pollinis masculi formas delineavit Geoffræus; Burckardiani placiti nescius sexuum actionem palàm promulgavit

---

<sup>a</sup> Alienæ in flore partes à staminibus tanquàm à vasis excretoriis exceptæ deponuntur in apices (antheras) velut in cloacas. *Tournef. Isag. p. 68. 70.* Alibi tamen Tournefortius plantarum sexum quasi subodoratur, dum de dioicis ait: An corpuscula fluentia ex floribus in teneros fructus procul nascentes feruntur, ut veluti è torpore ad proprium incrementum excitentur? Quemadmodum de Palmis mare & foeminâ... affirmatur... ramulum floris maris in spatham foeminæ inferi quo tempore spatha hiare solet; flos explicatus pulverem fundit sine cujus affectione dactyli acerbi forent & insuaves. *ibid. p. 69.*



Vaillantius; pollinis dehifcentia & auræ feminalis emiffio B. Juffæi & Needhamii obfervationibus innotuère. Indè piftillum & ftamina pluris æftimata meliores exhibuère notas quas Linnæus in genericas aptè composuit. Adaucto fic intrâ florem caracterum genericorum numero, eos omnes ex fructificatione, nullos ex cæteris partibus eruendos effe fancivit circumfcriptâ antecessorum lege. Secundaria igitur rejiciens Tournefortii genera, cætera omnia recudens, utiles unicuique ftaminum & piftilli notas addidit, nonnullas infuper ex calice & corollâ & fructu deprompsit antèrius prætermiffas, & ordinatim perpensis partium numero & figurâ & proportionè & fitu, protensam uniformemque generum tum novorum tum reformatorum feriem, gratam Botanicis ac omnibus ferè nunc acceptam constituit.

Ea genericæ constructionis norma in præfenti fcientiæ ftatu utilis, arbitraria tamen videtur & etiamnùm indefinita ideòque nondùm generibus verè naturalibus conficiendis omninò fufficiens, contradicente Linnæo qui fuas generum cæfuras femper naturales iudicat & cuilibet ordinationi facilè accommodandas. Dantur enim in fructificatione partes ac rationes aliæ aliis præftantiores, & subindè characteres dignitate inæquales, alii primarii effentiales, alii fecundarii tantùm generales, alii infimi plurimùm inconstantes, non omnes certè genericæ designationi peræquè idonei. Quidam infuper extrâ fructificationem fparguntur, præcedentibus infimis digniores, iis longè præponendi, generalibus interdùm coæquales, partim refusi in fecundariis Tournefortii generibus, in aliis verè naturalibus fæpè conformes, in ipsis ordinibus definiendis nonnunquàm adjuutores & ideò non mediocres in ufu botanico. Factitiæ igitur funt regulæ Linnæanæ caracterum floralium inæqualitem & extrâ-floralium quorundam vim non exprimentes; fed à naturalibus parùm diffitæ genera exhibent Tournefortianis præftantiora, plurima femper admittenda, pauciora reformanda, quæ fimul utilem in fcientiâ bafim nunc fuppeditant.

Cognitis caracterum ope fpeciebus & iisdem in genera collectis, alius eft Botanico labor inchoandus, nempè ut genera fpeciesque apto designet nomine & folidâ descriptione definiat, ita ut nomine & definitione à cæteris omnibus dignoscantur. Ea autem fcientiæ pars, licèt non primaria nec fcientiam verè



constituens, huic tamen promovendæ plurimum confert, idcirco non aspernanda sed elaboranda accuratius, ut faciliiori locutione conjunctiores Botanici mutuâ promptius erudiantur observatione aut meditatione. Nihil utile ex Veterum scriptis eruendum, qui nec aptas sæpius descriptiones nec nomina immutabilia protulêre, & indè plures horum plantæ in usu medico receptæ nunc nullatenus innotescunt defectu accuratæ descriptionis. His successe viri in re botanicâ peritiores, sed nondum certis circa nomenclationem principiis innixi & in describendis plantis contractiores aut diffusi nimis, medium tenere nescii. Nec ii profuere scientiæ, qui descriptione & nomine simul conjunctis plantas designabant definitione phrasim integram adæquante, quæ speciei nominandæ proluxior, describendæ impar evadit: indè mendosa præcedentis seculi nomenclatio à Tournefortio <sup>a</sup> admissa progredienti scientiæ moram interposuit. Huic verè maximam tulit opem Linnæus, dum solutis phrasium botanicarum vinculis plantas omnes duplici tantum inscripsit nomine, altero generico substantivo, altero adjectivo seu specifico, caracteres prætereà exhibens in descriptione adæquatâ, verbis significantibus, multa paucis exprimens stilo tecnico. Regulas insuper tum nomenclationis tum descriptionis tradidit, plerasque optimas & generatim admittendas, quasdam fortè infirmandas <sup>b</sup> & ipsimet non sacras. Sic sapienti hujus instituto nomen *genericum* esse debet immu-

---

<sup>a</sup> Ille tamen nomenclationem emendandam judicans, aiebat in Isag. pag. 63. 64: Nomina sunt quædam velut definitiones, quarum prima vox genus, cæteræ differentiam exprimunt... Nomina sint brevia... nonnulla proluxiora vix uno spiritu sustineri possunt... Aliud est plantam appellare, aliud describere.

<sup>b</sup> Sic vocabula ex græco & latino fonte non deducta nunc palam rejicit nunc recipit facilius. Sic etiam vernacula excludens nomina, licet barbariem non redoleant antiquitatis recepta & latinè desinentia, supprimit *Adhatodam*, *Calabam*, *Ceibam*, *Guazumam*, *Iforam*, *Ketmiam*, *Mançanillam*, *Guanabanum*, *Guaïavam*, *Papayam*, *Sapotam*, *Tapiam* &c., quibus sua substituit, ab edicto tamen principio aliundè deflectens admissis *Mammeâ*, *Basellâ*, *Yuccâ*, *Hurâ*, *Tulipâ*, *Curcumâ*, *Genipâ* &c.



tabile <sup>a</sup>, simplex, non geminatum aut ex geminato malè compositum <sup>b</sup>, non fefquipedale nec barbarum aut malèsonum <sup>c</sup>, nominans <sup>d</sup> potiùs quàm significans <sup>e</sup>, generi proprium non alteri corpori commune <sup>f</sup>, non syllabæ unius additione aut detractiōe

<sup>a</sup> Qui novum genus constituit, eidem nomen imponere tenetur, & nomen genericum dignum, alio licèt aptiore non permutare licet, edicente Linnæo *Phil. Bot. n. 218. 243*, & annuente Botanicorum choro. Legem tamen sæpè infregit ipse legislator, imitantibus aliis. Nulla enim causa manifesta est cur nova aut antiquiora substituerit nomina pluribus à Tournefortio datis aut consecratis, qualia sunt *Abutilon, Acacia, Balsamina, Buglossum, Brunella, Bugula, Caprifolium, Casia, Cassida, Cataria, Elychrysum, Lappa, Mandragora, Pimpinella, Rapuntium, Sphordylium, Stramonium, Syringa, Tamariscus, Tamnus, Terebinthus, Thymelæa* &c. Quorumdam vulgò usitatorum restitutio visa fuit opportuna, parciùs tamen agenda, ne delicti labes in censorem ipsum transferatur.

<sup>b</sup> Ut *Corona Solis, Virga aurea, Dens Leonis, Lingua cervina, Lauro-cerasus, Corallodendron.*

<sup>c</sup> Ut *Hypophyllocarpodendron, Stachyarpagophora, Jabotapita.* Similia quædam ex Aubletio aliisque nunc mutuamur rudia nimis & in posterum leviganda, dùm de certâ horum generum fabricâ constiterit.

<sup>d</sup> Nomen genericum utpotè non necessariò significans, arbitrium ideò dari potest, 1°. poëticum ut *Adonis, Narcissus, Hyacinthus, Amaryllis, Circea*; 2°. divinum aut regium, ut *Serapias, Atropa, Mercurialis, Lyfimachia, Artemisia, Helenium*; 3°. ex inventoribus aut primis nunciis ut *Nicotiana, Cinchona, Sarracenia*; 4°. ex Botanices fautoribus ut *Eugenia, Borbonia, Bignonia, Cliffortia*; 5°. ex peregrinatoribus ut *Banisteria, Lippia, Gundelia, Commerfonia, Dombeya*; 6°. ex Botanicis optimis ut *Gesneria, Columnea, Cesalpinia, Bauhinia, Morifonia, Tournefortia, Plumeria, Dillenia, Linnaea, Jussiaea, Halleria, Adansonia, Jacquinia* &c. quarum appellationum à Tournefortio primùm rarissimè admissarum & tunc honorificarum numerus increvit in infinitum abutente Linnæo, ita ut eviluerit decus indè confectarium, cuilibet nunc concessum Botanophilo.

<sup>e</sup> Indè delenda ipsius *Gloriosa, Mirabilis, Impatiens*, verba verè adjectiva, & idcirco substantivis pejora. *Phil. Bot. n. 235.*

<sup>f</sup> Ut *Ephemerum, Onagra, Elephas, Auricula, Sagitta, Bursa.*



alteri nomini conforme aut comparativum <sup>a</sup>. Nomen specificum fit pariter simplex ac facile, sed prætereà significans, præcipuè desumendum ex solido caractere speciem à congeneribus distinguente & tunc verè *specificum* <sup>b</sup>, aut eo deficiente interim undequaque eliciendum, nempe ex solo, regione, tempestate, duratione, colore, sapore, odore, usu &c., tunc deterius *triviale* dictum<sup>c</sup>.

Descriptio vel est partialis vel universalis : hæc propria Monographis unicam plantam describentibus aut peregrinatoribus de vegetantis hætenus incogniti genere incertis, singulas nominatim recenset partes ordine uniformi (ne quædam omittantur), nempe radicem, caulem, folia, inflorescentiam, calicem, corollam, stamina, pistillum, fructum & semina, easque omnes ratione existentiae, sitûs, numeri, connexionis, figuræ & proportionis, additis insuper habitu, patriâ, solo, vernaculo nomine & usu. Descriptio partialis usitatio altera genericos, altera específicos delineat caracteres eodem ordine, nunc prolixior in dissertationibus & phytographiâ partiali, nunc in universali contractior dissimilia tantum proferens signa præcipua, qualis in nuperiori Linnæano systemate habetur generum adumbratio & descriptoria phrasis specifico nomini adjecta. Eæ autem compendiosæ Botanicorum descriptiones sæpè peccant pravo caracterum delectu, essentialium omissione, comparabilium defectu, indicatione non sufficiente, quas igitur iterum atque iterum reconcinnare opus est. His subjicienda sunt non sine emolumento *synonyma* seu diversa nomina ab Autoribus præcipuè primariis <sup>d</sup> eidem

<sup>a</sup> Nomina comparativa alia syllabam præmittunt, ut *Linagrostis*, *Pseudodiētamnus*, *Chamæcerasus* &c., alia eandem postponunt, ut *Asteroides*, *Plantaginella*, *Myrtillus*, *Salicaria*, *Alsinastrium*, *Juncago* &c.

<sup>b</sup> Ut *Fumaria vesicaria*, *Fumaria bulbosa*, *Pyrola umbellata*, *Pyrola uniflora*, *Hordeum distichum*, *Hordeum hexastichum*.

<sup>c</sup> Ut *Veronica arvensis*, *Eryngium maritimum*, *Circæa Lutetiana*, *Leucotium vernum*, *Iva annua*, *Lamium album*, *Mentha piperita*, *Viola odorata*, *Anchusa officinalis*, *Saturcia hortensis*, *Myagrum sativum*, *Pastinaca oleracea*.

<sup>d</sup> Qui in Autorum prolatione præcipuos aut utiles quolibet conficiunt



plantæ impofita, quibus velut ariadneo filo anteaكتورum explatur laborum difquifitio, patent vitandi errores, merita inclarefcunt & fuum cuique tribuitur. Plurimum etiam ftudio confert Ichniographia feu plantarum repræfentatio æri incifa, non officiofè mendax fed genuina ac fimplex, descriptionibus potior in habitu exprimendo. Prifcorum icones pleræque vitiofæ, Récentiorum accuratiores, è quarum numero præcipuæ feligantur fynonymis admifcendæ, aut in novis plantæ nondum delineatæ mox incidantur. Sic nomenclatione facili, accuratâ descriptione, fynonymiâ certâ & iconibus nitidis folida perficitur plantarum designatio & earum tum specifica tum generica cognitio confirmatur.

Classes &  
Systemata.

Quæ autem fpeciebus confociandis prævaluère principia à Botanicis edicta, eadem conficiendis generum claffibus fimili jure fed contractiora profuerunt. Ut enim generica conftitutio præcipuos elicit fpecierum caracteres, fic claffica primarios delibat in genericorum ferie. Indè specificæ in omnes, genericæ in quafdam, clafficæ in pauciffimas partes diffunduntur notæ. Progrediens fcientia fimplicioribus fimul & præftantioribus utitur fignis: genericas designationes integra fructificatio, clafficas unica ferè ejufdem pars fuppeditat, legem præfentiente Cæfalpino, Morifonio partim exequente, firmiùs fanciente Tournefortio, confirmantibus aliis, iterum & ftrictiùs promulgante Linnæo. Hæc diftributionis norma Veteres latuit qui organis minùs perfpectis fuas ex habitu, loco, diuturnitate, florationis tempore, ufu medico &c. <sup>a</sup> ordinationes deduxerant. Ubi primùm fruc-

---

omittit, ipsis & fcientiæ & fibi nocet. Sic defuit Linnæus, vir cum Tournefortio Botanicus Princeps, dùm hujus neglectâ fæpiùs Synonymiâ & mutatis nominibus, oculis omnium quafi fubduxit æmulum quem non obfcuraverat: tantus amor indivifæ laudis!

<sup>a</sup> *Orthodoxos* dicit Linnæus Autores ex fructificatione methodum defumentes qui funt *Fructifæ*, vel *Calicifæ*, vel *Corollifæ*, vel *Sexualifæ*; *Heterodoxos* ab alio principio Vegetabilia diftribuentes, quales habentur *Alphabetarii* ordine alphabetico, *Rhizotomi* à radicis ftructurâ, *Phyllophili* à foliorum fpeciebus, *Phyfiognomoni* ab habitu,



ificationis præstantia veris innotuit Botanicis, singulus suo arbitrato partem in eâ manifestiorem aut præcipuis characteribus multiplicandis aptiorem elegit. Sexubus nondum cognitis, alii fructum, alii calicem, alii corollam præposuere, suo modo superstruentes unicuique methodum variè dispositam ac verè systematicam.

Utilitas methodi ea est ut genera species similes connectentia, in sectiones notis secundariis designatas convocata, ulterius congregata in classes ex nonnullis sectionibus compositas signoque definitas primario ac simpliciore, ordinationis hujus beneficio facile dignoscantur dato caractere, & incunctanter nomine proprio salutentur. Sic quilibet in exercitu miles mox reperitur, cognitis hujus legione & turmâ & manipulo & contubernio. Sed eæ plantarum distributiones methodicæ in tantum valent, in quantum naturales & faciles & uniformes habentur: 1º. Qui enim naturæ sedulo parent Botanici in individuorum & specierum connexionem, ab eâ nimium recedere erubescunt in generum approximatione, quorum dantur plurimæ series apprimè naturales omnibus acceptissimæ, aliis *ordines naturales*, aliis *fragmenta naturalia* dictæ. Harum nonnullas methodus quælibet servat indivisas, eò perfectior habita tacito naturæ jussu, quò plures admiserit. 2º. Explanandæ tamen scientiæ studiiq; contrahendi cupido Methodicos à naturâ sæpè detorquet, notitiam facilem universaliore præponentes, quibus plantam præsertim nominasse, minus ex integro novisse expedit: indè omnes requiruntur systematis divisiones non confusæ nec ambiguæ, sed distinctissimæ & perspicuæ & intellectu faciles, signis manifestis & constantibus innixæ. 3º. Aliqua insuper laus tribuitur systemati cujus primariæ omnes ex eodem organo & secundariæ ex altero divisiones eruuntur ita circumscriptæ ac solidæ, ut uno quasi tenore diffuentes & expeditæ, exceptionem nullatenus aut rarissimè admittant.

---

*Chronici* à tempore florendi, *Topophili* à loco naturali, *Empirici* ab usu medico, *Seplasiarii* à Pharmacopæorum dispositione. *Phil. Bot.* n. 25-31.



Hæ sunt compositionis systematicæ præceptiones, arbitrariæ quidem & naturæ partim repugnantes, sed in scientiâ adhucdum incertâ utiles, quas nunc severè contractas, nunc remissiores quilibet ad nutum variè interpretatur. Plurima exindè prodierunt ex intervallo systemata, singula laude digna & certa Autorum ingenii ac doctrinæ indicia, nulla tamen prædictis omninò conformia regulis, sed ab iisdem plus minùsve discedentia, quæ hinc diversis addicta partibus diversos earum modos plurimasque retegunt affinitates magno scientiæ emolumento, illinc ex adverso instabilibus innixa principiis arbitrariæ legis vitium scientiæque artificialis tenuitatem evidenter manifestant. Singulari omnium judicatione confirmaretur præmissæ assertionis veritas, sed in iis figillatim sistendis ac discutiendis <sup>a</sup> immorari non expedit, ne nimium producat sermo contrahendus & in alias utiliter convertendus meditationes. Sufficiet utcunque systematum inter omnia certò præcipuorum, Tournefortiani nempe & Linnæani, sincera expositio & collatio mutua & æqua perpen-satio, quibus ex integro cognitis patefcent utriusque commoda & incommoda, ac subindè totius simul systematicæ doctrinæ utilitas & merita stabiliter definientur.

Tournefor-  
metho-

Qui primus aptiora construxit genera Tournefortius in horto

---

<sup>a</sup> Quindecim enumerantur à Linnæo (*Class. Plant.*), disposita ratione organi methodum præcipuè definientis. Suos à fructu præprimis deprompsere characteres Cæsalpinus anno 1583, Morisonius 1680, Raius 1682, Christoph. Knautius 1687, Hermannus 1690, Boerhaavius 1710; à calice Magnolius 1720, Linnæus 1737; à corollâ Rivinus 1690, Tournefortius 1694, Christian. Knautius 1716, Ruppius 1718, Pontedera 1720, Ludwigius 1737; à staminibus & plantarum sexu Linnæus 1735. Singula hæc in prædicto opere systemata seorsum aptè delineantur facili negotio percipienda. Adansonius eadem commemorat (*Famil. Plant.*), additis aliis recentioribus exaratis à Royeno 1740, Hallero 1742, Morando 1744, Seguerio 1745, Wachendorffio 1747, Heistero 1748, Gleditchio 1749, Allionio 1762 &c., quibus suos addit numerosos distributionum modos, eâ nimirum mente ut simul & exemplo & præcepto confirmaret facilem nimis dari posse ordinationis arbitrariæ multiplicationem.



Parisiensi Professor ab anno 1683 ad 1708, primus etiam generalem methodum rectè delineatam, præmissis longè præstantiorem & Botanicis acceptiorem exhibuit. De studio explanando & plantis idcirco commodè ac æquabiliter ordinandis præsertim sollicitus, suæ fundamentum distributionis posuit in corollâ ( seu, ut ait, flore ) utpotè manifestiore, apud vulgum præstantiore & plurimos sufficiente characteres facilè observandos, scilicèt existente aut nullâ, simplici aut intrâ calicem communem multiplici seu compositâ, monopetalâ aut polypetalâ, regulari aut irregulari. A Veterum tamen institutis nondùm omninò deflektens, antiquam præposuit herbarum & arborum distinctionem, non uni severè addictus parti, & deîn classes herbaceas septemdecim, quinque arboreas protulit. Prima harum & illarum partitio datur in petalodes seu corollâ instructas & apetalas eâdem orbatas, secunda petalodum in simplices & compositas, tertia simplicium in monopetalas & polypetalas, quarta utrarumque in regulares & irregulares; quinta ex diversâ omnium formâ deducitur. Altera in Apetalis & Compositis habetur divisionis ratio infrâ memoranda.

Præmissis igitur herbaceis petalodibus simplicibus prodeunt in primâ classe corollæ monopetalæ regulares *Campaniformes* seu campanæ patentis aut tubulosæ aut globosæ formam æmulantes; in secundâ eâdem regulares *Infundibuliformes* seu infundibulo aut hypocrateræ aut rotæ conformes; in tertiâ eâdem irregulares *Anomalæ*, formâ plurimùm variæ, fructui capsulari præmissæ; in quartâ eâdem irregulares *Labiata* seu limbo quasi bilabiato, fructu prætereà tetraspermo nudo; in quintâ corollæ polypetalæ regulares *Cruciformes*, seu tetrapetalæ petalis in crucem decussatis; in sextâ eâdem *Rosaceæ* petalis sæpius quinque, interdùm pluribus aut paucioribus, in Rosam dispositis; in septimâ rosaceæ pentapetalæ *Umbelliferæ* seu pedunculis unifloris in umbellam collectis & fructu infero dispermo nudo; in octavâ polypetalæ regulares *Caryophyllæ*, petalis ex imo calice tubuloso emerfis longiùs unguiculatis, ut in Diantho seu Caryophyllo vulgatiùs dicto; in nonâ eâdem *Liliaceæ* seu Lilio conformes, tri aut hexapetalæ aut tantùm sexfidæ, fructu supero aut infero semper triloculari; in decimâ polypetalæ irregulares *Papilionaceæ* petalis dissimilibus ( vexillum, alæ, carina ) papilionem imitantibus & fructu supero



leguminoso ; in undecimâ eadem non papilionaceæ sed *Anomalæ* multiformes , non aliter definiendæ. Simplicibus compositæ succedunt corollæ , in calice communi plures aggregatæ & monopetalæ , germini proprio insidentes suprâ thalamum seu receptaculum commune ; nunc in classe duodecimâ omnes *Flosculosæ* seu tubulosæ limbo quinquefido ; nunc in decimâ tertiâ omnes *Ligulatæ* seu tubulosæ & apice hinc fissæ , indè in ligulam productæ ; nunc demùm in decimâ quartâ *Radiatæ* , id est , centrales flosculosæ , marginales ligulatæ radium constituentes. Subeunt posthac Apetalæ , aliæ in decimâ quintâ classe *Stamineæ* flore (calix & stamina) & fructu instructæ , aliæ in decimâ sextâ *Flore carentes* non semine , aliæ in decimâ septimâ *Flore & fructu carentes*. Arborea fruticibus junctæ sunt in decimâ octavâ apetalæ simpliciter *Stamineæ* , in decimâ nonâ apetalæ *Amentaceæ* floribus stamineis & prætereà instar caudæ felinæ suprâ amentum seu axim communem spicatis , in vigesimâ *Monopetalæ* , in vigesimâ primâ polypetalæ *Rosaceæ* regulares , in vigesimâ secundâ polypetalæ irregulares *Papilionaceæ*. Classium sectiones designantur nunc ipsâ corollæ formâ aut florum dispositione aut rariùs plantarum habitu , nunc sæpiùs fructu supero aut infero , simplici aut multiplici , baccato aut capsulari , uni aut multiloculari , mono aut polyspermo.

Sic perficitur methodus principiis simplicibus & signis manifestis innixa , ideòque facili plantarum ordinationi ac studio conducens , nonnunquàm absque exceptione naturam colligans , admissis in classium numero ordinibus verè naturalibus , quales extant Labiatæ , Cruciformes , Umbelliferæ , Papilionaceæ , Compositæ &c. , pluribus etiam sectiones aliarum classium integras constituentibus. Sed ea cæteris simplicior , aliundè vitiatur 1º. pravâ herbarum & arborum distinctione nullis circumscriptâ certis limitibus , affinia disjungente genera in Rosaceis , Papilionaceis , Compositis , species disgregante congeneres in Araliâ , Bupleuro , Salice , Rubo , Daturâ , Senecione , Genistâ , Coronillâ aliisque benè multis generibus partim herbaceis , partim arboreis frutescentibusve , quæ tamen dissimulante methodo herbis aut arboribus indivisa adduntur ; 2º. ordinatione interdùm vagè designatâ & non semper uniformi , dùm classis una inter apetalas



dicuntur flore non femine carens, & Caryophyllæ ac Liliacæ solo designantur habitu ac quâdam similitudine, & quædam Liliacæ (Hyacinthus, Narcissus, Gladiolus) certò non polypetalæ cognatis admiscuntur polypetalis favente lege naturali, systematicâ refragante; 3°. improbo caracterum in corollâ infimorum defectu præcipuis posthabitis, dùm constans corollæ situs vix sectionibus designandis adhibetur, & varias ejusdem forma classes definit in Campanulatis, Infundibuliformibus, Anomalis &c., affines subindè segregat Campanulam & Lobeliam, Rubiam & Rubeolam, Cerinthem & Pulmonariam &c., discordes connectit Araliam & Asparagum, Lobeliam & Aristolochiam, Butomum & Helleborum, Violam & Orchides, Paridem & Cruciferas &c.; 4. pauciorum caracterum enumeratione, iis tantùm prolatis systematico more, quæ speciei ad summum distinguendæ ac nominandæ sufficiunt, cæteris omissis; 5°. integumento florali certè secundario & tamen in primarium organum malè constituto classicosque suppetente characteres, dùm organa sexualia verè primaria, nempe stamina & styli, omninò prætermissa ne sectionibus quidem definiendis impenduntur.

Ex dictis p. xxj. Tournefortius ignotâ sexuum actione stamina respuerat, quorum præsentiam posthac manifestam si novisset priùs, ea certè in usum botanicum evocata perfectiori generum & classium fabricæ adhibuisset. Utiles in classibus delineandis stamineos characteres animadverterat Burckardus, in eâ cogitatione subsidens. Ultrà processit Linnæus Professor Upsaliensis ab anno 1741 ad 1778, & confirmatâ organorum sexualium dignitate, suum exstruxit systema sexuale dictum, cujus characteres sectionum sæpius ex pistillo, classium semper ex staminibus depromuntur. In his perpendit numerum & proportionem & connexionem mutuam & conjugationem cum pistillo, & occultationem & quandoque situm: undè viginti quatuor exurgunt classes, singulæ ratione numeri germinum aut styliorum multipartitæ.

Sic priores undecim classes numero staminum definito (ab uno ad duodenarium, undenario nunquàm existente) & appellatione conformi græco-latinâ designantur, dictæ *Monandria*, *Diandria*, *Triandria*, *Pentandria*, *Hexandria*, *Heptandria*, *Octandria*, *Enneandria*, *Decandria*, *Dodecandria*. Ad *Icosandriam* subsequentem

Linnæi systema.



referuntur stamina plura, sæpè viginti, calici inserta; ad *Polyandriam* adjunctam eadem verè indefinita ac numerosa, calici non inserta. Habitâ dein ratione proportionis staminum, nomine *Didynamia* & *Tetradynamia* seorsum adstant in classe decimâ quartâ & quintâ plantæ tetrandræ & hexandræ quarum stamina duo aut quatuor duobus cæteris longiora sunt. Posthac perpensâ eorum connexionem, filamentis in unum aut duo aut plura corpora conatis triplex datur classis, nempe *Monadelphia*, *Diadelphia* & *Polyadelphia*; ex antheris in cylindrum coalitis unica eruitur *Syngenesia* dicta. Ponè subit *Gynandria* cujus stamina cum pistillo concrescunt aut eidem insident. Præteritâ in vicinis classibus florum hermaphroditorum seu bisexualium serie, prodeunt unisexuales masculi aut foeminei, quos nunc eadem plantâ mixtos profert in *Monoëciâ*, nunc distinctæ plantæ gerunt in *Dioëciâ*, nunc interdum quædam promiscuos habent cum hermaphroditis in *Polygamiâ*. Congeruntur demum in *Cryptogamiâ* plantæ quarum flores & ideò stamina præ tenuitate nondum aut minus innotescunt, obscuratâ simul sexuum actione. Classium diversæ sectiones plerumque definiuntur germinum aut stylium numero, communi horum & illorum denominatione dictæ *Monogynia*, *Digynia*, *Trigynia*, *Tetragynia*, *Pentagynia* . . . *Polygynia*. Interdum distinguuntur floribus variè polygamis; seminibus nunc *gymnospermis* nudis, nunc *angiospermis* pericarpio tectis; fructu siliquoso aut sili culoso; ipsomet staminum numero dum classi designandæ non præfuit.

Systematis hujus ut & præcedentis aliæ sunt laudandæ partes, aliæ redarguendæ. Præ cæteris uniforme & accuratum & uni principio addictius, omnes ex unicâ parte classicos eruit characteres ita delineatos ac circumscriptos, ut facili negotio percipiantur & plantis omnibus ordinatè distribuendis ac sine præceptore agnoscendis conducant. Quædam insuper hujus classes ferè omninò naturales habentur, ut *Tetradynamia*, *Monadelphia*, *Diadelphia*, *Syngenesia*. Sed 1º. systema tenuissimis interdum innititur organis, oculo armato & acu divellente tunc difficilius observandis, ignoscendo tamen vitio molestiam tantummodò & erroris metum inducente. 2º. Præterea arbitrarium systematico more, dum multiplicatis classibus omnes earum designationes ex unicâ parte



parte mollior deprimere, tunc solidorum caracterum penuriam, essentialibus promiscue addit inconstantes quos etiam utpotè numerosiores frequentius usurpat, prioribus plerumque neglectis. Indè primarias ex flaminum numero & proportionem notas minus stabiles deducens, discordes in iisdem sectionibus congerit plantas, in Diandriâ Piper & Jasminum, in Triandriâ Tamarindum & Iridem, in Tetrandriâ Rubiam & Evonymum, in Pentandriâ Primulam & Coffeam, Ulmum & Cicutam, in Hexandriâ Berberidem & Hyacinthum, in Octandriâ Tropæolum & Ericam, in Decandriâ Malpighiam & Alfinem, in Polyandriâ Chelidonium & Tiliam &c. Affines aliundè fecernit didynamas à tetrandris, Chloram à Gentianâ, Blitum à Chenopodio, Ericam ab Andromedâ, Centunculum ab Anagallide, Canarinam à Campanulâ, Myosurum à Ranunculo, Sibbaldiam à Potentillâ, Sempervivum à Sedo, Cassinem ab Illice, Labiatis diandras à didynamis, Gramineas triandras ab hexandris &c. 3°. Staminum numero sic discrepant non tantum genera cognatissima in systemate sejuncta, sed & species congeneres ab invicem dimoveri nesciæ, in Convallariâ, Polygono, Riviniâ, Verbenâ, Gentianâ, Valerianâ, Rubiâ, Lepidio, Geranio, Ceraffio, Lino, Tillæâ, &c., quarum arctiorem nexum non solvit systema, exceptionibus ideò deturpatum & minus uniforme. 4°. Simile, licet multò rarius, diversos ejusdem plantæ flores obsidet numeri discrimen in Monotropâ, Chrysofplenio, Adoxâ, Trientali, Disandriâ, Rutâ aliisque indè difficilius ordinandis & staminei hujus caracteris instabilitatem confirmantibus. 5°. Quædam sterilescunt aut & supprimuntur stamina in Bignoniâ, Gratiolâ, Chelone &c., abortu inveterato plantarum ordinationem immutante. 6°. Gynandria parum à præmissis (præcipue à Monandriâ) discrepat classibus, in eas optimè refundenda, & insuper plantas pauciores verè gynandras complexa. 7°. Nec servandæ classes sexuum discessione insignes, cum multæ monoicæ aut dioicæ & omnes polygamæ plantæ tales habeantur solo partium abortu, veris hermaphroditis rectius confociandæ.

Si methodus facilis & magis Naturæ sequax indè judicetur perfectior, Tournefortiana cæteris præstat, utpotè naturales affinitates minus subvertens, manifestioribus usa signis & in decursu

Circumscripta systematum utilitas.



expeditior. Linnæani systematis ordinatio nonnunquam operosa; designationes interdum difficiles & frequentior plantarum dissidentium connexio. Sed illud magis circumscriptum, certius definitum, signis innixum sedulo exaratis & ex unâ parte primariâ depromptis, numerosiori superbiens Vegetantium agmine sub iis ordinatim militante & rarius devio, meliori ditatum descriptione ac nomenclatione tum genericâ tum specificâ, pluribus abundans commodis, ideo prævaluit universo ferè Botanicorum consensu. Hæc autem systemata arbitrariò constructa, scientiam exhibent fictitiâ non naturalem & plantis non penitus cognoscendis sed tantum compendiosè definiendis ac certò nominandis addictam. Habenda sunt igitur quasi præludia botanica, aut repertoria aptè digesta, indicesque non alphabetici, alii aliis commodiores, in quibus, secundum signa in faciliorem propriæ investigationis laborem mutique Botanicorum commercii nexum admissa, pacto ordine disponuntur plantæ, donec felicius iteratâ meditatione in seriem verè naturalem distribuantur.

Verum  
scientiæ  
propositum.

Ex præmissis innotescunt plantarum partes & functiones & partium differentiæ & characteres indè confectarii. Noscuntur etiam specierum generumque designationes & appellationes & simul aptiores utrarumque perficiendarum modi. Neminem insuper præterit hinc plantarum ordinationis necessitas, illinc arbitraria ac imperfecta systematum hucusque ordinantium compositio, artificialis non genuina, veris affinitatibus proferendis nullatenus accommodata & utilem tantummodò verioris scientiæ prospectum exhibens. Ea novo sub aspectu nunc considerata, non factitiis sed immutabilibus subjicitur legibus quas Natura in plantis apertè insculpsit, cuilibet assiduo observatori manifestas. Botanicum diù delusit errans aut vaga nimis definitio <sup>a</sup> scientiæ

---

<sup>a</sup> Botanices pars prior in rectâ plantarum cognitione sita est... Plantas apprimè nosse aliud nihil videtur, quam in promptu habere nomina quæ iis aptè imposita sunt. *Tourn. Isag. p. 1*... Botanica est scientiæ naturalis pars, cujus ope felicissimè & minimo negotio Plantæ cognoscuntur & in memoriâ retinentur. *Boerh. Hist. 16*... Botanica est scientia naturalis quæ Vegetantium cognitionem tradit. *Linn. Phil. Bot. n. 4.*



quæ dùm plantis tantummodò designandis ac nominandis incubuit, characteres solos excerpfit ad hanc designationem necessarios cæteris omiſſis, & tunc in generum ſpecierumque determinatione atque nomine ſæpiùs anceps ac ſibi non ſimilis, apud vulgum viſa fuit ſcientia meræ nomenclationis, non menti ſed memoriæ exercendæ præprimis idonea. Cum autem ſincerus naturæ contemplator, ipſam in plantis explorans, teneatur integram earum organiſationem ſcrutari ac evolvere, omnes ideò proſequitur characteres, & neglectâ methodo pauciores memorante, eam tantùm inquiriſt quæ nullos omittens & mutuas omnium deprehendens affinitates, abſolutam plantarum cognitionem ſuppeditat.

Hæc dudùm quæſita ordinatio <sup>a</sup>, inter omnes longè præcipua, Methodus naturalis. ſola verè uniformis ac ſimplex, affinitatum legibus conſtanter obtemperans, eſt *methodus* dicta *naturalis* quæ omnigenas connectit plantas vinculo indiviſo, & gradatim à ſimplici ad compositam, à minimâ ad maximam continuatâ ſerie procedit, quaſi ſimilis catenæ cujus annuli totidem ſpecies ſpecierumve fasciculos præſentant, aut compar mappæ geographicæ <sup>b</sup> in quâ ſpecies pagorum inſtar diſtribuuntur per territoria & provincias & regna. Ex unâ parte quemlibet annulum cum duobus tantùm vicinioribus cohærentem admittens plantarum circumſcribit affinitates, ex alterâ eaſdem amplificat & ſingulas ſpecies aut genericas clafficaſve ordinationes pluribus ambientibus æqualiter conterminas exhibet. Utcunque ſe res habeat, genuinæ plantarum connexionis & præſtantiffimæ hujus methodi exiſtentiam ac digni-

<sup>a</sup> Claffes quò magis naturales, cò cæteris paribus præſtantiores ſunt. Summorum Botanicorum hodiernus labor in his ſudat & deſudare decet. *Methodus naturalis* hinc ultimus finis Botanices eſt & erit. *Linn. Phil. Bot. n. 206.* Primum & ultimum in Botanice quæſitum eſt *methodus naturalis*. Hæc adeò à Botanicis minùs doctis vili habita; à ſapientioribus verò tantum ſemper æſtimata, licet detecta nondùm... Diu & ego circa eam inveniendam laboravi, benè multa quæ adderem obtinui, perficere non potui, continuaturus dùm vixero. *Linn. Claff. pag. 485.*

<sup>b</sup> Natura non facit ſaltus. Plantæ omnes utrinque affinitatem monſtrant, uti Territorium in Mappâ geographicâ. *Linn. Phil. n. 77.*



tatem tacitè aut palàm agnoscunt Botanici principes tum antecessores tum & hodierni, quorum aut labores ad hujus disquisitionem spectant, aut systematicæ classes ipsam imitantur, sæpè tamen improspéro exitu suscepti operis difficultatem arguente.

Diversos inter Autores qui feliciùs in investigandâ methodo naturali defudârunt, præcipui dantur Linnæus, Bern. Jussæus & Adansonius. Fragmenta naturalia primus edidit Linnæus anno 1738 (*in Class. Plant.*), pluriùsque dein emendavit, nullam tamen eorum fabricæ ac dispositionis rationem adjiciens. Ordines naturales jampridem consultè elaboratos anno 1759 Jussæus disposuit in horto regio Trianonensi, quos sibi minùs fidens nunquàm antea promulgaverat<sup>a</sup> nisi in familiaribus colloquiis, nec posthac ausus est prelo subicere, utpotè nondùm ipso judice satis confirmatos. Anno 1763 plantarum Familias principiis in præfatione expositis superstructas protulit Adansonius. Singulis Autoribus suæ sunt tribuendæ laudes quas tamen hic enarrare ac judicio confirmare nondùm expedit, cum antea tradendæ sint leges methodi naturalis, quibus ritè perpensis & in perpetuum consignatis, dein virorum labores æquiùs judicabuntur eorumque merita certiùs eminebunt.

Methodi  
naturalis o-  
bices.

Methodus naturalis, verum & optimum scientiæ propositum, Botánicos latuit & adhuc partim latet defectu cognitionis plantarum omnium ordinandarum & principiorum ordinantium. 1º. Entium reverà nequit continuata stabiliri series, nisi priùs innotuerint omnia. Quotidianis profunt inventis peregrinationes botanicæ; exotica tamen fortè supersunt plura detegenda quàm dantur detecta, nec unquàm speranda omnium existentium absoluta cognitio. Sed cunctæ licèt nondùm sint exploratæ telluris regiones, cæteræ nihilominus à Geographis in mappâ sedulò notantur suo quæque loco dispositæ. Quamvis etiam numerosi in catenâ desint annuli procul dispersi, plures habentur facilè connectendi in diversas catenæ partes quæ posthac diverso tempore novis annulis intermediis junctæ, paucioribus sensim spatiis intervacantibus distin-

---

<sup>a</sup> Ut autem integer tantì viri labor innotescat & cum cæteris conferatur, memorati ordines hic in proæmii fine transcribuntur, quales exhibuit tum in horto Trianonensi, tum in indice propriâ manu exarato.



uentur. Methodus ideò catenam aut mappam æmulans pariter est elaboranda, non obstante generum exoticorum penuriâ. 2º. Nec valet impedimentum ex difficili principiorum naturalium investigatione deductum: ea enim extant plantis arctissimè inhærentia & cuique observanti facilè obvia, quæ duplici possunt explanari ratione nunc vicissim prosequendâ, ut altera alterius sit quasi confirmatio.

Prima ac communior datur progressio ascendens à cognitis simplicibus ad composita incognita, & ex uniformi ac concisâ observationum & enuntiationum serie vera absque gravi negotio eruuntur methodi naturalis principia. Ejusdem  
assequenda  
prima ratio

Sic noscitur primùm species propriis definita signis, entium simillimorum adhæsiō, nunquàm dividenda sed simplex unanimi consensu, simplex jubente primariâ Naturæ lege perspectissimâ quâ *in unam speciem colligenda sunt vegetantia seu individua omnibus suis partibus simillima & continuatâ generationum serie semper conformia*, ita ut quodlibet individuum sit vera totius speciei præteritæ & præsentis & futuræ effigies. Certa speciei  
cognitio.

Quæ autem in unam compellit speciem individua omninò parilia, eadem specierum similibus adjunctionem æquo jure lex determinat. Nam pariter, nemine dissentiente, *consociandæ sunt species majori characterum numero conformes*, ac ideò dimovendæ quæ pluribus differunt signis. Hæc prior connexionum ratio primam exhibet affinitatum trutinam quâ examinantur species quælibet in eundem fasciculum congregandæ. Genus indè constituitur, specierum similibus congeries, cujus tamen nulla traditur definitio certa nec accurata constructionis præceptio, præcipuè in methodo naturali. Ea siquidem, à systematicâ plurimùm abudens, non strictos generibus limites assignat, sed omnes nexu insensibili connectit species servatâ affinitate, quas deîn scientiæ concinnandæ causâ, cæsuris ferè arbitrariis in distincta compingit genera, pluribus aut paucioribus ad libitum ditata speciebus, & dicenda verè naturalia dùm affines non segregant nec universam disturbant seriem. Specierum  
affinium  
connexio  
generica.

Plurima insuper Naturæ minùs occultatæ vestigia passim impressa manent, observatorem non eludentia, cæteris persequendis ac totius progressionis manifestandæ præprimis utilia. Nimirum



extant genera quædam apprimè naturalia nemine refragante, ut Aconitum, Delphinium, Ranunculus, Scabiosa, Geranium, Gentiana, Valeriana, Rosa &c., quibus sigillatim perpenfis verus genericæ constructionis modus apparebit, undè cætera possint ad horum exemplum certò constitui. Sic Rosa est genus fruticosum, alternifolium & stipulaceum, calice urceolato quinquefido, pentapetalum & polyandrum petalis & staminibus calicis fauci insertis, polygynum germinibus in eodem calice latentibus & singulis stylo laterali ac stigmate simplici instructis, feminibus totidem calice baccato tectis, corculo seminum recto, perispermio nullo. Singulæ generis species præcedente designatione conformes, inter se discrepant calice ovato aut globofo, lævi aut echinato, ejusdem divisuris modò partim appendiculatis & partim nudis, modò rariùs omninò nudis, petalorum formâ & colore & magnitudine, seminum figurâ & numero, caule elato aut humili, inermi aut aculeato, foliis pinnatis aut rarissimè simplicibus, foliolorum numero & formâ, floribus solitariis aut subcorymbosis &c. Valeriana, alterum genus herbaceum, oppositifolium, floribus instruitur corymbosis, calice supero, corollâ epigynâ monopetalâ tubulosâ & ad limbum quinquefidâ, staminibus epipetalis definitis, germine infero simplici monostylo, fructu submonospermo, corculo ascendente recto, perispermio nullo. Differentias hujus specificas constituunt caulis humilis aut assurgens, folia variè figurata, simplicia aut pinnata, corymbus florum densus aut laxus, calix integer aut dentatus, corolla basi calcarata aut gibba, limbo regularis aut irregularis, stamina & stigmata numero varia, fructus nunc papposus monospermus, nunc loculofus bi aut trispermus apice dentatus. Seu genus illud in geminum dispescatur ratione fructûs, seu indivisum persistet, hujus diversæ nequeunt ab invicem dimoveri species in serie naturali.

Ex eâ Rosæ & Valerianæ caracterum enumeratione concludendum certè 1<sup>o</sup>. eosdem non esse semper genericos, sed quosdam dari in generibus constantiores ut situs partium &c., quosdam nunc stabiles nunc varios ut forma & numerus &c.; 2<sup>o</sup>. plures ex fructificatione & nonnullos extrâ eandem desumptos dari conformes in speciebus congeneribus; 3<sup>o</sup>. in iis inconstantes esse tum plurimos à fructificatione alienos tum & quosdam huic



proprius. Omnes igitur huius characteres non jure præficiendi sunt cæteris extrâ prodeuntibus: foliorum enim situs nunc vincit in Rosâ formam calicis, nunc in Valerianâ ipsimet flaminum numero præstat. 4°. Prætereà cum characteres habeantur alii plerumque mutabiles, alii alternatim stabiles aut varii, alii stabiliiores, diversè ideò ordinandi sunt ratione constantiæ & in recensione non numerandi sed ponderandi, ita ut suus cuique constituatur gradus & *unus constans pluribus inconstantibus compar aut & superior evadat.*

Placitum illud, observatione confirmatum & inter leges verè naturales reponendum, priori additur legi quâ *consociandæ sunt plantæ majori characterum numero affines*; & ex his duabus congruenter expositis ac amplificatis integra pendet genuinæ plantarum distributionis norma. Qui pluribus æquipollet unus character, is in genere semper est uniformis; qui paucioribus, valet interdum; qui paucissimis, speciei definiendæ tantum impenditur: indè foliorum situs, inter characteres semistabiles ordinandus, genericæ nonnunquam designationi prodest, æquo jure cum semistabilibus fructificationis signis. Non sufficit tamen characterum partitio triplex; unaquæque plurimos admittit gradus ægrè definiendos, optimusque Botanici Naturam sectantis labor is erit, ut characterum omnium momenta perpendat, suum singulis locum daturus immutabilem; sed solâ generum verè naturalium mutuique eorum consortii assiduâ meditatione hæc ardua poterit stabiliri gradualis characterum dispositio.

Affinitatum  
leges natu-  
rales.

Postquam confines in suum naturale genus simplex aut partitum fuerunt adactæ species, consimili modo ac eâdem lege neçtenda sunt genera cognata & in ordines congreganda. Hujus autem consociationis exempla in apertum conjiciuntur favente naturâ, nempe ordines certò naturales & spectatissimi, in Systematicorum methodis sæpè indivisi, quales sunt Gramineæ, Liliaceæ, Labiatæ, Compositæ, Umbelliferæ, Cruciferæ, Leguminosæ. Ut præcipui specierum characteres constituendis generibus impenduntur, sic non omnia generum signa sed constantiora tantum designandis ordinibus priora meritò aptantur. Quò generalior enim extat plantarum ordinatio quælibet, cò paucioribus utitur signis definientibus; sancitæ tamen obtemperans

Ordines  
naturales.



legi, ea cogitur præficere quæ præcipua ac valentiora pluribus æquipollent infimis vilioribus. Quod ratiocinio fulcitur axioma, illud observatione multiplici & imprimis ordinum supradictorum commentatione confirmatur.

Diversos inter horum characteres in operis decursu posthac enuntiatos ac ibidem recensendos manifesta datur disparilitas & multiplex æstimatio.

1<sup>o</sup>. Alii siquidem dantur in singulis hisce ordinibus primarii semper uniformes, seu essentialia ex organis essentialibus deprompti, ut insertio staminum seu horum & pistilli mutua dispositio, situs corollæ staminiferæ, lorum numerus in corculo. Unilobum illud semper extat in Gramineis & Liliaceis, bilobum in cæteris. Stamina sunt constanter hypogyna in Gramineis & Cruciferis, epigyna in Umbelliferis, perigyna in Liliaceis & Leguminosis, epipetala in Labiatis & Compositis quarum priores corollâ hypogynâ, posteriores epigynâ instruuntur.

2<sup>o</sup>. Alii secundarii sunt subuniformes, seu generales & exceptione tantum varii, ex organis non essentialibus ideòque interdum deficientibus elicit, ut existentia aut defectus perispermii & calicis & corollæ non staminiferæ, ejusdem structura corollæ utpotè monopetalæ aut polypetalæ, mutuus calicis & pistilli situs, indoles perispermii existentis. Sic corolla sæpius in eodem ordine similiter habita, in Gramineis & Liliaceis nulla, monopetala in Labiatis & Compositis, polypetala in Umbelliferis & Cruciferis & Leguminosis, rarò datur monopetala in Leguminosis, rariùs in iisdem & in Cruciferis deficit. Sic calix in plerisque plantis existens, manifestè tamen deest in Calthâ aliisque paucissimis; idem germi superus in Umbelliferis & Compositis, inferus in Gramineis & Labiatis & Cruciferis & Leguminosis, variat in Liliaceis modò superus modò inferus. Seminis perispermum in Gramineis habetur farinaceum, in Liliaceis corneum, in Umbelliferis ligneum, in Labiatis & Compositis & Cruciferis nullum, in Leguminosis nunc nullum, nunc rariùs quasi existens & carnosum membranâ intimâ seminis incrassatâ ipsum æmulante; undè signum anceps & in novis ordinibus pervestigandum fluctuat inter primaria & secundaria. Idem fortè dicendum de situ corculi intrâ semen & seminis intrâ fructum, signis plerumque stabilibus, sed interdum dubiis & accuratè recognoscendis.



30. Alii tertiarii semiuniformes, modò in ordinibus constantes, modò varii, tum ex organis essentialibus tum ex aliis deducuntur, nempè è calice mono aut polyphyllo, germine simplici aut multiplici, staminum numero & proportionem & connexionem, fructus dehiscentiâ & loculorum numero, foliorum & florum situ, caule arboreo aut herbaceo, aliisque aut similibus aut levioribus notis, quæ seorsum generibus distinguendis aptæ, simul definiendis ordinibus impenduntur. Necessaria inter illas manet instituenda gradatio, cum aliæ aliis sint aut multò aut paulò constantiores. Sed ulterior promoveri nequit earum æstimatione quæ forsàn pauciorum nunc ordinum notissimorum inquisitione illustratur.

Illud tantum in promptu jamjam concludere juvat, nempè distinctas dari characterum cohortes quibus singulis suus est generalis præstantiæ gradus, quæ tamen non certò circumscriptæ extremis inter se cohærent ac quasi complicantur, & posthàc aucto ordinum verè naturalium numero, ampliato observationum campo, multiplicatis probationum rationibus & accuratiori subindè institutâ æstimatione, in plures aptius definitas iterum dividuntur.

Admissâ interim trifariâ characterum genericorum partitione, dispar ex iis deducitur generum affinitas, scilicèt nulla ex solis semiuniformibus minoris notæ, mediocris ex iisdem constantioribus, aliqua ex subuniformibus, major ex uniformibus. Aliundè etiam in instituendis ordinibus verè naturalibus diversa cujuslibet partitionis est habenda ratio: genera enim in iis coordinata consentiunt necessariò characteribus primariis, generaliter secundariis, plurimum tertiariis constantioribus, interdum iisdem instabilioribus. Sic in Cruciferarum ordine primarii uniformes sunt stamina hypogyna & corculum bilobum. Secundarii sunt perspermi defectus, calix existens & germine inferus, corolla hypogyna & polypetala, corculi radícula descendens, semina inserta duplici receptaculo laterali opposito. Tertiarii habentur calix tetraphyllus deciduus, petala quatuor calici alterna, stamina sex tetradynama, germen simplex, fructus siliquosus bilocularis bivalvis, folia alterna, flores non axillares; extant tamen rarissimè calix persistens, flores abortu diandri aut tetrandri, fructus uni aut trilocularis non dehiscens, folia opposita



& flores axillares; undè quidam tertiarii in ordine cæteris minùs sunt constantes, qui tamen seorsùm non simul varii generalem ordinis caràcterem non pervertunt. His prætereà adduntur pauci inferiores quasi quartarii, quibusdam ordinis generibus communes & sectionibus tantummodò constituendis idonei, nempe fructus in aliis longus filiquosus stylo destitutus, in aliis brevis filiculosus monostylus. Tali caràcterum distributione facilis eruitur Cruciferarum designatio. Qui cæteros modo consimili cognitos peruestigabit ordines, eandem perspiciet inter caràcteres progressionem, & tunc confirmatà lege eorum disparilitatem statuente, dùm novis incumbet ordinibus delineandis, generaliora semper præficiet signa, uniuscujusque vim computans. Hæc unica est ordinum fabricationis norma, hæc sola ratio detegendarum affinitatum in quarum disquisitione sincerus Botanicus curam omnem defigit.

Classes naturales.

Ut naturali nexu species in genera coeunt & genera in ordines compelluntur, sic continuatà serie cognati ordines in eandem concurrunt classem. Natura enim ab edictà suà non deficiens lege, diversos plantarum fasciculos in majores semper colligit fasces quas dein iteratà sensim amplificatas connexione, omnes uno demùm complexu coërcet. Cum autem in distributione generali valentiores debeant præponi caràcteres, definiendis classibus ideò minùs conferunt tertiarii solidæ designationi sufficiendæ impares, & rectè antecedunt tum secundarii tum certius primarii, in plantis universales aut uniformes. Sed variant interdum secundarii, primarii constantes habentur: inæqualis igitur extat horum & illorum præstantia, & primariis meritò jus tribuitur definiendi primarias ordinationes. Hi deducuntur ex corculo seminis, ex staminibus & pistillo, ex corollâ staminiferâ. An horum vis eadem & absoluta quatuor organorum æquatio; an potius diversa & organorum & caràcterum primariorum dignitas?

Methodi naturalis assequendæ altera ratio.

In faciliorem quæstionis solutionem præcedentia paucis revolvè expedit inverso ordine, non procedendo à simplicibus ad composita, sed à compositis ad simpliciora, ita ut contracto ratiocinio & congestis observationibus præmissa confirmentur, caràcterum magis ac magis pateat disparilitas & præstantiores su-



peremineant. Huic probationi plurimùm conferunt supràdicti ordines naturales nunc admissi, in quibus tentantur promulgandæ leges botanicæ, accuratiùs conservandæ dùm nulli contradicunt ordini, incunctanter rejiciendæ si vel uni repugnent.

1º. Caractères in ordinibus plurimùm aut nonnunquàm instabiles iis primariò definiendis nullatenùs inserviunt, quia signum in ordinatione partiali varium, in generaliori profectò non valet. Indè ablegantur partes in generibus coordinatis interdùm sæpiùsve non conformes, ut radix, caulis & folia. Radix in Liliaceis nunc tuberosa extat nunc capillacea. Compositarum folia sunt promiscuè alterna aut opposita, simplicia aut pinnata. Leguminosæ & Umbelliferæ in aliis dantur herbaceæ, in aliis fruticantur aut arborescunt. Indè etiam non rectiùs in plantis discernendæ sunt herbæ & arbores quam in Animantibus quadrupedibus Elephas & Mus, in Avibus Struthio & Trochilus. Prætereà caulis & folia quandoque nulla, ideò præcipuas inter partes numerari nequeunt.

2º. Primarii igitur caractères in partibus fructificationis & præprimis in essentialibus delitescunt; indè minùs curantur calix & corolla, quia utrumque illud integumentum minùs necessarium, simul aut singulatim absque noxâ deficit, flore nihilominùs ad generationem apto & ideò perfectò. Horum insuper præcipui quandoque titubant caractères, sociatis in eodem ordine corollis monopetalis & polypetalis, calice supero & infero, monophyllo & polyphyllo.

3º. Exclusis calice & corollâ, jure prodeunt organa sexualia, speciei propagandæ necessaria & ipsi tunc essentialia, quæ si abortu desint in individuo, nihil indè consequitur nisi imperfectum plantæ specimen à naturâ abludens & in universali serie nullum. Hæc vera perfecti floris organa simul conspirant in generationem seminis seu futuræ plantulæ quæ novam germinando ingreditur vitam, ultrà processura donec conformem debito tempore prolem susceperit.

4º. Expleto munere decidunt stamina cum stylis, ad id tantùm utilia ut seminis intrâ fructum reconditi fecundationem operentur aut promoveant. Indè semen aut rectiùs corculum in ipso delitescens, primum junioris plantæ rudimentum, pars est in



Vegetante præcipua ac generalior, ad cujus conformationem & nutritionem & præsidium cætera fructificationis organa concurrunt, posthac arefcentia. Entium progeneratio summum est Naturæ propositum & functio primaria. Hujus apparatus, & sexualium organorum dignitas, & florum ambientium utilitas, & utrorumque post fecundationem aut maturationem prolapsio, seminis tam magnificè elaborati præstantiam arguunt, & primarias ex eo seu ex corculo, essentiali seminis parte, deducendas esse Vegetantium divisiones affirmant.

Classes primariæ à corculo.

Triplex è numero partium corculi *p. xvij* & ejusdem germinationis modo eruitur partitio generalis, nempe Acotyledonum, Monocotyledonum & Dicotyledonum, jam à nonnullis Autoribus celebrata, ab aliis posthabita, in horto Trianonensi præcipuè recepta. Hæc constans <sup>a</sup> & naturalis ablegatur tamen tum ex Fragmentis Linnæanis tum ex Adansonianis Familiis, utrâque ordinatione Monocotyledones Dicotyledonibus intermixtas nonnunquam exhibente. An autem singuli ordines seorsum à Naturâ constituuntur absque ullâ mutuae ipsorum affinitatis consideratione? An contra communi nexu classico colligantur omnes, ita ut indivisam constituent seriem? Classium existentiam & simul præstantiam corculi indicant probatissimi ordines hujus structuræ primario designati, & plurium eodem signo præprimis conformium manifesta cognatio, & singularis demum analogia cum

---

<sup>a</sup> Characteris hujus constantiam denegant Autores nonnulli qui plantas dicotyledones monocotyledonum quandoque congeneres esse contendunt. Sic Cactis bilobis rectè confociatur Melocactus ex Linnæo unilobus, & Liliaceis unilobis Juncus ex Adansonio bilobus; sic Pedicularibus bilobis contermina datur Orobanche ex eodem uniloba. Sed ex iteratâ observatione confirmandæ sunt assertiones. Mihi quidem visus est Juncus omnino unilobus, cujus germinantis folium primarium simplex, apice gerens crustam seminis persistentem (vide infra *Monocotyl. obs. p. 12*), basi vaginante cætera folia juniora complectitur. Similiter recognoscenda est germinatio anceps Aroidearum & Cuscutæ, & *Ranunculi glacialis* L. ex quibusdam folium seminale unicum emittentis, qui rectius fortè existimandus est secundo anno pullulans monophyllus, quàm primo germinans unilobus.



Animantibus quorum incubatio similis est Vegetantium germinationi. Cor, in animali fœtu primum movens & vivens, structurâ suâ diversas definit Animantium classes quarum unaquæque plurimos ordines complectitur. In Quadrupedibus & Cetaceis & Avibus biloculare & biauriculatum, in Piscibus & Reptilibus uniloculare uniauriculatum, in Vermibus & Insectis uniloculare non auriculatum, in singulis nunquàm varium, evolutione suâ ac perenni motu differentias illas amplificat, adjunctis signis exterioribus secundariis prænuntiatis, ita ut unaquæque classis habitu proprio facilè dignoscatur. Sic etiam corculum in plantis primum vivens præcipuas earum ordinationes designat, cordis auriculas quasi æmulans lobis duobus aut unico aut nullo, & aliundè hujus characterem peractâ germinatione fugacem suppleant extimæ notæ quibus constituitur proprius singularum classium habitus. Hæc duo Animantis & Vegetantis organa primaria, in utroque primis à fecundatione temporibus ens integrum constituentia, universam tunc complectuntur organisationem coarctatam ac vitali motu posthac evolvendam, & cunctos idcirco characteres in unum quasi contrahunt mox occupandum antequàm diffuens incremente fœtu in plures dispertiatur. Indè ordines seu corde seu corculo similes, verè conveniunt plurimis signis in unum collectis, & prima confirmatur Animantium ac Vegetantium divisio ex organo primigenio deprompta; indè universalis plantarum distinctio in Acotyledones, Monocotyledones & Dicotyledones recta ac inconcussa subsistit.

Primæ subeunt Acotyledones structurâ simplices & in universali serie pauciores. Subsequuntur progressionem naturali Monocotyledones numero plures ac minus simplices. Demùm prodeunt numerosissimæ Dicotyledones organisatione pleniori præditæ. Non severè circumscribuntur illæ classes systematico more, sed absque intervallo juxtâ Naturæ normam extremis invicem cohærent generibus ambiguis. Nec satis est: eadem nimis amplæ in secundarias necessariò dividuntur similiter connexas, quarum præcipui characteres æquo jure uniformes requiruntur, ex organis essentialibus depromendi.

An autem corculum, pars Vegetantium primaria, suo lorum numero primas definiens classes, alia insuper profert signa solida

Classes secundariæ.



quibus secundæ pariter designentur? Hujus germinatio in quâlibet plantâ sibi semper similis, in cognatis sæpè conformis, in diversis diversos admittit modos quorum exempla præcipuè in Monocotyledonibus conspicua se produnt, generali earum caractèri infra adjecta *p.* 21. Cum tamen Monocotyledones nonnullæ fructificatione vix dissimiles, germinatione discrepent ut in Asphodelorum ordine *p.* 51; cum prætereà Dicotyledonum confinium germinatio non certò habeatur uniformis, solidæ idcirco ex eâ non deducendæ sunt notæ nisi prius in singulis attentè perpendatur. Alii prostant ejusdem organi caracteres præcipui, nempe situs corculi in semine & seminis in fructu <sup>a</sup>. Corculum nunc perispermio caret, nunc eodem instructum in ipso centrale est aut laterale, minimum aut mediocre aut majus; suam insuper obvertit hilo radiculam, aut eam trudit ex adverso; lobos emittit sæpè rectos, rariùs inflexos aut plicatos aut corrugatos. Semen intrâ fructum receptaculo centrali aut laterali, elevato aut demissiori, sessile aut loratum annectitur. Singula hæc signa in quibusdam ordinibus verè conformia, in cæteris aut nondum satis sunt explorata, aut interdum primo aspectu contraria videntur. Usquedum igitur iteratis ac certis observationibus innoverint omnium germinationis modus & situs corculi & seminis insertio, nullus inde stabilis extrahetur caractèr.

A stamini-  
um & pistilli  
mutuo  
situ, seu ab  
insertione  
staminum.

Exhausto seminis penu, è partibus post ipsum præcipuis ac essentialibus jure deducuntur primi classium inferiorum caracteres, ex organis nempe sexualibus quæ ejusdem procreationi conspiciantur necessariò præexistunt & in Vegetantium œconomiâ magni æstimantur. Ut autem in eâ seorsum nullius sunt momenti, nec

---

<sup>a</sup> Hos fortè meditans caracteres Linnæus aiebat: Qui clavem methodi naturalis fabricare student, sciant nullam partem universalem magis valere, quam illam à situ, præsertim seminis, in semine punctum vegetans, quod vel perforat longitudinaliter semen, seu undique involvitur, vel ad ejus latus reponitur; hoc vel extrâ cotyledones vel intrâ; vel in basî, juxtâ basim, ad latus, vel in apice seminis; basî seminis est cicatrix illa, quâ pericarpio vel receptaculo proprio affixum fuit semen. Hinc Cæsalpini methodus magni facienda. *Linn. Class. plant. p.* 487.



nisi conjunctis viribus præcludunt in futuræ prolis generationem, sic pariter nullos separatim produnt solidos caractères, quos juncta protinus exhibent. Ex prædictis enim *p. xxxiiij* instabiles habentur in eodem ordine staminum numerus & proportio & connexio; nec constantissimæ *p. xl. xlj* ex germine supero aut infero, simplici aut multiplici, uni aut multiloculari &c. eruuntur notæ. His itaque neglectis, manet inquirendus essentialis caracter, utrique organo communis, qui quidem unicus extat verè primarius ac in probatis ordinibus certò uniformis, mutuus scilicet staminum & pistilli situs, seu insertio staminum respectivè ad pistillum, à plerisque Autoribus prætermissa. Linnæus in levioribus hærens staminum modis, valentiolem minùs perspexit quem rarò ipsimet genericæ adjecit definitioni; hunc in Familiis constanter memoravit Adansonius.

Triplex est mutuus staminis & pistilli situs; alterum enim alteri subjacet aut ipsi juxtaponitur: indè triplex præcipua staminum insertio, *epigyna* suprà pistillum, *hypogyna* sub eodem, *perigyna* parti pistillum ambienti seu calici<sup>a</sup>. Harum unaquæque ab aliis distinctissima nunquàm iis permiscetur in eodem ordine: Umbelliferas constanter definit staminum epigynia, Cruciferas & Gramineas hypogynia, Leguminosas & Liliaceas perigynia.

Aliis subdita legibus quarta prodit insertio, nempe *epipetala* seu suprà corollam, quæ nunc ordines integros definit ut Labiatis & Compositis, nunc interdum tribus prædictis insertionibus præcipuis seorsum consociatur in eodem ordine, in eodem genere & etiam in eodem flore. Sic stamina in Leguminosis perigyna, in Mimosâ & Trifolio generibus coordinatis sunt interdum epipetala; sic in flore Dianthi & consinium stamina dantur quinque epipetala & quinque hypogyna. Hujus discriminis

Diversæ staminum insertiones.

<sup>a</sup> Ambigua datur insertio, dum stamina inhærent ei puncto quo calix superus à germine infero, aut germinis superi receptaculum à calice infero discedit, indè dubitanter nunc epigyna aut perigyna, nunc perigyna aut hypogyna. Compar extat dum stamina affiguntur suprà discum ex eodem puncto prominulum qui, inter duo organa medius, quasi mixtæ est originis. Sed in utroque casu veram indicat insertionem collatio generum consinium in quibus ea certius definitur.



rationem explicat maxima corollæ affinitas cum staminibus quorum ex dictis *p. v. vj. xvj* vera est appendix & quasi pars luxurians, ex eodem receptaculo enata. Hæc dum ipsis non adhæret, minoris est momenti; dum contrà cum iisdem infrà coalescit, tunc quasi staminifera ac subindè necessariò existens, fulcrum refert intermedium cujus propria insertio stamineæ insertioni subrogata, huic omninò assimilata, conversa in characterem essentialem, cum tribus præmissis insertionibus seorsum convenit. Indè *stamina corollæ adnexa habentur quasi inserta parti tunc corolliferæ*; indè etiam triplex ipsiusmet corollæ staminiferæ diversissima extat insertio, nempe hypogyna, epigyna & perigyna, in eodem ordine nunquàm promiscua, in Labiatis semper hypogyna, in Compositis epigyna.

Duplex igitur corollæ beneficio generalis habetur modus insertionum notandus sedulò, alter *immediatus* dum stamina memorato triplici puncto immediatè affiguntur, alter *mediatus* dum eidem adhærent mediante corollâ quæ tunc ipsa est staminifera. Uterque modus in eodem genere & in eodem flore interdum commixtus, affinis subindè certò judicatur, modò tamen eadem sit utriusque origo & simile insertionis punctum. Sic in Trifolio perigyniâ immediatâ signato, quædam species eandem mediatam exhibent, nempe corollam staminiferam ipsammet perigynam; in Dianthi flore dantur stamina quinque immediatè hypogyna, & petala quinque his alternantia, staminifera simul & hypogyna. Tres idè præcipuæ sunt insertiones ab invicem omninò discrepantes & in ordinibus nunquàm conjunctæ, quæ singulæ in duplicem rarò miscellaneam, mutuò tamen affinem dividuntur.

Classium  
prima distri-  
butio a cor-  
culi lobis &  
staminum  
insertione.

Perspectâ staminum insertione & statutis ejusdem legibus, facilis eruitur prima classium præmissarum distributio. Acotyledones sexibus vix conspicuis & obscurato staminum situ, classificam idcirco nequeunt sufficere notam & interim indivisæ perstant. Tripartitò scinduntur Monocotyledones ratione insertionis epigynæ, hypogynæ & perigynæ, non obstante corollâ in iis semper deficiente. Similis ex triplici insertione deducitur trifaria Dicotyledonum partitio, unaquæque complectens tum stamina uni floris puncto inserta, tum corollas staminiferas eidem puncto infixas.



infixas. Indè septem prodeunt secundariæ classes, uniformibus organorum essentialium signis definitæ.

Hæc ulterior Vegetantium ordinatio confirmatur divisione Animantium pariter septenariâ *p. xlv* & præcipuis itidem partium primitiarum caracteribus stabilitâ. Quadrupedes enim & Aves, corde biloculari & biauriculato similes, discrepant sexuum structurâ determinante generationem in his oviparam, in illis viviparam. Manifesta etiam datur eorundem organorum dissimilitudo in Reptilibus & Piscibus, corde uniloculari & uniauriculato cæterum conformibus. Aptè igitur, velut rami prodeuntes ex eâdem stirpe, congruunt duæ Regni organici partes quarum simplex & constans & certò coæqualis habetur ratio atque progressio, ita ut principia uni addicta alteri etiam conveniant, & ex organis in utrâque præcipuis ac similiter agentibus compares tum primariæ divisiones, tum secundariæ eliciantur. Definiendis in hâc aut illâ Naturæ classibus non sufficiunt organa inferiora aut inferiores organorum superiorum modi & indè deducti characteres ad summum tertiarium, qui Methodicum quemlibet iis innitentem à naturali abducunt tramite, nisi faustè notas feligens essentialibus consociatas, assumpto sic famulari signo, primarium inscius attigerit.

Eximium Trianonensis ordinationis Autorem Bern. Jussæum non præteriit hæc characterum inæqualitas, & instabilium abjectio, & constantiorum præstantia, & dignitas corculi atque sexualium organorum, & affinitas generum atque ordinum hisce signis aut partibus primariis consimilium. Quos construxit ordines, ii generatim verè naturales & principiis antea memoratis aptati, in septenariam classem suprâdictam distribuuntur, habitâ ratione structuræ corculi & staminum insertionis & corollæ staminiferæ. Nullas reverà classium cæsuras indicat, quasi qui non classes sed ordines tantum admiserit; sed in privatis documentis præmissos semper prædicavit characteres, & prætereà seriei ab eo propositæ consideratio vel levior abundè comprobabat hanc ipsi fuisse mentem ut horum communi nexu suos ordines colligaret. Omnibus methodis simplicior ac naturæ sequacior ordines ut plurimum integros servat hæc distributio, quæ tamen ad seriem indivisam spectans & idcirco fatente Autore non strictè methodica nec



partita in classes severè circumscriptas, facili Botanices studio minùs conducit. In hâc igitur major exoptatur numerus classium ideò contractiorum, ut inde promptior ac expeditior evadat generum specierumque investigatio.

Classium autem multiplicationi obstat characterum essentialium penuria. Qui enim singuli cæteris omnibus conjunctis æquipollent præstantissimi, hi seorsùm definiunt abundè classes quæ unico tali signo notatæ certò naturales habentur. Dùm contrà defectu primariorum alia impenduntur signa subsequencia, tunc plura sunt colligenda quæ viribus valentiora junctis ad primaria propiùs accedunt; sed æqua priùs instituenda est eorum æstimatio, eò difficilior quò plura simul sese offerunt primo aspectu æqualia; & intereà cessat ulterior classium partitio, utpotè quæ simplicibus non sit absolvenda signis.

Classium altera partitio numerosior, corollæ beneficio.

Cùm tamen Botanices studio numerosiores verè famulentur classes, in solidâ earum constitutione nunc est elaborandum, adhibitis characteribus secundariis *p. xl*, servatâ quantum fieri potest lege naturali, servatis etiam genuinis ordinibus non sine scientiæ detrimento dissolvendis. Characteres memorati, alii essentialibus cognatissimi, ipsorum immutabilitatis fiunt omninò consortes, ut existentia & insertio corollæ staminiferæ; alii primariis affines & ejusdem immutabilitatis tantùm semiparticipes, generales habentur *p. xl*, exceptione nonnunquàm varii, ut corollæ partitio aut integritas & ejusdem non staminiferæ situs: sic ex observatis corolla monopetala est sæpiùs staminifera, & eadem polypetala sæpiùs est non staminifera, ex eodem cum staminibus puncto plerumque enata: undè paucis exceptis, ex insertione & numero partium corollæ concluditur staminum ipsorummet insertio.

Corolla igitur staminibus affinis auxiliatrices potest notas addere, quibus novæ classes aut classium præmissarum divisiones designentur, à naturâ non alienæ. Quapropter Linnæanum systema Tournefortiano minùs est naturale: Linnæus enim in organo essentiali signa tantùm selegit tertiaria; Tournefortius in secundario præposuit secundaria, & monopetalos flores ab apetalis & polypetalis distinguens, inscius staminum insertioni partim obtemperavit. Sexubus nondùm perspectis, stamineum organum



& hujus cum corollâ consensum prætermiserat, undè firmiores protulisset characteres. Quos omisit, ii nunc insumendi sunt tempore opportuniori, & ipso præeunte quærendus in corollâ simplex multiplicandarum classium modus, absque ullâ ordinum legumque naturalium subversione.

Hûc propterea sunt revocandæ primùm duæ staminum insertiones supradictæ *p. xlvij*, altera *immediata*, altera *mediata*, quas non commiscere ut in septenariâ distributione, sed ab invicem sedulò distinguere expedit. Raris enim exemplis *p. xlvij* in eodem sociantur ordine aut in eodem flore, & insuper mutatâ insertionem plerumque mutatur simul corollæ structura: sic corolla Fraxini monopetalis plantis cognatissimæ, stamina abjiciens, fit simul polypetala aut omninò evanescit; sic eadem in Leguminosarum ordine polypetala & non staminifera, in Trifoliis quibusdam leguminiferis prodit staminifera simul & monopetala, petalorum connexione epipetalam staminum insertionem quasi prægrediente. Hinc facilè iteranda sequens assertio: *paucis exceptis corolla monopetala est simul staminifera*<sup>a</sup>, aut aliter, *corolla staminifera est simul sæpiùs monopetala*. Utriusque tanta est characteris cognatio, ut propemodùm unus alterum prænuntiet: insertionem igitur mediatam generatim designat corolla monopetala.

Essentialis in hac insertionem habetur corolla, sed in insertionem immediatâ dantur ordines alii apetalis ut Gramineæ & Liliaceæ, alii petalodes ut Umbelliferae & Cruciferae & Leguminosæ. Rarò corollatis intermiscuntur ordinibus plantæ apetalæ, ut Ceratonia Leguminosis, aut Cruciferis Cardamine impatiens; nec vulgò dantur ordines partim petalodes, partim corollâ destituti. Non obstant idcirco rarissimæ exceptiones quominus, classium multiplicandarum causâ, corollati ordines ab apetalis secernantur, non neglectâ staminum insertionem quæ tunc est aut *absolutè* aut *simpliciter immediata*. Corollæ enim seu fulcri intermediarii defectus

---

<sup>a</sup> Filamenta staminum à corollâ polypetalâ distincta, corollæ verò monopetalæ inserta sunt; exceptis antheris bicornibus. Vaillantius hoc observavit in Monopetalis. Pontedera ex dissectione 2000 specierum didicit flores monopetalos gerere stamina corollæ inserta, at polypetalos receptaculo floris. *Linn. Phil. Bot. n. 108.*



in Apetalis absolutè determinat insertionem certò immediatam. In petalodibus autem fit simpliciter immediata in mediatam aliquandò mutabilis, quia ab exordio stamina corollæ existenti congenita & tamen distincta, cum ipsâ interdum basi coalescunt <sup>a</sup>, quasi eidem imposita.

Plantæ naturâ apetalæ non petalodes evadunt; petalodes contrâ exuunt quandoque corollam, aut fiunt rarò ex polypetalis monopetalæ in Trifolio, Saponariâ, Cotyledone &c., rarissimè ex monopetalis polypetalæ in Fraxino. Indè in insertione absolutè immediatâ nulla unquàm datur corolla, in simpliciter immediatâ fortuitò deficere potest sed sæpius existit, & tunc ex observatis plerumque est polypetala <sup>b</sup>. Ergò generatim quasi characteres analogi & alii aliorum prænuntii habentur corolla monopetala & insertio mediata, corolla polypetala & insertio simpliciter immediata, corolla nulla & insertio absolutè immediata; ergò harumce insertionum signo interiori rudique appellationi commodè ac tutè subrogari potest manifestior character nomenque acceptius plantarum monopetalarum, polypetalarum & apetalarum. Indè altera facilè delineatur methodus à Trianonensi septenariâ parùm discrepans, plures complexa classes, ordines naturales servans integros, præcipuos corollæ characteres Tournefortianos exhibens, & prætereà solido staminearum insertionum signo innixa.

<sup>a</sup> Staminum insertio quælibet epipetala, tum solita in Monopetalis, tum in Polypetalis insueta, fortè nihil aliud est quàm coalitio basium staminis & corollæ, quæ bases non distinctæ sed arctissimè junctæ, ad commune insertionis punctum concurrunt, mutuam sibi tutelam ministrantes. Indè insertionis hujus analogia cum cæteris confirmatur, ut & triplex corollæ staminiferæ insertio ab invicem distinctissima.

<sup>b</sup> Polypetali flores stamina à petalis distincta gerunt. Exceptio tamen admittitur rariùs: Statice pentapetala filamenta unguibus petalorum inserta habet... Lychnides alterna stamina unguibus petalorum sæpius adnectunt. *Linn. Phil. Bot. n. 108...* Monopetali flores dantur staminibus à corollâ separatis in Bicornibus, Ericâ, Andromedâ &c. *ibid.* Dantur similes in Plumbagine & Campanulaceis, sed ex infra observandis p. 92. 154. 163, non indè subvertenda est quæ paucis exceptis inter plantas polypetalas & insertionem simpliciter immediatam subsistit consensio.



1<sup>o</sup>. Inconcussa manet prima in Acotyledones, Monocotyledones & Dicotyledones partitio.

2<sup>o</sup>. Acotyledones indivisæ perstant, donec certiùs innotuerit earum organisatio. Sexuales in iis partes inconspicuæ sunt aut sæpè diclines; idcirco difficilis est insertionum observatio & nondum tentandæ classis divisiones.

3<sup>o</sup>. Cum in Monocotyledonibus defectu corollæ unicus habeatur insertionis modus, nempe absolutè immediatus, trifaria indè nequit amplificari earum distributio exhibens in triplici classe stamina hypogyna, perigyna, epigyna; nec ulteriori quidem disjunctione indigent classes paucis ordinibus gravidæ.

4<sup>o</sup>. Dicotyledones numerosissimæ ac præmissarum ferè decuplæ, classium veriùs exigunt multiplicationem, quæ corollæ beneficio perficietur facilè, mutatâ paulisper ordinatione Trianonensi, habitâ diversarum insertionum ratione & distinctis vicissim plantis apetalis, monopetalis & polypetalis.

5<sup>o</sup>. Apetalæ, utpotè simpliciores seu uno organo destitutæ, primæ subeunt Monocotyledonibus subjacentes similiter apetalis, & pariter tripartitæ staminibus immediatè epigynis, perigynis, hypogynis.

6<sup>o</sup>. In Monopetalis subsequenter stamina sæpiùs epipetala, propriam idè vix variant insertionem, cui substituitur triplex corollæ ipsius staminiferæ insertio hypogyna, perigyna & epigyna. Insuper in epigyniâ discernuntur ab antheris distinctis antheræ connatæ quæ numerosam Compositarum seriem rectè definiunt: undè quadruplex facilè datur Monopetalorum classis.

7<sup>o</sup>. Polypetalæ tripartitò dehiscunt ratione insertionis staminum epigynæ, hypogynæ & perigynæ, aut ipsius corollæ sæpiùs non staminiferæ quæ ex eodem cum staminibus puncto plerumque oritur.

8<sup>o</sup>. Dicotyledonibus classis additur decima, plantas complexens diclines irregulares, seu insertionum regulis non subditas utpotè quæ sexus in diversis floribus sejunctos habeant. Stamina in masculis insident calici aut stipiti intrâ ipsum centrale, aut squamæ calicem deficientem supplenti. Hæ minoris sunt momenti insertiones quæ mutuam sexuum dissociatorum positionem non statuunt; & intereà diclines plantæ hanc nostram ut & Triano



nensem absolvunt ordinationem, tum quia à cæteris plurimum discrepant classibus, tum quia staminibus sæpè calici aut calicinæ parti insertis ad polypetalas perigynas facilius accedunt, licet corollâ vulgò destitutæ. Veris autem diclinibus non permiscendæ sunt diclines spurix quæ tales abortu tantum extant & singulæ affinibus hermaphroditis in præmissorum ordinum serie adji-  
ciuntur.

Judicium de  
eâ methodo:

Hæc methodus<sup>a</sup> multiplicans classes, scientiæ studium promovet, indè tantum potior Trianonensi cui cæterum consonat primariâ corculi partitione, Acotyledonibus indivisis, triplici Monocotyledonum cæsurâ, perspectissimâ staminum insertione & naturalibus iisdem ex integro servatis ordinibus. Dùm tamen scientiæ explanandæ causâ trinas Dicotyledonum classes ad undenas ulteriori distributione provehit; dùm characterum essentialium defectu generales insumit exceptionibus obnoxios, tunc minoris horum constantiæ ipsa particeps, exceptiones pariter cogitur admittere quas Trianonensis eludit ordinatio. Sic in polypetalos ordines irrepunt nonnunquam plantæ monopetalæ aut apetalæ omninò affines, in Leguminosas Mimosa & Trifolium & Ceratonia, in Sempervivas Cotyledon, in Portulaceas Trianthema, in Ficoïdeas Tetragonia; sic commiscentur rariùs monopetalis ordinibus species apetalæ aut polypetalæ, ut Fraxinus Jasmineis; aut apetalis admoventur monopetalæ, ut Amaranthis Plantago. Illud methodi propositæ vitium, selectis characteribus aliquantisper variis, est ineluctabile; multò tamen rarius habetur quàm in syste-

---

<sup>a</sup> Hujus tabula prodit infra p. lxxj. Anno 1774 primum exarata fuit ea methodus in Scholâ Horti Regii Parisiensis, traditis simul ejusdem principiis in dissertatione academicâ (Act. Acad. Paris. 1774 p. 175), in quâ argumentorum series nunc prelata similis ferè exhibetur. Aliquantulum nuper fuit emendata methodus, principiis tamen non immutatis: ea siquidem prius in quatuordecim classes distributa, nunc quindecimam addit classem Apetalarum staminibus epigynis, ex quo Aristolochiarum corculum germinatione bilobum confirmatur. Præterea ordines quidam ex unâ in alteram classem transiliunt, notiore in illis staminum insertionem; quidam in plures dividuntur sufficienti caractere distincti; quidam novi omninò prædeunt.



matibus quibus ea methodus præstat, in quantum à dissidentis manifestis prorsus aliena, veras generum affinitates plerumque non invertit. Sed ipsius ordinum dicotyledonum dispositio, quæ primarios à corollâ monopetalâ aut polypetalâ aut nullâ, secundarios à flaminum insertione characteres desumit, ideò forsan à naturali deflectit serie, essentiali signo præficiens aliud tantum generale, & dimovens insertiones generatim affines, eas nempe quæ ex eodem puncto mediatè aut immediatè, absolutè aut simpliciter prodeunt. Si prior restitueretur ternaria Dicotyledonum divisio ex partium insertionem deprompta, recensitis posthac in triplici uniuscujusque classe vicissim plantis apetalis, monopetalis & polypetalis, eæ tunc trifariam scissæ pluriès mutuò intermiscerentur inverso classium ordine, accederentque Campanulaceis Onagræ, Caryophylleis Amaranthi &c. ut in distributione Trianonensi. Hæc quadantenus prævaleret ordinatio utpotè quæ, multiplicatis pariter classibus & servatâ simul lege naturali, signa primaria constantius secundariis anteponeret. Non tamen inde consequeretur utilis memoratarum exceptionum amandatio nec perfectior constructio classium quæ in hac aut illâ semper eadem, diversè tantum ordinarentur. Mediocris igitur percipienda est utilitas ex mutatâ earum serie quæ prætereà plurimis acceptas Botanicis divisiones Tournefortianas ex corollâ primariò depromptas disturbaret.

Quæcunque maneat earumdem classium dispositio, plures in quâlibet congregantur ordines communi caractere classico essentiali aut generali cohærentes; plura etiam in quovis ordine dantur genera signis inferioribus connexa, secundariis aut tertiariis & subindè non solitariò sed collectim exhibitis ac conjunctione valentioribus. Hinc ordinum definitiones inferuntur prolixæ aut contrahiores, pro signorum coordinatis generibus communium numero. Quò prolixiores autem habentur, eò difficilior est ordinum faciliorque generum cita perceptio, & vice versâ: dum enim plures in ordine communes congeruntur characteres, pauciores ideò in generibus supersunt commemorandi tantum dissimiles & iisdem distinguendis idonei. Institutis etiam intra singulos ordines sectionibus genera affinia complectentibus, certior consequitur generum intima distributio determinante proprio cujus-

Ordinum in  
classibus &  
generum in  
ordinibus  
dispositio.



libet sectionis caractere, quo simul seposito brevior ac simplicior extat generica designatio. Præterea inter communes ordinum & sectionum & generum caracteres enumerantur non ii tantum quos fructificatio profert, sed alii plures ex inflorescentiâ p. x. & foliis & caule desumpti, nullatenus prætermittendi dum cognatis generibus communes habentur. Horum nonnullos Tournefortius admiserat in generibus suis secundariis; omnes severè excluserat Linnæus ex genericâ definitione, subvertens certissimam Naturæ legem quæ caracteres in designandis ordinibus sæpè adjunctos, à fortiori in generibus ultrò adhibendos esse statuit.

Maxima  
methodi na-  
turalis com-  
moda.

Ex effatis autem sequentia meritò concluduntur methodi naturalis commoda, nempe 1°. Hujus ordinatio pluribus definita signis difficilior est systematicâ paucioribus utente, ita tamen ut ex systematicâ citior sed tantum inchoata, ex naturali tardior & simul non modica cognitio deducatur.

2°. Contrà facilior est naturalis generum designatio quàm systematica, quia pauciores infumit caracteres, cæteris valentiori. bus in classe aut sectione præpositis: sic definitis fusiùs Gramineis p. 28 & additis sectionibus, Alopecuri definitionem p. 29 explent gluma bivalvis, calix univalvis apice simplici & flores spicati.

3°. Cum tamen generum designatio naturalis signa quævis communia tum in fructificatione, tum extrà eandem selecta aut exprimat aut jam in ordine expressa subsequatur, indè plenior ac perfectior est systematicâ quæ licèt extensa mutilas plerumque definitiones profert: sic in prolixis generibus Linnæanis frequenter omittitur staminum insertio & interior fructûs seminisque structura & caracter quilibet extrà-floralis.

4°. Agente naturali lege nunquàm alienæ consociantur aut cognatissimæ disjunguntur plantæ, ut in systematibus quæ interdum species in diversissimis ordinibus dimovendas proclamant congeneres. Plurima in Veterum scriptis & quædam in Recentiorum operibus<sup>a</sup> occurrunt genera sic miscellanea; nec ab iis abstinuit

---

<sup>a</sup> Nullâ corollæ & germinis superi aut inferi habitâ ratione D. Jacquin Rubiaceam plantulam adjecit Peplidi (infra p. 333), transferente Linnæo qui alibi arborem Guettardæ congenerem p. 207 addidit



ipse Linnæus arbitrariæ legi nimiùm obtemperans, qui tamen genericas constitutiones plerumque optimas exhibuit.

5°. Ignota nequit in systemate ordinari planta, nisi caracterem classicum & præcipuè florem perfectum expromat. Adhibitis contrà in methodo naturali signis plurimis, sæpè primariorum auxiliariis, dùm quædam evanuère, cætera perstantia & habitum constituentia determinando ordini aut & generi sufficiunt: sic Rubiaceum caracterem p. 196 plerumque designant in frutice folia opposita & utrinque stipulâ unicâ mediante junctâ; Polygoneum p. 82 indicant folia alterna basi vaginantia, quorum juniora sunt subtùs revoluta.

6°. Præter auxiliares minoris notæ, alii etiam præstantiores dantur characteres in eâdem plantâ cognatissimi, plerumque aut semper connexi, jam antea prænuntiati p. xix, & infra singulis accuratè præmissi classium observationibus. Quò plures sic sociantur, eò constantiores extant, quia mutatio unius determinat sæpè alterius mutationem, & plurium difficilior est quàm pauciorum inversio. Sic corolla monopetala exigit calicem monophyllum & stamina ut plurimùm epipetala atque definita, quæ eidem imposita non indefinite multiplicantur nisi prius basi coalescant. Facilior indè in Leguminosis quàm in Papaveraceis corollæ polypetalæ non staminiferæ in monopetalam staminiferam conversio, quia priores jam antea calice monophyllo & staminibus definitis ac basi coalitis, posteriores autem calice polyphyllo & staminibus indefinitis ac distinctis instruuntur. Similia poterunt benè multa enucleari problemata, observatis characterum affinitatibus & perspectâ lege quâ plures cognati difficiliùs mutantur.

7°. Non tantùm integram characterum & affinitatum cognitionem tradit methodus naturalis, sed & plantarum simul virtutes indicat magno rei medicæ & alimentariæ artiumque emolumento. Cum enim cuilibet similari Vegetantium parti-

---

Nyctanthi. Eiusdem filius in Supplemento Chiococcæ malè consociat Tabernæmontanam novam p. 145 & Lycio Serissam p. 209. Thunbergius in Florâ Japonicâ Cornum nuncupat arborem germine supero instructam.



culæ sua sit simplex virtus, ex organicâ igitur particularum connexionem vis mixta prodit, in organis simillimis semper eadem; nec ideò dispar, experientiâ teste, habetur in plantis conspecificis seu consimili omninò organisatione instructis, nisi natale solum & varia succorum proportio aliquam inter montanas & pratenses, inter hortenses & sylvaticas tum intus tum extus levem intulerint mutationem. Vix etiam virtute dissident congeneres <sup>a</sup> plantæ caracteribus seu organis subsimiles: sic *Salviæ* omnes sunt cephalicæ, *Anchusæ* pectorales, *Cochleariæ* antiscorbuticæ, *Euphorbiæ* catharticæ, *Rubiæ* diureticæ ac tinctoriæ. Ulteriori collatione eadem sensim protrahitur consecutio & genera confinia seu pluribus ac præcipuis organis cognata, virtute quadantenus proxima conjiciuntur, quam reverà plerumque uniformem <sup>b</sup> in ordinibus verè naturalibus aut in genuinis ordinum sectionibus comprobatur observatio. Sic generatim *Gramineæ* nutritivæ sunt ac farinaceæ; *Cruciferae* diversè scorbutum impugnant; *Labiatae* aromaticæ dantur & amaræ, ita tamen ut in aliis stomachicis amarities, in aliis cephalicis aroma prævaleat. Sic præcipua etiam *Liliacearum*, *Leguminosarum*, *Compositarum* & *Umbelliferarum* virtus minus circumscripta ac mutatâ elementorum proportionem quasi sibi non similis, in singulis harum sectionibus diversè manifestatur, ejusdem tamen primigeniæ indolis semper particeps. Dùm autem junguntur species quædam malè congeneres aut

---

<sup>a</sup> Plantæ quæ genere conveniunt, etiam virtute conveniunt; quæ ordine naturali continentur, etiam virtute propius accedunt &c. *Linn. Phil. Bot. n. 337.*

<sup>b</sup> *Graminum* folia pecoribus & jumentis læta pascua; semina minora avibus, majora hominibus esculenta sunt... *Umbellatae* in siccis aromaticæ, calefacientes & pellentes; in aquosis venenatae sunt &c... *Verticillatae* (*Labiatae*) sunt fragrantæ, nervinæ, resolventes & pel-lentes &c... *Siliquosæ* (*Cruciferae*) aquosæ, acres, insidentes, abster-gentes & diureticæ sunt; exsiccatione imminuitur virtus... *Papilionacearum* (*Leguminosæ*) folia jumentis & pecoribus, semina variis animalibus esculenta, sunt farinacea & flatulenta... *Syngenesia* *Compositorum* in Medicinâ receptissima communiter amara est. *Ibid. n. 338. 342. 347. 348. 350. 351.*



genera minus rectè coordinata, similis tunc subsequitur virtutum discrepantia : differt enim à Ranunculo caustico *Ficaria innoxia* p. 233, à Papaveraceis narcoticis *Fumaria* p. 237 humorum acrimoniam temperans. Maxima igitur inter caracteres & virtutes subsistit affinitas, tanta quidem ut alii aliarum sint quasi prænuntii & ex cognitis Vegetantium quorundam virtutibus ignotæ confinium virtutes propemodùm certò concludantur. Quæ verò apta remedia, salutarem escam & artium promovendarum modos multiplicat scientia naturalis, hæc sedulò excolenda scientiam systematicam seu artificialem minus fructuosam valdè supereminet.

Ex dictis patet quanti sint momenti labores ad methodi naturalis disquisitionem spectantes quos nemo frustrà susceperit, dùm species plurimas in genera vera & genera in ordines rectè compulerit, dùmque majora moliens partialem aut universam delineaverit ordinum seriem. Veræ enim quælibet affinitates seu jam detectæ, seu in posterum detegendæ, perstabunt immutabiles absque ullâ scientiæ retrocessione : sic multa Tournefortii & plura Linnæi genera nunquàm subvertentur ; sic quædam generum connexiones in Linnæano systemate & plures in Tournefortianâ methodo apprimè naturales dissolvi nequeunt ; sic & in cunctis systematibus nonnullæ passim dantur optimæ plantarum consociationes nullatenus disturbandæ. De scientiâ promeruit Linnæus fragmenta condens in quibus multò numerosior quàm in quolibet systemate prodit affinium concursio. Horum tamen constructionis atque distributionis leges nec antehàc innotuère defectu probationum, nec unquàm sunt excerpendæ ex meditatâ hâc ordinatione quæ dissidentias <sup>a</sup> insignes & legi cuilibet adversas profert. Plerosque forsàn mutuò exæquavit caracteres, commixtis promiscuè primariis & secundariis & tertiariis, vix admissò inter ipsos discrimine. Familiarum autor Adansonius or-

---

<sup>a</sup> Connectit in Fragmentis Commelinam & Ixiam, Dioscoream & Menispermum, Gentianam & Hypericum, Melianthum & Pinguiculam, Lycium & Catesbeam, Convolvulum & Campanulam, Gardeniam & Vincam, Guettardam & Hippomanem, Sideroxylum & Viburnum, Spigeliâ & Oldenlandiam, Hebenstretiam & Scabiosam &c.



dines accuratius elaboravit diffidentiis paucioribus deformatos & pluribus ditatos certis generum conjunctionibus, sed characteres tantum quosdam generales & nullos essentialia admittens, eorum disparilitatis legem non sancivit nec classicas inde deduxit partitiones in sua ordinum distributione penè arbitrariâ, cujus ut & Linnæanæ vera ac generalis non prorsus intelligitur ratio. Cum autem essentialia atque præcipua in plantis prodeant organa *p. xliij*, ex quibus primarii *p. xl. xliv. xlvij* eruuntur characteres in ordinibus semper uniformes; cum prætereà primarius unus secundariis aut tertiariis pluribus æquipolleat *p. xxxix*, & ideò admovendi sint *p. xliv* ordines tali caractere conformes; prædictis igitur tum Fragmentis tum Familiis præstat Trianonensis ordinatio <sup>a</sup> quæ memoratis generatim assentiens legibus, meliores plerumque profert ordines, & classicam eorum verè admittit partitionem aut eidem posthac institutæ plenius congruit.

**Conclusio.** Et nunc statutâ Historiæ naturalis & scientiæ organicæ & Botanices certâ definitione, expositis plantarum partibus & functionibus & differentiis & characteribus, definitâ specie & traditis aptioribus nominum atque descriptionum formulis, arbitrariis constructionum genericarum & classicarum exhibitis præceptionibus, quibusdam systematicis & inter omnes præcipuis plantarum ordinationibus delineatis ac ritè perpensis, systemata quælibet plantis nominandis utilia sed Naturæ minùs consona ab usurpato verioris scientiæ gradu ad inferam præludii Botanici & methodici indicis <sup>b</sup> conditionem descivère. His genuina mox

---

<sup>a</sup> Fragmenta Linnæana 58 dinumerantur, Adansonianæ Familiæ totidem, ordines Trianonenses 65, Parisienses nuperrimi 100. Hos ratione lorum corculi & corollæ polypetalæ aut monopetalæ aut nullæ & staminum sitûs & demùm organisationis completæ aut incompletæ, simplicioris aut plenioris, disposuit in Dict. Encycl. 2. p. 32. D. Lamarck cujus distributioni systematicæ sua est verè laus tribuenda.

<sup>b</sup> Ut libro cuilibet index opportunè subjicitur brevem contentorum rationem exhibens, sic in usu botanico utilis est systematicus ordo seu index methodicus plantarum distributionem proferens facilem in quâ quæsitæ citius reperiuntur. Talem præmissi generibus incertæ sedis



substituatur scientia quæ Vegetantium non modò nomina sed & naturam inquirens, integram eorum organisationem <sup>a</sup> cunctosque characteres prospicit; quæ simplicibus etiam ac certis suffulta principiis, naturalem seriem seu methodum exhibet digestam ratione affinitatum, ita ut consocientur Vegetantia majori characterum numero affinia & in eâ characterum enumeratione præstantiores pluris habeantur. Quædam insuper notissima generum & ordinum verè naturalium specimina hisce affinitatum legibus adduntur, easdem confirmantia, & novis generibus ordinibusque simili ratione conficiendis utilia, & ad accuratiorem characterum computationem instituendam necessaria. Iis juvantibus jam certò distinguuntur invicem characteres uniformes, subuniformes, semiuniformes & nunquàm uniformes seu tantùm specifici. Præterea uniformium mutua jam certius statuitur æstimatio; primariæ ex corculo deductæ divisiones multiplici confirmantur probatione; stabilitur organorum sexualium dignitas & orta ex mutuo eorum situ ordinatio. Maxima comprobatur staminum & corollæ affinitas & peculiaris regula insertionum exindè deprompta, novarum fons divisionum. Classis ordines complexa paucis definitur characteribus primariis; ordo genera similia connectens pluribus ac numero indefinitis designatur signis semiuniformibus, nunc constantibus nunc variis & ideò difficilius mutuò æstimandis. Illud autem præstantius habebitur quod in pluribus ordinibus constans substiterit. Hinc multiplicandi primùm ordines unanimi

---

(infra p. 416) quæ arbitrariò disponuntur, donec veræ innotescant affinitates. Similem animus fuerat adjicere universo operi, ut quæ in ordinibus amplificatâ definitione difficilius perspiciuntur à Tyronibus genera, indicis ope mox paucis impensis signis certò nominentur: sed instante operis evulgatione, huic construendo tempus defuit indici, quem tamen necessarium continenter elaboro, ut seorsum aut alteri, si qua detur, adjunctus editioni suo tempore prodeat.

<sup>a</sup> Non ratione numeri entium ordinandorum, sed ratione numeri organorum in singulis pervestigandorum atque æstimandorum augefcit affinitatis statuendæ & ordinationis perficiendæ difficultas: indè difficilior Animantium & præcipuè Quadrupedum scientia cæterum similis, quæ plura complectens organa, computationem subindè multò protentiolem exigit.



consensu verè naturales , & computatione posthàc institutâ caracteri cuilibet totidem tribuentur præstantiæ gradus quot ordinibus adfuerit stabilis : sic positis ordinibus sexagenis , foliorum limbus plerumque varius & vix in uno aut altero uniformis , à constantissimâ corculi structurâ ferè sexagies superatur. Botánicos opportunæ ordinum multiplicationis & diuturnæ caracterum computationis molitores excipiet publica laus & felix non tamen mox plenior eventus. Scientia arbitrarias ejurans leges & naturalibus obsequens , in primis nunc hærens viæ nondùm tritæ stadiis , lento primùm sed firmo nec unquàm retrogrado incedet gressu , junctisque dein Botanicorum viribus citiùs invalescet. Recensitæ ordinationes nondùm omnibus suis partibus manent absolutæ , nec intrâ breve tempus consummabuntur , omnes demùm in unicam componendæ. Suam ipse judicaverat imperfectam Bern. Jussæus , utpotè quæ spatiis vacuis frequenter abrumperetur , connexiones quasdam retexendas admitteret , & iteratis ob incertas partes elucidandas indigeret observationibus. Optimus ille noster patruus in quem videbantur aptè coalescere ingenui primarum ætatum mores & futurarum doctrina , se non methodum naturalem sed tantùm iter ad ipsam instituisse existimaverat , pluriès à Botanicis perlustrandum antequàm tyronibus recluderetur. Alteram intereà exoptaverat dari in horto publico distributionem , quadantenùs systematicam nec tamen ordines naturales subvertentem , quæ statutis ac multiplicatis classibus faciliiori accomodaretur studio. In scholâ igitur Parisiensi fuit exarata methodus in quâ ordines & primarii seminis organorumque sexualium servantur characteres , additis prætereà facilibus Tournefortii primis divisionibus. Felix autor , si hinc Botanicis veris consulens , naturalibus affinitatum expositis legibus & traditâ ordinum atque generum accuratâ definitione , illinc in gratiam tyronum ordines & genera disponens in methodo signis aliis certissimis , aliis generalibus & simul manifestis innixâ , acceptum his & illis ediderit opus , & perenne sui ergà omnes studii , ergà patrum grati ac venerantis animi monimentum exhibuerit.



## BERNARDI DE JUSSIEU

## ORDINES NATURALES

IN LUDOVICI XV HORTO TRIANONENSI DISPOSITI

Anno 1759.

## FUNGI.

Mucor.  
 Peziza.  
 Helvella.  
 Clavaria.  
 Clathrus.  
 Phallus.  
 Lycoperdon.  
 Hydnum.  
 Boletus.  
 Agaricus.

## ALGÆ.

Byssus.  
 Conferva.  
 Chara.  
 Spongia.  
 Ulva.  
 Tremella.  
 Fucus.  
 Lichen.  
 Riccia.  
 Marsilea.  
 Blasia.  
 Anthoceros.  
 Jungermannia.  
 Marchantia.  
 Equisetum.

Viscum?

## MUSCI.

Hypnum.  
 Bryum.  
 Mnium.  
 Buxbaumia.  
 Polytrichum.  
 Splachnum.  
 Fontinalis.  
 Phascum.

Sphagnum.

Porella.

Lycopodium.

Ophioglossum.

Isoëtes.

## NAÏADES.

Naïas.

Callitrichë.

Myriophyllum.

Ceratophyllum.

Hippuris.

Trapa.

Proserpinaca.

## ARISTOLOCHIÆ.

Pistia.

Asarum.

Aristolochia.

## FILICES.

Pilularia.

Lemma J.

Osmunda.

Onoclea.

Acrostichum.

Asplenium.

Trichomanes.

Adiantum.

Polypodium.

Lonchitis.

Hemionitis.

Blechnum.

Pteris.

## ORCHIDES.

Orchis.

Satyrium.

Ophrys.

Serapias.

Limodorum.

Arethusa.

Cypripedium.

Epidendrum.

## CANNÆ.

Canna.

Amomum.

Costus.

Alpinia.

Maranta.

Curcuma.

Kæmpferia.

Thalia.

## MUSÆ.

Musa.

Bromelia.

Galanthus.

Leucoium.

Hypoxis.

Vallisneria.

Stratiotes.

Hydrocharis.

## IRIDES.

Sisyrinchium.

Ferraria.

Ixia.

Gladiolus.

Antholyza.

Meriana *Trew.*Watsonia *Mill.*

Iris.

Crocus.

Gethyllis.

## NARCISSI.

Narcissus.

Amaryllis.

Pancratium.

Crinum.

Hæmanthus.

Hemerocallis.



Agave.  
 Pontederia.  
     LILIA.  
 Liliū.  
 Erythronium.  
 Gloriosa.  
 Fritillaria.  
 Uvularia.  
 Tulipa.  
 Yucca.  
 Aloë.  
 Asphodelus.  
 Anthericum.  
 Ornithogalum.  
 Scilla.  
 Albuca.  
 Aletris.  
 Cyanella.  
 Hyacinthus.  
 Bulbocodium.  
 Allium.  
 Polyanthes.  
 Colchicum.  
 Dracæna.  
 Convallaria.  
 Medeola.  
 Ruscus.  
 Asparagus.  
 Smilax.  
 Dioscorea.  
 Rajania.  
 Tamus.  
     JUNCI.  
 Xyris.  
 Juncus.  
 Aphyllanthes.  
 Tradescantia.  
 Commelina.  
 Trillium.  
 Paris.  
 Helonias.  
 Melanthium.  
 Veratrum.  
 Scheuchzeria.  
 Wachendorfia.  
 Narthecium.  
 Tillandsia.  
 Acorus.  
 Triglochin.  
 Alisma.

Sagittaria.  
 Butomus.  
 Sparganium.  
     PALMÆ.  
 Chamærops.  
 Borassus.  
 Corypha.  
 Cycas.  
 Cocos.  
 Phoenix.  
 Areca.  
 Elate.  
 Caryota.  
 Calamus.  
     AROIDÆ.  
 Lemna.  
 Arum.  
 Calla.  
 Pothos.  
 Dracontium.  
 Orontium.  
 Saururus.  
 Zannichellia.  
 Ruppia.  
 Potamogeton.  
 Menyanthes.  
     GRAMINEÆ.  
 Nardus.  
 Bobartia.  
 Saccharum.  
 Phalaris.  
 Phleum.  
 Cinna.  
 Paspalum.  
 Agrostis.  
 Stipa.  
 Pharus.  
 Zizania.  
 Oryza.  
 Holcus.  
 Alopecurus.  
 Lagurus.  
 Andropogon.  
 Anthoxanthum.  
 Aira.  
 Avena.  
 Milium.  
 Olyra.  
 Panicum.  
 Ischæmum.

Melica.  
 Apluda.  
 Lygeum.  
 Tripsacum.  
 Cornucopiæ.  
 Cenchrus.  
 Cynosurus.  
 Elymus.  
 Hordeum.  
 Secale.  
 Triticum.  
 Lolium.  
 Arundo.  
 Briza.  
 Poa.  
 Uniola.  
 Dactylis.  
 Festuca.  
 Bromus.  
 Aristida.  
 Ægilops.  
 Cyperus.  
 Scirpus.  
 Eriophorum.  
 Schoenus.  
 Carex.  
 Coix.  
 Zea.  
 Typha.  
 Zostera.

    CICHORACEÆ.  
 Tragopogon.  
 Scorzonera.  
 Picris.  
 Sonchus.  
 Lactuca.  
 Chondrilla.  
 Prenanthes.  
 Leontodon.  
 Hieracium.  
 Crepis.  
 Andryala.  
 Hyoseris.  
 Seriola.  
 Hypochaeris.  
 Lapsana.  
 Cichorium.  
 Scolymus.

Catananche.



Catananche:  
Elephantopus.  
CINAROCEPHALÆ:

Gundelia.  
Echinops:  
Arctium.  
Serratula.  
Carduus.  
Cnicus.  
Onopordum.  
Cinara.  
Carlina.  
Atractylis.  
Carthamus.  
Storbe.  
Centaurea.  
Stæhelina.  
Xeranthemum:

CORYMBIFERÆ:

Gorteria.  
Corymbium:  
Seriphium.  
Sphæranthus:  
Milleria.  
Sigesbeckia:  
Tagetes:  
Pectis:  
Bidens.  
Zinnia:  
Coreopsis.  
Verbescina:  
Polymnia:  
Eupatorium.  
Ageratum.  
Cacalia:  
Tussilago.  
Chrysocoma:  
Santolina.  
Athanasia.  
Tanacetum:  
Ethulia:  
Carpesium.  
Baccharis.  
Conyza.  
Erigeron.  
Senecio.  
Cineraria.  
Aster.  
Solidago.  
Perdicium.  
Inula.

Othonna:  
Arnica.  
Doronicum:  
Helenium.  
Bellis.  
Chrysanthemum:  
Matricaria.  
Cotula.  
Anacyclus.  
Anthemis:  
Achillea:  
Tridax.  
Amellus:  
Buphtalmum:  
Helianthus:  
Rudbeckia.  
Silphium:  
Chrysogonum:  
Melampodium:  
Calendula.  
Arctotis.  
Osteospermum:  
Polymnia:  
Eriocephalus:  
Filago:  
Gnaphalium:  
Micropus.  
Artemisia:  
Parthenium.  
Tarchonanthus:  
Iva.  
Ambrosia:  
Xanthium:

DIPSACEÆ.

Valeriana.  
Morina.  
Allionia.  
Dipsacus:  
Knautia.  
Scabiosa:  
Viburnum:  
Cornus:  
Sambucus:  
Trioosteum:  
Linnæa.  
Lonicera:  
Diervilla T.  
Mussaenda.  
Knoxia.

RUBIACEÆ.

Sherardia:

Asperula:  
Galium.  
Crucianella:  
Valantia:  
Rubia.  
Phyllis.  
Spermacoce:  
Diodia.  
Hedyotis:  
Oldenlandia.  
Anthospermum:  
Mitchella:  
Pæderia.  
Cephalanthus:  
Lippia.  
Ixora.  
Knoxia:  
Pavetta:  
Coffea:  
Chiococca:  
Morinda:  
Genipa:  
Randia:  
Cinchona:  
Catesbea.  
Petesia:  
Psychotria:  
Portlandia.  
Hamelia:  
Richardia:

UMBELLIFERÆ:

Lagoecia.  
Hydrocotyle:  
Eryngium:  
Sanicula.  
Astrantia.  
Buplevrum:  
Echinophora:  
Tordylium.  
Hasselquistia:  
Caucalis.  
Artemisia.  
Daucus.  
Ammi.  
Bunium.  
Conium.  
Selinum:  
Athamantia:  
Peucedanum.  
Crithmum.  
Cachrys.



Ferula.  
 Laserpitium.  
 Heracleum.  
 Ligusticum.  
 Angelica.  
 Sium.  
 Sifon.  
 Bubon.  
 Cuminum.  
 Œnanthe.  
 Phellandrium.  
 Cicuta.  
 Æthusa.  
 Coriandrum.  
 Scandix.  
 Chærophylum.  
 Imperatoria.  
 Sefeli.  
 Thapsia.  
 Pastinaca.  
 Smyrnum.  
 Anethum.  
 Carum.  
 Pimpinella.  
 Apium.  
 Ægopodium.  
 Aralia.  
 Panax.

LYSIMACHIÆ.

Tozzia.  
 Centunculus.  
 Anagallis.  
 Lysimachia.  
 Hottonia.  
 Aretia.  
 Androsace.  
 Primula.  
 Dodecatheon.  
 Cyclamen.  
 Soldanella.  
 Coris.  
 Trientalis.  
 Selago.  
 Globularia.  
 Rhacoma.  
 Theophrasta.

VERONICÆ.

Hebenstretia.  
 Bartia.  
 Melampyrum.  
 Rhinanthus.  
 Pedicularis.

Schwalbea.  
 Polygala.  
 Securidaca.  
 Veronica.  
 Pæderota.  
 Browallia.  
 Euphrasia.  
 Buchnera.  
 Erinus.  
 Gerardia.  
 Stemodia.  
 Limosella.  
 Monniera *Brown.*  
 Sibthorpia.

SCROPHULARIÆ.

Russelia.  
 Besleria.  
 Halleria.  
 Chelone.  
 Calceolaria.  
 Scrophularia.  
 Polypremum.  
 Digitalis.  
 Buddleia.  
 Antirrhinum.  
 Celsia.  
 Verbascum.  
 Cortusa.  
 Spigelia.  
 Scoparia.  
 Schwenckia.

SOLANÆ.

Bontia.  
 Brunfelsia.  
 Aquartia.  
 Crescentia.  
 Lycium.  
 Arduina.  
 Cestrum.  
 Hyoscyamus.  
 Nicotiana.  
 Solanum.  
 Physalis.  
 Atropa.  
 Capsicum.  
 Datura.  
 Nolana.

OROBANCHEÆ.

Pinguicula.  
 Utricularia.  
 Lathræa.  
 Orobanche.

Obularia.  
 Cymbaria.  
 JASMINA.  
 Syringa.  
 Eranthemum.  
 Ligustrum.  
 Jasminum.  
 Nyctanthes.  
 Phyllirea.  
 Olea.  
 Chionanthus.  
 Fraxinus.

VERBENÆ.

Verbena.  
 Phryma.  
 Houstonia.  
 Lantana.  
 Petitia *Jacq.*  
 Cornutia.  
 Callicarpa.  
 Vitex.  
 Clerodendrum.  
 Volkameria.  
 Citharexylum.  
 Duranta.  
 Petrea.  
 Gmelina.

ACANTHI.

Capraria.  
 Dodartia.  
 Columnea.  
 Mimulus.  
 Gratiola.  
 Sesamum.  
 Martynia.  
 Craniolaria.  
 Bignonia.  
 Pedalium.  
 Torenia.  
 Dianthera.  
 Justicia.  
 Barleria.  
 Ruellia.  
 Acanthus.

GENTIANÆ.

Swertia.  
 Chironia.  
 Exacum.  
 Gentiana.  
 Ophiorhiza.  
 Lisianthus.  
 Chlora.



## SAPOTÆ.

Myrsine.  
 Leucoxydon *Burm.*  
 Achras.  
 Chrysophyllum.  
 Sideroxylum.  
 Carissa.  
 Olax.  
 Rauvolfia.  
 Jacquinia.  
 Ophioxylum.  
 Cerbera.

## APOCINA.

Plumeria.  
 Echites.  
 Ceropegia.  
 Nerium.  
 Apocinum.  
 Asclepias.  
 Periploca.  
 Pergularia.  
 Cynanchum.  
 Stapelia.  
 Vinca.  
 Tabernæmontana.  
 Cameraria.

## CONVOLVULI.

Convolvulus.  
 Ipomœa.  
 Evolvulus.  
 Polemonium.  
 Phlox.  
 Diapensia.  
 Loëselia.  
 Penœa.

## BORRAGINEÆ.

Messerschmidia.  
 Tournefortia.  
 Siphonanthus.  
 Borrago.  
 Cynoglossum.  
 Asperugo.  
 Pulmonaria.  
 Lycopsis.  
 Anchusa.  
 Myosotis.  
 Onosma.  
 Symphytum.  
 Lithospermum.  
 Heliotropium.  
 Oldenia.

## Hydrophyllum.

Patagonula.  
 Ehretia.  
 Cordia.  
 Varronia.  
 Menais.

## LABIATÆ.

Lycopus.  
 Amethystea.  
 Cunila.  
 Ziziphora.  
 Monarda.  
 Rosmarinus.  
 Salvia.  
 Collinsia.  
 Ajuga.  
 Teucrium.  
 Satureia.  
 Thymra.  
 Hyssopus.  
 Nepeta.  
 Lavandula.  
 Betonica.  
 Sideritis.  
 Perilla.  
 Mentha.  
 Glecoma.  
 Lamium.  
 Galeopsis.  
 Stachys.  
 Ballota.  
 Marrubium.  
 Leonurus.  
 Phlomis.  
 Molucella.  
 Clinopodium.  
 Origanum.  
 Thymus.  
 Melissa.  
 Dracocephalum.  
 Horminum.  
 Melittis.  
 Ocimum.  
 Trichostema.  
 Scutellaria.  
 Prunella.  
 Cleonia.  
 Prasium.

## CRUCIFERÆ.

Bunias.  
 Isatis.

## Crambe.

Myagrum.  
 Vella.  
 Anastatica.  
 Subularia.  
 Draba.  
 Lepidium.  
 Thlaspi.  
 Cochlearia.  
 Iberis.  
 Alyssum.  
 Clypeola.  
 Biscutella.  
 Lunaria.  
 Ricotia.  
 Dentaria.  
 Cardamine.  
 Sisymbrium.  
 Erysimum.  
 Cheiranthus.  
 Heliophila.  
 Hesperis.  
 Arabis.  
 Turritis.  
 Brassica.  
 Sinapis.  
 Raphanus.  
 Cakile *T.*

## PAPAVERACEÆ.

Bocconia.  
 Sanguinaria.  
 Chelidonium.  
 Argemone.  
 Papaver.  
 Hypecoum.  
 Fumaria.  
 Impatiens.  
 Podophyllum.  
 Nymphaea.  
 Sarracena.  
 Monotropa.

## CAPPARIDES.

Cleome.  
 Tropæolum.  
 Viola.  
 Reseda.  
 Melianthus.  
 Capparis.  
 Crateva.  
 Morifonia.  
 Marcgravia.



RANUNCULI.

Adiaa.  
Clematis.  
Anemone.  
Atragene.  
Thalictrum.  
Adonis.  
Peonia.  
Caltha.  
Myosurus.  
Ranunculus.  
Helleborus.  
Isopyrum.  
Trollius.  
Aquilegia.  
Delphinium.  
Aconitum.  
Garidella.  
Nigella.

LAURI.

Epimedium.  
Leontice.  
Berberis.  
Hamamelis.  
Laurus.

RUTÆ.

Ruta.  
Dictamnus.  
Peganum.  
Fagonia.  
Zigophyllum.  
Guaiacum.  
Diosma.  
Lawsonia.  
Cistus.  
Hypericum.  
Ascyrum.

GERANIA.

Malpighia.  
Banisteria.  
Triopteris.  
Bombax.  
Hermannia.  
Geranium.  
Oxalis.  
Paullinia.  
Cardiospermum.  
Passiflora.  
Vitis.  
Cissus.  
Menispermum.  
Cissampelos.

Sapindus.

TILIÆ.

Heliocarpus.  
Triumfetta.  
Tilia.  
Grewia.  
Thea.  
Tribulus.  
Corchorus.  
Bixa.  
Helicteres.  
Liriodendrum.  
Magnolia.

ANONÆ.

Anona.  
Uvaria.  
Xylopiæ.  
Curatella.  
Ochna.  
Illicium.

CARYOPHYLLÆ.

Bufonia.  
Ortega.  
Loeflingia.  
Holoosteum.  
Mollugo.  
Polycarpon.  
Minuartia.  
Queria.  
Lechea.  
Sagina.  
Nama.  
Pharnaceum.  
Alfina.  
Linum.  
Velezia.  
Moerhingia.  
Gypsophylla.  
Saponaria.  
Dianthus.  
Drypis.  
Cucubalus.  
Silene.  
Stellaria.  
Arenaria.  
Cherleria.  
Agrostemma.  
Lychnis.  
Cerastium.  
Spergula.  
Glinus.  
Frankenia.

Sarothra.

JALAPÆ.

Pisonia.  
Boerhaavia.  
Mirabilis.  
Ovieda.  
Plumbago.  
Statice.  
Plantago.  
Cressa.  
Gomphrena.  
Achyranthes.  
Celosia.  
Iresine.

AMARANTHUS.

SALSOLÆ.

Salicornia.  
Salsola.  
Crucita.  
Anabasis.  
Ceratocarpus.  
Blitum.  
Piper.  
Chenopodium.  
Atriplex.  
Corispermum.  
Axyris.  
Acnida.  
Beta.  
Spinacia.  
Petiveria.  
Rivinia.  
Phytolacca.  
Coriaria.  
Calligonum.  
Galenia.  
Datisca.

THYMELEÆ.

Thesium.  
Stellera.  
Passerina.  
Lachnæa.  
Dirca.  
Daphne.  
Gnidia.  
Osyris.  
Hippophae.  
Elæagnus.  
Conocarpus.  
Nyssa.

POLYGONÆ.

Polycnemum.



Camphorosma,  
 Basella.  
 Polygonum.  
 Atraphaxis.  
 Coccoloba.  
 Rumex.  
 Rheum.  
 Triplaris.  
 Corrigiola.  
 Telephium.  
 Tamarix.  
 Herniaria.  
 Illecebrum.  
 Scleranthus.  
 Trianthema.

SEMPERVIVÆ.

Montia.  
 Claytonia.  
 Portulaca.  
 Cuscuta.  
 Sauvagesia.  
 Saxifraga.  
 Tiarella.  
 Mitella.  
 Ribes.  
 Hydrangea.  
 Heuchera.  
 Samolus.  
 Adoxa.  
 Chrysosplenium.  
 Penthorum.  
 Aldrovanda.  
 Drosera.  
 Parnassia.  
 Tillæa.  
 Crassula.  
 Cotyledon.  
 Sefuvium.  
 Aizoon.  
 Forskalea.  
 Sedum.  
 Sempervivum.  
 Rhodiola.

Mesembryanthemum.  
 Cactus.  
 Tetragonia.  
 Itea.

MYRTILLÆ.

Diospyros.  
 Royena.  
 Styrax.

Blæria.  
 Azalea.  
 Kalmia.  
 Epigæa.  
 Gaultheria.  
 Rhododendrum.  
 Andromeda.  
 Erica.  
 Arbutus.  
 Vaccinium.  
 Hedera.  
 Empetrum.  
 Ledum.  
 Pyrola.  
 Clethra.  
 Samyda.  
 Citrus.  
 Melia.  
 Trichilia.  
 Swietenia.  
 Cedrela.

MALVÆ.

Theobroma.  
 Ayenia.  
 Byttneria.  
 Melochia.  
 Pentapetes.  
 Sida.  
 Napæa.  
 Malva.  
 Malope.  
 Alcea.  
 Althæa.  
 Lavatera.  
 Urena.  
 Gossypium.  
 Hibiscus.  
 Adansonia.  
 Stewartia.  
 Camellia.  
 Gordonia.

LEGUMINOSÆ.

Ceratonia.  
 Gleditsia.  
 Tamarindus.  
 Guilandina.  
 Mimosa.  
 Adenanthera.  
 Poinciana.  
 Cæsalpina.  
 Cassia.

Hæmatoxylum.  
 Hymenæa.  
 Bauhinia.  
 Cercis.  
 Anagyris.  
 Sophora.  
 Parkinsonia.  
 Borbonia.  
 Ulex.  
 Genista.  
 Spartium.  
 Ebenus.  
 Aspalathus.  
 Crotalaria.  
 Ononis.  
 Anthyllis.  
 Psoralea.  
 Trifolium.  
 Trigonella.  
 Lotus.  
 Medicago.  
 Cytisus.  
 Dolichos.  
 Phaseolus.  
 Erythrina.  
 Arachis.  
 Lupinus.  
 Clitoria.  
 Lathyrus.  
 Pisum.  
 Orobus.  
 Cicer.  
 Vicia.  
 Ervum.  
 Scorpiurus.  
 Ornithopus.  
 Æschynomene.  
 Hippocrepis.  
 Hedyсарum.  
 Coronilla.  
 Amorpha.  
 Glycyrrhiza.  
 Galega.  
 Indigofera.  
 Robinia.  
 Phaca.  
 Colutea.  
 Glycine.  
 Piscidia.  
 Biserrula.  
 Asragalus.



CAMPANULÆ.

Campanula.  
Trachelium.  
Roella.  
Gesneria.  
Phyteuma.  
Jasione.  
Lobelia.

ONAGRÆ.

Circæa.  
Oenothera.  
Gaura.  
Epilobium.  
Ludwigia.  
Jussia.  
Philadelphus.  
Blakea.  
Melastroma.  
Mentzelia.  
Turnera.  
Combretum.

CUCURBITACEÆ.

Sicyos.  
Bryonia.  
Melothria.  
Momordica.  
Cucumis.  
Cucurbita.  
Trichosanthes.  
Fevillea.  
Gronovia.  
Zanonia.

SALICARIÆ.

Isnardia.  
Ammania.  
Peplis.  
Glaux.  
Rhexia.  
Lythrum.  
Bæckeia.  
Osbeckia.

MYRTI.

Eugenia.  
Caryophyllus.  
Myrtus.  
Psidium.  
Punica.

RHAMNI.

Rhamnus.  
Ziziphus T.  
Paliurus T.

Ceanothus.

Celastrus.  
Bosea.  
Castine.  
Evonymus.  
Staphylea.  
Ilex.  
Prinos.  
Phylica.  
Gouania.

ROSACEÆ.

Sanguisorba.  
Poterium.  
Cliffortia.  
Alchimilla.  
Aphanes.  
Agrimonia.  
Nevrada.  
Rosa.  
Tormentilla.

Sibbaldia.  
Fragaria.  
Comarum.  
Potentilla.  
Dryas.  
Geum.  
Rubus.  
Amygdalus.  
Cerasus.  
Prunus.  
Cratægus.  
Sorbus.  
Mespilus.  
Pyrus.  
Spiræa.  
Æsculus.  
Acer.

TEREBINTI.

Anacardium.  
Avicennia.  
Chrysobalanus.  
Hirtella.  
Myrica.  
Cneorum.  
Ptelea.  
Dodonæa.  
Fagara.  
Rhus.  
Spondias.  
Schinus.  
Bursera.

Pistacia.  
Zanthoxylum.  
Juglans.

AMENTACEÆ.

Salix.  
Populus.  
Platanus.  
Liquidambar.  
Betula.  
Carpinus.  
Fagus.  
Ulmus.  
Celtis.  
Corylus.  
Quercus.  
Morus.  
Humulus.  
Cannabis.  
Theligonum.  
Urtica.  
Parietaria.  
Ficus.  
Dorstenia.

EUPHORBIÆ.

Mercurialis.  
Acalypha.  
Tragia.  
Euphorbia.  
Buxus.  
Phyllanthus.  
Andrachne.  
Clusia.  
Ricinus.  
Jatropha.  
Croton.  
Dalechampia.  
Plukenetia.  
Hura.  
Hippomane.  
Sterculia.  
Carica.

CONIFERÆ.

Ephedra.  
Taxus.  
Juniperus.  
Cupressus.  
Thuya.  
Pinus.



## INDEX METHOD I

## ORDINES NATURALES COMPLECTENTIS.

Acotyledones. . . . .			Class. I
Monocotyledones. . . . .	{	Stamina hypogyna.	II
		perigyna.	III
		epigyna.	IV
Dicotyledones. . .	{	Stamina epigyna.	V
		perigyna.	VI
		hypogyna.	VII
	{	Corolla hypogyna.	VIII
		perigyna.	IX
		epigyna.	{
		antheris connatis.	
		antheris distinctis.	
	{	Stamina epigyna.	XII
		hypogyna.	XIII
		perigyna.	XIV
	Dielines irregulares.		XV



# SERIES ORDINUM NATURALIUM.

CLASSIS I.		33 Plumbagines.	66 Acera:
1 Fungi.		CLASSIS VIII.	67 Malpighiæ:
2 Algæ.	34 Lyfimachia.		68 Hyperica.
3 Hepaticæ:	35 Pediculares.		69 Guttiferæ:
4 Musci:	36 Acanthi.		70 Aurantia.
5 Filices.	37 Jasmineæ:		71 Meliæ.
6 Naiades:	38 Vitices.		72 Vites.
CLASSIS II.		39 Labiatæ:	73 Gerania:
7 Aroïdeæ.	40 Scrophulariæ:		74 Malvaceæ.
8 Typhæ:	41 Solanææ.		75 Magnoliæ:
9 Cyperoïdeæ:	42 Borraginææ.		76 Anonæ.
10 Graminææ.	43 Convolvuli.		77 Menisperma:
CLASSIS III.		44 Polemonia.	78 Berberides.
11 Palmæ.	45 Bignoniæ.		79 Tiliaceæ.
12 Asparagi.	46 Gentianæ.		80 Cisti.
13 Junci.	47 Apocinææ.		81 Rutaceæ.
14 Lilia.	48 Sapotæ.		82 Caryophylleæ.
15 Bromeliæ:	CLASSIS IX.		CLASSIS XIV.
16 Asphodeli.	49 Guaiacanæ.		83 Sempervivæ.
17 Narcissi.	50 Rhododendra.		84 Saxifragæ.
18 Irides.	51 Ericæ:		85 Cacti.
CLASSIS IV.		52 Campanulaceæ:	86 Portulacææ.
19 Musæ.	CLASSIS X.		87 Ficoïdeæ.
20 Cannæ.	53 Cichoraceæ.		88 Onagræ.
21 Orchides.	54 Cinarocephalæ.		89 Myrti.
22 Hydrocharides.	55 Corymbiferæ.		90 Melastomæ:
CLASSIS V.		CLASSIS XI.	
23 Aristolochiæ.	56 Dipsaceæ.		91 Salicariæ.
CLASSIS VI.		57 Rubiaceæ.	92 Rosaceæ.
24 Elæagni.	58 Caprifolia.		93 Leguminosæ.
25 Thymelex.	CLASSIS XII.		94 Terebintaceæ:
26 Proteæ.	59 Araliæ.		95 Rhamni.
27 Lauri.	60 Umbelliferæ.		CLASSIS XV.
28 Polygoneæ.	CLASSIS XIII.		96 Euphorbiæ.
29 Atriplices.	61 Ranunculaceæ.		97 Cucurbitaceæ.
CLASSIS. VII.		62 Papaveraceæ.	98 Urticæ.
30 Amaranthi.	63 Cruciferæ.		99 Amentaceæ:
31 Plantagines.	64 Capparides.		100 Coniferæ.
32 Nyctagines.	65 Sapiindi.		



# I.

## ACOTYLEDONES,

### *LES ACOTYLEDONES.*

Corculum feminis Cotyledonibus destitutum.

---

**C**ORCULUM in germinatione extensile, non partitum in cotyledones seu feminales lobos, sed indivisum, in aliis (Ord. 1, 2, 3, 4.) subtùs radicans aut floccidum, suprà & in ambitu variè productum, in aliis (Ord. 5, 6.) suprà caulescens, basi caulis laterales emittente radículas.

*Obs.* Præcipuus Acotyledonum caracter è semine deducendus diversos in ejusdem evolutione modos admittit suprà expositos, & secundariæ divisioni instituendæ præprimis idoneos, modò præmissâ observatione in omnibus innotuerint. Huic minùs proficit divisioni respectivus sexuum situs, in classe nondùm satis definitus quia vel ignoti occultantur sexus, vel in distinctis perianthiis sæpius segregantur. Indè stat usquenunc indivisa classis in plurimos tantùm ordines dispertienda.





## CLASSIS I.

## PLANTÆ ACOTYLEDONES.

**O**RGANA sexualia in aliis minimè aut parùm conspicua, in aliis tenuissima aut incerta, in aliis spectabilia. Masculæ partes, dùm conspicuæ, interdum mixtæ fœmineis in eodem organo, sæpius in diverso segregatæ. Pollen masculum nunc nudum, nunc latens in antherâ aut folliculo, quorum diversa insertio ac dispositio. Pistillum structurâ & partium situ numeroque varium, germine nudo aut sæpius tecto. Semina quorundam notissima, plurimorum nondum visa, cæterorum vix conspicua, in germinatione non manifesta: undè incerta in multis & observationibus confirmanda germinis suprà indicata evolutio.

*Obs.* Sextuplex hùc revocatur ordo; Algæ & Naiades nondum satis definitæ; Fungi, Hepaticæ, Musci & Filices apprimè naturales. Fungi Animantibus Zoophytis partim analogi, Vegetantium seriem inchoantes, inter hæc & illa quasi medii, quibusdam tantum Algis conveniunt, à cæteris plantis structurâ, florazione & habitu diversissimæ. Ab Algis ad Hepaticas progressio facilis mediante Lichene; faciliior ab Hepaticis ad Muscos iisdem ferè præditos florum organis. Utrisque Filices subnectuntur florazione folliculari subaffines, cæteris signis tamen minùs similes & Palmarum quandoque mentientes habitum. Memoratos quinque ordines complectitur Cryptogamia Linnæi sic dicta à sexuum tenuiorum occultatione aut difficili investigatione. A præcedentibus plurimum dissentiunt Naiades, quarum floratio jamdiù spectabilis, sed anceps germinatio, nondum certus caractèr generalis, & vaga ordinis generumque mutua affinitas.

## O R D O I.

## F U N G I , L E S C H A M P I G N O N S .

**F**UNGI parasitici, aut erumpentes è tellure modò nudi, modò inclusi in volvâ scissili. Substantia aliis suberosa aut corticosa, aliis mollior & carnosa, aliis mucilaginea. Quidam simplices aut ramosi, quidam sphaericei; plures instructi pileo stipitato aut sessili, nunc orbiculari & pel-tato, nunc semiorbiculari & lateribus inserto. Folia nulla nec flores, sed antherarum loco pulvis intrâ aut extrâ dispersus. Pistilli vicem supplent organa variè contexta, nempe laminæ, rugæ, sulci, pori, tubi, papillæ, squamulæ, reticula, cavitates, interdum universa compages: in iis latent corpuscula, quæ terræ commissa similem, seu germinando feminum instar, seu radicando ut furculi, plantam progenerant. Suberosi Fungi perennes sunt & sæpè parasitici; ceteri parasitici aut terrestres, fugaces, ad putrescentiam promi.

## I. Fungi carnosî sphaericei.

**MUCOR**, L. \* *Moississure*. Vesiculæ læves, intus pulverulentæ; solitariae aut variè aggregatae, sessiles aut sæpius stipitatae, stipite simplici aut ramoso.

**LYCOPERDON**, T. L. \* *Tesselop*. Globus nudus aut volvâ radiatim dehiscente cinctus, sessilis aut rarius stipitatus, lævis aut rugoso-pulvereus, intus primò carnosus, mollis, solidus, dein cavus emissio per fissuram aut foramen pulvere copioso.

**TUBER**, T. \* **LYCOPERDON**, L. \* *Truffe*. Globus subterraneus, sessilis, intus carnosus, compactus, cortice venoso, undique tecto iquamis innumeris, subtus fortè feminiferis.

**CLATHRUS**, L. \* *Clathre*. Volva sphaericea aut ovoidea, sessilis aut stipitata, includens reticulum primò molle solidum, dein ipsâ lacerâ cavum cancellatum, pulvere conspersum.

I I. Fungi carnosî pileati, pileis orbicularibus, sessilibus aut sæpius stipiti centrali impositis.

**PHALLUS**, L. \* **BOLETUS**, T. \* *Satyre*. Pileus conicus subtus lævis, supra sinuosus cellulosus & umbilico pervius in stipitem fistulosum reticulatum, è volvâ erumpentem.



**BOLETUS**, T. \* **PHALLUS**, L. \* *Morille*. Pileus conicus subtus lævis aut stipiti adhærens, supra sinuosus & cellulosus, non perforatus, stipitatus stipite vix fistuloso.

**HELVELLA**, L. \* *Monacelle*. Pileus membranaceus supra & subtus lævis, plurimum corrugatus & undatim complicatus, sessilis aut stipitatus stipite rimoso ac fistuloso.

**PEZIZA**, L. \* **FUNGOIDES**, T. \* *Pesise*. Pileus stipitatus aut sæpius sessilis, utrinque lævis, modò planus, modò cupularis, subtus interdum granulofus.

**CANTHARELLUS**. \* **FUNGUS**, T. \* **AGARICUS**, L. \* *Chanterelle*. Pileus stipitatus turbinatus, supra lævis, interdum concavus, subtus plicatus plicis lamelliformibus radiatis.

**AMANITA**, Hall. \* **FUNGUS**, T. \* **AGARICUS**, L. \* *Champignon*. Pileus umbelliformis stipitatus, supra lævis aut interdum rugosus, subtus lamellatus, lamellis circa stipitem radiatis, pileo contiguus. *Species numerosissimæ in plures dividuntur sectiones (forsan posthac in plura genera) ratione stipitis pleni aut fistulosi, annulati aut nudi, lamellarum æqualium aut inæqualium, volvæ existentis aut nullæ, coloris partium, succi venenati aut innoxii.*

**SUILLUS**, Hall. \* **FUNGUS**, T. \* **BOLETUS** L. \* *Cèpe*. Pileus umbelliformis stipitatus, supra lævis, subtus tubulosus, tubulis confertis, in stratum pileo contiguum dispositis.

**HYDNUM**, L. \* **FUNGUS**, T. \* *Erinace*. Pileus turbinatus aut cyathiformis, stipitatus, supra aut intus lævis, subtus aut extus aculeis papillisve tectus.

I I I. Fungi plerumque suberosi, pileati, pileis semiorbicularibus, latere stipitatis aut sessilibus.

**AGARICUS**, T. L. \* **BOLETUS**, L. \* *Agaric*. Pileus suberosus parasiticus formâ varius, sæpè sessilis, rarò stipitatus, supra lævis, subtus excavatus sinibus inæqualibus, aut pertusus poris, aut tubulosus tubulis in unicum multiplexve stratum dispositis. *Species quædam orbiculares sessiles, supra sinuosæ aut porosæ, subtus læves; quædam carnosæ. Genus in plura fortè dividendum.*

**MERULIUS**. \* **AGARICUS**, L. \* Pileus parasiticus suberosus (quandoque carnosus terrestris) sessilis aut rarò stipitatus, supra lævis, subtus lamellatus, lamellis radiatis. *Huc referatur Agaricus alneus L.*

**AURICULARIA**, Bull. \* Pileus parasiticus sessilis coriaceus tenuis, junior contractus supra lævis aut reticulatus, subtus pilosus & arborum cortici omninò applicitus, vetustior dilatatus marginibus hinc discedens sensimque inverso habitu resupinus.

**HERICIUS**. \* **HYDNUM**, L. \* *Urchin*. Pileus parasiticus suberosus, aut subcarnosus, stipitatus aut sessilis, modò supra lævis, subtus aculeis aut papillis tectus, modò undique papillaris excepto insertionis puncto laterali; papillæ primò extus pulverulentæ,



dein pulvere evanido ad apicem tumidæ. *An pulvis masculus, tumor fœmineus?*

I V. Fungi anomali, simplices aut ramosi.

CLAVARIA, L. \* CORALLOIDES, T. \* CORALLOFUNGUS, V. \* *Clavaria*. Fungus subcarnosus, terrestris aut parasiticus, modò clavatus simplex oblongus, modò coralloides ramosus, ramulis apice tumidis, papillarum æmulis. *Hinc eliminandæ Clavariæ 1-5 Linnæi.*

*Obs.* Incerta adhucdum Fungorum generatio, licet ab Autoribus descripta. Michelius organa in laminis & tubis marginalia exserta dicit mascula, & alia intra laminas & tubos recondita fœminea asserit; sed interdum, memorante Hedwigio, marginalia deficiunt organa; interdum etiam seminibus jam maturis vigent, pro antheris ideo non habenda, rectius forsan pro germinum interiorum stigmatibus. Admissis autem germinibus Michelianis, observavit Hedwigius in lamellatis & tubulatis pileis organa præcociora ac fugaciora, idcirco mascula, nempe materiem ex filamentis succosis & annexis globulis compositam, quâ vestitur intus tela filamentosa ex contracto pilei immaturi margine ad hujus stipitem producta, expanso pileo facile solubilis, & globulis mox evanidis circa stipitem annuli instar sæpè persistens. Adversantes alii pollinis masculi feminumque denegant existentiam, & germina supradicta veros existimant surculos in tellure non germinantes sed tantummodò radicantes. Alii Fungum quia maturus sæpè vermiculis scatet putrescitque animantium more, inter animantia Zoophyta annumerant. Tenuitas partium in primâ evolutione non finit nodum planè solvere, sed observata phænomena sexuum actionem & analogiam cum cæteris plantis confirmant. Nascentis Fungi primordium filamentosum est & byssinum, in tellure aut arborum cortice latens radicis instar, passim tuberculis oblitum occultis, vicissim extra prominulis & in verum Fungum productis celeri incremento; undè D. Duchesne, in opusculo nondum edito, Fungos Lichenibus assimilans, hos pro scutis habet extraneis plantarum subterranearum seu clandestinarum. Hæc de Fungorum naturâ: difficilis etiam specierum determinatio atque distributio, quia pleræque nimium fugaces & absconditæ investigantem oculum effugiunt, indè à Linnæo pauciores memoratæ. Nomenclatio ejusdem non omnis admittitur, utpote minus recta & à vulgari nimis discrepans. Numerosiora dividuntur genera, & in novâ serie multiplicantur sectiones, postea tamen recognoscendæ, dum omnes in accuratis iconibus D. Bulliard species depinxerit.

## ORDO II.

### ALGÆ, LES ALGUES.

ALGARUM diversus habitus, dispar textura ac substantia, non similis organorum apparatus. Aliæ filamentosæ



aut gelatinosæ, Fungis aliquantulum analogæ; aliæ coriaceæ aut crustaceæ; quædam herbaceæ, quasi foliosæ, cæteris plantis magis affines. Organa sexualia in quibusdam omninò latentia, in aliis spectabilia, in aliis notissima, plurimum diversa inter se quoad structuram & situm.

### I. Filamentosæ aut gelatinosæ. Fructificatio latens.

#### BYSSI.

BYSSUS, L. \* Substantia filamentosa aut pulverulenta. *Plantæ in humidis, fugaces.*

CONFERVA, V. L. \* ALGA, T. \* *Conferve*. Fibræ capillares inter-nodis numerosis distinctæ, simplices aut ramosæ aut reticulatæ. *Plantæ lacustres & marinæ.*

TRIMELLA, L. \* NOSTOC, T. \* *Nostoc*. Substantia gelatinosa variæ figuræ. *Plantæ in humidis, fugaces; quædam tactu irritabiles, observante Adansonio.*

### II. Membranaceæ aut coriaceæ. Fructificatio incerta.

#### FUCI.

ULVA, L. \* FUCUS, T. \* Substantia membranacea pellucida, in quibusdam tubulosa aut vesiculosa. *Plantæ rivulares, lacustres & marinæ.*

FUCUS, T. L. \* ALGA, T. \* *Varec*. Monoïcus. Frondes coriaceæ sparsis instructæ vesiculis, quarum masculæ pilis intertextis intus hispidae, foemineæ gelatinâ turgidae in quâ nidulant globuli perforati semine foeti. *Plantæ aquaticæ marinæ; species formâ plurimum variæ.*

### III. Coriaceæ aut crustaceæ. Fructificatio spectabilior. LICHENES.

CYATHUS. \* FUNGOIDES T. \* PEZIZA, L. \* Calix radicalis, coriaceus, campanulatus, patens, in fundo seminifer, seminibus lentiformibus. *Huc pertinet Peziza lentifera L.*

HYPOXYLUM. \* AGARICUS, T. \* CORALLOFUNGUS, V. \* CLAVARIA, L. \* SPHÆRIA Hall. \* Monoïcum. Stipes erectus, coriaceo ligneus, simplex aut ramosus; hujus apex pulvere masculino conspersus, persistens aut deciduus. Foveolæ infra in superficie stipitis turgidi excavatæ numerosæ, pulvere foemineo nigro lunulato foetæ. *Genus Sphæria affine, discrepans fructificatione caulescente, complectens Sphærias caulescentes Halleri & Clavarias 1-5 Linnæi.*

**SPHÆRIA**, Hall. \* **CERATOSPERMUM**, Mich. \* Monoïcum. Verrucæ hemisphæricæ crustaceæ, sub corticibus arborum nascentes, & iisdem distractis exsertæ sessiles, extus conspersæ pulvere masculino mox evanido, intus ad peripheriam excavatæ alveolis minimis numerosis 1-spermis, femine lunulato. *Huc referantur Sphæriæ sessiles & crustaceæ Halleri.*

**LICHEN**, T. L. \* *Lichen*. Monoïcus. MASC Farina frondi inspersa, aut verrucæ eidem immerse, granulosa turgida massa (ex Hedwig.) mox evanida. FEM. Scutellæ sessiles aut stipitatae, sæpè subrotundæ & marginatæ margine integro aut denticulato, interdum lineares oblongæ aut convexæ sphaeroidæ, pulvere foemineo foetæ. *Plantæ terrestres aut saxosæ aut parasiticæ, formâ plurimum variæ; frondes crustaceæ, aut coriaceæ complanatæ, aut fibrosæ teretes sæpius ramosæ; scutellæ in fronde centrales aut marginales aut terminales. Species scyphiferæ & fruticulosæ seu cellis convexis sphaeroidæis terminalibus genere posthac distinguendæ, ut & L. scriptus & congenere quorum tubercula sessilia linearia minima corticibus & foliis arborum emortuis innascentia plantam ex integro constituunt.*

*Obs.* Ambiguus innititur signis character Algarum quæ dum rectius innotescunt, in duos tresve posthac ordines distribuentur. Byssi Fungis affines; Hepaticis Lichenes analogi; incertior Fucorum cognatio.

## ORDO III.

### HEPATICÆ, LES HEPATIQUES.

**FLORES** monoïci aut dioïci. Organa mascula granulosa aut follicularia, polline aut viscido humore turgida, solitaria aut sæpius conferta, nuda aut in perianthio communi aggregata, sessilia aut rariùs pedunculata. Organa foeminea nuda aut sæpius perichætio seu calice monophyllo sessili instructa, intrâ perichætium solitaria aut plurâ unico sæpius superstitè & cæteris sessilibus, singula nuda aut involuta membranâ styliferâ ad apicem sæpius dehilcente, rariùs infrâ circumscissâ. Capsulæ totidem uniloculares, mono aut polyspermæ, sessiles aut rariùs stipitatae, nudæ aut membranâ calyptræformi suprâ tectæ aut sæpius eadem circâ stipitis basim persistente cinctæ. Semina nunc levia nunc crinibus elasticis affixa, in germinatione infrâ radiantia, suprâ undique extensilia. Plantulæ herbacæ,



terrestres aut parasiticæ, repentes, subtus polyrhizæ. Frondes nunc aphyllæ complanatæ, indivisæ aut lobatæ, nunc polyphyllæ foliis distichis aut rariùs imbricatis. Organa mascula in polyphyllis axillaria aut terminalia aut foliolis insidentia, in aphyllis suprâ frondem sparsa aut marginalia; fœminea in his è frondis apice aut sinubus exorta, in illis axillaria aut terminalia.

**RICCIA**, Mich. L. \* Monoïca aut rariùs dioïca. MASC. Conulus exsertus (punctum granulatum ex *Hedwigio*) sessilis, apice truncatus & dehiscens, granulosa massâ foetus. FÆM. Capsula frondi semiimmerfa sphaerica, stylo acuminata, polysperma feminibus granulatis. *Frons aphylla complanata, plerumque radiatim lobata; flores fœminei centrales, masculi marginales aut frondis sinubus innascentes.*

**BLASIA**, Mich. L. \* Monoïca, rariùs dioïca. MASC. Punctum granulatum (capsula ex *Mich. & Linn.*) frondi immersum sessile, vix prominulum, tempore evanidum. FÆM. calix (masculus ex *Mich. & Linn.*) puncto perennior, sessilis 1-phyllus, basi ventricosus, suprâ tubulosus, limbo integer, foetus granulis racematim per tubum expulsis & circa limbum aliquandiù agglutinatione persistentibus. *Frons aphylla complanata, lobata, singulis divisuris medio 1-nerviis, versus finem nervi 1-floris flore fœmineo, juxta margines passim unicâ punctorum masculorum serie instructis. Matura humi & etiam in capsulâ germinant granula calicis idè fœminei. A Ricciâ differt calice extrâ frondem prominente.*

**ANTHOCEROS**, Mich. L. \* Monoïcus aut dioïcus. MASC. Calix frondi semiimmerfus, primò clausus, dein urceolatus apice lacerus & patens folliculis pluribus circiter 3 (femina ex *Mich. & Linn.*), sessilibus, margine annulatis foetus. FÆM. Calix sessilis cylindricus (masculus ex *ist.*) apice fissus aut dentatus, emit-tens capsulam (in exortu calyptratam ex *Hedwig.*) longam filiquæformem 2-valvem polyspermam; femina crine affixa valvis aut axi centrali filiformi. *Frons aphylla complanata lobata, versus limbum terminalem passim florifera.*

**TARGIONIA**, Mich. L. \* Monoïca? Calix sessilis 2-valvis (masculus ex *Mich. & Linn.*) globulum includens filamentis granulosis foetum. *Frons complanata oblonga obcordata sub apice 1-flora, latere instructa corpusculis (fœmineis?); cætera ignota. Character ex Schmidelio. Jungermannia congener ex Hedwigio.*

**JUNGERMANNIA**, Mich. L. \* MUSCUS, T. \* HEPATICOIDES, V. \* LICHENASTRUM, Dill. \* MARSILEA, Mich. \* Monoïca, rariùs dioïca. MASC. Folliculi vesiculares (femina ex *Linn.*) pulverulenti minimi, solitarii aut conferti, substipitati aut sæpiùs sessiles, nudi aut in membranâ vel sub fronde aut in ejusdem



sinubus latentes. Fœm. Perichætium sessile tubulosum; apice fissum. Intus germen 1 minimum sessile, stylo instructum, sæpius cinctum aliis corpusculis oblongis pistilliformibus, sed inanibus & ipso crescente ad latera rejectis. Huic membrana exterior (corolla ex Schmid.) arilliformis styliфера, posthàc apice variè dehiscens, & exhibens capsulam (anthera ex Linn.) primò sessilem, deìn stipitatum stipite gracili celerius elongato, penitus 4-valvem, polyspermam, filis elasticis seminiferis foetam. *Caracter ex Schmidelio.* *Herbulæ terrestres aut parasiticæ; frondes nunc simplices 1-phyllæ (Marfilea Mich.) variè incisæ, in superficie aut marginibus floriferæ, nunc polyphyllæ foliis imbricatis aut distichis, floribus axillaribus aut terminalibus aut foliorum apici insidentibus. Hedwigius Schmidelio assentiens in determinando partium usu, vidit insuper semina humi germinantia & radicantia. Ex ipso in J. nemorosâ, J. asplenioide, J. pusillâ membrana capsulam ambiens, infra solvitur more calyptræ Muscorum. Perichætio & corpusculis germini appositis destituitur J. pinguis ex Schmidelio.*

**MARCHANTIA**, March. L. \* **HEPATICA**, V.\* *Hépatique*. Monoïca aut dioïca. MASC. Calix margine inæqualis aut sinuatus; nunc stipitatus turbinato-peltatus (umbraculum Schmid.) subtus interdum squamulosus, suprâ alveolatus singulis alveolis folliculorum arctè complectentibus annulatum ovatum acuminatum acumine vix exserto; nunc sessilis frondi innascens cyathiformis, pariter alveolatus. Fœm. Pileus umbelliformis, primò sessilis, deìn stipitatus stipite longo, conicus ad limbum sinuosus, aut radiatim 5-10-partitus, subtus intrâ radios aut sinus alternatim 5-10-ocularis; loculi membranacei sæpè 2-valves 1-6-flori, (quidam intus tantum criniti, floribus evanidis); flosculi minimi cernui. Singulis perichætium turbinatum sessile 4-6-dentatum. Germen intus subrotundum, stylo acuminatum (basi cinctum filamentis succulentis ex Hedwig.). Huic membrana exterior (corolla ex Schmid.) arilliformis styliфера, mox apice dehiscens & 2-3-fida, retegens capsulam (vasculum ex Schmid.) primò subsessilem, deìn stipitatum & exsertam, apice multivalvem, valvis patentibus urceolatam polyspermam. Semina numerosa minuta, crinibus elasticis affixa. *Caracter ex Schmidelio.* *Herbulæ terrestres fronde granulosa pingui complanatâ repente sinuosâ; flores masculi, dum sessiles frondis superficiem impositi, dum pedunculati ex ejusdem sinubus subtus exorti ut & pedunculi florales feminei qui masculis tardiores. Quibusdam insuper speciebus organa scyphiformia limbo dentato, suprâ frondem sessilia, granulis sæta lentiformibus, aggregatis aut invicem superstratis, posthàc humi excrecentibus (observante primùm Michelio) in novam plantulam bulbilorum instar; unde Linnæus scyphos dixit femininos, licet in speciebus monoïcis sæpè deficiant & in dioïcis utrique addantur individuo, quasi superflui & nullè sexuales, organis sexualibus multò præcociores. Fructificatio eadem ac Jungermanniæ, sed sub pileo glomerata cernua,*



*non solitaria frondi insidens, capsulâ urceolatâ non penitus 4-valvi. Vis crinium seminalium elastica à Marchantio primum memorata. An genus dividendum ratione monoeciae aut diœciae, calicis masculi sessilis aut pedunculati, pilei foeminei conici aut radiati loculis uni aut multifloris?*

Obs. Hepaticæ, alias Musci hepatici dictæ, Muscis quidem hinc verè affines folliculis masculis, perichætio foemineo, germine arillato in stylum attenuato & corpusculis pistilliformibus interdum cincto, capsulâ post arilli scissionem prominente sæpè stipitatâ 1-loculari polyspermâ; indè dissimiles fronde sæpius simplici complanatâ, folliculorum congerie non filis intermixtâ, arillo germinis non infra circumscisso nec ideo calyptræ instar stipitatum fructum obtegente, sed plerumque superius fisso & circa stipitis basim intrâ perichætium persistente; dissimiles etiam defectu columellæ intrâ capsulam non operculatam & crinibus seminum elasticis. A Lichenibus membranaceis fructificatione discrepant Hepaticæ, cæterum fronde pariles & propterea à priscais autoribus Lichenes dictæ, quas ab iisdem diù prætermittas accuratius observavere post Vaillantium Micheliumque Schmideliū & Hedwigius, alique Neoterici veram organorum structuram & functionem exhibentes.

## ORDO IV.

### MUSCI, LES MOUSSES.

FRUCTIFICATIONIS pars præcipua pyxis *capitulum* dicta (anthera ex Linn.), unilocularis columellâ centrali instructa; foeta polline seu pulvere copioso columellam ambiente; sphaericea aut oblonga; apice operculata aut rariùs multivalvis; ad limbum ciliata aut rariùs integra; calyptrata aut rariùs nuda; axillaris aut terminalis; sessilis aut sæpius stipitata; antè florescentiam cincta *perichætio* seu calice mono aut polyphyllo interdum vix conspicuo, ad stipitis basim persistente, dum calyptra pyxidi prius circumposita arilli instar, dein infra soluto nexu circulari & stipite pyxididis elongato fursùm abripitur eandem obtegens. Organum aliud (foeminea pars ex Linn.) in aliis conspicuum, in aliis ignotum (aut nullam?), constans corpusculis cylindricis minimis & interjectis filis pluribus articulatis, omnibus promiscuè aggregatis in gemmas aut stellulas squamulis cinctas, plerumque sessiles.



axillares aut terminales. Plantulæ herbaceæ, terrestres aut parasiticæ, repentes aut erectæ, simplices aut ramosæ, foliis distichis aut sparsis imbricatis tectæ, aliæ tantum pyxidiferæ, aliæ pyxidiferæ simul & gemmiferæ seu monoïcæ, aliæ dioïcæ in diversis individuis pyxidiferæ & stelluliferæ.

### I. Musci veri, diclines, pyxidiferi & stelluliferi.

**SPLACHNUM**, L. \* **MUSCUS**, V. \* **BRYUM**, Dill. \* Dioïcum (aut monoïcum?). Pyxis terminalis stipitata, basi plurimum ventricosa, apice angustior cylindrica, ore 8-valvi seu 8-dentato, operculo nullo, calyptrâ lævi caducâ. Stellula solitaria terminalis. *Caulis simplex brevissimus, apice 1-florus.*

**POLYTRICHUM**, Dill. L. \* **MUSCUS**, T. \* Dioïcum. Pyxis terminalis stipitata oblonga, interdum angulata, ore ciliari & membranâ tectâ, operculo acuminato, calyptrâ villosâ, perichætio 1-phylo tubuloso. Stellulæ solitariae terminales, in rosam patentes. *Caulis simplex, apice 1-florus; stipitis apex sub pyxide tumidus.*

**MNIUM**, Dill. L. \* **MUSCUS**, T. \* **BRYUM**, Dill. \* Monoïcum aut dioïcum. Pyxis terminalis stipitata ovata, ore ciliari annulato, operculo acuminato, calyptrâ lævi, perichætio 1-phylo tubuloso minuto. Stellulæ squamulis cinctæ, aut sphaerulæ pulverulentæ nudæ, utraque terminales. *Caulis simplex aut ramosus. Mnium Dillenii, quod Conianthos D. de Beauvois, distinguitur sphaerulis pulverulentis.*

**HYPNUM**, Dill. L. \* **MUSCUS**, T. \* Monoïcum. Pyxis axillaris stipitata oblonga ciliata, operculo acuminato, calyptrâ lævi, ex perichætio polyphylo orta lateralis. Gemmæ axillares sessiles distinctæ. *Herbæ sæpius ramosæ.*

### II. Musci veri, monoclines, tantum pyxidiferi, stellulis gemmisve inconspicuis aut nullis.

**FONTINALIS**, Dill. L. \* **MUSCUS**, T. \* Pyxis axillaris, subsessilis oblonga ciliata, operculo acuminato, calyptrâ lævi, perichætio urceolari squamuloso. *Herbæ pleræque aquaticæ, ramosæ.*

**BRYUM**, Dill. L. \* **MUSCUS**, T. \* Pyxis terminalis stipitata aut rarius sessilis, sphaericea aut oblonga, ore ciliari annulato, calyptrâ lævi aut rarius pilosâ, perichætio 1-phylo minimo vix conspicuo. *Caulis simplex aut ramosus, interdum nullus. Species calyptrâ villosâ sæpè subacaulis constituunt Pogonatum D. de Beauvois, & Weissiam Ehrharti.*

**PHASCUM**, L. \* **MUSCUS**, T. \* Pyxis terminalis subsessilis aut



rariùs stipitata, ore ciliato, operculo acuminato, calyptrâ minutâ. *Caulis simplex, brevis aut subnullus.*

**BUXBAUMIA**, L. \* **Pyxis** radicalis stipitata aut subsessilis, hinc gibba, indè membranacea, ore ciliari, operculo conico facculum interiorem polliniferum sustinente, calyptrâ lævi caducâ. *Herbæ acaules; folia radicalia aut nulla.*

**SPHAGNUM**, Dill. L. \* **MUSCUS**, T. \* **Pyxis** axillaris, stipitata stipite pellucido crassiusculo, subovata, ore integro non ciliato, operculo brevi, calyptrâ nullâ, perichætio inconspicuo. *Herbæ ramosæ palustres; stipitis apex sub pyxide tumidus.*

### III. Musci spurii.

**PORELLA**, Dill. L. \* **Pyxis** axillaris sessilis oblonga, non calyptrata nec operculata, poris plurimis lateralibus dehiscens, squamulis basi cincta, foeta pulvere farinoso. *Herba ramosa, foliis distichis. Genus soli notum Dillenio.*

**LYCOPodium**, V. Dill. L. \* **MUSCUS**, T. \* **SELAGO**, Dill. \* **SELAGINOÏDES**, Dill. \* **LYCOPODIOÏDES**, Dill. \* *Lycopode*. Capsulæ sessiles nudæ non operculatæ, intus pulverulentæ; in plurimis 1-loculares 2-valves subrotundæ aut reniformes, in paucis (*Selaginoïdes Dill.*) 3-4-coccae 3-4-valves; nunc distinctæ (*Selago & Selaginoïdes Dill.*) & foliis axillares, nunc spicatæ (*Lycopodium & Lycopodioïdes Dill.*) intrâ singulas spicarum squamas imbricatas singulæ. *Herbæ ramosæ, repentes aut erectæ; foliatio imbricata circularis, aut pinnulæformis complanata ut in Lycopodioide Dill.; spicigerarum spicæ simplices aut dichotomè partitæ, sessiles aut pedunculatæ, terminales aut axillares. Pulvis capsularum inflammabilis, masculus ex Linnæo & Hallero, fœmineus ex Kolreutero quia in aquâ non intumescit: an potius uterque commixtus? Præter capsulas ex Linnæo masculas, alia sæpè exstant organa per caulem sparsa axillaria, quæ gemmæ ex Hallero, perianthia ex Linnæo fœminea 4-phylla foeta corculo nudo cotyledonibus destituto.*

**Obs.** De Muscorum naturâ & sexu inter Autores ambigitur. Michelius prior, neglectâ pyxide quam tamen fructum nuncupabat, utrumque prætereâ in stellulis sexum descripserat, nempe masculum filiformem articulatam, & fœmineum fusiformem seu cylindricum. Posthâc Dillenius pulverem pyxidis frustra satum ideò masculum, & stellulas feliciter pullulantes ideò fœmineas asseruerat experimentis suffultus, licet nondum in omnibus Muscis innotuissent stellulæ. Prædictam Dilleni determinationem mox à Linnæo deîn ab aliis diutissimè admissam impugnârunt Cryptogamistæ recentiores. Hillius posthabitis stellulis, pyxidem hermaphroditam judicans, cilia hujus marginalia staminum more mascula & pulverem in eâ delitescentem fœmineum aiebat; sed defectus ciliorum in Sphagno & aliis assertionem infirmat. Stellulas cum Michelio hermaphroditas admittunt Meesius & Kolreuter. Quoad pyxidem Meesius Hillio consentit. Kolreuter autem, observatâ Poly-



trichi pyxide post avulsam calyptram emarcidâ, masculam indè vim calyptræ pyxidem fœmineam ambientis concludit inmeritò; marcescit enim potius pyxis, quia præmaturè denudatur, calyptrâ & operculo tunc simul deciduis: quædam insuper Muscorum genera dicuntur non calyptrata. Recentior Hedwigius, accuratâ & multiplici fretus observatione, Muscis omnibus stellulas gemmasve tribuens, harum corpuscula cylindrica dicit mascula, fœta polline per terminale foramen profliente, filis articulatis succosis fœcundationem promoventibus intermixtis distincta, intrâ squamas florales imbricatas, patentes in stellulis terminalibus, conniventes in gemmis axillaribus. Alibi intrâ junius pyxidis perichætium vidit germen subfessile minimum, membranulâ vestitum propriâ, stylo & stigmate instructum, cinctum corpusculis plurimis (2-15) ipsi omninò conformibus, sed minoribus & effœtis inanibusque, intereâ *adductores* ab Autore dictis, & antea jam à Schmidelio semel observatis. Hedwigio teste, distensa ob stipitis interioris productionem membranula fœcundati germinis & dein scissione circulari infrâ soluta, cum ipso sensim erigitur mutata in calyptram; capsula seu pyxis sic stipitata, post calyptræ casum matura, copioso turgēt pulvere humi posthac germinante & ideò fœmineo. Sic ex Hedwigio calyptra corollæ vicem gerens à perichætio verè calicino distinguenda; sic etiam Musci rarò hermaphroditi germine & antheris communi involucro cinctis, plerumque diclines stellulis aut gemmis polyandris, & perichætiis monogynis effœto adductorum agmine, aut rariùs polygynis dum adductores quidam stipitati gravidantur. Pyxidis urceolatæ officium ciliis sæpè clausum marginalibus irritabilibus, duplici aut simplici serie dispositis, prætereâ operculo tegitur acuminato deciduo, cui medio subtus continua est centralis *columella*, sic à Schmidelio & ab Hedwigio dicta, ex imâ pyxide enata, nunc gracilis, nunc dilatata & pyxidi conformis instar pyxidæ internæ, intus cava & pulvisculo quasi fœta, sensim marcescens & interdum evanida aut cum operculo decidua. Hæc est theca interior jamdudum à Duhamelio (*phys. arb.* 1. p. 291.) observata in *Mnio capillari* L.; hic Buxbaumix sacculus pollinifer à Linnæo memoratus; hæc anthera lageniformis à Millero generatim admissa intrâ fœmineum pyxidis pulverem. Hæc nuper ex Belvisio (D. Palisot de Beauvois in *Dissert. mss.*) pyxidis hermaphroditæ capsula interior Muscis omnibus communis, pulvere fœmineo fœta, masculo circumdata polline, apice in operculum desinens, basi fortè continua filamento seu pedicello intrâ stipitem fistulosum contento, cujus fœcundationem concitant cilia irritatione conniventia pollen extra profliens in ipsam reprimentia. Sic fistuloso stipiti continua pyxis corollam mentitur tubulosam apice dilatatam; & Musci omnes in eodem organo bissexuales, Belvisio iudice, pistillum exhibent centrale & stamina ambientia; & prætereâ fœcundationi nullatenus incumbunt stellularum corpuscula alienis & adhucdum ignotis usibus nata. Sic etiam adversantia circa germinationem explanarentur experimenta Dillenii & Hedwigii quorum alter pyxidis pollen ambiens, alter centalem pulverem fortè severat. Quæ tamen ut prævaleat Belvisii opinio de Muscorum sexu contra Hedwigianum systema plurimis jamtunc Cryptogamistis acceptum, numerosis est observationibus confirmanda.

Muscorum semen telluri commissum, Hedwigio observante, infrâ



radicatur persistente suâ tunicâ vestiente, & simul suprâ per fissuram (ferè lateralem?) tunicae emittit corpuscula quædam (quandoque unicum aut duplex) ligulæformia succosa pellucida, apice viridula, primò brevia indivisa, dein longiora ramola, inter quæ sensim eminet nova plantula, nullusque præterea cotyledon exhibetur. An autem corpuscula pro cotyledonibus habenda; an indè potius Musci verè acotyledones; an rectius monocotyledones, indicante germinatione ferè laterali? Nodum solvent assidui germinationis hujus inquisitores.

Donc de partium naturâ & generibus indè deducendis & speciebus ad genera compellendis constiterit omnium consensu, maneat interdum genera Linnæana species omnes nunc complectentia, & conferantur admittenda tempore opportuno 25 genera Hedwigii instituta ratione orificii pyxidis nudi aut ciliati ciliis ordine simplici aut duplici, definitis aut indefinitis, integris aut partitis.

## ORDO V.

### FILICES, LES FOUGERES.

**O**RGANA ab aliis antheræ, ab aliis capsulæ dicta, in Filicibus plurimis sola hucusque cognita, sunt folliculi uniloculares, polline aut pulvere foeti, plerumque transversim bivalves, valvis hinc annulo elastico sæpè junctis, diversimodè aggesti in inferiore frondium paginâ sub membranâ involucrante, aut à fronde segregati. His in eâdem congerie commixta creduntur sexûs alterius organa ferè conformia, sed nondum satis explorata. In paucis sexus uterque conspicuus; antheræ nudæ aut involucro plures cinctæ, folliculorum instar uniloculares bivalves polliniferæ; germina simplicia aut plura, singula stigmatē unico instructa, nuda aut involucrata, nunc ab antheris segregata, nunc eisdem juncta in eodem involucro, mutata in fructus sæpè monospermos. Folia alterna, recentiora ab apice ad basim convoluta. Frondes simplices aut ramosæ, basi sæpius squamosæ, herbaceæ aut rarius arborecentes.

I. Folliculi in spicam distinctam dispositi. Cætera ignota.

**OPHIOGLOSSUM**, T. L.\* *Ophioglosse*, *Langue de serpent*. Spica oblonga linguæformis compressa, utrinque ad margines unicâ



serie multilocularis loculis transversim dehiscentibus polline  
tortis, post emissum pollen quasi utrinque crenata & plurimum  
veruculosa. *Ophioplossis* veris folium radicale, non convolutum,  
sepius simplex & enerve, emittens spicam plerumque simplicem &  
paucimulatam. Spuriis fondes ramosæ pluriis pinnatæ, recentiores  
corollatæ fuscino mare, vetustiores in ambitu foliolorum radiatim  
spiciferæ spicis sessilibus imbricatim & distichè subsquamulosis. Genus  
in hoc arvidendum & interced. medium inter Muscos & Filices. An spica  
tantum mascula; an potius in singulo ejusdem loculo uterque sexus  
ad mentem Hedwigii?

ONOCLEA, L. \* POLYPODIUM, T. \* Spica racemosa disticha.  
Folliculi 5-valves. Ex *Linnaeo* capsulæ 5-valves, valvis singulis  
basi seminiferis, semina scobiformia: an rectius?

OSMUNDA, T. L. \* POLYPODIUM, T. \* *Osmunda*. Spica racemosa.  
Folliculi 2-valves. Capsulæ polyspermæ ex *Linnaeo*.

II. Folliculi frondibus subtus impositi. Cætera ignota.

ACROSTICHUM, T. L. \* FILICULA, T. \* Fructificatio totum  
frondis terminalis discum tegens.

POLYPODIUM, T. L. \* FILIX, T. \* LONCHITIS, T. \* FILI-  
CULA, T. \* *Polypode*, *Fougere*. Fructificatio in punctis subrotun-  
dis per frondis discum sparsis.

ASPLENIUM, T. L. \* HEMIONITIS, T. \* LINGUA CERVINA, T. \*  
TRICHOMANES, T. \* RUTA MURARIA, T. \* FILICULA, T. \*  
LONCHITIS, T. \* *Cétérach*, *Scolopendre*, *Politric*, *Sauve-vie*.  
Fructificatio in lineis rectis, subparallelis, per discum frondis  
sæpius obliquè decurrentibus.

HEMIONITIS, L. \* Fructificatio in lineis variè decussatis & inter-  
textis, per frondis nervos decurrentibus.

BLECHNUM, L. \* Fructificatio in lineis duabus parallelis costæ  
frondis approximatis.

LONCHITIS, L. \* Fructificatio in lineis lunatis, frondium sinus  
occupantibus.

PTERIS, L. \* FILIX T. \* LINGUA CERVINA, T. \* *Fougere*. Fruc-  
tificatio in lineis marginalibus, frondem cingentibus.

MYRIOTHECA, Comm. \* Fructificatio in thecis numerosis an-  
theriformibus oblongis distinctis sessilibus, transversim paral-  
lelis. unicâ serie frondem subtus cingentibus. *Frons bipinnata*.  
*Caractèr ex Commersf. herb. Borb. Μυρίος θάκην, infinitæ thecæ.*

ADIANTUM, T. L. \* *Capillaire*. Fructificatio in punctis termi-  
nalibus, sub replicato margine frondis.

DAREA. \* Fructificatio in lineis brevibus solitariis, ex unico  
frondis latere subtus exsertis. *Frons decomposita singulis folio-  
lorum lobulis lateralibus unicâ lineâ instructis.*



TRICHOMANES, L. \* FILICULA, T. \* Fructificationes solitariae in calicibus seu capsulis distinctis turbinatis, supra frondem marginalibus, stylo fetaceo terminatis. *An antheræ aut germina?* T. Canariense calicibus multifloris instructum, novi forte generis prima species.

III. Antheræ strobilo impositæ. Pistilla conspicua à staminibus segregata.

ZAMIA, L. \* Dioica. Conus florum non spathaceus. MASC. Squamæ coni subpeltatæ pluribus antheris 1-ocularibus 2-valvibus onustæ. FÆM. Squamæ peltatæ; germina 2 sub singulâ peltâ; stigmata capitata; drupæ duæ 1-spermæ; nuces fibrosæ oblongæ. *Caulis simplex frutescens; folia alterna, vaginantia, conferta, terminalia, pinnata; conus inter folia terminalis, foemineus simplex magnus, masculus minor multiplex: habitus Palmæ.*

CYCAS, L. \* Dioica. MASC. Amentum unicum terminale strobiliforme imbricatum, squamis spatulatis carnosissimis numerosâ antherarum 1-ocularium 2-valvium serie subtilius testis. FÆM. Germina plura distincta, spadicebus confertis carnosissimis ultra medium immersa; styli & stigmata totidem. Drupæ totidem 1-spermæ. *Caulis simplex arborescens; folia alterna vaginantia, pinnata, terminalia: habitus Palmæ.*

IV. Antheræ pistillis mixtæ in eodem involucri.

PILULARIA, V. L. \* Pilulaire. Involucrum sessile, globosum piliforme, coriaceo-villosum, 4-valve, 4-loculare; loculi germinibus paucis infra, antheris pluribus supra foeti, utrisque eidem receptaculo laterali impositis; semina tunicata. *Caulis repens radicans; folia graminea; involucri axillaria. Character ex B. Jussæo. Linnæus pulverem masculum sub foliis admittit, & globulos foemineos 4-loculares polyspermos.*

LEMMA, J. \* MARSILEA, L. \* Involucrum pedicellatum ovatum, transversim multiloculare; loculi pistillis & antheris eidem receptaculo promiscuè impositis foeti. *Caulis repens radicans; folia longè petiolata quaternata, basi petioli floriferâ. Character ex B. Jussæo: genus sequenti malè annexum à Linnæo.*

V. Fructificatio minus nota. Plantæ Filicibus affines, foliis non convolutis.

SALVINIA, Mich. \* MARSILEA, L. \* Monoica. MASC. Verrucæ foliorum nervis impositæ sessiles numerosæ, filamentis 4 (antheræ ex Linnæo) oblongis spiralibus terminatæ. FÆM. Capsulæ intra singulos radicem fasciculos subsolitariæ globosæ 1-loculares polyspermæ.



polyspermæ *Planta aquis innatans, ramosa diffusa, ramis ad gemmula bifolius & subtilis rubicantibus. Character ex Michxio & Linnæo. An anthera verè foliis impositæ, an potius delitescens in capsulâ radicali cum gemmibus? Hujus congener Azolla Lamarck. Dict. 1. P. 343.*

ISOETES, L. \* Monoïca. Folia copacea fasciculata radicalia, basi interiori florifera, interiora iquamam cordatam, 1-andram, exteriora capsulam 2-locularem polyspermam foventia. Character denud examinandus. *Anthera sessilis 1-locularis? Planta lucifera.*

EQUISETUM, T. L. \* *Præle.* Spica densa seu conus solitarius terminalis constans filamentis numerosis axi communi densè impositis, singulis apice peltatis, peltâ subtus multivalvi emitteente spherulas plures polliniformes seris 4 elasticis instructas. *Hert & aphylla caule fistuloso striato, simplici aut ramoso, foliis verticillatim ramuloso, articulato articulis vaginâ denudâ cinctis. Cælibus vernalibus coniferis plerumque mox perituræ succedunt aliæ non coniferæ perenniores: an priores masculinæ, posteriores femininæ, sexum nondum detecto? Spherulas Hedwigianæ stigmati assimilæ, & setas pulvisculo aspersas, apice cochleariformi dilatatas, conniventes in humido, in sicco patulas, microscopio manifestas pro filamentis antheriferis habet.*

Obs. Hinc refertur ordo Muscis quodammodo affinis, licet Lemna & Pilularia monocotyledones videantur, sed habitu similior Palmis. Dùm patebunt seduloque distinguantur in omnibus antheræ & semina, verus generationis germinationisque statuetur modus verique ordinis affinitas. Sexuum concursus in eodem fasciculo suadet Lemnæ & Pilulariæ analogia, indicant Schmideliæ & Hedwigianæ observationes. Schmidelius in *Polypodio thelypteri* L. conspexit sub fronde peltas membranaceas, margine laciniatas dentibus globulosis, globulis croceis (masculis?), superimpositas congeriei capsularum quæ annulatæ polyspermæ, folliculis suprâ memoratis conformes, receptaculo communi affixæ, singulæ filo proprio detentæ. Vidit Hedwigius in *Osmundâ spicant* L. sub geminâ fasciculi oblongi membrana hinc & inde seriem corpusculorum pellucetium pedicellatorum femininorum, & alia corpuscula dissimilia globulosa nervo fasciculi medio imposita cæteris præcociora & citius evanida, ideò mascula: utraque iterum in quibusdam Polypodii & Asplenii speciebus observavit, sed feminæ oratione. Ulterius ergo scrutandæ partes, definiendusque folliculorum usus, præcipuè in Filicibus arboreis: scrutandi quoque specierum characteres. Genera Linnæi à fasciculorum formâ & situ desumpta affines separant plantas; admittuntur tamen licet non naturalia, usquedum nova & rectiora, suadente Cuettardo, deducantur è frondium texturâ aut aliis signis.





## ORDO VI.

## NAIADES, LES NAIADES.

**C**ALIX integer aut divisus, superus aut inferus, rarò nullus. Stamina definita (perigyna?). Germen superum aut inferum, unicum aut quadruplex; stylus unicuique simplex, aut rariùs duplex, aut nullus; stigma unum aut multiplex. Semina solitaria aut plura, nuda supera, aut inclusa pericarpio supero vel infero. Folia sæpiùs opposita aut verticillata. Flores in aliis hermaphroditi, in aliis monoïci aut dioïci. *Plantæ omnes herbacæ, & (excepto Saururo) aquaticæ.*

## I. Fructus inferus.

**HIPPURIS**, L. \* **LIMNOPEUCE**, V. \* *Pesse*. Calix integer non manifestus. Stamen 1 (epigynum?) filamentò brevi, antherâ oblongâ hinc sulcatâ. Germen inferum, calice suprâ marginatum; stylus 1, sulco antheræ receptus; stigma 1. Semen 1. *Caulis cylindricus simplex; folia verticillata; flores axillares.*

## II. Fructus superus, monospermus aut tetraspermus.

**CHARA**, V. L. \* *Charagne*. Monoïca. FÆM. Calix 4-5-phyllus (superus ex *Vaill. act. Paris. 1719*) laciniis spiràliter appressis germi turbinato cui stylus 0, stigma 5-fidum; capsula polysperma (1-sperma ex *Linn.*) MASC. Anthera globulosa sessilis, nunc fœmineo flori extrâ calicem subjecta, nunc ab eodem distans & solitaria. *Caulis aphyllus ramosus, ramis verticillatis pluriès articulatis, ad articulos dentatis & sæpiùs 1-floris.*

**CERATOPHYLLUM**, V. L. \* Monoïcum. Calix multipartitus. MASC. Stamina plura, numeri laciniarum calicis dupla (14-20) antheris oblongis. FÆM. Germen 1 compressum; stylus 0; stigma obliquum. Nux acuminata 1-sperma. *Folia verticillata, linearia, dichotoma; flores axillares solitarii. An semen potiùs 2-lobum?*

**MYRIOPHYLLUM**, V. L. \* **POTAMOGETON** T. \* *Volant d'eau*. Monoïcum. Calix 4-partitus inæqualis. MASC. Stamina 8 antheris oblongis. FÆM. Germina 4; styli 0; stigmata pubescentia. Semina 4. *Folia verticillata, linearia, pinnata; flores axillares sessiles solitarii, in superioribus verticillis masculi, in inferioribus fœminei. M. Verticillatum sæpè hermaphroditum. Caractèr ex Linn. Corolla intrâ calicem 4-petala ex Vaill. act. Paris. 1719. An calix verè 4-par-*



titus ; an potius 4-fidus superus apice 4-petalus , ut in *Cercodæ* & *Onagris* imò affinis ? An germen idè simplex inferum corculo seminum 2-lobo ?

**NAIAS**, L. \* **FUCUS**, T. \* **FLUVIALIS** V. \* *Naiade*. Monoïca. Masc. Calix 2-fidus. Stamen 1 filamento longo, antherâ 4-valvi (quæ corolla 4-fida Linn.) valvis patentibus. Fœm. Calix 0. Germen 1 ; stylus 1 ; stigmata 2. Nux 1 aut 4-sperma. *Folia 3 verticillata vaginantia ; flores axillares sessiles.*

**SAURURUS**, L. \* Calix, squamula lateralis persistens. Stamina 6-7 (hypogyna ?). Germina 4 ; styli 0 ; stigmata 4, germinibus intus adnata. Baccæ 4 monospermæ. *Caulis erectus ; folia alterna petiolo alato vaginante, juniora convoluta ; flores amentacei ; amenta foliis opposita. An affnior Aroïdeis, aut Piperi ? An semen germinans 1 aut 2-lobum ?*

**APONOGETON**, LS. \* Calix, squamula lateralis simplex aut 2-partita. Stamina 6-12 lateralia seu exteriora (hypogyna ?). Germina 3-4, inter rachim & stamina ; styli & stigmata 3-4. Capsulæ 3-4, singulæ basi 3-spermæ. *Folia radicalia ; flores in scapis densè spicati terminales, spathâ tenuissimâ aut subnullâ spicam regente simplicem aut 2-partitam. Character ex L. Suppl. Habitus Potamogetonis. An Aroïdeis approximandum ?*

**POTAMOGETON**, T. L. \* *Epi d'eau*. Calix 4-partitus. Stamina 4. Germina 4 ; styli 0 ; stigmata 4. Semina 4 nuda. *Folia vaginantia, caulina sæpè alterna, floralia sæpè opposita ; flores spicati, terminales aut axillares ; ramuli & spicæ sæpè basi 2-spathacæ.*

**RUPPIA**, L. \* **CORALLINA** T. \* Calix 2-valvis deciduus. Stamina 4. Germina 4 subfessilia ; styli 0 ; stigmata 4. Semina 4 nuda, stipitata stipitibus plurimùm elongatis filiformibus. *Herba capillaris ramosa ; folia graminea vaginantia, caulina alterna, floralia subopposita ; flores in spiculis seu spadicebus solitariis plerumque terminalibus distichis ; spicula subulata, maturis fructibus apice incurva.*

**ZANICHELLIA**, L. \* **ALGOIDES**, V. \* Monoïca. Calix 1-phyllus turbinatus. Germina 4, rariùs 2-6 ; styli totidem ; stigmata totidem peltata plana. Semina totidem nuda. Stamen 1 filamento ad basim calicis extùs inserto. *Flores axillares solitarii ; planta capillaris ramosa.*

**CALLITRICHE**, L. \* **STELLARIA**, V. \* Calix 2-partitus. Stamen 1 filamento longo. Germen 1 ; styli & stigmata 2. Capsula 4-gona 2-ocularis 4-sperma. *Folia opposita ; flores axillares. An Peplidi affinis ? An semen germinans 1 aut 2-lobum ? Species una monoïca.*

III. Fructus superus oligospermus, feminibus non definitis.

**LENTICULA**, T. V. \* **LEMNA**, L. \* *Canillée, Lentille d'eau*. Monoïca.



Calix 1-phyllus integer, latere dehiscens. MASC. Stamina 2; pistillum abortiens. FÆM. Germen 1; stylus brevis persistens; stigma 1. Capsula acuminata 1-locularis, oligosperma, seminibus oblongis striatis. *Herbæ minimæ aquis innatantes, sæpius 3-phyllæ, subius radicales, in junctiōe foliorum florifræ, hinc masculæ, indè fæmineæ.*

Obs. Naiadum semen germinans indivisum nullo emisso lobo laterali, in aliis infra radicitur & supra in caulem assurgit, in aliis superius tantum emittit plumulam basi hinc & indè radicantem, ut in Trapa. An indè Trapa ad Naiades revocanda? An potius plurimæ ex Acotyledonibus eliminandæ Naiades, aliis ordinibus paulò affiniores? Denuò observanda hæc in omnibus germinatio.







## I I.

# MONOCOTYLEDONES, *LES MONOCOTYLEDONES.*

Corculum seminis ex radiculâ, plumulâ  
& unico lobo seu cotyledone constans.

---

**C**ORCULUM germinans è tuberculo ad latus producto emittit superiùs plumulam, inferiùs radiculam, utramque, dùm tenera adhuc, enutritam succis in cotyledone collectis ac paratis, donec radicula increscens, ipsa telluris rorem exfugat & sufficientem idoneumque plumulæ caulescenti deferat succum. Inutilis tunc marcescit cotyledon, & plantula suâ compos affurgit proprio gaudens habitu quem constituit laxis & mollis organorum, præcipuè interiorum, apparatus. Indè cotyledon simplex, germinatio lateralis, & mollior habitus proprii sunt Monocotyledonum characteres.

*Obs.* Constans cotyledonis unitas, diversus ejusdem lateralis in semine germinante situs. Seminis enim crusta seu tunica cotyledonem emissâ plantulâ involvens, & postea superstes ejusdem detrimento facta, diversimodè disponitur. Modò fursùm elevatur insidens apici folii

primarii, ut in Phœnice, Typhâ, &c., aut dependens ex eodem apice in filum reflexum attenuato, ut in Allio, Asphodelo, Hyacintho, &c.; modò vaginæ primariæ plantulam circumdanti appingitur, terminalis in Aletri, Alstroëmeriâ, &c., aut dorsalis sessilis in Ixiâ, Gladiolo, Aloë, &c., aut dorsalis filo pendulus in Antherico, &c., aut radicalis in Gramineis, Cyperoides, &c. Cæteras omittimus evolutiones feminis utpotè minùs perpensas. Harum quælibet est immutabilis & essentielles præfert characteres, forsan præponendos in distinguendis Monocotyledonum classibus; sed nondùm observata plurimarum evolutio, nec constat eandem esse in plantis aliundè analogis.

Staminum insertio, notiora usquedùm suppedians signa pariter immutabilia, ideò præponitur. Ea, deficiente in Monocotyledonibus corollâ, est absolutè immediata, & nullo mediante fulcro petalode, stamina triplici insident parti, nempe calici, aut pistillo, aut pistilli fulcro seu receptaculo: undè triplex conficitur classis. Quartam non exigit sexuum separatio quæ abortu tantùm producitur in Gramineis quibusdam monoïcis, aut in paucis Liliaceis dioïcis, nec potest declines plantas ab hermaphroditis consimilibus dimovere.

Numero classium majori obstat corollæ defectus. Hunc in Monocotyledonibus defectum negant ii qui simplex floris perianthium calicinum in Liliaceis coloratum, Tournefortio duce, corollam nuncupant minùs rectè. Corolla enim, involucrum floris interius, in cæteris plantis sæpiùs calice stipatur; non pedunculi cuticulæ sed libro continua est; nunquàm cum germine infero concrescit, & suas lacinias aut sua petala cum staminibus numero æqualibus plerumque alternat. Hæc signa corollæ propria sibi non vindicat perianthium Monocotyledonibus commune, orbatum calice extraneo, cuticulæ continuum, infero germi adnatum, ad ungues staminiferum, & ideò pro vero habendum calice.





## C L A S S I S I I.

## P L A N T Æ M O N O C O T Y L E D O N E S.

## S T A M I N A H Y P O G Y N A.

**C**ALIX inferus mono aut polyphyllus aut nullus. Corolla nulla. Stamina hypogyna, seu sub pistillo inserta, sæpè definita, rariùs indefinita. Germen superum simplex; stylus unicus aut multiplex aut nullus; stigma simplex aut partitum. Semen unicum, nudum tectumve, aut fructus unilocularis mono vel polyspermus. Folia plerumque alterna & vaginantia. Flores interdum abortu diclines.

*OBS.* Quæ postea de staminibus apud Dicotyledones hypogynis (Class. 7. 13.) dicentur, eadem ferè nunc Monocotyledonibus hypogynis tribuenda.

Quadruplex in hac classe disponitur ordo, singulus naturalis, nempe 1°. Aroïdeæ à subsequentibus plurimum discrepantes, nulli tamen alteri classi rectiùs adjiciendæ, donec innotuerit germinatio; 2°. Typhæ floribus aroïdeo more ferè dispositis, Cype-roïdeis tamen viciniore, sed diversè germinantes; 3°. Cype-roïdeæ inter Typhas & Gramineas mediæ, his præcipuè affines; 4°. Gramineæ demum floratione & fructu distinctæ, ordinem verè naturalem nemine dissentiente constituentes. Conneditur classis hinc præcedenti (I) quia Aroïdeæ Naiadibus quibusdam analogæ, inde sequenti (III) quia parum dissentiunt à Palmis & Juncis Gramineæ.

## O R D O I.

## A R O I D E Æ , L E S A R O I D E S.

**S**PADIX simplex multiflorus, spathâ involutus aut nudus. Calix nullus aut simplex. Stamina definita aut

indefinita, spadici inserta. Germina ex eodem spadice nata, nuda aut cincta calice, nunc staminibus mixta, nunc ab eisdem segregata; styli totidem aut nulli; stigmata totidem. Fructus totidem uniloculares mono aut polyspermi. Corculum in perispermio carnosio centrale. Folia vaginantia alterna, sæpius omnia radicalia. Spadix sæpè solitarius, insidens summo cauli aut sæpius scapo radicali. Plantæ rarius caulescentes; quadam sexuum dispositione admodum irregulares.

### I. Spadix spathâ involutus.

**AMBROSINIA**, L. \* Spadix complanatus, dissepimenti instar tubum spathæ convolutæ bipartiens; in loculo posteriori infra nudus 2-glandulosus, supra staminifer antheris sessilibus numerosis; in anteriori supra nudus, basi monogynus, stylo & stigmate simplici, capsulâ polyspermâ.

**ZOSTERA**, L. \* **ALGA**, T. \* Folium vaginans, spathæ vicem gerens. Spadix linearis planus, alterâ paginâ nudus, alterâ tectus supra antheris pluribus subsessilibus, infra germinibus paucioribus nudis. Styli 0; stigmata simplicia. Capsulæ membranaceæ 1-spermæ.

**ARUM**, T. L. \* **DRACUNCULUS**, T. \* **ARISARUM**, T. \* *Gouet*, *Serpentaire*. Spatha ventricosa, basi convoluta. Spadix cylindricus apice nudus, subtus staminifer antheris 4-gonis sessilibus numerosis, infra duplici cirrhorum ordine instructus, basi tectus germinibus numerosis nudis. Styli 0; stigmata simplicia villosa. Baccæ globosæ 1-spermæ aut rarius polyspermæ. *Folia Ari T. sagittata*. *Dracunculi T. multifida*; *spatha utriusque magna patens*, *Arisari T. parva connivens*.

**CALLA**, L. \* Spatha plana aut cucullata. Spadix cylindricus tectus antheris & germinibus commixtis nudis (*in C. aethiopica* basi tantum germinifer). Styli brevissimi; stigmata acuta. Baccæ polyspermæ. *An cirrhi intermixti*.

**DRACONTIUM**, L. \* Spatha cymbiformis. Spadix cylindricus brevis, floribus tectus. Singulis calix 5-partitus coloratus. Stamina 7 antheris 4-angulis. Germen 1; stylus 1; stigma 3-gonum. Bacca polysperma. *Huc fortè referendū Quehena, Aeth. Cuyana. t. 327. (insidente ipso autore), cui caulis terroscus, folia alterna, flores minimi non descripti, in spiculam axillarem basi bracteolatam aut spathaceam dispositi*.

**POTHOS**, L. \* Spatha globosa. Spadix brevis, incrassatus, floribus tectus. Singulis calix 4-partitus. Stamina 4. Germen 1 truncatum; stylus 0; stigma 1. Bacca 1-sperma.



**HOUTTUYNIA**, Thunb. \* Spatha cordata, folio similis. Spadix oblongus pedunculatus, è spathæ petiolo vaginante erumpens, cinctus involucri seu calice communi 4-phylo, rectus germinibus. Stamina plurima supra spadicem germinibus intermixta, circa singulum circiter septena. Capsulæ 3-gonæ... *Herba caule simplici; folia alterna petiolo infra (vaginante?) 2-alato, quasi 2-stipulaceo. Character ex Thunb. Jap., mutato partium quarundam nomine. An Naiadibus affinior?*

**II. Spadix nudus, spathâ destitutus.**

**ORONTIUM**, L. \* Spadix cylindraceus, flosculis tectus. Calix 6-partitus persistens. Stamina 6, laciniis calicinis alterna. Germen 1; stylus 0; stigma 2 fidum. Folliculus tenuis 1-spermus, calice tectus, immerfus spadici.

**ACORUS**, T. L. \* Spadix cylindricus flosculis tectus. Calix 6-partitus persistens. Stamina 6, (calici inserta?). Germen 1; stylus 0; stigma punctum prominens. Capsula 3-gona 3-sperma (3-locul. polysp. ex Linn.). *Spadix innascens medio folio ultra producto æmulanti spatham planam. Affinior fortè Juncis, ex Bern. Jussæo.*

**Obs.** Germinatio præcipuos Aroidearum datura characteres, nondum satis patescit. Monocotyledones judicantur, à cæteris tamen diversæ: quod ulterius observandum. Stamina, quamvis dispositione parum regularia, hypogyna dicuntur quia semper affixa sunt spadici simul germinifero, seu quod idem est, germinum receptaculo. An Saururus & congeneres huc referendi; an idem de Pipere quoad habitum sat simili? Quis in Aro cirrhorum usus? An ordini affinis Pandanus?

## ORDO II.

### TYPHÆ, LES MASSETES.

**FLORES** monoïci: masculi aggregati, triandri, calice triphylo; foeminei pariter aggregati, calice triphylo, germine supero, stylo simplici, semine unico. Folia omnia alterna vaginantia. *Herbæ aquaticæ.*

**TYPHA**, T. L. \* *Massete*. Amentum duplex, utrumque longum cylindricum, compactum pannosum, sessile, culmi apicem obvestiens: masculum terminale calicibus 3-fetosis, staminibus stipiti communi impositis: foemineum inferum, quandoque geminum, calicibus papposis, germinibus stipitatis, stigmatibus capillaribus, seminibus minimis nudis acuminatis. *Culmi enodes*

*erecti. Seminis germinantis lobus in apice folii primarii persistens ut in Juncis.*

**SPARGANIUM**, T. L. \* *Ruban d'eau*. Amenta globulosa compacta, plura juxta caulem flexuosum; mascula terminalia; foeminea inferiora, stigmatibus geminis, drupis turbinatis mucronatis 1-spermis, (2-spermis *ex Linn.*), seminibus conduplicatis.

*Obs.* Amentacea floratio subjungit Aroïdeis Typhas aliundè Cyperoides similiores floribus triandris monospermis pariter congestis, dissimiles germinatione & defectu palearum, arilli atque perispermii. Ut in Sparganio, sic in Pandano fructus capitati: an inde affinitas?

## ORDO III.

### CYPEROIDEÆ, LES SOUCHETS.

**FLORES** hermaphroditi aut monoïci, singuli stipati paleâ calicis vicem gerente. Calix plerumque nullus. Stamina tria, sub pistillo inserta. Germen unicum superum; stylus unicus; stigma sæpiùs triplex, rarò duplex. Semen unicum nudum, aut arillatum, id est tunicâ tectum, in quibusdam fetis aut villis è basi enatis cinctum. Corculum & germinatio ut in Gramineis. Paleæ unifloræ, confertæ, in spicas aut fasciculos variè dispositæ, quædam vacuæ floribus abortientibus. Caules seu culmi cylindrici aut triquetri, in plurimis enodes, in paucis articulati. Folia floralia sessilia; radicalia & caulina vaginantia, vaginâ integrâ non fissili.

#### I. Flores monoïci.

**CAREX**, L. \* **CYPEROIDES**, T. V. \* **SCIRPOIDES**, V. \* *Laiche*. Paleæ in amentum dispositæ. Flores masculi foemineis mixti (*in Scirpoïde*, V.), aut in amento distincto superiore segregati (*in Cyperoïde* T.). Foemineis stigmata 3, interdum 2. Semen tunicatum, villis destitutum. *Margo vaginæ foliorum membranaceus.*

#### II. Flores hermaphroditi.

**FUIRENA**, Rottb. \* Paleæ aristatæ, in spiculas undique imbricatæ. Singulo flori calix 3-valvis æqualis, valvis cordatis



aristatis; stigmata 2. Semen 3-quetrum. *Spiculæ umbellato-paniculatae terminales & axillares. Character ex D. Rottboll.*

SCHÆNUS, L. \* GRAMEN, T. \* SCIRPUS, T. \* Choin. Paleæ fasciculatae conniventes. Semen nudum, villis minimis aut sæpius nullis. *Paleæ quædam vacuæ glutinam mentientes.*

GAHNIA, Forst. \* Gluma 2-valvis. Calix 2-valvis brevior. Stamina 6, filamentis persistentibus. Stylus 1 bifidus; stigmata 2 bifida. Semen angulatum. *Habitus Schæni. Character ex Forst. & L. Suppl. An potius ut in Schæno ustulato spicula ex 4 aut 6 paleis, inferioribus vacuis, 2 superioribus 1-floris 3-andris 1-gynis stylo supra 2-3-fido? Flosculi 2 sic approximati florem unicum 6-andrum 2-gynum mentiuntur, præcipuè germine uno sæpè abortivo. Genus inde fortè delendum.*

ERIOPHORUM, L. \* LINAGROSTIS, T. \* Paleæ in spicam undique imbricatæ, rectæ. Semen nudum, villis longissimis cinctum.

SCIRPUS, T. L. \* CYPERUS, T. \* Scirpe. Paleæ in spicam undique imbricatæ, conniventes. Semen nudum, villis palearum brevioribus cinctum.

CYPERUS, T. L. \* Souchet. Paleæ in spicam distichè imbricatæ. Semen nudum, villis destitutum. *Paleæ inferiores interdum vacuæ. Species plurimæ caule triquetro, spicis aggregatis pedunculatis & umbellatis.*

THRYOCEPHALUM, Forst. \* Paleæ 1-floræ. Stamina 3. Stylus 1; stigmata 2. Semen subrotundum. *Spiculæ sub-4-floræ, flosculis 1-2 inferioribus scemineis, in culmo 3-quetro dense capitati terminales involucri 3-phyllo cincti. Character ex Forstero.*

KILLINGIA, Rotth. \* Gluma 2-valvis inæqualis 1-flora. Calix longior 2-valvis inæqualis. Stamina 3. Stylus 1; stigmata 2-3. Semen 3-quetrum calice tectum. *Character ex Rottboll. Flores paleis distincti, capitati aut umbellato-capitati terminales, involucri capituli aut umbellæ 3-4-phyllo, culmo sæpius angulato. An potius flos habendus pro spiculâ 4-paleacea, paleis exterioribus vacuis?*

MAPANIA, Aubl. \* Gluma 6-valvis, valvis dentatis imbricatis. Stamina 3; stylus 1; stigmata 3. Semen 1. *Flores in culmo 3-quetro enodi infra folioso, capitati terminales involucri 3-phyllo cincti. Character ex Aubl. Guyan. t. 17. Genus idem fortè cum Thryocephalo & Killingiâ, collato in vivis caractere. An flos verè calicatus; an potius pro spiculâ habendus 6-paleacea & ideo 6-florâ, cujus flos unicus superstes terminalis, cæteris abortivis? An congener Cladium Brownæ?*

CHRYSITRIX, L. \* Capitulum compressum imbricatum squamis plurimis oblongis subæqualibus, coriaceis, cingentibus receptaculum tectum paleis numerosis fasciculatis filiformibus & totidem intermixtis staminibus quorum antheræ oblongæ fila-



mentis adnatæ Germen in capituli centro unicum aut duplex; unicuique stylus 1 brevis; stigmata 3 longa; fructus... *Herba; folia radicalia graminea; scapus compressus anceps versus apicem margine hinc fissus, emittens capitulum unicum sessile infra stipatum spatula 1-valvi coriaceo. Germen quandoque abortivum. Stigma 1 ex Linn., 5 ex König. Habitus Cyperoidearum, caracter paulo diversus. An fructus 1-spermus?*

*Obs.* Distinctio sexuum in Carice & aliorum villi cingentes & seminis unitas analogiam cum Typhis confirmant, imminutam tamen diversâ germinatione quâ Gramineis Cyperoideæ magis consentiunt. Ab his autem discrepant paleis glumam & calicem supplementibus, & seminis arillo, & foliis caulinis sessilibus aut vaginâ integrâ instructis. Genera calicata dicta diligentius observata calicem abdicabunt, admissis paleis vacuis florum abortu. An his addenda Bobartia?

## ORDO IV.

### GRAMINEÆ, LES GRAMINÉES.

**GLUMA** (calix ex Linn.) uniflora, aut multiflora flores duos pluresve distichos in spiculam seu locustam dispositos stipans, sæpius bivalvis, rarò uni aut multivalvis aut nulla. Singulo flori calix (corolla ex Linn.) glumæ conformis, plerumque bivalvis, rarò univalvis aut nullus, valvâ exteriori muticâ aut aristatâ. Stamina hypogyna, definita (indefinita in Parianâ) plerumque tria, rarius duo aut sex aut unicum, antheris oblongis basi & apice bifurcis. Germen unicum superum, basi cinctum squamulis duabus non semper conspicuis. Styli plerisque duo & stigmata duo plumosa; quibusdam stylus unicus & stigma simplex aut divisum. Semen his & illis unicum, nudum aut sæpè rectum valvâ calicis intimâ persistente. Corculum parvum, infra adnatum lateri perispermii farinacei multò majoris. Lobus ejusdem in germinatione cum adjuncto perispermo persistens sessilis, imæ hinc affixus vaginæ primariæ plumulam circumdanti.

Radices fibrosæ capillares. Caules seu culmi cylindrici, fistulosi aut intus medullares, articulati seu internodiis distincti, sæpius simplices & herbacei. Folia



alterna, in singulo culmi nodo subsolitaria vaginantia, vaginâ ad nodum usque fissili. Flores glomerati aut suprà rachim spicati, aut paniculati, autè maturefcentiam in superioris folii vaginâ reconditi. Species quædam abortu partium monoicæ.

I. Styli duo. Stamen unicum aut duplex.

CINNA, L. \* Gluma 1-flora 2-valvis. Calix 2-valvis. Stamen 1. Flores paniculati, interdum 3-andri, unde genus fortè delendum & adjiciendum Agrostidi.

ANTHOXANTHUM, L. \* GRAMEN, T. \* Flouve. Gluma 1-flora 2-valvis. Calix 2-valvis oblongus acuminatus. Squamulæ 2 interiores. Stamina 2. Flores spicato-paniculati.

II. Styli duo. Stamina tria. Gluma uniflora.

BOBARTIA, L. \* Gluma multivalvis, valvis imbricatis. Calix 2-valvis. Flores glomerati. Character ex Linn. An affinior Cype-roideis, & pæcip. è Killingiæ?

ARISTIDA, L. \* Gluma 2-valvis. Calix 1-valvis apice 3-aristato.

ALOPECURUS, L. \* GRAMEN T. \* Gluma 2-valvis. Calix 1-valvis apice simplici. Flores spicati.

PHLEUM, L. \* GRAMEN, T. \* Gluma 2-valvis truncata acumi-nata sessilis. Calix 2-valvis calice minor. Flores densè spicati.

PHALARIS, L. \* GRAMEN, T. \* Gluma 2-valvis, valvis æqua-libus carinatis. Calix 2-valvis calice minor. Flores spicati aut spicato-paniculati.

PASPALUM, L. \* Gluma 2-valvis, valvis æqualibus subro-tundis concavis. Calix 2-valvis calici subæqualis.

DIGITARIA, Hall. \* PANICUM, L. \* Gluma 2-valvis inæqua-lis mucronata. Calix 1-valvis. Flores in rachide excavatâ sessiles spicato-secundi, spicis digitatis.

PANICUM, T. L. \* MILIUM, T. \* GRAMEN, T. \* Panis, Millet. Gluma 3-valvis, valvâ tertiâ exteriori dorsali minore. Calix 2-valvis cartilagineus persistens. Flores densè aut laxè pa-niculati (sæpè setis stipati), aut digitato-spicati (qui ad Digitariam fortè revocandi omnes). An potius gluma 2-flora stosculo altero abortivo, & idèò 2-valvis?

MILIUM, L. \* Gluma 2-valvis, valvis ventricosus subæqualibus Calix 2-valvis calice minor. Flores paniculati Stigmata penicilli-formia.

AGROSTIS, L. \* Gluma 2-valvis, valvis acutis. Calix 2-valvis glumâ major. Flores paniculati.



**STIPA**, L. \* Gluma 2-valvis. Calix 2-valvis, valvâ exteriorē in aristam longissimam basi articulatam desinente.

**LAGURUS**, L. \* Gluma 2-valvis, apicibus aristatis villosis. Calix 2-valvis, valvâ exteriorē apice 2-aristatâ, dorso 1-aristatâ. *Flores spicati. Confer Trisetariam Forsk. dissimilem gl. mâ 2-florâ.*

**SACCHARUM**, L. \* **ARUNDO**, T. \* *Canne*. Gluma 2-valvis (aut o) extus basi lanata. Calix 2-valvis. *Flores paniculati. Arundini L. simile, sed hujus lanugo interior, illius exterior.*

III. Styli duo. Stamina tria. Gluma uniflora. Flores polygami.

**HOLCUS**, L. \* **GRAMEN**, T. \* Gluma 2-valvis (interdum 2-flora). Calix 2-valvis, valvæ exterioris apice aristato. Flores masculi hermaphroditis mixti, calice & germine orbat. *Flores spicato-paniculati.*

**ANDROPOGON**, L. \* **GRAMEN**, T. \* Gluma 2-valvis. Calix 2-valvis, valvæ exterioris basi aristatâ in hermaphroditis floribus sessilibus, nudâ in masculis pedunculatis.

IV. Styli duo. Stamina tria. Gluma bi aut triflora. Flores polygami.

**ANTHISTIRIA**, L. \* **ANDROPOGON**, L. \* Gluma 4-valvis 2-4-flora; valvis æqualibus apice papilloso pilosis. Flosculus 1 hermaphroditus sessilis, basi germinis aristam emittente; cæteri masculi pedunculati. Omnibus calix 2-valvis. *Flores paniculati.*

**SPINIFEX**, L. \* Gluma 2-valvis 2-flora, valvulis rachi parallelis (ut in Lolio), flosculo altero hermaphrodito, altero masculo. Utrique calix 2-valvis; hermaphrodito squamulæ 2 interiores. *Flores distichi spicis aggregatis; rachis pungens; culmus fruticosus.*

**ISCHÆMUM**, L. \* Gluma 2-valvis 2-flora, flosculo altero hermaphrodito, altero masculo. Utrique calix 2-valvis. *Flores spicati.*

**TRIPSACUM**, L. \* Monoicum. Masculis gluma 2-valvis 4-flora. Fœmineis gluma 2 aut 4-partita, 1-flora, sinubus basi perforatis. Omnibus calix 2-valvis membranaceus. *Flores spicato-digitati, fœminei ad basim spicæ masculæ. Species una hermaphrodita.*

**CENCHRUS**, L. \* **GRAMEN**, T. \* Gluma 2-valvis 2-flora, flosculo altero hermaphrodito, altero masculo. Utrique calix 2-valvis. Involucrum laciniatum echinatum, includens 3 glumas. *Flores spicati.*

**ÆGILOPS**, L. \* **GRAMEN**, T. \* *Egilope*. Gluma 2-valvis aristata 3-flora, flosculo 1 masculo inter 2 fœmineos. Singulis calix



2-valvis, valvâ exteriorē 2 aut 3-aristatâ. Pistillum in masculo abortiens. *Flores spicati.*

ROTTBOLLIA, L. S \* ÆGILOPS, L. \* Gluma 1-valvis 1 flora flosculo hermaphrodito, aut 2-partita 2 flora flosculo altero masculo. Utrique calix 2-valvis inæqualis glumâ brevior. *Flores in rachidis articulatae sinibus excavatis & alternis sessiles spicati.*

V. Styli duo. Stamina tria. Gluma bi aut triflora. Flores hermaphroditi.

AIRA, L. \* GRAMEN, T. \* Canche. Gluma 2-valvis 2-flora. Calix 2-valvis. *Flores paniculati.*

MELICA, L. \* GRAMEN, T. \* Mélique. Gluma 2-valvis 2-flora. Calix 2-valvis. Inter flosculos rudimentum tertii floris pedunculati. *Flores spicato-paniculati.*

VI. Styli duo. Stamina tria. Glumæ multifloræ glomeratæ.

DACTYLIS, L. \* GRAMEN, T. \* Gluma 2-valvis carinata; valvâ alterâ longiore. Calix 2-valvis, valvis inæqualibus. Gluma D. glomeratæ interdum 1-flora; an ea ad Phalaridem revocanda?

VII. Styli duo. Stamina tria. Glumæ multifloræ; suprà axim seu rachim densè spicatæ. *Spica sæpius simplex.*

SESLERIA, Ard. \* CYNOSURUS, L. \* GRAMEN, T. \* Gluma 2-valvis 2-3-flora (rarius 4-5-flora), valvis acuminatis, dorso subhirsutis. Calix 2-valvis valvâ exteriorē 3-aristatâ, interiorē 2-furcatâ aut 2-corni. *Flores spicati, involucro ad basim spicæ 1-3-phyllis brevi. Character ex Arduino, Hallero & Scopolio.*

CYNOSURUS, L. \* GRAMEN, T. \* Cretelle. Gluma 2-valvis multiflora. Calix 2-valvis. Receptaculum proprium 1-laterale foliaceum. *Flores secundi.*

LOLIUM, L. \* GRAMEN, T. Ivroie. Gluma 1-valvis, rachi parallela multiflora, flosculis pariter parallelis. Singulis calix 2-valvis.

ELYMUS, L. \* GRAMEN, T. \* Glumæ 2-3 in singulo axis dense; 2-valves (in *E. hystrice* nullæ), 1-2-floræ, aut sæpius multifloræ, calicibus 2-valvibus. Glumæ junctæ involucrum glumæve mutantur 4 aut 6-phyllam, 2 aut 3-stachyam, calicibus in spiculas distinctas dispositis.

**HORDEUM**, T. L. \* *Orge*. Glumæ 2-3 in singulo axis dente; 2-valves 1-floræ calicibus 2-valvibus. *An potius gluma 6-phylla 3-flora floribus distinctis?*

**TRITICUM**, T. L. \* **GRAMEN**, T. \* *Froment*. Gluma 1 in singulo dente, 2-valvis, rachii opposita, multiflora, flosculis pariter oppositis. Singulis calix 2-valvis, aristatus aut muticus..

**SECALE**, T. L. \* *Seigle*. Gluma 1 in singulo dente, 2-valvis 2-flora, floribus distinctis, calicibus 2-valvibus, valvâ exteriori aristatâ.

V I I I. Styli duo. Stamina tria. Glumæ multifloræ vagæ. *Flores sæpius paniculati.*

**BROMUS**, L. \* **GRAMEN**, T. \* *Droue*. Gluma 2-valvis. Calix oblongus 2-valvis, valvis sub apice aristatis.

**FESTUCA**, L. \* **GRAMEN**, T. \* *Fétuque*. Gluma 2-valvis. Calix 2-valvis oblongus, valvis mucronatis. *Interdum F. Myuros 1-andra, inde Cinnae affinis.*

**POA**, L. \* **GRAMEN**, T. \* *Paturin*. Gluma 2-valvis. Calix 2-valvis ovatus valvis acutiusculis.

**UNIOLA**, L. \* Gluma multivalvis, valvis distichè imbricatis. Calix 2-valvis acutus valvis carinatis. *Caracter ex Linn. Spiculae late compressæ calicibus distichis ut in Poa. An gluma melius diceretur 2-valvis & calices in spiculâ inferiores duo aut plures 2-valves vacui, flore abortivo?*

**BRIZA**, L. \* **GRAMEN**, T. \* *Amourette*. Gluma 2-valvis. Calix 2-valvis cordatus, valvis ventricosus.. *Panicula divaricata.*

**AVENA**, T. L. \* **GRAMEN**, T. \* *Avoine, Aviron*. Gluma 2-valvis. Calix 2-valvis oblongus, valvis acutis, exteriori dorso aristatâ. *Flores laxè aut contractè paniculati. Arista dorsalis A. fativæ abortiens.*

**ARUNDO**, T. L. \* **GRAMEN**, T. \* *Roseau*. Gluma 2-valvis (quibusdam 1 aut 2-flora). Calix 2-valvis basi lanatus. *Flores spicato-paniculati. Saccharo affinis, sed multiflora, glumâ non lanatâ.*

I X. Styli duo. Stamina sex, aut plura.

**ORYZA**, T. L. \* *Riz*. Gluma 2-valvis 1-flora. Calix 2-valvis; valvis navicularibus, exteriori striatâ aristatâ. Stamina 6. Squamulæ 2 interiores conspicuæ. *Flores paniculati.*

**ERHARTA**, Thunb. \* Gluma 2-valvis 1-flora. Calix duplex; uterque 2-valvis, exterior transversim rugosus major, interior lævis. Stamina 6. Squamulæ 2 interiores minimæ. Styli 2 aut stylus profundè 2-fidus. *Flores spicato-paniculati. Habitus Melicæ.*

**ZIZANIA**;



**ZIZANIA**, L. \* Monoïca. Gluma 0. Calix 2-valvis, valvâ exteriorē aristatâ. MASC. Stamina 6; antheræ subsessiles. FÆM. Styli 2 aut stylus 2-fidus. Semen oblongum nudum. *Flores paniculati, femineæ superiores in spicam contracti, masculi inferiores divaricati.*

**LUZIOLA**. \* Monoïca. Gluma 0. Calix 2-valvis muticus, in fœminis multò minor. MASC. Stamina sæpius 8, interdum 9 10; antheræ pedunculatæ. FÆM. Styli 2. Semen ovatum nudum. *Gramen annuum Peruvianum; spica mascula superâ unica laxa; panicula femineæ plures inferæ minores. Character ex D. Dombey, cui Zizania dicitur.*

X. Stylus unicus; stigma simplex. Stamina tria.

**NARDUS**. \* GRAMEN T. \* Gluma 0. Calix 2-valvis. Semen glumâ tectum. *Flores spicati.*

**LYGEUM**, L. \* GRAMEN, T. \* *Sparte*. Gluma 1-valvis magna; convoluta spatuliformis, aristata 2-flora. Calices 2, 2-valves, basi coaliti. Germina cum calicibus coalita, indè infera. Nux communis infera 2-locularis 2-sperma, hirsutissima non dehiscens. *Character in Gramineis insolitus. An stamina hypogyna, aut agglutinatione perigyna? Flores subsolitarii.*

**APLUDA**, L. \* Monoïca. Gluma 2-valvis 3-flora, floribus 2 masculis pedunculatis, 1 fœmineo sessili. Huic & illis calix 2-valvis. *Flores paniculati.*

**ZEA**, L. \* MAYS, T. \* *Mays, Mahiz*. Monoïca MASC. Gluma 2-valvis, 2-flora. Calix 2-valvis. Squamulae 2 interiores conspicuæ. FÆM. Spadix simplex, longus carnosus cylindricus, flosculis numerosissimis pressis rectus. Singulis gluma 2-valvis 1-flora; calix 2-valvis; stylus longissimus, stigma pubescens; semen subrotundum nudum, glumâ & calice persistentibus coriaceis infra cinctum. *Panicula mascula terminalis; spadices feminei infra axillares, foliis seu spathis involuti, fasciculo stylorum exserto.*

XI. Stylus unicus; stigma divisum. Stamina tria.

**PHARUS**, L. \* Monoïca. Gluma 2-valvis 1-flora. Calix 2-valvis. MASC. Stamina 3. FÆM. Germen lineare; stylus 1; stigmata 3. Semen oblongum calice tectum. *Flores laxè paniculati, masculi pedunculati, feminei commixti sessiles.*

**OLYRA**, L. \* Monoïca. Gluma 2-valvis 1-flora, valvâ exteriorē aristatâ. Calix 2-valvis. MASC. Stamina 3. FÆM. Stylus brevis; stigmata 2. Semen cartilagineum. *Flores paniculati, masculi infra fœmineos.*

**CORNUCOPIÆ**, L. \* Involucrum 1-phyllum infundibuliforme aut urceolatum, margine crenatum aut integrum, multiflorum,



Singulo flori calix 3-valvis; stamina 3; stylus 1 brevis; stigmata 2 longa; semen tectum. *Culmus ad nodos uniramulosus; involucra florifera è ramulorum nodis folio spathiformi cinctis exorta, pedunculata, solitaria aut plura.*

COIX, L. \* LACRYMA JOB, T. \* *Larmille, Larme de Job. Monoïca. MASC. Gluma 2-valvis 2-flora. Calix 2-valvis. FÆM. Gluma 3-valvis valvâ exteriori majore, 1-flora. Calix 2-valvis minor. Stylus 2-fidus; stigmata 2. Semen tectum. Pedunculi 1-2 ex foliorum superiorum vaginis, singuli compressi basi spathacei, apice desinentes in involucrum coriaceum ovatum, intus cavum, apice perforatum, monoicum, foetum flore 1 fœmineo tecto sessili, hinc valvâ glutacea exteriori cincto, indè 1-sulcato & 2-appendiculato appendicibus (flores steriles?) fistulosis clausis. Stipes ex imo involucri inter appendices exsertus, desinens in spicam masculam brevem paucifloram. Involucrum persistens durum nitidum margaritifforme.*

MANISURIS, L. \* Gluma 2-valvis 1-flora, valvâ exteriori coriaceâ subrotundâ basi utrinque emarginatâ. Calix minor 2-valvis. Stylus brevis; stigmata 2. *Flores in rachide articulata compressâ 1-laterali imbricatim spicati secundi, masculi hermaphroditis mixti, magis exstantes & divaricati. Styli 2 ex D. Thunberg. An indè genus Andropogo affinius?*

POMMEREULLA, LS. \* Gluma turbinata 2-valvis 3-4-flora; valvis inæqualiter 4-fidis dorso aristatis. Calix 2-valvis inæqualis valvâ exteriori 4-valvi majore aristatâ, interiori brevi muticâ indivisâ. Stylus 1; stigmata 2. Semen glaberrimum. *Culmi ramosi; folia bifariam imbricata; flores racemoso-spicati elegantes, quasi turbinato-pennati. Caractèr ex Linn. Suppl.*

REMIREA, Aubl. \* Gluma 2-valvis 1-flora. Calix 2-valvis minor. Stylus longus; stigmata 3. Semen calice tectum. *Culmi foliosi, supra ramosi; flores densè paniculati terminales. Caractèr ex Aubl. Guyan. t. 16.*

XII. Stylus unicus; stigma divisum. Stamina sex.

NASTUS. \* Gluma 6-8-valvis 1-flora, valvis distichè imbricatis lævibus exterioribus minoribus. Calix 2-valvis, hinc stipatus pedicello villosa (flosculi alterius abortivi?). Squamulae quaedam (2-4?) in calice interiores. Stamina 6. Styli 2 aut stylus profundè 2-fidus. Semen quandoque abortivum. *Culmus arborescens ad nodos ramosus, ramis verticillatis in apice floriferis; flores paniculati. Caractèr ex Borbonico Commerçonii specimine, dicto Calumet des Hauts. Habitus Arundinis arborescentis. Νάστος, antiquum Arundinis indicæ nomen.*

XIII. Stylus unicus; stigma divisum. Stamina plura.

PARIANA, Aubl. \* Monoïca. Gluma 2-valvis 1-flora. Calix 2-valvis. MASC. Gluma calice minor. Stamina numerosa, circiter



40. FEM. Gluma major. Stylus 1; stigmata 2. Semen calice tectum. *Spica in culmo terminalis, simplex densa verticillis 6-floris, floribus 5 masculis peduncularis, sexto centrali fœmineo sessili. Folia subpetiolata, basi coarctata, vaginae fauce barbata. Character ex Aubl. Guyan. t. 337.*

Oss. Ordo apprimè naturalis, distinctissimus habitu, flore glumaceo, feminis unitate, perispermio farinaceo, corculi situ & germinationis modo. Perispermum, maxima pars seminis, duplici tectum membranâ, hinc convexum foveâ excavatur internâ in quâ corculum sub membranâ delitescit, inde sæpius sulco exaratur longitudinali. Corculum perispermio semicinctum, ipsi nullatenus adhæret nisi mediantibus membranâ circumpositis aut fortè vasculis infimis inconspicuis. Inchoatâ germinatione semen intumescit; juxtâ corculum dirumpitur membrana duplex; emollitur perispermum; dilatatus corculi lobus rimam agit externam perispermio oppositam; idcirco perispermii simul & lobi succo enutrita per rimam superius assurgit plumula vaginulâ propriâ conclusa, inferiusque demittitur radícula, sæpius triplex multiplexve, singula ad collum involucrata, nempe una verticalis in radicem ramosam mox immutanda, dux aut plures horizontales ad latera prorepentes & posthâc culmiferæ. Ex dictis in Graminum semine maturo pars triplex constitutione dissimilis, perispermum farinaceum, corculum glutinosum, & membrana utraque furfuracea; triplex etiam in corculo germinante pariter distincta, lobus lateralis, plumula assurgens & radícula demissa.

## CLASSIS III.

### PLANTÆ MONOCOTYLEDONES.

#### STAMINA PERIGYNA.

**C**ALIX monophyllus, tubulosus aut profundè partitus, superus aut inferus, interdum nudus, plerumque stipatus spathâ uni aut multiflorâ, rariùs involucro calicem anteriorem mentiente. Corolla nulla (quod enim corolla dicitur à Tournefortio, Linnæo & aliis, nobis est verè calix). Stamina definita, rarò indefinita, imò aut summo calici inserta, calicinis laciniis opposita, filamentis distinctis aut rariùs connatis, antheris bilocularibus distinctis. In paucioribus germina

plura supera; styli aut stigmata totidem; capsulæ totidem uniloculares, monospermæ, aut polyspermæ intus bivalves feminibus valvularum margini appositis. In plurimis germen unicum, superum aut inferum; stylus unicus, rarò triplex aut nullus; stigma simplex aut divisum; fructus baccatus aut capsularis, trilocularis tri aut polyspermus, interdum loculis duobus abortivis & etiam femine unico superstite. Semina in baccis angulo loculorum interno affixa sunt; in capsulis solito trivalvibus inferuntur hinc & inde margini receptaculi elevati dissepimentum constituentis, in singulâ valvâ medii, & cum ipsâ dehiscentis. Corculum parvum in perispermo corneo majori.

*Obs.* Stamina perigynia diversos sibi semper aut sæpè confociat characteres, infra in observationibus classium VI, XIV memoratos.

Liliacæ Tournefortii seriem naturalem nemine dissidente constituentes, huc revocantur in septeno ordine dispersitæ, calicatæ omnes & corollâ destitutæ ex antea observatis p. 22. Difficilis ordinum distinctio habitu non minus percipitur quàm signis botanicis quandoquæ non satis definitis, quæ nunc deducuntur præsertim ex germinis situ, staminum numero, calicis divisuris, feminum dispositione, spatharum existentia, &c. Quæ si in omnibus ejusdem ordinis generibus signa essent conformia, statuendæ distinctioni sufficerent; sed in eodem sæpè opposita confociantur jubente naturâ quæ germen superum cum infero, calicem tubulosum cum sexpartito, stamina indefinita cum definitis conjungit interdum, & Crinum ab Amaryllide, Dioscoream à Tamno, Hyacinthum à Scillâ, Sagittariam ab Alismate non separat. An inde mutandi ordines quæsitis simplicioribus signis? Præcipuam in germinatione inquirendam distinctionem suadent observationes (p. 21. 22.) nonnullæ in generibus infra relatæ, quæ si posthac multiplicatæ valeant, hodiernus Asphodelorum ordo diversas admittens germinationes certò dividetur. Liliaceis præponuntur



Palmæ iis plurimum analogæ , aliundè tamen hinc Filicibus inde Gramineis affines.

## O R D O I.

## P A L M Æ , L E S P A L M I E R S .

**CALIX** fexpartitus , sæpè persistens , laciniis tribus exterioribus sæpè minoribus. Stamina sex , rariùs plura aut pauciora , imis laciniis calicinis ( an potiùs glanduloso corpori hypogyno ? ) inserta , filamentis sæpè basi coalitis. Germen superum , simplex , rariùs triplex ( in Chamærope ) ; stylus unicus aut triplex ; stigma simplex aut trifidum. Fructus baccatus aut drupaceus drupâ intùs reticulatâ , uni aut trilocularis , mono aut trispermus seminibus offeis. Corculum minimum , in cavitate dorsali aut laterali aut rariùs infimâ perispermi magni primò mollioris esculenti , deìn indurati cornei.

Caulis simplex cylindraceus , caudiciformis , fruticosus aut arborescens , squamosus basibus foliorum persistentibus , aut circinatis veterum basium vestigiis scaber. Folia terminalia conferta alterna , basi vaginantia ; juniora plicata & reticulari folii præcedentis vaginâ inter bases persistente cooperta aut cincta. Spadix inter folia medius , terminalis , simplex aut plerumque ramosus ramis bispathaceis , multiflorus , involutus spathâ maximâ simplici , rariùs polyphyllâ. Flores dioïci , aut monoïci ( abortu partium ? ) in eodem vel in distincto spadice , aut rariùs hermaphroditi , singuli bispathacei , spathis brevibus.

I. Frondes pinnatæ. *Foliola sæpiùs lanceolata angusta.*

**CALAMUS**, L \* *Rotang*. Calix extùs 3-squamosus brevis , intùs 3-partitus longior. Stamina 6. Germen 1 ; stylus 3-fidus ; stigmata 3. Fructus subglobosus squamis tessellatis imbricatis nitidis tectus , primò pulposus , deìn exsuccus , 1-spermus ( rarò 2-3-spermus ). *Caractèr ex Linnæo. Arbuscula ramosa , ramis arundinaceis ; folia pinnata petiolo communi spinuloso ; spadices*



*axillares graciles ramosi & ramulosi imbricatim squamulosi, squamulis ramulorum alternatim & distichè 1-floris. Corculum seminis in perispermii cornei cavitate laterali. Flos Palmarum, sed habitus Graminearum; undè genus inter utrasque medium. An hujus congener Palma Raphia dicta cujus idem situs corculi, fructus & spadix ferè conformis sed multò major? Flores hujus parùm absimiles, sed certè monoïci: an idè Calamus pariter monoïcus? Fructum tessellato-squamulosum describunt in Palmâ Bache Aubletius Cay. app. p. 103, in Palmâ Sagu Rumphius Amb. 1. p. 74. t. 18: an idè uterque Calamo congener?*

**PHŒNIX**, L. \* *Dattier*. Dioïca. Spatha 1-phylla. MASC. Stamina 3 ex Linn. FŒM. Germen 1; stylus brevis; stigma 1. Bacca ovata 1-sperma, semine oblongo hinc sulcato, indè convexo. Seminis germinantis lobus elevatur insidens apici folii primarii. Ex observatis pollen masculinum remotissima fecundat interdum germina jacente zephyro; utilis tamen iisdem admovetur, agente hominum industriâ.

**ARECA**, L. \* *Arequé*. Monoïca in eodem spadice. Spatha 2-valvis. MASC. Stamina 9 ex Linn. FŒM. Germen 1; stylus...; stigma... Drupa fibrosa 1-sperma, calice imbricato persistente.

**ELATE**, L. \* Monoïca in eodem spadice. Spatha 2-valvis. MASC. Stamina 3 ex Linn. FŒM. Germen 1; stylus 1; stigma 1. Drupa subovata acuminata 1-sperma; semen sulcatum.

**COCOS**, L. \* *Cocotier*. Monoïca in eodem spadice. Spatha 1-phylla. MASC. Stamina 6. Germen abortivum. FŒM. Germen 1; stylus 0; stigma 3-lobum. Drupa maxima coriacea fibrosa, foeta nuce, ad basim foraminibus 3 perviâ, 1-spermâ. In plerisque Palmarum seminibus solitariis foraminuli pares aut puncta 3 extant, fortè seminum abortivorum indicia.

**ELAIS**, L. \* Monoïca (in eodem spadice?). Spatha 1-phylla. Calix duplex, exterior 6-partitus, interior 6-fidus. MASC. Stamina 6. Germen abortivum. FŒM. Germen 1; stylus crassus; stigmata 3. Drupa coriacea fibrosa subangulata, foeta nuce 3-valvi ex Jacq., 1-loculari, basi 3 foraminibus perviâ.

**CARYOTA**, L. \* Monoïca in eodem spadice. Spatha polyphylla. MASC. Stamina plura ex Linn. FŒM. Germen 1; stylus 1; stigma 1. Bacca subrotunda 1-locularis 2-sperma ex Rumph., seminibus oblongis. Folia 2-pinnata, pinnulis basi appendiculatis, foliolis triangulis.

**NIPA**, Rumph. Thunb. \* *Lé Nipz*. Monoïca. MASC. Amentum oblongum terminale, squamis pressis 1-floris. Calix 6-partitus. Stamina 6 antheris oblongis erectis conniventibus (filamentum 1 apice 1-antheriferum antherâ perforatâ oblongâ 12-sulcatâ ex Thunb.). FŒM. Flores in capitulum terminale sphaericum compacti. Spatha... Calix... Germen 1; stylus 0; stigma latum. Drupa fibrosa irregularis, vicinarum pressione angulata, 1-



locularis 1-2-sperma. *Folia pinnata, inermia. Spadix ramosus monoïcus, ramis 1-spathaceis, plurimis lateralibus masculis, unico centrali fœmineo. Caractèr ex Rumph. & Thunb.*

## I I. Frondes palmatæ, seu flabelliformes.

**CORYPHA**, L \* Hermaphrodita. Spatha polyphylla. Stamina 6. Germen 1; stylus 1; stigma 1. Bacca globosa magna 1-sperma; semen osseum globosum. *Species una maxima (Coddapana H. Mal.) foliis palmato-pinnatifidis, petiolo spinuloso, spadice magno candelabrisformi; altera (Saribus Rumph.) foliis radiatim plicatilibus palmato-peltatis, petiolo spinuloso; tertia minor (Sabal Adans.) foliis palmatis, petiolo inermi, spadice longè minore & fructu pistiformi. An genera diversa?*

**LICUALA**, Thunb. \* Hermaphrodita. Spatha . . . Calix laciniis 3 exterioribus extus pilosis, 3 alternis (petala ex Thunb.) interioribus petaloïdeis. Stamina 6, filamentis connatis in tubum (nectarium ex Thunb.) brevem, apice truncatum & 6-antheriferum. Germen 1; stylus 1; stigmata 2. Drupa globosa pistiformis 1-sperma femine duro. *Folia palmato-multipartita petiolo spinoso; flores spicato-racemosi. Caractèr ex D. Thunberg act. Holm. 1782, mutato partium nomine. Confer cum Coryphæ.*

**LATANIA**, Commerf. \* *Latanier de l'isle de Bourbon.* Dioïca. MASC. Spatha polyphylla, foliis imbricatis. Spadix ramosus, ramis 1-spathaceis apice digitato-ramulosis, ramulis amentiformibus subcilindricis imbricatim squamulosis, squamulis 1-floris. Singulo flori calix sessilis 6-partitus, laciniis 3 exterioribus minoribus. Stamina 15-16 filamentis basi in columnam crassam coalitis; antheræ oblongæ 2-loculares. FÆM. . . . *Folia palmato-pinnatifida petiolo inermi. Caractèr ex Commerf. mss.*

**LONTARUS**, Rumph. \* **BORASSUS**, L. \* *Rondier, Lontar.* Dioïca. Spatha polyphylla. MASC. Spadix amentaceus, densè imbricatus, simplex aut apice 2-3-partitus. Stamina 6. FÆM. Spadix ramosior laxior. Germen 1; styli 3; Stigmata 3. Bacca fibrosa subrotunda magna 3-sperma, feminibus osseis extus filamentosis, hinc angularibus, indè convexis. *Folia digitata petiolo utrinque spinoso. Hinc retulit D. Sonnerat speciem novam, (Lodoïcea, Commerf. absque descript.) foliis distinguendam pinnato-palmatis, spadice & fructu majori, & præcipuè seminibus semididymis maximis rotundatis, 1 aut 2 sæpè abortivis, Gallis dictam Cocotier de mer: an genus diversum?*

**CHAMÆEROPS**, L \* *Palmier éventail.* Hermaphrodita, aut in distincta arbore mascula. Spatha 1-phylla. Spadix ramosus. Staminum filamenta coalita in urceolum 6-dentatum dentibus 1-antheriferis. Germina urceolo cincta; styli 3; stigmata 3. Baccæ; parvæ globosæ 1-spermæ. *Folia profundè palmata aut digitata, petiolo utrinque spinoso.*



**MAURITIA**, L. \* Dioica? MASC. Spadix basi 2-spathaceus amentiformis, bifarius, imbricatim squamosus squamis 1-floris. Calix extus cyathiformis truncatus integer triquetor brevis, intus 3-partitus laciniis futurâ junctis. Stamina 6. FEM. ....  
*Arbor ferè aphylla ramis angulatis floriferis. Character ex Linn. fil. Suppl. qui nec flores fœmineos nec folia vidit.*

*Oss.* Plurimarum usquenunc in Europâ non observatus Palmarum character. An generalior in iis numerus staminum senus, germinum distinctorum aut in uno fructu trioculato coadunatorum trinus; an contra utraque interdum plura aut pauciora absque abortu aut luxurie insolitâ? Palmæ Filicum arborecentium & præsertim Zamiae & Cycæ habitum mentientes, ab iisdem flore præprimis discrepant. Spathaceos & paniculatos Graminearum more flores gerunt & semen Phœnicis tritico semini extus assimilatur. Hinc affinitas quædam cum Gramineis, inde cum Filicibus; sed in fructificatione plurimos Asparagorum & Dracænæ characteres induunt, iis ergo usquenunc approximandæ. An stamina verè calici inserta; an potius hypogyna seu glandulæ hypogynæ infixæ?

## ORDO II.

### ASPARAGI, LES ASPERGES.

**CALIX** sexdivisus regularis, plerumque profundè partitus & inferus, rarò superus. Stamina sex imo (rariùs medio) calici inserta. Germen simplex, sæpiùs superum; stylus triplex cum stigmate triplici, aut stylus unicus cum stigmate simplici vel trifido. Fructus bacatus aut rarò capsularis, superus aut rarò inferus, trilocularis loculis uni aut bi aut oligospermis. Corculum in hylo perispermii cornei.

Caulis sæpè herbaceus, interdum fruticosus. Folia plerumque alterna, rarò opposita aut verticillata, sæpiùs non vaginantia & tantummodò amplexicaulia. Flores singuli spathacei, in quibusdam (abortu?) dioici. Tertia pars fructificationis supprimitur interdum in paucis, aut quarta additur.

I. Flores hermaphroditi. Germen superum.

**DRACÆNA**, L. \* *Sang-dragon*. Calix connivens. Filamenta staminum medio crassiora. Stylus 1; stigma 1. Bacca loculis



1-spermis, interdum 2 abortivis. *Habitus Palmarum*; *caulis idem, fruticosus, foliorum vestigiis scaber*; *folia omnia terminalia, sæpè conferta (vaginantia?) simplicia*; *panicula terminalis ramosissima, singulis ramis, ramulis & floribus basi 2-spathaceis*. *Species quædam (Cordylina Commerf.) staminum filamentis instructæ filiformibus non incrassatis, loculis fructus polyspermis, foliis latioribus Cannæ similibus, non omninò congeneres nisi emendato Dracænæ caractere.*

**DIANELLA**, Lamark. \* **DRACÆNA**, L. \* **DIANA**, Comm. \* *Dianelle*. Calix 6-partitus, patens æqualis, laciniis 3 alternis interioribus. Stamina 6, filamentis apice tumidis. Stylus 1; stigma 1. Bacca oblonga 3-locularis loculis 4-5-spermis. *Caulis herbaceus ramosus subnudus; folia alterna vaginantia ensiformia; flores laxè paniculati terminales, ramis & pedunculis spathaceis. Character ex Commerf. cui Diana dicitur & ex Lamark dict.*

**RIPOGONUM**, Forst. \* Calix 6-partitus minimus æqualis. Stamina 6, antheris longis 4-gonis subsessilibus. Stylus 1; stigma 1. Bacca globosa (2-locularis?) 2-sperma, seminibus hemisphaericis. *Planta geniculata scandens, Smilaci affinis. Character ex Forstero.*

**FLAGELLARIA**, L. \* Calix campanulato-patens æqualis. Stylus 3-fidus persistens; stigmata 3. Drupa 3-sperma aut abortu 1-sperma. *Caulis frutescens ramosus, ramis basi squamosis aut spathaceis; folia apice cirrhosa, omnia vaginantia vaginâ longâ integrâ; panicula terminalis. An affinior Juncis?*

**ASPARAGUS**, T. L. \* *Asperge*. Calix basi connivens æqualis. Stylus 1; stigma 3-gonum. Bacca loculis 2-spermis. *Caulis ramosus, herbaceus aut frutescens non caudiciformis; folia sæpè setacea & fasciculata; flores sæpè solitarii axillares; spatha 2-valvis, & interdum spina, sub singulo ramulo & foliorum fasciculo. Species quædam dioicæ.*

**CALLIXENE**, Comm. \* Calix 6-partitus æqualis, laciniis 3 alternis basi subbiglandulosis. Stamina 6, filamentis basi latioribus; antheræ oblongæ versatiles. Stylus 1; stigma 3-gonum. Bacca parva 3-locularis, loculis intus pulposis sæpè 3-spermis. *Suffrutex Magellanicus Philesiæ facie, infra nodosus & aphyllus nodis squamulâ vaginatis; ramuli squamulis aut foliis axillares, basi 2-spathacei; folia in summis ramulis alterna, margine tumida petiolo semiamplexicauli; flores solitarii terminales, folio supremo stipati; pedicelli breves squamulis 2-4 infra cincti. Character ex Commerf. Καλὸς pulcher, ἔξωτος exterus.*

**PHILEsia**, Comm. \* Calix campanulatus 6-partitus regularis magnus, laciniis 3 exterioribus acuminatis, 3 interioribus duplò longioribus obtusis. Stamina 6 filamentis basi connatis; antheræ longæ versatiles. Stylus 1, stigmata 3. Bacca subtrigona (3-locularis?) polysperma. *Suffrutex Magellanicus buxi facie; ramuli flexuosi basi 2-spathacei axillares; folia alterna re-*



*voluta, petiolo amplexicauli nudo; flores solitarii terminales, pedicello brevi squamis distichè imbricatis tecto. Character ex Commerf. Philæw amo.*

**MEDEOLA**, L. \* Calix patens æqualis. Germen 3-sulcum; styli 3; stigmata 3. Bacca 3-sulca 3-sperma. *Caulis herbaceus, erectus aut scandens, simplex aut ramosus; ramuli & folia basi spathacea; flores solitarii axillares. M. virginicæ folia verticillata & habitus Trillii aut Paridis: an species verè congener?*

**TRILLIUM**, L. \* Calix patens, laciniis 3 alternis exterioribus angustioribus. Germen subrotundum; styli 3; stigmata 3. Bacca subrotunda, loculis polyspermis. *Caulis seu scapus medio 3-phyllus foliis verticillatis, apice 1-florus.*

**PARIS**, L. \* **HERBA PARIS**, T. \* *Parifette*. Calix patens 8-partitus, laciniis 4 alternis angustioribus. Stamina 8; antheræ mediis filamentis adnatæ. Styli 4; stigmata 4. Bacca 4-locularis, loculis oligospermis. *Caulis seu scapus medio 4-phyllus foliis verticillatis, apice 1-florus. Interdum quinta pars additur plantæ, aut quarta supprimitur. Genus affine Trillio, & Medeolæ Convallariæque verticillatæ, sed numero partium discrepans, non propterea distrahendum.*

**CONVALLARIA**, L. \* **LILIUM CONVALLIUM**, T. \* **POLYGONATUM**, T. \* **SMILAX**, T. \* *Muguet, Sceau de Salomon*. Calix 6-fidus tubulosus in *Polygonato* T., aut globosus in *Lilio convallium* T., aut 6-partitus patens in *Smilaxe* T. Stamina tubo inserta. Stylus 1; stigma 3-gonum. Bacca loculis 1-spermis, antè maturitatem maculata. *Flores axillares, aut spicati terminales. Species una foliis 6 verticillatis, altera radicalibus vaginantibus spathaceis, cæteræ sessilibus alternis. In C. bifoliâ tertia pars supprimitur.*

## II. Flores dioïci. Germen superum.

**RUSCUS**, T. L. \* *Fragon*. Calix 6-partitus patens, aut rarò globosus 6-fidus. Stamina filamentis connatis in tubulum (corolla T., nectarium L.) ventricosum, apice antheriferum in masculis floribus, nudum in fœmineis. His germen 1; stylus 1; stigma 1; bacca globosa loculis 2-spermis. *Caulis subfrutescens ramosus, ramis & foliis spathaceis; flores in plurimis dioïci 6-partiti folio insidentes, in R. racemoso hermaphroditi globosi racemosi terminales. Genus Asparago & Medeolæ plurimum affine.*

**SMILAX**, T. L. \* *Salsepareille*. Calix campanulato-patens. Germen fœmineis 1; styli 3; stigmata 3. Bacca loculis 2-spermis. *Caulis sæpè subfrutescens; folia petiolo 2-cirrhoso; flores corymbosi axillares.*

**DIOSCOREA**, L. \* *Igname*. Calix campanulato-patens. Germen fœmineis 3-gonum; styli 3; stigmata 3. Capsula compressa 3-



angularis 3-valvis, loculis 2-spermis, interdum 2 abortivis; femina compressa membranacea. *Caulis sinistrorsum volubilis; flores spicati aut racemosi, axillares; folia in quibusdam opposita; radix plerumque tuberosa.*

### III. Flores dioici. Germen inferum.

**TAMNUS**, T. \* **TAMUS**, L. \* *Taminier, Sceau notre Dame.* Calix campanulato-patens, supra germen coarctatus in foeminis. His stylus 1; stigmata 3; bacca infera loculis 2-3-spermis. *Radix tuberosa; caulis sinistrorsum volubilis; folia petiolo sæpè ad basim 2-glanduloso glandulis subulatis; flores spicati axillares.*

**RAJANIA**, L. \* Calix campanulato-patens, supra germen coarctatus in foeminis, quibus germen compressum, styli 3, stigmata 3; fructus capsularis alâ laterali obliquâ auctus 1-spermus (loculis & seminibus aliis abortivis). *Radix tuberosa; caulis sinistrorsum volubilis; flores spicati axillares.*

**Obs.** A plerisque Liliaceis differunt Asparagi præcipuè fructu baccato oligospermo & foliis sæpè sessilibus; à Palmis dispositione florum, habitu proprio, foliis reticulo non vestitis, nec, ut plurimum, vaginantibus. Cur autem in aliis germen inferum, in aliis fructus capsularis; cur in quibusdam divisuræ panicularum basi bispathacæ; cur in paucis folium spathiforme sub ramis, ramulis & foliis? An inde generum discordia & cum cæteris affinitas; an contra huc revocanda Uvularia?

## ORDO III.

### J U N C I , L E S J O N C S.

**CALIX** inferus sexpartitus, æqualis, aut inæqualis laciniis alternis majoribus & petaloideis, aut glumaceus gramineo calici affinis. Stamina definita (indefinita in Sagittariâ) sæpius sex, rarius tria aut novem, imo calici inserta. In aliis germen superum simplex; stylus unicus; stigma simplex aut divisum; capsula trilocularis trivalvis polysperma, valvis in medio septo feminiferis. In aliis germina supera, tria aut sex, rarius indefinita, interdum basi juncta; styli aut & stigmata totidem; capsulæ totidem uniloculares, distinctæ aut coalitæ, monospermæ sæpè non dehiscentes, aut polyspermæ intus bivalves, marginibus valvarum se-



miniferis. Corculum (omnium?) in hylo perispermī cornei. Plantæ herbaceæ; folia radicalia & caulina inferiora, alterna vaginantia; caulina superiora & floralia, sæpè spathiformia & sessilia. Flores spathacei.

I. Germen unicum. Capsula trilocularis. Calix glumaceus.

**ERIOCAULON**, L. \* Monoïcum. Calix 4-partitus. MASC. Stamina 4. FÆM. Stylus 2-fidus; capsula 2-cocca 2-sperma. Flores masculī centrales, fœminei marginales in calice communi imbricato hemisphærico scapum angulosum terminante; folia graminea radicalia. Species quædam fructu 3-cocco, (idèò calice 6-partito 6-andro?) ulterius examinandæ.

**RESTIO**, L. \* Dioïcus. Calix æqualis persistens, rariùs inæqualis. MASC. Stamina 3. FÆM. Germen 6-sulcatum; styli 3 persistentes; stigmata 3. Capsula 6-plicata, stylis acuminata, polysperma. Caulis juncus aphyllus nodosus, simplex aut ramosus, nodis spathaceis; flores paniculati aut spicati; spiculæ imbricatæ squamis 1-floris. Huc referantur *Thamnochorthus Bergii* & *Chondropetalum Rottbollii*, quibus calicis lacinia interior petaloïdæ multò majores, cætera omninò similia.

**XYRIS**, L. \* Calicis lacinia 3 intimæ basi staminiferæ. Stamina 3: Stylus 1; stigma 3-fidum. Capsula polysperma. Caulis gramineus enodis aphyllus simplex; folia radicalia vaginantia; flores densè spicati terminales, squamis imbricatis 1-floris. Habitus *Schœni*, sed fructus non idem. An *Cyperoïdeis* affiniore, an *Iridibus* utpotè 3-andra?

**APHYLLANTES**, T. L. \* *Bragalou des Languedociens*. Calix æqualis, basi connivens, limbo patens. Stamina 6 brevia. Stylus 1; stigma 3-lobum. Capsula polysperma. Caulis gramineus subnudus, capitulo paucifloro terminali oblongo, squamis imbricatis cincto; folia graminea. Habitus *Junci* & *Dianthi* proliferi.

**JUNCUS**, T. L. \* *Junc.* Calix æqualis. Stamina 6 brevia. Stylus 1; stigma 3-lobum. Capsula polysperma. Caulis gramineus simplex, enodis aphyllus, aut nodosus foliis ad nodos vaginantibus; flores terminales aut laterales, corymbose aut paniculati, ramulis basi spathaceis.

II. Germen unicum. Capsula trilocularis. Calix semi-petaloïdeus.

**RAPATEA**, Aubl. \* Calix 6-partitus laciniis 3 exterioribus glumaceis, 3 interioribus ovatis (petala ex Aubl.) petaloïdeis convolutis, cinctus squamis circiter 8 glumaceis acuminatis in-



æqualibus oppositè imbricatis. Stamina 6, antheris sessilibus longis apice auctis appendiculo antheriformi. Stylus 1; stigma 1 (triplex connivens ex *Aubl.*). Fructus... (capsularis 3-locularis 3-valvis 3-spermus, valvis medio septiferis? ex inspecto germine). *Herba*; folia radicalia, graminea; scapi compressi ancipites; spatha compressa 2-valvis, in singulo scapo solitaria terminalis, multiflora; flores numerosi, ut in *Allio* conserim umbellati, pedunculis 1-floris. *Caracter ex Aubl. Guyan. t. 118 & ex sicco specimine.*

**MAYACA**, *Aubl.* \* Calix laciniis 3 exterioribus acutis, 3 interioribus (petala ex *Aubl.*) subrotundis petaloïdeis. Stamina 3, antheris 2-locularibus. Stylus 1; stigma 3-fidum. Capsula stylo acuminata, 1-locularis 3-valvis, valvis medio 2-spermis sterula musciformis; folia alterna conferta linearia subtrinervia; flores solitarii axillares, pedicello 2-squamuloso. *Caracter ex Aubl. Guyan. t. 15. An capsula potius 3-locularis, septo valvarum medio post maturitatem retracto?*

**POLLIA**, *Thunb.* \* Calix laciniis 3 interioribus tenuissimis, 3 exterioribus majoribus ovatis. Stamina 6. Stylus 1; stigma 1. Bacca globosa parva (3-locularis?) polysperma seminibus angulatis. Caulis angulatus ramis raris alternis; folia alterna amplexicaulia; flores verticillato-corymbosi, pedunculis 4-6 verticillatis 2-3-floris basi 1-bracteatis. *Caracter ex Thunb. Jap. An Asparagis affinior; an fructus verè baccatus?*

**CALLISIA**, *L.* \* Calix laciniis 3 interioribus petaloïdeis. Filamenta 3, singula 2-antherifera. Stylus 1; stigmaria 3 penicillata. Capsula 2-locularis (loculo tertio abortivo?) 2-sperma. *Habitus Commelinæ.*

**COMMELINA**, *L.* \* *Commeline.* Calix æqualis aut inæqualis, laciniis 2 aut 3 interioribus petaloïdeis. Stamina 6, interdum omnia fertilia, sæpius 3-4 (nectaria *Linn.*) sterilia. Stylus 1; stigma 1. Capsula 3-locularis 3-valvis; loculi duo 2-spermi, tertius cum valvulâ propriâ sæpè abortivus, aut in valvulæ alterius dorso nidulans 1-2-spermus. Caulis herbaceus ad nodos alternè foliosus & sæpè ramosus; foliorum vagina longa integra, mox fissilis; ramuli basi spatulacei; pedunculi axillares aut terminales, uni aut multiflori, spathâ cordatâ connivente flores obvolvante & persistente, rariùs nullâ.

**TRADESCANTIA**, *L.* \* **EPHEMERUM**, *T.* \* Calix laciniis 3 interioribus petaloïdeis. Stamina 6 filamentis hirsutis. Stylus 1; stigma 3-gonum. Capsula 3-locularis oligosperma. Species pleraque habitu & spatha & partium dispositione similis *Commelinæ*, discrepantes tantumdem hirsutis filamentorum. *T. virginicæ* folia eadem, sed flores umbellati terminales, umbellâ inæquali, involucre 2-3-phyllo pedunculis multò longiore.



III. Germina plura. Capsulæ totidem uniloculares. Flores in scapo umbellati aut verticillati, umbellis & verticillis involucro triphyлло cinctis.

*Plantæ aquaticæ.*

**BUTOMUS**, T. L. \* *Butome*, *Jonc-fleuri*. Calix subæqualis coloratus. Stamina 9, quorum 3 interiora. Germina 6; styli 6. Capsulæ polyspermæ. *Flores umbellati; folia graminea.*

**DAMASONIUM**, T. V. \* **ALISMA**, L. \* *Fluteau*. Calix laciniis 3 petaloïdeis. Stamina 6. Germina 6; styli 6. Capsulæ acuminatæ 1-2-spermæ, stellatim patentes. *Flores umbellati; folia lanceolata aut ovata.*

**ALISMA**, L. \* **RANUNCULUS**, T. \* **DAMASONIUM**, V. \* *Plantain d'eau*. Calix laciniis 3 petaloïdeis. Stamina 6 (interdum plura?). Germina numerosa aggregata; styli totidem. Capsulæ 1-spermæ non dehiscentes. *Flores umbellati, aut paniculati ramis & ramulis ternis verticillatis; folia lanceolata.*

**SAGITTARIA**, L. \* **SAGITTA**, T. \* *Fléchier*, *Flèche d'eau*. Monoïca. Calix laciniis 3 petaloïdeis. MASC. Stamina numerosa (24?) aggregata. FÆM. Germina numerosa, receptaculo globoso imposita; stigmata totidem absque stylis. Capsulæ marginatæ, compressæ, 1-spermæ non dehiscentes. *Flores verticillati, superiores masculi, inferiores feminei rariores; folia sagittata.*

IV. Germina plura (sæpius tria). Capsulæ totidem uniloculares, interdum basi coalitæ. Flores paniculati aut spicati.

**CABOMBA**, Aubl. \* Calix 6-partitus, laciniis 3 interioribus petaloïdeis. Stamina 6, imis laciniis calicinis inserta. Germina 2; styli 2; stigmata 2. Capsulæ 2, stylo terminatæ, 1-loculares polyspermæ. *Herba aquatica; folia petiolo non vaginante; caulina demersa opposita, digitata foliolis pluries trichotomis linearibus; floralia natantia alterna orbiculata integra peltata; flores solitarii axillares. Character ex Aubl. Guyan. t. 124. An Ranunculis affinior? Confer in vivâ. Habitus Ranunculi aquatilis L., sed folia opposita & flos parum similis.*

**SCHEUCHZERIA**, L. \* Calix æqualis. Stamina 6, filamentis brevibus, antheris longis. Germina 3, interdum 4, 5, aut 6; stigmata totidem extrorsum germinibus adnata. Capsulæ distinctæ, compressæ, inflatæ, 2-valves, 1-2-spermæ. *Folia graminea; flores laxè spicati rariores.*



**TRIGLOCHIN**, L. \* **JUNCAGO**. T. \* Calix laciniis 3 petaloïdeis. Stamina 6 brevissima. Germina 3 aut 6 conniventia; stigmata totidem absque stylis. Capsulæ 1-4permæ erectæ acutæ. *Folia graminea; flores in scapo spicati.*

**NARTHECIUM**. \* **PHALANGIUM**, T. \* **ANTHERICUM**, L. \* Calix æqualis, caliculo minimo 3-partito cinctus. Stamina 6. Germina 6 aut plura; stigmata totidem absque stylis. Capsulæ polyspermæ, basi junctæ. *Folia graminea; flores spicati, scapo subnudo. Numerus partium varius.*

**HELONIAS**, L. \* Calix æqualis coloratus. Stamina 6, calice longiora. Germen 3-gonum; styli 3 breves. Capsula 3-locularis polysperma. *An potius capsulæ 3 junctæ? Flores spicati; quibusdam caulis foliosus, & habitus Asphodeli.*

**MELANTHIUM**, L. \* Calix æqualis coloratus. Stamina 6. Germina 3 coalita; styli 3. Capsulæ junctæ polyspermæ. *Flores paniculati, aut rarius spicati. Hinc referatur Wurmbea Thumbergii calice discrepans minùs partito.*

**VERATRUM**, T. L. \* *Varaire, Hellebore blanc.* Calix æqualis coloratus. Stamina 6. Germina 3 distincta, in quibusdam floribus abortiva; styli 3 breves. Capsulæ intus 2-valves polyspermæ, seminibus membranaceis. *Folia ovata, nervosa, vaginis oblongis integris; flores paniculati.*

**COLCHICUM**, T. L. \* *Colchique.* Calix tubulosus longus, limbo campanulato corollæformi 6-partito. Stamina 6 tubo inserta. Germina 3 basi junctæ; styli 3. Capsulæ basi in unam coalitæ, polyspermæ. *Habitus Croci aut Gethyllidis, sed major cum Veratro affinitas. Ex persistente pristini caulis tubere striato dilatato hinc sinuato & tunicis foliorum radicalium præcedentiam vestito, lateralis infrà exoritur sub iisdem tunicis nova plantula basi tuberosa & subtilius bulborum more radicans, in tuberis pristini semiamplexantis sinu recepta. Huic spathæ exterior radicalis cylindrica tubulosa, apice hinc fissa, semisubterranea; flores 2-6 ex spathâ semiprodeuntes absque foliis; fructus, interdum flore multo tardiores, assurgenti extrâ spatham cauli insidentes; folia cum fructibus eminentia, nervosa, radicalia vaginantia, caulina semiamplexicaulia. Increscens planta suum expandit tuber, pristinum hinc exsugit operimitque mox perituum, novamque simul inde basi trudit sequentis plantulæ gemmam. Priscum tuber tum habitu tum & usu quasi assimilandum perispermio aut & cotyledoni, utrique in Monocotyledonibus laterali, proprio succo plantulam enutrienti, & ipsâ adultiore marcescenti ac evanido. Duplex plerumque simul ex eodem tubere exilit gemma lateralis, altera hinc inferior jam descripta & frugifera, altera inde superior pariter caulescens sed gracilior & vix florifera.*

**Obs.** Junci Asparagis & Liliis non omninò affines, nec alteri ejusdem classis ordini accommodatiores, usquedum innotuerit in iis



germinatio. Horum insuper sectiones seorsim naturales remissius copulantur; glumaceæ Cyperoideis & Gramineis, semipetaloideæ Ranunculis habitu similes, dissimiles caractere. Peculiaris in classe caliculus Narthecii. An Colchicum verè tricapsulare?

## ORDO IV.

### LILIA, LES LIS.

**CALIX** inferus, coloratus, sexpartitus, plerumque æqualis & regularis. Stamina sex imis laciniis calicinis inserta. Germen simplex superum; stylus unicus, rarò nullus; stigma triplex. Capsula supera, trilocularis, trivalvis, polysperma, feminibus gemino ordine dispositis in singulo loculo, sæpiùs planis.

Caulis plerumque herbaceus. Folia radicalia interdum vaginantia; cætera sessilia, sæpiùs alterna, rariùs verticillata. Flores nudi, aut spathacei seu stipati folio spatham æmulante, sæpè cernui stylo staminibus longiore.

**TULIPA**, T. L. \* *Tulipe*. Calix campanulatus, laciniis rectis non nectariferis. Stylus 0; stigma sessile. Capsula oblonga, obtusè 3-gona; semina plana. *Folia vaginantia radicalia; scapus 1-florus erectus, penè aphyllus.*

**ERYTHRONIUM**, L. \* **DENS CANIS**, T. \* Calix campanulatus, laciniis à medio reflexis, 3 interioribus basi intus 2-callibus. Stamina breviora. Capsula globosa, basi angustior; semina ovata. *Folia vaginantia radicalia; scapus 1-florus cernuus.*

**METHONICA**. \* **GLORIOSA**, L. \* *Superbe*. Calix patens, laciniis undulatis longissimis reflexis. Stamina stylo breviora. Capsula ovalis; semina globosa. *Caulis scandens ramosus; folia apice cirrhosa; pedunculi 1-flori, axillares & terminales; radix tuberosa.*

**UVULARIA**, L. \* *Uvulaire*. Calix campanulatus laciniis rectis; unguibus foveâ nectariferâ oblongâ excavatis. Stamina brevissima. Stigmata reflexa. Capsula ovata 3-gona; semina subrotunda compressa. *Folia fissilia, aut amplexicaulia; pedunculi 1-2-flori axillares. Habitus Convallariæ: an indè affinior Asparagus? An fructus verè capsularis?*

**FRITILLARIA**, T. L. \* *Fritillaire*. Calix campanulatus, laciniis rectis, unguibus foveâ nectariferâ oblongâ excavatis. Stamina

style



stylo breviora. Capsula oblonga, obtusè 3-gona; femina plana. Radix 2-tuberculata; flores terminales, solitarii nudi, aut spathacei laxè spicati.

**IMPERIALIS.** \* **CORONA IMPERIALIS**, T. \* **FRITILLARIA**, L. \*  
*Imperiale.* Calix campanulatus laciniis rectis, unguibus foveâ nectariferâ rotundâ excavatis. Stamina stylo breviora. Capsula 6-angula, marginibus acuta; femina plana. Radix tuberosa tunicata; caulis simpl. x, medio nudus, basi & apice foliosus, suprâ 6-florus floribus axillaribus cernuis, capsulis erectis.

**LILIUM**, T. L. \* *Lis.* Calix campanulatus laciniis rectis aut revolutis, basi conniventibus & sulco longitudinali nectarifero, nudo aut ciliato, exaratis. Stamina stylo breviora. Capsula oblonga 6-sulcata 3-gona; femina plana. Radix tuberosa, basibus foliorum imbricata; caulis foliosus simplex, foliis alternis aut verticillatis; flores spathacei, spicati aut subpaniculati, in pluribus cernui.

**YUCCA**, L. \* Calix campanulatus, laciniis rectis non nectariferis. Stamina filamentis supernè crassioribus, antheris minimis. Stylus 0; stigma sessile. Capsula oblonga, obtusè 3-gona; femina plana. Caulis subnullus aut caudice assurgente fruticosus; folia conferta terminalia, ensiformia apice spinoso; flores spicati aut paniculati, terminales, bispathacei; calix Tulipæ. An caudice & paniculâ discrepans à Liliis; an Bromeliis affinior?

**Obs.** Yucca caractere affinis Tulipæ, sed ab ordine dispar caule fruticoso; an ad Bromelias aut Asphodelos depellenda? An Liliis adscribenda Alstroëmeria? An iisdem verè confocianda Uvularia; an potius Asparagis? Dubia solvet semen germinans.

## O R D O V.

### B R O M E L I Æ , L E S A N A N A S.

**CALIX** sexfidus aut sexpartitus, cum germine infero superus, cum supero inferus, nunc æqualis, nunc sæpiùs inæqualis laciniis tribus alternis majoribus. Stamina sex, imo aut medio calici inserta, aut interdum glandulæ calicinæ germen obtegenti. Germen simplex, superum aut inferum; stylus unicus; stigma trifidum. Fructus trilocularis, superus aut inferus, baccatus non dehiscens, aut capsularis trivalvis, loculis mono aut polyspermis.



Folia vaginantia, sæpius omnia radicalia. Flores spicati aut paniculati aut rarius corymbosi, singuli spathacei.

### I. Germen superum.

**BURMANNIA**, L. \* Calix prismaticus tubulosus coloratus, limbo 6-fido, laciniis 3 intimis minimis. Stamina subseffilia, summo calici inserta, antheris ter germinatis, mucrone reflexo distinctis. Germen oblongum. Capsula calice tecta, polysperma, feminibus minutis. *Caulis simplex, apice 2-florus aut 2-stachios; folia radicalia graminea, caulina squamiformia. Genus sui ordinis, nulli perquam affine, nisi fortè Hypoxi.*

**TILLANDSIA**, L. \* **RENEALMIA**, Pl. \* **CARAGUATA**, Pl. \* Calix duplex, exterior 3-partitus, interior coloratus longior, 3-partitus in *Renalmia* Pl., aut tubulosus 3-fidus in *Caraguata* Pl. Stamina imo calici inserta. Capsula obtusè 3-gona, 3-locularis (1-locularis ex Linn.) polysperma, feminibus papposis. *Folia plerumque radicalia; flores in scapo aut caule spicati aut paniculati. Plantæ herbaceæ plurimæ parasiticæ, aliæ Agavem, aliæ Aloë, aliæ Bromeliæ habitu mentientes. Character in vivis examinandus & observanda germinis evolutio. Capsula quarundam subunilocularis? An genus dividendum?*

### I I. Germen inferum.

**XEROPHYTA**. \* Calix tubulosus limbo 6-partito regulari persistente, laciniis 3 exterioribus angustioribus acuminatis. Stamina imis laciniis inserta; antheræ longæ subseffiles, limbo æquales. Stylus 1; stigma oblongum tumidum (simplex?). Capsula scabra coronata, 3-locularis polysperma. *Suffrutex Madagascariensis aridus, alternè ramosus; rami aridis foliorum precedentium vaginis alternatim imbricatis omnino scabri; cætera folia, ut in Pino, linearia rigida pungentia, in ramulis axillaribus terminalia conferta; flores in ramulis subsolitarii terminales. Character ex sicco & immaturo Commersonii specimine. Ξηρὸς φυτόν, sicca planta.*

**BROMELIA**, Pl. L. \* **KARATAS**, Pl. \* **ANANAS**, Pl. T. \* *Ananas*. Calix duplex, uterque tubulosus, exterior brevior 3-fidus, interior petaloïdeus longior 3-partitus laciniis ungue appendiculatis. Stamina summo calici inserta, aut glandulæ calicinæ suprâ germen productæ (indè quasi epigyna?). Bacca umbilicata polysperma. *Plantæ herbaceæ, quædam parasiticæ; folia radicalia canaliculata, marginibus sæpè dentato-spinosis; flores Bromeliæ Pl. in scapo vel caule laxè spicati aut paniculati, fructibus vix baccatis; flores Karatæ Pl. densè corymbosi, corymbo radicali, baccis ovatis; flores Ananassæ Pl. densè spicati in scapo*



*suprà folioso, spicâ maturescente strobiliformi carnosâ squamosâ eduli, è coadunatis concretâ baccis, vix loculosis & malè fecundis. An genera diversa; an à fluminum situ aliò revocanda, licèt affinia Tillandsiæ?*

**AGAVE, L. \* ALGE, T. \* Pitte, Maguey des Mexicains.** Calix tubulosus infundibuliformis, limbo 6-partito. Stamina exserta, summo calici infixâ; antheræ longæ versatiles. Capsula uirique attenuata, sub3-gona, polysperma, seminibus planis gemino ordine dispositis. *Caulis subnullus aut caudiciformis; folia radicalia canaliculata, rigida, apice (sæpè etiam margine) spinosa, juniora obvoluta; panicula è caudice assurgens, maxima, pyramidata. Habitus Yuccæ, flos diversus.*

**Obs.** Ordo nondùm absolutè naturalis, caractere minùs distinctus quàm habitu, in vivis recognoscendus præcipuè quoad germinationem, quâ determinatâ certior ordinis generumque statuetur affinitas. Narcissis Agavem adjicit B. Jussæus & Bromeliam Musis.

## ORDO VI.

### ASPHODELI, LES ASPHODELES.

**CALIX** inferus, coloratus, sæpè sexpartitus æqualis; rarò tubulosus sex-fidus. Stamina sex, imo aut medio calici inserta. Germen superum simplex; stylus unicus; stigma simplex aut trifidum. Capsula trilocularis tri-valvis polysperma.

Radix plurimorum bulbosa, scapum emittens, sub bulbo capillata; cæterorum fibrosa, in caulem sæpiùs herbaceum assurgens. Folia vaginantia alterna, sæpiùs omnia radicalia. Spica sæpè in scapo simplex, interdum ramosa ramis spathaceis. Flores singuli spathacei, spicati (in Allio umbellati), terminales aut rariùs axillares.

I. Flores spicati. Radix fibrosa. Calix tubulosus.

**ALETRIS, L. \*** Calix infundibuliformis, rugosus, 6-fidus, medio staminifer. Stigma 3-fidum. Capsula 3-quetra polysperma. *Calix in A. capensi lavis, limbo minori; capsulæ loculi compressi membranacei, quasi alati, 1-spermi; apex scapi foliolis seu spathis vacuis testus; seminis germinantis lobus sessilis, suprà annectitur vagina.*



*foliorum primariae : an genus idem ? Caterarum germinatio non observata.*

**ALOE, T. L. \* Aloës.** Calix fundo nectarifer, 6-fidus aut ferè 6-partitus, laciniis rectis aut revolutis, basi staminiferis. Stigma sub 3-lobum. *Caudex in quibusdam frutescens & foliosus ; folia succulenta, imbricata, in pluribus margine & superficie spinosa ; spicae axillares aut terminales, interdum ramosae. Seminis germinantis lobus sessilis appingitur lateri vaginae primariae.*

**I I.** Flores spicati. Radix fibrosa. Calix sexpartitus, basi staminifer.

**ANTHERICUM, L. \* ASPHODELUS, T. \*** Calix patens aut connivens. Stamina filamentis filiformibus hirsutis. Stigma 1. Semina angulata. *Folia fistulosa, aut succulenta imbricata ; spicae terminales aut axillares, saepè ramosae ; flores lutei. Seminis germinantis lobus lateri vaginae primariae annexitur, filo pendulus.*

**PHALANGIUM, T. \* LILIASTRUM, T. \* ASPHODELUS, T. \* ANTHERICUM, L. \*** Calix patens aut connivens. Stamina filamentis filiformibus nudis. Stigma 1. Semina angulata. *Radices fibrosae in Phalangio T., fasciculatae in Liliastro T. ; folia plana, saepius radicalia ; spica terminalis, interdum ramosa ; flores albi aut purpurascens ; germinatio Asphodeli.*

**ASPHODELUS, T. L. \* Asphodele.** Calix patens. Stamina filamentis basi latioribus fornicatis. Stigma 1. Semina angulata. *Radices fibrosae aut fasciculatae ; folia plana ; spica interdum ramosa. Seminis germinantis lobus pensilis haeret apici folii primarii flexo & in filum attenuato.*

**I I I.** Flores spicati. Radix bulbosa. Calix basi tubulosus.

**BASILÆA. \* CORONA REGALIS, Dill. \* FRITILLARIA, L. \*** Calix campanulatus 6-fidus, laciniis oblongis. Stigma 1. Semina ovata. *Flores virentes, densè spicati, scapo supra spicam folioso ; germinatio nondum observata.*

**HYACINTHUS, T. L. \* MUSCARI, T. \* Jacinte.** Calix aequalis ; globoso-ventricosus in *Muscari T.*, aut tubulosus 6-fidus in *Hyacintho T.*, aut rarius 6-partitus. Germen apice 3-porosum. Stigma 1. Capsula loculis saepius 2-spermis. *Caracter ex Linnæo. Germinatio Asphodeli. An caracter non è germine sed è calice tantum deducendus, excluso 6-partito ?*

**PHORMIUM, Forst. \*** Calix 6-partitus (aut potius profundè 6-fidus ?) laciniis 3 exterioribus brevioribus. Stigma 1. Capsula loculis polyspermis. *Habitus Hyacinthi, & genus vix diffi-*



*mile. An hùc referenda Lachenalia Jacq.? Capsula P. tenacis longa triquetra.*

**MASSONIA**, Thunb. \* Calix basi tubulosus, limbo 6-fidus laciniis basi retroflexis & mox erectis, undè faux (nectarium Thunb.) prominens. Stamina summæ faucis inserta. Stigma 1. Capsula 3-quetra. *Flores in scapo brevi spicato-capitati.*

**I V.** Flores spicati. Radix bulbosa. Calix sexpartitus, basi staminifer.

**CYANELLA**, L. \* Calix laciniis 3 infimis propendentibus. Stamina filamenta breviter conniventia; horum infimum declinatum, cæteris longius. Stigma 1. Semina oblonga. *Statura Scillæ ex Linn. Germinatio observanda.*

**ALBUCA**, L. \* Calicis laciniæ 3 interiores conniventes apice crassiusculo, 3 extimæ patentes. Stamina 3 his opposita sterilia, cætera 3 fertilia. Stylus pyramidato-inversus; stigma acutum, 3-plici mucrone cinctum. Semina plana. *Germinatio Asphodeli. Stamina A. viscosæ omnia fertilia ex D. Thunberg.*


**SCILLA**, L. \* **ORNITHOGALUM**, T. \* **LILIO-HYACINTUS**, T. \* *Scille.* Calix omninò patens, deciduus. Filamenta omnia filiformia. Stigma 1. *Germinatio Asphodeli. Genus nimium affine sequenti. Bulbus Lilio-Hyacinti T. squamosus.*

**ORNITHOGALUM**, T. L. \* *Ornithogale.* Calix basi connivens, apice patens, persistens. Filamenta 3 alterna, basi dilatata. Stigma 1. *Germinatio Asphodeli. Flores O. lutei ferè umbellati.*

**V.** Flores umbellati. Radix bulbosa. Calix sexpartitus æqualis.

**ALLIUM**, T. L. \* *Ail.* **CEPA**, T. \* *Oignon.* **PORRUM**, T. \* *Poireau.* Calix patens. Stigma 1. Spatha 2-valvis multiflora, in scapo terminalis. *Folia fistulosa aut plana; flores densè aut laxè umbellati, quandòque bulbiferi non capsulares; filamenta quorundam 3-cuspidata, mediâ cuspide antheriferâ. Bulbus Cepæ T. sphæriceus, Porri T. cylindricus, Allii T. compositus. Germinatio Asphodeli.*

**OBS.** In Asphodelo, Aloe, Antherico diversa lobi feminalis evolutio, diversus ejusdem situs. Maximum indè discrimen ordinisq; dividendi indicium, quod tamen non satis prænunciat fructificatio in his & illis parùm diversa.





## O R D O VII.

## NARCISSI, LES NARCISSES.

**C**ALIX superus aut interdum inferus, coloratus, basi tubulosus, limbo sexpartito, sæpius æquali. Stamina sex, tubo inserta, filamentis distinctis aut rariùs basi coalitis. Germen simplex, in plurimis inferum, in paucis superum; stylus unicus; stigma trilobum aut simplex. Capsula infera aut supera, trilocularis, tri-valvis polysperma, (in *Hæmantho* bacca trisperma).

Radix sæpiùs bulbosa. Folia radicalia, vaginantia. Flores in scapo terminales, spathacei, solitarii aut umbellati, spathâ communi simplici aut divisâ umbellam cingente.

## I. Germen superum.

**GETHYLLIS**, L. \* Calix tubulosus filiformis longissimus, limbo brevi æquali. Stamina (12 aut 18 ex *Linn.*) in 6 fasciculos æquales disposita. Germen imo calice tectum (inferum?) stylus filiformis; stigma 3-fidum. Capsula tecta ventricosa. Radix bulbosa; flos radicalis, solitarius; spatha simplex persistens & capsulam recondens; habitus *Croci*. An verè 12-andra, & indè à *Narcissis* discrepans; an potiùs 6-andra, ut asserit *Linnaeus fl. in Suppl. Papiriani Thunbergii* hùc revocans?

**BULBOCODIUM**, L. \* Calix infundibuliformis 6-partitus, laciniarum unguibus angustis conniventibus, apice staminiferis. Stigma 3-fidum. Capsula 3-angularis. Interdum tertia pars supprimitur. Flos radicalis solitarius; habitus *Colchici*. An *Liliis* magis affine?

**HEMEROCALLIS**, L. \* **LILIO-ASPHODELUS**, T. \* *Lis-Asphodele*. Calix basi infundibuliformis, limbo campanulatus 6-fidus, apice revolutus. Stamina declinata. Stigma 3-gonum. Capsula 3-gona, calice tecta. Radices fasciculatae, & flores in scapo corymbosi. An indè *Narcissis* minùs affinis?

**CRINUM**, L. \* Calix infundibuliformis, limbi laciniis longis; 3 alternis uncinatis. Stigma simplex aut 3-fidum. Capsula ovata, calice tecta. Spatha 2-partita, multiflora. Species una bulbisperma.

**TULBAGIA**, L. \* Calix infundibuliformis, limbo æquali;



squamulæ 3 bifidæ, faucem coronantes. Stamina 3 in fauce, 3 intrâ tubum. Stigma turbinatum. Capsula sub3-gona *Spatha 2-valvis multiflora; habitus Galanthi, & Allii.*

## I I. Germen inferum.

**HÆMANTHUS**, T. L. \* Calix tubo brevi, limbo æquali. Stigma 1. Bacca 3-locularis 3-sperma. *Spatha 6-partita campanulata, multiflora, floribus confertis umbellatis pedicellatis; folia 2 radicalia subopposita.*

**AMARYLLIS**, L. \* **LILIO-NARCISSUS**, T. \* Calix infundibuliformis fauce squamulis 6 instructâ, limbo æquali aut inæquali, partim reflexo. Stigma 3-fidum. *Spatha 1-phylla, latere dehiscens, 1 aut multiflora; stamina sæpè declinata ut & stylus.*

**PANCRATIUM**, L. \* **NARCISSUS**, T. \* Calix infundibuliformis; limbo campanulato, coronâ ad faucem 12-fida, cujus laciniae 6 subulatæ antheriferæ. Stigma 1. *Spatha 1-phylla, latere dehiscens, 1 aut multiflora.*

**NARCISSUS**, T. L. \* *Narcisse.* Calix infundibuliformis, limbo patente, coronâ ad faucem campanulatâ, integrâ aut divisâ. Stamina tubo inserta, intrâ coronam, ipsâ breviora. Stigma 3-fidum. *Spatha 1-phylla, latere dehiscens, 1 aut multiflora.*

**LEUCOIUM**, L. \* **NARCISSO-LEUCOIUM**, T. \* Calix tubo brevi; limbo campaniformi æquali, laciniis apice crassiusculis. Stigma 1. *Spatha 1-phylla compressa, latere dehiscens, 1 aut multiflora; stamina inserta glandulæ calicinæ germen obtegenti; antheræ apice dehiscentes; germinatio ferè ut in Aletri.*

**GALANTHUS**, L. \* **NARCISSO-LEUCOIUM**, T. \* *Perce-neige.* Calix tubo brevi, laciniis 3 exterioribus, 3 intimis brevioribus emarginatis. Stigma 1. *Cætera ut in Leucoio.*

## I I I. Genera Narcissis non omninò affinia.

**HYPOXIS**, L. \* Calix superus tubo brevi, limbo 6-partito; æquali persistente. Stamina 6 breviora, (glandulæ calicinæ semen obtegenti inserta). Germen inferum; stylus 1; stigma 1. Capsula 3-locularis polysperma, coronata calice. *Radix fibrosa; folia graminea; flores radicales aut in scapo bigemini spathacei. An Burmanniæ affinis? An congener Hypoxis Forsk. cui calix inferus?*

**PONTEDERIA**, L. \* Calix infundibuliformis, limbo sæpè bilabiato inæqualiter 6-fido, rariùs 6-partito subæquali. Stamina 3 summo, 3 medio calici inserta. Germen in plurimis inferum; stylus 1; stigma 1. Capsula carnosâ 3-locularis polysperma. *Herbæ aquaticæ; radices fibrosæ; folia radicalia & caulina vaginantia, sæpè sagittata; flores spicati aut umbellati terminales aut ex fissâ foliorum vaginâ exserti, singuli spathacei. Species quædam germine supero aut semisupero, Juncis affiniores.*



**POLIANTHES**, L. \* **HYACINTHUS**, T. \* *Tubéreuse*. Calix infundibuliformis, limbo 6-fido patulo. Stamina 6, fauci calicis inserta, antheris longis. Germen rectum; stylus 1; stigma 3-fidum. Capsula basi recta calice, 3-locularis, polysperma; semina plana, gemino ordine disposita. *Radix tubo osobulbosa; folia radicalia longa, caulina squamiformia; flores spicati, seorsum aut geminatum spathacei. An affinis Lilio, an Hyacintho?*

**ALSTROEMERIA**, L. \* Calix superus, limbo 6-partitus, laciniis 3 interioribus, quarum 2 basi tubulosæ aut convolutæ. Stamina 6, inæqualia declinata, imis laciniis inserta. Germen inferum, 6-gonum; stylus 1; stigmata 3. Capsula infera (apice non recta) 6-angularis, mucronata, 3-locularis polysperma, seminibus globosis. *Radix fibrosa; caulis foliosus, erectus aut volubilis, foliis alternis, sessilibus, obliquis; flores terminales subsolitarii aut corymbose, non spathacei. Germinatio ut in Aletri. An affinis Liliis?*

**TACCA**, Rumph. Forst. LS. \* Calix superus 6-fidus. Stamina filamenta 6 (petala ex Forst.) mediis lobis calicinis inserta, basi lata, supra in cucullum dilatatum fornicata; antheræ 6, 2-loculares oblongæ, filamentis intus sub cucullo adnatæ. Germen inferum; styli 3; stigmata 3 latiora obcordata. Bacca sicca ovata, calice coronata, 6-striata, 3-locularis polysperma seminibus striatis. *Radix tuberosa; folia radicalia, nunc palmata, nunc pinnatifida ut in Dracontio polyphylllo L.; flores in scapis terminales umbellati, pedunculati aut sessiles, filis intermixtis longissimis aut brevibus distincti, involucri magno polyphylllo umbellam cingente. Dissipimenta in baccis exsiccatis evanida ex Forstero. Habitu plantæ Arcideæ & involucri cum adjunctis filis spatham & cirrhos Ari quasi æmulans, sed character præterea diversus. Hujus congener Tavoulou Madagascariensium.*

**Obs.** Narcissorum sectio secunda, in ordine præcipua, verè naturalis, germine infero & floribus umbellatis hexandris insignita. Huic certè conveniunt Leucoium & Galanthus quorum glandula staminifera, licet supra pistillum irrepens, è calice tamen exoritur & indè in iis staminum perigyniam habitu consimili prænuntiata confirmat. Affiniori sectionis primæ parum obstat germen superum, exceptâ forsan Hemerocalli. Genera sectionis tertiæ non omninò Narcissorum, nec invicem, nec satius ordinis alterius confinia, hæc ideo reposita donec horum verus ordo constiterit.





## ORDO VIII.

## IRIDES, LES IRIS.

**CALIX** superus coloratus, basi tubulosus, limbo sexfido aut sexpartito, æquali aut inæquali. Stamina tria, tubo inserta, tribus laciniis calicinis alternis opposita, filamentis distinctis aut rariùs connatis in tubum stylo trajectum. Germen inferum; stylus unus; stigma triplex. Capsula infera, trilocularis tri-valvis, polysperma; semina sæpè subrotunda.

Radix fibrosa, aut tuberosa, aut bulbosa. Caulis plerumque herbaceus foliosus, aut rarò subnullus. Folia alterna vaginantia, sæpiùs ensiformia. Flores spathacei, spathis sæpè bivalvibus, uni aut multifloris.

## I. Stamina filamentis connatis.

**GALAXIA**, Thunb. \* Calix tubulosus erectus basi filiformis, limbo dilatatus 6-lobus æqualis patens. Filamenta connata. Stigmata 3 multipartita. *Radix bulbosa; folia radicalia; flores inter folia subacaules.*

**SISYRINCHIUM**, L. \* **BERMUDIANA**, T. \* *Bermudienc.* Calix tubo brevi, limbo 6-partito plano. Filamenta omninò connata. Stigma 3-fidum. *Radix fibrosa; caulis compressus, anceps, ramosus; flores terminales aut axillares; spathæ compresso-carinatae, multifloræ.*

**TIGRIDIA**. \* **FERRARIA**, LS. \* Calix tubo brevi, limbo magno plano 6-partito regulari, laciniis 3 exterioribus magnis ovatis, 3 interioribus minoribus, utrinque ad unguem & sub apice coarctatis. Filamenta omninò coalita, tubo longissimo. Stigmata 3 bipartita. *Radix tuberosa tunicata; flores in caule cylindrico terminales, rariores, purpurei, disco eleganter maculato.*

**FERRARIA**, L. \* Calix tubo brevi, limbo 6-partito patente, laciniis undulatis. Filamenta basi coalita. Stigmata 3 cucullata. *Radix tuberosa tunicata; flores spicati, terminales, spathis 1-floris.*

## II. Stamina filamentis distinctis.

**IRIS**, T. L. \* **XIPHION**, T. \* **HERMODACTYLUS**, T. \* **SISYRINCHIUM**, T. \* *Iris, Flambe.* Calix regularis, tubo oblongo germen



adæquante, limbo 6-partito magno, laciniis 3 alternis rectis, 3 alternis reflexis intus barbatis aut imberbibus basi stamini-feris. Stylus brevis; stigma 3 petaloïdea, oblonga, magna, staminibus incumbentia, sulco longitudinali nectarifero marginato suprà exarata. *Flores terminales, solitarii aut spicati, spathis uni aut multifloris; caulis sæpè compressus. Radix Xiphii T. bulbosa simplex, Sisyrrinchii T. bulbosa duplex bulbis superimpositis, Hermodactyli T. tuberosa, Iridis T. carnosae oblongae repens. Folia Iridis ensiformia plana margine vaginantia, Hermodactyli 4-gona, cæterorum canaliculata.*

**MORÆA**, L. \* Calix tubo brevi, limbo patulo 6-partito æquali, laciniis 3 patentioribus, intus barbatis aut imberbibus, basi stamini-feris. Stylus simplex; stigma 3 petaloïdea 2-fida, staminibus incumbentia. *Flores terminales, spathis 1-2-floris; folia ensiformia latere vaginantia, aut canaliculata; radix tuberosa tunicata; flos Iridis, sed calix totus patens. Stamina filamenta basi connata ex Linn. Suppl.*

**IXIA**, L. \* Calix tubo oblongo aut brevi, limbo campanulato 6-partito æquali. Stigma 3-fidum. *Radix fibrosa, aut tuberosa tunicata; folia plana margine vaginantia, aut canaliculata, aut nervosa graminea; caulis sæpè compressus, interdum vix ullus; flores terminales, solitarii, aut spicati, aut paniculati, aut capitati; spathæ sub 1-floræ. Seminis germinantis lobus subsessilis annectitur dorso vaginæ foliorum primariæ.*

**CIPURA**, Aubl. \* Calix basi tubulosus superus, limbo 6-partitus, laciniis 3 interioribus alternis triplò minoribus. Stamina 3 tubo inserta. Stylus crassus 3-gonus; stigma 3-lobum. *Radix tuberosa tunicata; folia quædam radicalia vaginantia ensiformia nervosa; flores in scapo terminales, fertosi aut subspicati, spathacei spathis inferioribus longioribus. Caract. ex Aubl. Guyan. 1. 13.*

**WATSONIA**. \* Calix tubo filiformi longo, limbo 6-partito subæquali & subbilabiato. Stylus filiformis 3-fidus; stigma 3 gracilia 2-fida. *Radix tuberosa tunicata, hemispherica, margine dentato; flores in caule simplici aut parum ramoso laxè spicati terminales, spathis 1-floris 2-valvibus, valvâ exteriori multò majore.*

**GLADIOLUS**, T. L. \* *Glayeul*. Calix infundibuliformis, limbo inæquali 2-labiato, suprà 3-fido connivente aut patulo, infrà 3-partito patente. Stamina sub labio superiore latentia. Stigma 3-fidum. Semina arillata. *Radix tuberosa tunicata; caulis simplex; flores spicati, spathis 1-floris. Germinatio Ixiæ, lobo absolute sessili.*

**ANTHOLYZA**, L. \* Calix infundibuliformis, tubo incurvo, limbo 6-fido inæquali. Stigma 3-fidum. *Radix tuberosa tunicata; caulis simplex; flores spicati, spathis 1-floris. Genus non satis à Gladiolo distinctum.*



**WITSENIA**, Thunb. \* Calix tubulosus erectus, limbo dilatato erecto 6-lobo regulari, laciniis 3 exterioribus extus tomentosis. Stigma sub3-fidum aut emarginatum. Radix tuberosa; caulis sublignosus anceps 2-pedalis, ramosus aut simplex, apice tectus foliis planis margine vaginantibus, distichè & flabellatim imbricatis; gemmæ terminales aut & axillares, sessiles subbifloræ compressæ, squamis 7-8 imbricatis distichis, 2 interioribus longioribus 2-fidis; singulo flori spatha brevis in intimâ gemmâ delitescens.

**TAPEINIA**, Comm. \* Calix tubulosus, limbo profundè 6-partito æquali. Stigma 3-fidum. Herba Magellanica 2-pollicaris, caule ancipiti, foliis ut in *Witseniâ* dispositis minimis; flores parvuli solitarii terminales, subsessiles inter folia quorum 3 superiora spatharum æmula. Character ex Commersf. & ex specim. sicco. Ταπεινός, humilis.

**CROCUS**, T. L. \* Safran. Calix tubo gracili, limbo ampliori 6-partito æquali recto. Stigmata 3 convoluta cristata. Radix tuberosa tunicata duplex, tuberibus superimpositis; spatha 1-phylla 1-flora. Flos acaulis subsolitarius.

### I I I. Genera Iridibus affinia.

**XIPHIDIUM**, Loefl. Aubl. \* *La Glaivane*. Calix inferus 6-partitus regularis laciniis alternis interioribus. Stamina 3, imis iisdem laciniis inserta. Germen 1 superum; stylus 1; stigma 1. Capsula subbaccata 3-sulca 3-ocularis polysperma (feminibus receptaculo globoso insertis ex Loefl.). Radix repens fibrosa; caulis herbaceus; folia alterna subvaginantia sessilia ensiformia nervosa; flores alternè paniculati terminales, singuli bracteolati. Character ex Loefl. Amer. p. 239 & Aubl. Guyan. t. 11. Habitus *Wachendorfiæ*. An receptaculum seminiferum idem; an affinius *Juncis* & *Veratro*, licèt 3-andrum?

**WACHENDORFIA**, L. \* Calix inferus (basi tubulosus?) 6-partitus irregularis, laciniis 3 supremis erectis, 3 infimis patulis. Stamina 3 declinata, imis laciniis alternis inserta; filamenta 2 aut 3 (nectarium Linn.) brevissima sterilia, staminibus interposita. Germen superum; stylus declinatus; stigma 1. Capsula supera 3-quetra, 3-ocularis, 3-sperma, 3-valvis, valvis intus nudis; receptaculum centrale 3-gonum, in faciebus seminiferum, in angulis valviferum; femina peltata. Radix tuberosa tunicata; folia radicalia vaginantia, caulina squamiformia sessilia; flores paniculati aut corymbosi, spathis 1-valvibus. An inter 3-andras aut 6-andras numeranda?

**DILATRIS**, Berg. \* **WACHENDORFIA**, L. \* Calix superus; externè hirsutus, tubo brevi, limbo 6-partito æquali erecto, persistente, extus hirsuto; laciniis oblongis, canaliculatis, basi staminiferis. Filamenta 6, 3 brevissima abortiva, 3 fertilia longiora, laciniis involuta; antheræ 3 æquales (1 cæteris longior ex Berg.), unicâ sæpè superstiti. Germen inferum;



stylus 1; stigma 1. Capsula infera, calice coronata, hirsuta; 3-locularis, 3-sperma, 3-valvis, valvis intus nudis; receptaculum Wachendorfiæ; semina plana, peltata. *Radix fibrosa? Folia radicalia vaginantia, caulina sessilia; corymbus florum terminalis, hirsutus; spathæ simplices. Character ex sicco specimine, non idem cum Bergiano & Linnæano: an planta dissimilis, sed congener? Affinis certè Wachendorfiæ.*

**ARGOLASIA.** \* Calix superus, extus hirsutus albus, intus coloratus, tubulosus 6-fidus æqualis, laciniis basi staminiferis. Stamina 6 fertilia, filamentis oblongis; antheræ versatiles, basi 2-fidæ. Germen inferum; stylus 1; stigma sub 3-fidum. Capsula infera, calice coronata, hirsuta, 3-locularis, loculis 2-3-spermis. *Herba Capensis lanata erecta; radix fibrosa; folia radicalia..., caulina sessilia nervosa glabra; flores densè paniculati terminales; spathæ simplices. Habitus Wachendorfiæ. Character ex sicco specimine, nondum satis fructifero. An receptaculum centrale? Confer cum Hyacintho lanato L. Αργος λευκος, albus hirsutus.*

**OBS.** Irides sufficienter germine infero & staminibus trinis inter Liliaceas designatæ. Harum genera quædam à Linnæo malè ad gynandriam relata, verè monadelpha. Wachendorfia & affines ab Iridibus distinguendæ, præprimis ob centrale in fructu receptaculum, peculiare in Liliaceis signum, novi indicium ordinis cujus hæc erunt prima genera in duplici sectione distribuenda, ratione fructus inferi aut superi.

## CLASSIS IV.

### PLANTÆ MONOCOTYLEDONES.

#### STAMINA EPIGYNA.

**CALIX** monophyllus superus, tubulosus aut partitus. Corolla nulla (*ut in Class. III.*). Stamina definita, epigyna, id est germi aut stylo imposita. Germen simplex inferum; stylus unicus aut nullus aut rarò multiplex; stigma simplex aut divisum. Fructus inferus uni aut multilocularis, baccatus aut capsularis.

**OBS.** De staminum epigyniâ & characteribus inde sequentibus, analogæ conferantur observationes in classibus V, XII, comparè epigyniâ distinctis relatae.



Classis hujus ordo triplex apprimè naturalis, nempe 1°. Musæ hexandræ triloculares, indè Liliaceis affines; 2°. Cannæ triloculares monandræ, Musis prætereà simillimæ; 3°. Orchides monandræ uniloculares caractere distinctissimæ. His minùs conveniunt Hydrocharides, licèt staminibus epigynis pariter instructæ.

---

## O R D O I.

## M U S Æ , L E S B A N A N I E R S.

**C**ALIX superus, bipartitus laciniis simplicibus aut lobatis. Stamina sex, germiini imposita; quædam interdum sterilia aut abortiva. Germen inferum; stylus simplex; stigma simplex aut divisum. Fructus trilocularis, loculis mono aut polyspermis. Corculum in cavitate perispermi farinacei.

Caulis herbaceus aut arboreescens, sæpè petiolis vaginantibus tectus. Folia alterna vaginantia, juniora convoluta, nervo longitudinali medio simplici emitte utrinque nervos innumeros transversim aut obliquè parallelos. Flores singuli spathacei, juxtà spadicem è mediis foliis ortum fasciatim dispositi, fasciculis alternis & spathaceis.

**MUSA**, T. L. \* *Bananier*. Calix profundè 2-partitus, lobo superiore & exteriorè 5-dentato, inferiore & interiorè cordato concavo. Germen oblongum; stylus cylindræus; stigma capitatum 6-radiatum. Bacca cucumerina loculis & seminibus ob pulpam evanidis. Flores in spadice terminales, spathis persistentibus tecti, 5-andri, filamentò sexto sterili & germine abortivo; cæteri omnes frugiferi & 1-andri, filamentis 5 sterilibus. *Caulis herbaceus assurgens, vaginis foliorum longissimis tectus; spadix solitarius cernuus. Semina vidit Rumphius in plantâ sylvestri.*

**HELICONIA**, L. \* *BIHAI*, Pl. \* Calix profundè bilabiatus, labio inferiore simplici canaliculato, superiore 3-partito, lobis 2 lateralibus angustis, impositis dorso lobi mediî latioris canaliculati. Stamina 6, quorum 1 abortivum filamentò brevi spathæformi uncinato. Stylus filiformis; stigma oblongum prismaticum, apice incurvum. Capsula oblonga, 3-quetra, 3-locularis, 3-sperma. *Spadix rectus, spathis vestichis magnis distantibus, cymbiformibus, florum fasciculos involventibus; flores in singulo fasciculo densè spicati aut glomerati.*



**RAVENALA**, Adans. \* *Le Ravenal*. Calix longissimus 4-partitus; laciniâ inferiore infrâ ventricosâ latiore, spathâ propriâ con- simili 2-fidâ subtus appositâ. Stamina 6 longissima, apice incurva. Stylus longissimus subcilindricus; stigmata 3 bidentata conniventia. Capsula coriacea magna 3-gona, apice 3-valvis, valvis medio septiferis, polysperma seminibus arillo cæruleo rectis, & hilo laterali instructis. *Caulis* arboreescens simplex; *folia terminalia maxima, flabellatim disposita, longè petiolata, petiolis basi distichè imbricatis; spadices axillares magni, floribus ut in Heliconiâ dispositis.*

*Obs.* Musæ Cannis similes quoad habitum & staminum epigyniam; ab iisdem discrepant præcipuè numero staminum seno, unde proximum ordinem aut distinctam ejusdem ordinis sectionem constituunt.

## ORDO II.

### CANNÆ, LES BALISIERS.

**CALIX** superus coloratus, partitus in plures (sæpius sex) lacinias petaloideas ut plurimum inæquales & irregulares, tribus aliis interdum exterioribus & minoribus calicem exteriorem mentientibus. Stamen unicum filamento ad styli basim inserto, sæpè plano petaloideo, antherâ adnatâ lineari, nunc simplici, nunc rariùs geminâ. Germen inferum; stylus simplex, sæpè filiformis; stigma simplex aut partitum. Capsula infera trilocularis, plerumque trivalvis & polysperma.

Radix sæpè tuberosa repens. Caulis herbaceus, petiolis vaginantibus rectus. Folia alterna vaginantia, juniora convoluta, alia multinervia, alia è nervo medio simplici emittentia utrinque nervos parallelos. Flores spathacei, sæpius impositi spadici caulino aut radicali.

**CATIMBIUM**. \* **GLOBBA**, L. \* **RENEALMIA**, LS. \* *Le Catimban*. Calix duplicatus, exterior tubulosus 2-3-dentatus inæqualis, interior tubulosus limbo 3-fido, laciniis 2 superioribus intus auctis appendice (nectarium LS.) basi 2-dentatâ apice 3-lobâ, laciniâ tertiâ inferiore 1-andrâ. Anthera sessilis longa linearis, laciniam adæquans. Stigma peltatum, hinc perforatum. Bacca carnosa, umbilicata. *Caracter ex L. Suppl. Ex Rumph. 6. t. 62. habitus Musæ; caulis altissimus; flores in spadice*



*terminali mutante racemosi ; spiculæ in racemo alternæ 1-spathaceæ breves , squamulis seu spathis minoribus dense imbricatis 1-floris testæ ; flores fortè dioici ; racemus è pedunculis 3-floris non è spiculis factus. Confer in vivis.*

**CANNA**, L. \* **CANNACORUS**, T. \* *Balifier*. Calix duplicatus, exterior brevis 3-fidus persistens, interior 6-partitus, laciniis 5 rectis, 1 reflexa. Filamentum staminis 2-lobum, lobo superiore antherifero, Stylus petaloïdeus ensiformis; stigma lineare adnatum. Capsula scabra coronata. *Flores laxè spicati terminales.*

**GLOBBA**, L. \* Calix duplicatus, exterior 3-fidus brevis persistens interior tubulosus 3-fidus æqualis. Stamina 2 ex Linn. Stigma 1. Capsula coronata. *Flores spicati, terminales aut laterales.*

**MYROSMA**, LS. \* Calix duplicatus, uterque 3-partitus æqualis. Tubus interior ( corolla L. ) brevissimus limbo 5-partito, laciniis 2 superioribus emarginatis, 3 inferioribus longioribus 3-fidis. Filamentum laciniæ mediæ inferiori adnatum; anthera ovata. Stylus crassus, longitudinaliter fissus; stigma valviforme. Capsula 3-gona. *Racemi florum in scapis folio unico terminatis scitarii laterales, è folii vaginâ erumpentes, dense imbricati bracteis alternis 2-phyllis 2-floris. Caractèr ex L. Suppl.*

**AMOMUM**, L. \* *Gingembre, Cardamome*. Calix duplicatus, exterior 3-dentatus, interior tubulosus limbo 4-partito inæquali. Stigma obtusum. Capsula coriacea. *Flores in Zingiberibus dense spicati spicâ radicali propè caulem, in Cardamomis paniculati ad basim caulis.*

**COSTUS**, L. \* Calix duplicatus, exterior 3-dentatus, interior 3-partitus æqualis, cingens tubum inflatum ( filamentum fortè ) 2-labiatum labio inferiore 3-fido, superiore simplici antherifero, antherâ 2-partitâ. Stamen aliud nullum. Stigma capitatum emarginatum. Capsula coronata. *Flores dense spicati terminales.*

**ALPINIA**, Pl. L. \* Calix duplicatus, exterior brevis 3-fidus; interior tubulosus basi ventricosus, limbo 6-fidus, laciniis 3 interioribus brevioribus. Stigma 3-gonum. Capsula carnosâ receptaculo pulposo. *Flores pyramidati terminales.*

**MARANTA**, Pl. L. *Galanga*. Calix duplicatus; exterior 3-partitus parvus, interior tubulosus 6-fidus inæqualis, laciniâ summâ 2-partitâ. Stigma 3-gonum inflexum. Capsula foeta nucleo simplici sæpius 1-loculari, 1-spermo (loculis & seminibus 2 abortivis ex Adansf.) *Flores laxè paniculati, terminales.*

**THALIA**, L. \* **CORTUSA**, Pl. \* Calix profundè 5-partitus; laciniis 3 amplioribus & crispis, 2 minoribus convolutis. Stigma simplex. Drupa foeta nucleo 2-spermo, rariùs 1-spermo. *Flores laxè paniculati terminales, singulâ spathâ glumæformi 2-valvi, 2-2-florâ.*



**CURCUMA**, L. \* Calix tubulosus. limbo 4-lobo. Filamenta 5 linearia, 4 sterilia (quæ fortè laciniaë calicinaë), quintum 2-fidum altero apice antheriferum. Stigma uncinatum. *Flores densè spicati, spicâ radicali ad basim caulis.*

**KÆMPFERIA**, L. \* *Zédoaire*. Calix tubulosus tenuis, limbo 6-partito magno, laciniis 3 alternis lanceolatis, 2 ovatis, infimâ 2-partitâ magnâ. Filamentum 2-corne; anthera gemina. Stigma obtusum. *Flores, Croci instar, solitarii aut pauci, radicales, è mediis foliis erumpentes.*

**Oss.** Non facilis floralium distinctio partium quarum forma plurimum varia diversam induxit autorum sententiam de earundem nomine & usu. Ulteriùs ergò conferenda in vivis pleraque ordinis genera, ut consimilia in his & illis organa pateant & conformis omnium character eruat. Intereà Cannarum ordo verè naturalis inter Musas & Orchides medius certò reponitur.

## ORDO III.

### ORCHIDEÆ, LES ORCHIDÉES.

**CALIX** superus, sæpè coloratus, sexpartitus, laciniis quinque superioribus, sextâ inferiore (nectarium *Linn.*) plerumque majore & dissimili. Germen inferum; stylus unicus, ascendens, laciniaë superiori infrâ sæpè adnatus, interdum brevissimus aut subnullus; stigma dilatatum, non omninò terminale, sed stylo anteriùs quasi applicitum. Anthera unica, ex apice styli sub stigmatate erumpens, bilocularis loculis distinctis, interdum & distantibus, nunc stylo utrinque adnatis & sessilibus, nunc proprio filamento brevi infixis, bivalvibus, polline in massam agglutinato refertis. Capsula unilocularis, tricarinata trivalvis, sub carinis trifariam dehiscens, persistente sæpiùs repleto triscapo. Semina numerosa, plerumque scobiformia, receptaculo mediis valvis adnato imposita.

Radix fibrosa, aut sæpiùs bituberosa, singulo tubere indiviso aut lobato. Caulis plerumque simplex herbaceus scapiformis, rariùs scandens. Folia alterna, radicalia vaginantia nervosa, caulina sessilia sæpè squamiformia.



formia. Flores spathacei, plerumque spicati, rariùs solitarii, terminales.

ORCHIS, T. L. \* LIMODORUM, T. \* *Orchis*. Lacinia inferior calicis variè lobata, basi corniculata. *Flores spicati*.

SATYRIUM, L. \* ORCHIS, T. \* *Satirion*. Lacinia inferior calicis longa, angusta, basi scrotiformis seu instructa corniculo ad ortum coarctato. *Flores spicati*.

OPHRYS, T. L. \* ORCHIS, T. \* NIDUS-AVIS, T. \* *Ophrys*. Lacinia inferior calicis dependens, lobata, subtùs carinata. *Flores spicati*.

SERAPIAS, L. \* HELLEBORINE, T. \* *Helleborine*. Lacinia inferior calicis æqualis ovata, integra, intùs concava, extùs gibba. *Flores spicati*.

LIMODORUM, L. \* Lacinia calicis 3 exteriores (ex *Plum.*), patentès angustæ; 3 interiores latiores conniventes; inferior concava acuta pedicellata ex *Linn.* *Flores spicati*.

THELYMITRA, Forst. \* Lacinia inferior calicis cæteris conformis, ovata concava. Stylus (nectarium ex *Forst.*) margini stigmatis prominulo hinc continuus, complanatus truncatus, utrinque ex antheræ loculo 2-valvi emittens massam pollinariam apice penicilliformem. *Caracter ex Forst. Austr. t. 49, mutato partium nomine, in vivâ recognoscendus*.

DISA, Berg. \* Lacinia calicis 2 exteriores magnæ; 3 interiores parvæ; inferior magna concava, basi corniculata, cornu brevi. *Flos subsolarius terminalis*.

CYPRIPEDIUM, L. \* CALCEOLUS, T. \* *Sabot*. Lacinia superior calicis ovata; inferior inflata, ventricosa, calceiformis; exteriores 4 angustiores cruciatim dispositæ. *Flos subsolarius terminalis*.

BIPINNULA, Commerf. \* ARETHUSA, LS. \* Calicis lacinia 3 superiores magnæ, basi latæ, acutæ, in galeam fursum conniventes; laterales 2 inferiores ligulæformes duplò longiores, basi nudæ, apice ciliato-pennatæ; intermedia inferior brevis obcordata. *Herba Bonariensis, non Magellanica; radices fasciculatæ; flos solarius terminalis*.

ARETHUSA, L. \* Calicis lacinia 3 exteriores longæ ligulæformes, 3 alternæ interiores latiores subæquales nudæ, quarum inferior propendens. Stylus longus, apice antherifer, basi linearis. *Flos solarius terminalis*.

POGONIA, \* ARETHUSA, L. \* EPIDENDRUM, L. \* Calicis lacinia 5 superiores oblongæ nudæ subæquales; inferior subrotunda, ad limbum ciliato-barbata. *Flos subsolarius terminalis*. Huc referantur *Arethusa ophioglossoides* L., *A. ciliaris* LS.,



*Epidendrum ciliare* L., *E. cucullatum* L. *aliæque species ciliatæ.*  
*Πωγωνίασ, barbatus.*

**EPIDENDRUM**, L. \* **HELLEBORINE**, Pl. \* Laciniaë calicis 5 oblongæ patentēs sæpè subæquales; sexta basi tubulosa, deflecta, plurimùm varia, limbo integro aut sæpiùs lobato inæquali. Capsula ovata, sæpè 6-gona. *Foliorum petiolus quandòque in bullum dilatatus; flores spicati aut paniculati, formâ varii, in vivis denuò examinandi. Species plurimæ parasiticæ, omnes exoticæ.*

**VANILLA**, Pl. \* **EPIDENDRUM**, L. \* *Vanille.* Calicis laciniaë 5 æquales magnæ patentēs plerumque undulatæ; sexta interior in infundibulum convoluta, limbo inæquali. Capsula longa filiquæformis 2-valvis intùs pulpofa. *Caulis scandens alternè ramosus ramis axillaribus; flores laxè spicati axillares & terminales, spicis flexuosis.*

**OBS.** Orchidearum limbus calicinus semper sexpartitus, sed laciniarum formâ & situ varius: sæpè quinque superiores subæquales conivent, & sexta dissimilis ab exortu paulò interior declinat inferiùs: interdum triplex est exterior & triplex interior alternans, unâ semper dissimili: interdum duæ interiores, altera superior, altera inferior magna, corollam quasi bilabiata mentiuntur, quatuor aliis exterioribus cruciatim dispositis cinctæ. Stamineus apparatus peculiaris ex Hallero qui stylum habet pro staminis filamentò, & tum ex ejusdem formâ, tum ex antheræ loculis duobus proximis aut distantibus, sessilibus aut pedicellatis præcipuos eruit generum characteres. In utroque autem loculo delitescit organum clavatum (anthera ex Linn. & Hall.), stipiti proprio infra dilatato & viscido sæpè insidens, simplex aut geminum, quod maturum cum stipite solvitur, ex loculo profilit indivisum, & stigmati vel calicinis intùs agglutinatur laciniiis, aut extrâ florem decidit. Illud insuper vi distractum in globulos innumeros, spontaneâ contractione restituitur; undè non est anthera, sed pollinis masculi nexu glutinoso elastico concatenati congeries, docente Bern. Jussæo: idèò Orchideæ non diandræ ad mentem Linnæi & Halleri, sed monandræ antherâ biloculari rectiùs dicendæ sunt, confirmante Adansonio. Nondum innotuit germinatio præ seminum tenuitate, sed analogiâ corculum unilobum judicatur. Radix plurimarum bituberosa, quasi didyma, tuberibus omninò distinctis; altero vetustiore infimo, in vegetum caulem superiùs producto & sensim decresciente; altero juniore laterali increscente, ex imâ caulis parte sub foliis radicalibus hinc enato, & intrâ scissum quò superiùs detinetur funiculum, emittente gemmam futuri caulis.





## ORDO IV.

## HYDROCHARIDÆS, LES MORRÈNES.

**CALIX** monophyllus, superus (in *Nelumbio* inferus), integer aut divisus, laciniis simplici aut gemino ordine dispositis, interioribus plerumque petaloïdeis. Stamina definita aut indefinita, pistillo imposita. Germen simplex inferum (ferè superum in *Nelumbio*); stylus simplex aut definitè multiplex aut nullus; stigma simplex aut divisum. Fructus plerumque inferus, uni aut multilocularis. *Plantæ herbacæ aquatiles.*

**VALLISNERIA**, Mich. L. \* **VALLISNERIOIDES**, Mich. \* Dioïca. MASC. (*Vallisnerioïdes* Mich.) Spadix in scapo brevi terminalis conicus parvus, spathâ cinctus 2-4-partitâ patente, floribus minimis sessilibus reclusus. Singulis calix 3-partitus; stamina 2 (germini abortivo imposita?). FÆM. (*Vallisneria* Mich.) Scapus spiralis longus 1-florus; spatha floris tubulosa 2-fida. Calix superus longissimus, ad limbum 6-partitus, laciniis alternis linearibus. Germen inferum; stylus 0; stigmata 3 ovalia semibifida, medio appendiculata (nectarium *Linn.*). Capsula infera longa, cylindrica, 3-dentata, 1-locularis, polysperma, ad parietes feminifera. *Herbæ submersæ, vado affixæ; folia omnia radicalia; scapi axillares. Flores seminei laxato scapo detenti spermatant; masculi, adaperitâ spadiceis demersi spathâ, rupto nexu ad aquæ superficiem liberi elewantur, liant, catervatim juxtâ femineos vagantur, & præcludunt gnesi novæ prolis quæ in germine latens, retracto mox scapo, sub undis clam maturefcit. An semen 1-lobum?*

**STRATIOTES**, L. \* Spatha 1-flora, 2-partita, compressa, connivens. Calix 6-partitus, laciniis 3 interioribus majoribus. Stamina circiter 20, epigyna. Germen inferum; styli 6 bifidi. Bacca capsularis 6-locularis, polysperma, seminibus incurvis. *Herba submersa foliis vaginantibus confertis radicalibus; scapi axillares 1-flori.*

**HYDROCHARIS**, L. \* **MORSUS RANÆ**, T. \* *Morrère*. Dioïca. MASC. Spatha 2-partita, 3-flora. Calix 6-partitus, laciniis 3 interioribus petaloïdeis. Stamina 9, trino ordine, germini abortivo imposita, stylum cingentia. FÆM. Flores solitarii, non spathacei. Calix idem superus. Germen inferum; styli 6 bifidi. Capsula coriacea subrotunda, 6-locularis, polysperma. *Herbæ*



*aquis innatantes, radice seu caule repente, nodoso, nodis foliosis & floriferis; folia spathacea, fasciculata; flores pedunculati. An Damasonio affinis?*

**NYMPHÆA**, T. L. \* *Nenuphar*. Calix multipartitus laciniis multiplici ordine, exterioribus 4-5 extus viridibus, cæteris interioribus (petala T. L.) coloratis petaloïdeis. Stamina numerosa, multiplici ordine germinis lateribus affixa; filamenta exteriora latiora & petaloïdea; antheræ filamentis intus adnatae. Germen semiinferum; stylus 0; stigma sessile peltatum radiatum. Bacca ficca ovata multilocularis polysperma, loculis numero radiorum stigmatis interdum persistentis; semina dissepimentis annexa. *Herbæ; radices tuberosæ longæ; folia alterna, petiolo longo infra semivaginate, natantia; pedunculi (axillares?) longi scapiformes 1-flori; flores emersi magni. Genus idem ferè cum Nelumbio, germine & stigmate proximum Papaveri.*

**NELUMBIUM**. \* **NYMPHÆA**, L. \* *Nelumbo*. Calix & stamina Nymphææ, laciniis & filamentis germini depresso insertis; Germen ferè superum turbinatum, apice truncatum, stylos plurimos & stigmata totidem supra exerens. Fructus turbina-tus, totidem foveis supra excavatus 1-spermis margine coarctatis; semina magna ovata aut subrotunda; corculum in perispermio carnosio. *Radices, folia, floratio Nymphææ. An corculum 1-2-lobum? Lobulos in Nelumbii semine vidi 2, sed inæquales ex diverso corculi puncto natos, foliis primariis potius quàm cotyledonibus similes. Genus cum præcedenti affine hinc Hydrocharidi utpotè 1-lobum, inde Asaro & Aristolochiis utpotè 2-lobum.*

**TRAPA**, L. \* **TRIBULOIDES**, T. \* *Mâcre, Saligot, Cornuelle*. Calix superus 8-partitus, laciniis 4 exterioribus acutis persistentibus, 4 interioribus (petala, T. L.) majoribus petaloïdeis. Stamina 4 (epigyna?). Germen inferum; stylus 1; stigma emarginatum. Capsula nuciformis 1-sperma, 4-gona, 2-4 dentibus calicinis persistentibus recurvis in spinam induratis armata; semen tuberosum. *Herbæ aquis innatantes, caule simplici submerso; folia caulina submersa radiceformia, verticillata, multifido-capillaria; floralia emersa alterna, petiolo, ne demittantur, ventricoso cavo; flores solitarii axillares. E superiore capsulæ germinantis poro plumula exurgit, semini indiviso continua, lateribus supra radicans. An inde semen 1-lobum, & affinitas cum Naiadibus: an potius 2-lobum cum staminibus perigynis & corollâ intra calicem 4-fidum 4-petalâ, indeque Onagris adscribendum genus?*

**PROSERPINACA**, L. \* Calix superus 3-partitus, persistens. Stamina 3 (epigyna?). Germen inferum 3-quetrum; stylus 0; stigmata 3 pubescentia. Nux ossea 3-quetra, 3-locularis, coronata. *Herba palustris; folia alterna, inferiora multifida demersa, superiora lanceolata natantia; flores sessiles axillares. An semen 1-2-lobum?*



**PISTIA**, L. \* Calix tubulosus, externè villosus, medio coarctatus plicis lateralibus, ultrà dilatatus, limbo integro in ligulam lateralem, cuculli instar, obliquè producto. Germen oblongum, unico latere adnatum intus longitudinaliter calicis dorso (an ideò inferum?); stylus crassius brevis; stigma subpelatum. Filamentum simplex, continuum lineæ pistillum & calicem connectenti (an inde epigynum?) basi cinctum membranulâ circulari, stylo longius, apice obtusum & onustum antheris 6-7-8 in orbem positis. Capsula ovata, compressa, 1-locularis, polysperma receptaculo seminifero laterali, hinc adnata calici ex adverso fissili. *Herba aquis innatans, libera (aut in ripis radicans?)*; folia omnia radicalia, in circulum expansa; flores axillares subsessiles solitarii. *An Aroideis aut Aristolochiis affinior? An semen 1-2-lobum?*

**Obs.** Ordo nondum satis definitus, in posterum fortè restaurandus, nunc complectens genera staminibus epigynis & semine forsàn unilobo instructa, tribus aliis ejusdem classis ordinibus non adscribenda.







# III.

## DICOTYLEDONES, *LES DICOTYLEDONES.*

Corculum feminis ex radiculâ , plumulâ & lobo seu Cotyledone gemino constans.

**D**ICOTYLEDONES à Monocotyledonibus non tantum numero, sed & situ partium distinguuntur, & insuper evolutione peculiari habituque proprio quem visus attingit, descriptio malè designat. Germinationis tempore, corculum in plumulam assurgens, infra productum in radiculam, ad latera è punctis oppositis, lobulos seu Cotyledones emittit ipsi adnatos, sed expeditos & plantulâ adultiore deciduos. Laterales isti lobuli, duo ut plurimum sunt; sed in Pino & quibusdam congeneribus partiti, plantam quasi polycotyledonem simulant.

Plantulæ bilobæ incrementis, aliæ lobulos extrâ tellurem propellunt, mox lactatione peractâ amplificandos & in folia primaria semper opposita, *seminalia* dicta, convertendos, aliæ pau-



ciores lobis subterraneis & simul foliis feminalibus oppositis supereminentibus instruuntur. Varia lobulorum plicatio, contextura & evolutio, in generibus confimilibus sæpiùs conformis in speciebus congeneribus semper eadem.

*Obs.* Numerosissimæ inter Vegetantia Dicotyledones dividuntur ratione sitûs mutui organorum sexualium quæ aut alterum alteri submittuntur aut juxtaposita sunt: sic stamina epigyna pistillo insident, hypogyna sub eodem inseruntur, perigyna calici ambienti inhærent. Triplex hæc insertio *immediata* dici potest, quia stamina immediatè triplici insertionum puncto infixæ sunt. Quarta memoratis hîc additur insertio staminum *mediata* dicta, nempe epipetala seu suprâ corollam, cum tribus aliis insertionibus immediatis seorsim concilianda, pro consimili corollæ ipsiusmet staminiferæ insertionem. Diversus ideò, relativè ad pistillum, situs staminum epipetalorum quæ mediatè seu interpositâ corollâ inhærent triplici insertionum puncto. Ut autem triplex extat immediata staminum insertio ab invicem distinctissima nec unquam in eodem ordine promiscua, sic mediata triplex subsistit pariter essentialis & ab invicem omninò discrepans. Insertio autem mediata seu epipetala necessariam indicat existentiam corollæ, plerumque ex observatis tunc monopetalæ. Insertio immediata vel est *absoluta* in mediatam mutari nescia, dùm corolla supprimitur, ut in Apetalis; vel est *simplex* in mediatam fortuitò mutabilis, dùm corolla existens non gerit stamina & tamen ferre interdum potest, ut in plerisque Polypetalis quarum petala & stamina, sæpiùs ex eodem puncto seorsim exorta, quandoque basi coalescunt. Character igitur ex Apetalis, Monopetalis & Polypetalis desumptus & patens commodè substituitur (paucis exceptis) & adjungitur signo primario sed occultiori ex respectivo sexualium organorum situ, seu quod idem est, ex



staminum insertionibus deprompto. Tria indè eruuntur signa primaria, ferè essentialia ac cæteris spectabilia, jam in Tournefortianâ methodo feliciter adhibita, singula ter dividenda à situ staminum in Apetalis & Polypetalis, corollæ in Monopetalis. Classès novem ex hisce dimanant naturales, singulæ ordinum seriem complectentes. Decimam addit antherarum coalitio in plurimis Monopetalis epigynis. Ad calcem demùm in undecimâ seorsim reponuntur plantæ omninò diclines, quarum mutua ideò nequit determinari sexuum dispositio.

---

## CLASSIS V.

### PLANTÆ DICOTYLEDONES APETALÆ.

#### STAMINA EPIGYNA.

**C**ALIX superus, monophyllus. Corolla nulla. Stamina definita, epigyna id est pistillo imposita. Germen inferum; stylus nullus aut unicus aut definitè multiplex; stigma simplex aut divisum. Fructus inferus, uni aut multilocularis.

*Obs.* Integritas calicis determinatur ejusdem situ. Calix superus non staminifer indicat pistillum staminiferum, ideòque inferum & stamina definita. Memoratos characteres sola staminum insertio epigyna designat omnes. Nullo prænuntiatur signo corollæ defectus; is absolutam determinat epigyniam.

---

## ORDO I.

### ARISTOLOCHIÆ, LES ARISTOLOCHES.

**C**ALIX superus, monophyllus, integer aut divisus. Stamina definita. Germen inferum; stylus unicus aut



subnullus; stigma divisum. Fructus multilocularis polyspermus.

ARISTOLOCHIA, T. L. \* *Aristolochie*. Calix coloratus tubulosus, basi ventricosus, apice dilatatus, in ligulam extensus. antheræ 6 subsessiles sub stigmate. Stylus subnullus; stigma 6-partitum. Capsula 6-gona, 6-locularis. *Caulis erectus aut volubilis; folia alterna; flores axillares; tubus quorundam scyphiiformis incurvus.*

ASARUM, T. L. \* *Asaret, Cabaret*. Calix urceolatus 3-fidus. Stamina 12 brevia, germini imposita; antheræ mediis filamentis adnatæ. Stylus brevis; stigma stellatum 6-partitum. Capsula 6-locularis. *Radix tuberosa emittens cauliculos 2-phyllos, in foliorum dichotomiâ 1-floros.*

CYTINUS, L. \* HYPOCISTIS, T. \* *Hipociste*. Calix coloratus, tubuloso-campanulatus 4-5-lobus persistens, basi 2-squamosus. Stamina 8 (16 ex aliis) antheris sessilibus, stylo insertis sub stigmate. Stylus oblongus; stigma obtusum 8-fidum. Bacca coronata coriacea, 8-locularis. *Planta parasitica Cistorum radicibus innascens; folia sessilia, densè imbricata; flores terminales congesti.*

Obs. Adjectæ antea Monocotyledonibus Aristolochiæ, nunc determinatâ germinatione certò dicotyledones, classem in methodo constituunt novam, nempe Apetalarum staminibus epigynis, à cæteris indè omninò discrepantem. Flore apetalo & fructu infero conveniunt hinc Hydrocharidibus in semine unilobis, indè Elæagnis bilobis.

## CLASSIS VI.

### PLANTÆ DICOTYLEDONES APETALÆ.

#### STAMINA PERIGYNA.

CALIX monophyllus, superus aut inferus, integer aut divisus. Corolla nulla, sed interdum squamulæ summo calici insertæ, petala mentientes. Stamina perigyna seu inserta calici, definita aut indefinita, filamentis & antheris distinctis. Germen superum aut inferum aut tantummodò calice tectum, simplex aut rariùs definitè multiplex; stylus unicus aut definitè



multiplex aut nullus; stigma simplex aut multiplex. Semen nudum superum, aut fructus superus vel inferus, sæpè monospermus, rarò polyspermus. Varius corculi situs in femine. Sexus interdum distincti.

*Obs.* Perigynia staminum præscribit calicem monophyllum; cum germine infero superum, cum supero inferum; admittit stamina definita aut indefinita, germen superum aut inferum, simplex aut multiplex; stylium & stigmatum non statuit numerum; indicat sæpè corollam polypetalam aut nullam; quâ deficiente insertio perigyna fit absoluta.

Ordinum distributio à staminum situ præcipuè deducta. Calix apice staminifer, tubulosus superus in Elæagnis, tubulosus inferus non partibilis in Thymelæis, tubulosus inferus maturatione partitus in Proteis. Idem basi staminifer in Lauris, Polygoneis & præcipuè in Atriplicibus, indè affiniorebus subsequenti staminum hypogynorum classi. Perispermum insuper farinaceum in Polygoneis & Atriplicibus, nullum in cæteris ideò diversissimis. Præter collecta in sextuplici ordine genera, alia etiam staminibus perigynis apetalâ in polypetalis classis XIV ordinibus disperguntur, iis affinia & solo discrepantia corollæ defectu, nempe in Sempervivis aut confinibus, in Saxifragis & Salicariis, in Rosaceis quibus nunc adduntur Alchimilla & Sanguisorba & congeneres, in Leguminosis, Terebinthis & Rhamnis. Apetalæ igitur Polypetalis interdum conveniunt, & existentia corollæ non staminiferæ minùs interest.

## ORDO I.

### ELÆAGNI, LES CHALEFS.

**CALIX** monophyllus, tubulosus, superus. Corolla nulla. Stamina definita, summo tubo calicino inserta. Germen inferum; stylus unicus; stigma sæpiùs simplex. Fructus monospermus, baccatus, rarò capsularis. Corculum absque perispermo. Caulis frutescens aut arbo-



rescens. Folia plerumque alterna. Sexus interdum distincti.

## I. Stamina quinque aut pauciora.

**THESIIUM**, L. \* **ALCHIMILLA**, T. \* Calix 5-fidus. Stamina 5; calicinis laciniis opposita. Capsula 1-sperma non dehiscens. *Suffrutes aut herbæ; flores variè dispositi, singuli sub calice 2-3-bracteati, interdum 3-4-fidi 3-4 andri. An germen potius superum?*

**QUINCHAMALIUM**. \* *Quinchamali du Chily (Feuill t. 44.)*. Calix superus tubulosus 5-fidus laciniis antheriferis, caliculo cinctus intero globuloso subdentato coriaceo. Antheræ 5 subsessiles. Stigma 1. Semen inferum, caliculo persistente tectum. *Suffrutex; folia linearia; flores terminales.*

**OSYRIS**, L. \* **CASIA**, T. \* *Rouvet*. Dioïca. Calix 3-fidus. MASC. Stamina 3 brevia. FÆM. Stigma triplex. Bacca globosa officulo 1-spermo foeta. *Frutices ramosi; flores in ramis terminales racemosi, interdum hermaphroditi.*

**FUSANUS**, L. \* **COLPOON**, Berg. \* **THESIIUM** LS. \* Calix turbinatus 4-fidus. Stamina 4, brevia, calicinis laciniis opposita; antheræ didymæ. Germen inferum, supra glandulosum; stylus 0 aut brevissimus; stigmata 4. Drupa? .. turbinata 1-sperma. *Frutex glaucus, ramis oppositis; folia subopposita, integra vix nervosa; flores parvi paniculati terminales, quidam 5-fidi, plures masculi. An Rhamnis affinior?*

**HIPPOPHAE**, L. \* **RHAMNOIDES**, T. \* *Argouffier*. Dioïca. MASC. Calix 2-partitus. Stamina 4, antheris oblongis subsessilibus. FÆM. Calix 2-fidus. Stigma crassiusculum. Bacca globosa. *Arbusculæ; folia punctata; flores axillares.*

**ELÆAGNUS**, T. L. \* *Le Châlef*. Calix 4-fidus campanulatus; intus coloratus, extus rugosus. Stamina 4, laciniis calicinis alterna; antheræ subsessiles. Stylus brevis. Drupa foeta nuce 1-spermâ. *Arbuscula; flores axillares, quidam masculi.*

**NYSSA**, L. \* *Tupelo*. Calix 5-fidus. Stamina 5. Drupa foeta nuce sulcatâ angulatâ, irregulari 1-spermâ. *Arbores; flores axillares, polygami, in arbore distinctâ masculi 10-andri calice 5-partito.*

**CONOCARPUS**, L. \* Calix parvus. 5-fidus laciniis subulatis. Stamina 5. Capsula minima complanata 1-sperma, margine membranaceo, non dehiscens. *Flores capitati; capsulae in conum imbricatum dispositæ, squamiformes; conis axillares & terminales: an inde ab Elæagnis segreganda? C. racemosæ flores distincti, 5-petali, fortè 10-andri, folia opposita: an genus diversum?*

## II. Stamina sæpiùs decem.

**BUCIDA**, L. \* *Grignon*. Calix campanulatus 5-dentatus. Stamina 12



calice longiora. Bacca sicca coronata 1-sperma. *Folia in ramulorum dichotomia & apice conferta; flores spicati axillares & terminales, cornu spicam terminante (Brown. Jam. t. 23. f. 1.) spongioso, forsitan inani, Rhizophoræ clavum mentiente.*

**TERMINALIA**, L. \* *Badamier*. Calix 5-fidus intus villosus; limbo patens. Stamina 10. Drupa compressa margine carinato aut attenuato, 1-sperma non coronata. *Arbores; folia in ramis dichotomis ad apicem incrassatum conferta, spicis florum intermixtis, basi hermaphroditis, supra masculis.*

**CHUNCOA**, Pavon. \* *Chuncho du Maragnon*. Calix 5-fidus; limbo patens. Stamina 10. Capsula 5-gona, angulis alatis, 2 oppositis majoribus, 1-sperma non coronata. *Arbores ex sylvis fluvio Amazonio conterminis. Folia alterna sparsa; spicæ florum axillares, basi hermaphroditæ, apice masculæ. Character ex D. Pavon.*

**PAMEA**, Aubl. \* *Pamier*. Calix 3-fidus. Stamina ... Drupa ovata 3-gona; nux 1-sperma. *Arbor; folia ad ramulorum nodos conferta; flores racemosi axillares. Character ex Aubl. Guyan. t. 359. Habitus Terminaliæ: an specie congener?*

**TANIROUCA**, Aubl. \* *Taniboucier*. Calix urceolatus 5-fidus, basi 1-bracteatus. Stamina 10. Germen inferum; stylus 1; stigma 1. Fructus ... *Arbor; folia alterna; flores spicati axillares. Character ex Aubl. Guyan. t. 178. Fructus ordinem veriùs designabit.*

Obs. Apetalus & Thymelæis Proteisque subaffinis, hic propterea reponitur ordo ab iisdem germine infero discrepans, cujus incertus adhucdum in serie naturali locus, nec quidem sectiones duæ omnimodè conterminæ. Bucida & congeneres Myrtoideis decandris analogæ, solo corollæ defectu distinctæ.

## ORDO II.

### THYMELÆÆ, LES THYMÉLÉES.

**CALIX** monophyllus tubulosus, inferus. Corolla nulla; sed in quibusdam squamæ petaloideæ è calicis fauce enatæ, corollam polypetalam mentientes. Stamina definita, ibidem inserta, laciniarum calicinarum sæpiùs dupla, quorum alia iisdem opposita, alia alterna. Germen superum simplex; stylus unicus; stigma sæpiùs simplex. Semen unicum superum, nudum aut baccatum aut calice tectum. Corculi perispermio destituti radícula superior. Caulis sæpè frutescens. Folia plerumque alterna.



**DIRCA**, L. \* Calix coloratus turbinatus, margine inæquali. Stamina 8 exserta, inæqualia. Stylus filiformis. Bacca 1-sperma. *Gemmæ 3-floræ axillares.*

**LAGETTA**, \* *Lagetto, Bois dentelle.* Calix coriaceus tubulosus fauce coarctatus & sub 4-glandulosus, limbo 4-fidus. Stamina 8 sessilia. Stylus 1; stigma... Nux piliformis pilosa 1-sperma non dehiscens, calice persistente & demum infra circumscisso tecta. *Abor cortice interiore in reticulum extensili; folia alterna; flores spicati terminales, spicâ geniculatâ, ad geniculos 1-florâ. Corculum seminis absque perispermio.*

**DAPHNE**, L. \* **THYMELÆA**, T. \* *Garou, Sainbois, Lauriôle.* Calix coloratus 4-fidus. Stamina 8, non exserta. Stylus parvus; stigma capitatum. Bacca 1-sperma. *Flores axillares aut terminales, foliarii aut glomerati. Gemmæ in D. Mezereo 3-4-5-floræ, tubo calicis duplicato.*

**PASSERINA**, L. \* **THYMELÆA**, T. \* *Passerine.* Calix medio ventricosus, limbo 4-fidus patens. Stamina 8. Stylus filiformis lateralis; stigma capitatum hispidum. Semen corticatum. *Flores axillares aut terminales; folia in quibusdam opposita. Huc Banksiam Forsteri retulit Linnæus fil. Suppl., quæ discrepat utpote 2-andra & Jasmineis fortè affinium, sed calice orbata.*

**STELLERA**, L. \* **THYMELÆA**, T. \* Calix longus filiformis, limbo 5-fido. Stamina 8, non exserta. Stylus brevis; stigma capitatum. Semen rostratum. *Flores axillares aut terminales.*

**STRUTHIOLA**, L. \* Calix longus filiformis, limbo 4-fido. Glandulæ 8 squamiformes, summo calici insertæ. Stamina 4 brevia, non exserta. Stylus filiformis; stigma capitatum. Bacca exsucca 1-sperma. *Folia opposita; flores solitarii axillares.*

**LACHNEA**, L. \* Calix longus tenuis, limbo 4-fido inæquali. Stamina 8. Stylus filiformis lateralis; stigma capitatum hispidum. Semen subbacatum, calice tectum. *Flores aggregati terminales.*

**DAIS**, L. \* Calix longus filiformis, limbo 4-5-fido. Stamina 8-10. Germen infra adnatum calici; stylus filiformis; stigma capitatum. Bacca 1-sperma. *Folia in quibusdam opposita; flores aggregati sessiles in involucri 4-5-partito terminali.*

**GNIDIA**, L. \* Calix longus filiformis, limbo 4-fido. Squamulæ 4, calicinis laciniis alternæ. Stamina 8. Stylus filiformis lateralis; stigma capitatum hispidum. Semen calice tectum. *Folia in paucis opposita; flores terminales, distincti aut rarius aggregati.*

**NECTANDRA**, Berg. \* Calix infundibuliformis, limbo 4-fido. Squamulæ 8, summo calici insertæ. Stamina 8 brevia. Stylus filiformis; stigma crassiusculum. Semen nitidum calice tectum. *Folia opposita & alterna; flores axillares & terminales. Caractèr ex Bergio. Huc Gnidia Sericea L.*



**QUISQUALIS**, L. \* Calix longissimus filiformis limbo 5-dentato: Squamæ 5 oblongæ. Stamina 10. Stylus filiformis; stigma obtusum. Drupa 5-angularis 1-sperma. *Folia opposita; flores spicati, terminales aut axillares, singuli bracteati.*

*Obs.* An floris perianthium calix, an corolla dicendum? Corollam indicant affinitas Daphnes cum Cestro & tubi color & ejusdem forma. Calicem melius designant defectus perianthii exterioris & squamæ petaloideæ in summo quarundam tubo exsertæ, & tubus Daphnes Mezerei duplicatus, & idem in pluribus persistens fructui circumpositus, & demum quædam cum Elæagnis affinitas.

## ORDO III.

### PROTEÆ, LES PROTÉES.

**CALIX** quadri aut quinquepartitus, vel tubulosus quadri aut quinquefidus, interdum villis minimis aut squamulis infra stipatus. Stamina calicinis laciniis numero æqualia & iisdem mediis inserta. Germen unicum superum; stylus simplex; stigma sæpius unicum. Semen unicum nudum aut pericarpio inclusum, vel rarius capsula unilocularis polysperma. Corculum absque perispermo; radícula ejusdem inferior. Caulis frutescens. Folia alterna aut confertim subverticillata. Flores distincti aut intrâ calicis communis squamas imbricatas variè aggregati supra receptaculum commune, hermaphroditi aut rarius diclines.

I. Semen nudum, aut fructus monospermus.

**PROTEA**, L. \* **GLOBULARIA**, T. \* Calix 4-fidus aut 4-partitus, laciniis apice conniventibus & intus sulcatis, superiore interdum profundius fissâ. Stamina 4, summis laciniis inserta, filamentis brevibus, antheris sulco immersis oblongis, (calicis limbo tardius patente) approximatis & stigma circumdantibus. Stigma 1, rarius 2-fidum, oblongum, cum stylo interdum nodoso sæpè articulatum. Semen aut capsula non dehiscens, stylo acuminata, sæpè recta calice emarcido infra circumscisso. *Folia alterna; flores in quibusdam distincti, spicati, fortè abortu monoici; in plurimis hermaphroditi, aggregati supra receptaculum commune, nudum aut villis squamulisve tectum, cinctum squamis in strobilum imbricatis nunc flores distinguentibus, nunc florum congeriem*



*tantum ambientibus ; capitula terminalia aut rarius axillaria. An dividendum genus ?*

**BANKSIA**, LS. \* Calix 4-partitus laciniis primò conniventibus, dein à basi divaricatis, circà stigma diutius conniventibus. Stamina 4; antheræ sessiles in concavo laciniarum calicinarum apice. Stigma 1 crassiusculum. Capsula lignea 2-valvis 1-sperma. *Folia conferta; flores aggregati in strobilum squamosum, squamis coriaceis duplici ordine in spiram dispositis, aliis minoribus vacuis, aliis majoribus 2 floris. Character ex Linn. Suppl.*

**ROUPALA**, Aubl. \* Calix 4-partitus, laciniis spatulatis, apice intus concavis & staminiferis. Stamina 4, antheris subsessilibus calice patente erectis. Stigma 1. Fructus... 1-spermus. *Folia alterna; flores in spicis solitariis axillaribus & terminalibus alternatim geminati sessiles. Character ex Aubl. Guyan. t. 32.*

**BRABEIIUM**, L. \* Calix parvus 4-partitus, primò connivens, dein revolutus, laciniis basi staminiferis. Stamina 4, antheris filamento intus adnatis, oblongis. Stigmata 1-2. Drupa villosa 1-sperma. *Folia (Theophrastæ) subverticillata; flores spicati axillares, supra spicam fasciculati, fasciculis tri aut multifloris 1-bracteatis, calice interdum 5-partito 5-andro, flosculis pluribus masculis. Affine Proteis spicatis.*

## II. Fructus unilocularis polyspermus.

**EMBOTHRIUM**, Forst. LS. \* Calix tubulosus, apice tumidus & clausus, maturatione nunc 4-partitus revolutus, nunc infra latere fissus & à germine discedens, supra calyptræformis diutius connivens & stigmati circumpositus. Antheræ 4 sæpè subsessiles, in terminalibus laciniarum calicinarum foveolis receptæ. Germen stipitatum (squamulâ truncatâ stipitem infra semicingente ex Forst.); stylus 1 aut subnullus; stigma dilatatum. Folliculus oblongus hinc longitudinaliter dehiscens polyspermus seminibus semialatis. *Folia alterna; flores spicati aut subcorymbosi, terminales aut axillares, pedicellis 1-floris bijugis. Speciebus Forsterianis calix 4-partitus, stylus 0, folliculus membranaceus siliquæformis, semina rariora distantia; Commersonianis Magellanicis, calix apice connivens, stylus longus persistens, folliculus lignosus, semina numerosa imbricatim congesta.*

*Obs.* Protea sic dicta à specierum mirâ diversitate, antea Lysimachiis adjuncta, quasi monopetala hypogyna & monosperma Globulariæque affinis, nunc iterum observata inter Apetalas revocatur ad mentem D. Adanson qui corollam emarcidam persistentem, in mediis laciniis staminiferam & exteriore destitutam perianthio, rectius pro calice sumit, posthabitis specierum quarundam vilis squamulisve ambientibus. Calicinam hujus indolem confirmat analogia cum Thymelæis quarum pariter calix tubulosus inferus, interdum persistens emarcidus basi circumscissus, & fructus monospermus superus, & corculum



absque perispermo, & caulis frutescens, & flores quandoque aggregati, diverso tamen staminum numero & radiculae situ. Peculiaris in ordine fructus Embothrii polyspermus. Globulariam florum aggregatione & semine unico similem Proteis, aliò revocant corolla in calice interior & stamina ejusdem laciniis alternantia.

## ORDO VI.

### LAURI, LES LAURIERS.

**CALIX** sexdivisus persistens. Stamina sex imis calicinis laciniis inserta, aut dupla quorum cetera sex interiora; antheræ filamento adnatæ, à basi ad apicem dehiscentes. Germen superum; stylus unicus; stigma simplex aut divisum. Drupa aut bacca unilocularis, foeta nuce monospermâ. Corculum feminis absque perispermo. Caulis arborescens aut frutescens. Folia alterna, aut rariùs opposita.

**LAURUS**, T. L. \* *Laurier*. Calix 6-partitus aut 6-fidus æqualis. Staminum filamenta 12, 6 exteriora fertilia, 6 interiora exterioribus opposita quorum 3 fertilia basi 2-appendiculata aut 2-glandulosa & 3 alterna sterilia. Stigma capitatum. *Folia plerumque integra, in paucis subopposita; flores in plurimis subpaniculati axillares aut terminales, in paucis solitarii aut glomerati axillares, quandoque sexibus abortivis dioici. Calix quorundam deciduus, ceterorum persistens cupulæformis integer aut lobatus. Drupa in plurimis Olivæ aut Ceraso similis, in L. Perseâ pyriformis magna. Ex Linnæo stamina quorundam numero varia, 6-8 in L. Sassafras, 8-14 calice 4-fido in L. Nobili &c. Confer in vivis. An genus dividendum?*

**OCOTEA**, Aubl. \* Calix 6-partitus laciniis alternis interioribus. Staminum filamenta 9 membranacea lata apice truncata, quorum 6 exteriora calici opposita, 3 interiora basi 2-glandulosa; antheræ 4 singulo filamento intus adnatæ à basi ad apicem dehiscentes, 2 inferiores, 2 superiores. Stigma concavum. Drupa calice cupulæformi coriaceo persistente infra cinctâ, ovata 1-sperma. *Caracter fructus ex sicco, floris ex Aubl. Guyan. t. 310. An potius antheræ tantum duæ loculis distinctis? Arbor; folia lanceolata, salicina; flores paniculati axillares aut terminales, parvi, plures abortivi.*

**AJOVEA**, Aubl. \* *l'Aïouvé*. Calix turbinatus 6-fidus. Stamina 6, filamentis basi 2-glandulosis. Stigma 6-fidum. Bacca foeta nuce fragili



fragili 1-spermâ. *Arbuseula* ; folia integra ; flores paniculati terminales & axillares. *Caracter ex sicco & ex Aubl. Guyan. t. 120.*

### Genera Lauris affinia.

**MYRISTICA**, LS. \* *Muscadier*. Dioïca. Calix urceolatus 3-fidus. MASC. Stamina 12, rarius 9, antheris longis 2-ocularibus erectis conniventibus, filamentis in columnam centram brevem coalitis. FÆM. Germen superum ; stylus 0 ; stigma 2. Bacca drupacea pyriformis 1-sperma ; semen magnum solidum, intus venosum & variegatum, extus vestitum membranâ fissili reticulatâ. *Caracter floris ex D. Lamarck. Arborea succo corticis rubro ; folia alterna integra ; pedunculi axillares, uni tria ut multiflori, floribus pedicellatis 1-bracteatis. Semen aromaticum oleosum ; ejusdem membrana vestiens Macis dicta aromatica.*

**VIROLA**, Aubl. \* Dioïca. Calix tomentosus turbinatus 3-dentatus. MASC. Stamina 6 filamentis brevibus in imo calice. FÆM. Germen superum ; stylus brevis ; stigma 1. Drupa exsucca capsularis tomentosa, utrinque sulcata, 2-valvis, foeta nuce fragili 1-spermâ reticulatim sulcatâ & fibris carnosissimis planis reticulatis testâ ; semen subrotundum oleosum, venis rubris intus variegatum. *Arborea ligno albido, succo rubente acri turgida, ramulis tomentosis ; folia alterna ; flores racemoso-paniculati axillares, fœminei masculis minores ; semen sebiferum. Caracter ex Aubl. Guyan. t. 345. An Myristicæ congener ?*

**HERNANDIA**, Pl. L. \* Monoïca. MASC. Calix tomentosus 6-partitus (corolla L.) laciniis alternis interioribus & minoribus. Glandulæ 6 ex imis laciniis enatæ substipitatæ, ambientes stamina 3 erecta filamentis brevibus basi subconnatis. FÆM. Calix tomentosus duplex, exterior inferus brevis urceolatus subinteger, interior superus (corolla L.) 8-partitus (6-part. ex Lin.) laciniis deciduis, alternis extimis. Germen calici interiori inferum, exteriori cinctum ; stylus brevis basi cinctus glandulis 4 substipitatis ; stigma latius infundibuliforme. Drupa 8-sulcata, foeta nuce globosâ 2-valvi 1-spermâ, testâ calice exteriori persistente maximo, in vesicam coriaceam supra conniventem & perforatam ampliata ; semen (Myristicæ) oleosum pingue, intus lineatum. *Arborea ligno albido fragili ; folia alterna, peltata aut subpeltata ; spicæ aut corymbi axillares terminalesve pedunculis 1-bracteatis, singulis intra involucrum 4-phyllum 3-floris, floribus 2 masculis pedicellatis, 1 fœmineo sessili. Seminis 2-lobi perispermio destituti radícula assurgens. Caracter ex sicco. Myristicæ affinis, reluctante licet calice interiori supero.*

*Obs.* Laurus, ex Linnæo polypetala absque calice, rectius dicenda est calicata apetala, mutato nomine perianthii in basi laciniarum stamina ferri & persistentis & quandoquæ fructui infra circumpositi. Ad



Proteas accersitur utpotè similiter staminifera & apetala & monosperma. An indè conveniens etiam Myrsinica Lauro? Huic etiam flore affinis Cuscuta, sed habitu diversissima & similior Cuscuta.

## ORDO V.

### POLYGONEÆ, LES POLYGONÉES.

**CALIX** monophyllus, divisus. Stamina definita, imo calici inserta. Germen simplex superum; styli plures aut nulli; stigmata plura. Semen unicum nudum, aut calice (quasi supero) tectum. Corculum in farinaceo perispermo immersum. Folia alterna, basi vaginantia, aut vaginæ intràfoliaceæ adnata, juniora subtus revoluta. Caulis in plurimis herbaceus.

**COCCOLOBA**, L. \* *Raisnier*. Calix 5-partitus. Stamina 8. Styli 3; stigmata 3. Nux 1-locularis, calice baccato tecta. Caulis fruticosus; flores racemosi.

**ATRAPHAXIS**, L. \* Calix 4-partitus. Stamina 6. Styli 0; stigmata 2. Semen calice tectum. Caulis frutescens; flores axillares aut terminales. Calix *A. undulata* æqualis, *A. spinosa* inæqualis laciniis 2 majoribus petaloideis.

**POLYGONUM**, T. L. \* *Renouée*. **FAGOPYRUM**, T. \* *Sarrazin*. **BISTORTA**, T. \* *Bistorte*. **PERSICARIA**, T. \* *Perficair*. Calix 5-partitus. Stamina 5-9. Styli 2 aut 3; stigmata totidem. Semen tectum. Flores in Polygono T. axillares 8-andri, 3-gyni cum semine rotundo; in Fagopyro T. corymbosi paniculati, 8-andri, 3-gyni cum semine triangulo; in Bistorta T. spicati terminales, 9-andri, 3-gyni cum semine triangulo & radice bis torta; in Persicaria T. spicati & paniculati, axillares & terminales, 5-6-7-8-andri, 2-gyni aut rarius 3-gyni cum semine ovato. Genus idè fortè dividendum cum Tournefortio.

**RUMEX**, L. \* *Acetosa*, T. \* *Oseille*. **LAPATHUM**, T. \* *Patience*. Calix 6-partitus. Stamina 6. Styli 3; stigmata dissecta. Semen 3-quetrum, nudum aut tectum. Flores paniculati terminales aut axillares. Laciniae tres calicis in Lapatho T. glandulosæ, nudæ in Acetosa T. cui insuper folia auriculata acida. Species quædam dielines.

**RHEUM**, L. \* **RHABARBARUM**, T. \* *Rhubarbe*, *Rapontic*. Calix 6-fidus. Stamina 9. Styli 0; stigmata 3. Semen 3-quetrum marginibus membranaceis. Flores paniculati terminales.



**TRIPLARIS**, L. \* Calix magnus, basi tubulosus, apice 3-partitus. Stamina 3; antheræ lineares. Styli 3; stigmata 3 villosa. Nux 1-sperma 3-quetra, calice tecta. *Caulis fruticosus aut arborescens; flores spicati terminales & axillares. Petala 3 admittit Linnæus in Generibus, rejicit in Systemate. Reclius ferrè calicem describit 6-fidum Aubl. Guyan. p. 910, quo teste genus insuper dioicum, 12-andrum foliis basi vaginantibus, junioribus revolutis.*

**CALLIGONUM**, L. \* **POLYGONOIDES**, T. \* Calix 5-partitus, laciniis rotundatis inæqualibus. Stamina circiter 12. Styli 3 breves, rarius 2 aut 4; stigmata capitata. Capsula pyramidata, 3-4-angula, 1-sperma, setis ramosis tecta ac cancellata. *Frutex penè aphyllus, ramis sæpè dichotomis, articulatis; articuli membranacei, monophylli aut nudi, floriferi; folia linearia subrecta; habitus Ephedræ. Character ex succo Torrefortii specimine.*

**PALLASIA**, L. \* **PTEROCOCCUS**, Pall. \* Stamina 10-15. Styli 3-4. Nux tetraëdra, angulis membranaceis 2-fidis, non setosa. *Frutex aphyllus. Cætera ut in Calligono certè congeneri. Character ex D. Pallas. & Linn. fil. Suppl.*

**KOENIGIA**, L. \* Calix 3-partitus. Stamina 3. Styli 0; stigmata 2-3. Semen nudum. *Plantula caule nodoso; folia alterna, basi vaginantia more Persicariæ, terminalia quaterna; flores terminales fasciculati. Character ex Linn.*

*Oss.* Naturalis ordo nec unquam immutandus, præcedentibus parum conveniens, affinium Atriplicibus tum habitu tum perispermio farinaceo, ab his distinguitur præcipuè situ corculi intra perispermum, & foliis vaginantibus, & iisdem junioribus revolutis. An huic affinis Begonia?

## ORDO VI.

### ATRIPLICES, LES ARROCHES.

**CALIX** monophyllus, sæpè profundè partitus. Stamina definita, imò calici inserta. Germen unicum superum; stylus unicus aut nullus, aut sæpius definitè multiplex; stigma singulo stylo unicum, rarius duplex. Semen unicum (multiplex in Phytolaccâ, duplex in Galeniâ) nudum, aut tectum calice quasi supero, aut inclusum pericarpio baccato vel capsulari. Corculum farinaceo typo circumpositum. Caulis in plurimis herbaceus, in quibusdam frutescens. Folia sæpius alterna, interdum opposita. Sexus interdum distincti.



## I. Fructus baccatus.

**PHYTOLACCA**, T. L. \* Calix 5-partitus. Stamina 8-20. Germen striatum; styli 8-10. Bacca orbiculata 8-10-fulcata, loculis totidem 1-spermis. *Caulis frutescens; flores spicati; spicae sæpius foliis oppositæ, rarius axillares: foliorum apex rostratus. Species una dioica.*

**RIVINIA**, Pl. L. \* **SOLANOIDES**, T. \* Calix 4-partitus. Stamina 4-8. Stylus 1. Bacca 1-sperma. *Caulis subfrutescens; flores spicati axillares; folia acuminata.*

**SALVADORA**, L. \* Calix 4-fidus lobis revolutis. Stamina 4. Stylus 1. Bacca 1-sperma, semine arillato. *Frutex foliis oppositis, racemo terminali.*

**BOSEA**, L. \* Calix 5-partitus. Stamina 5. Stylus 0; stigmata 2. Bacca globosa 1-sperma. *Arbusecula foliis acuminatis; flores racemosi axillares. An affinior Rhamnis?*

## II. Fructus capsularis.

**PETIVERIA**, Pl. L. \* Calix 4-partitus. Stamina 6 aut 8. Styli 4. Capsula 1-sperma non dehiscens, calice tecta. *Folia acuminata; flores terminales, laxè spicati, sessiles; capsula spicae appressa.*

**POLYCNUM**, L. \* Calix 5-partitus. Stamina 3. Stylus 2-fidus. Capsula 1-sperma non dehiscens. *Habitus Camphorosmæ.*

**CAMPHOROSMA**, L. \* **CAMPHORATA**, T. \* *Camphrée*. Calix urceolatus 4 partitus laciniis alternis majoribus. Stamina 4 exserta. Stylus 2-fidus. Capsula 1-sperma, calice tecta. *Caulis ramosus, diffusus densè foliosus; folia minima, linearia; flores axillares. An Urticis aut Plantaginibus affinior? an semen perispermio instructum?*

**GALENIA**, L. \* Calix 4-fidus. Stamina 8. Styli 2. Capsula 2-ocularis 2-sperma. *An idcirco ab Atriplicibus repellenda. Suffrutex foliis inferioribus oppositis; flores paniculati terminales.*

## III. Semen tectum calice. Stamina quinque.

**BASELLA**, L. \* *Basille*. Calix urceolatus 7-fidus. Styli 3; stigmata styliis adnata. Semen calice baccato tectum. *Caulis dextrorsum volubilis; flores spicati axillares.*

**ANREDERA**. \* Calix 2-partitus, lobis dorso carinatis. Stylus 2-fidus; stigmata 2. Semen tectum calice compresso membranaceo bialato, supra & infra emarginato. *Caulis scandens; flores spicati axillares. Habitus Basellæ. Character ex sicco, instaurandus.*

**ANABASIS**, L. \* Calix 5-partitus, basi 3-bracteatus. Styli 2. Semen cochleatum, tectum calice infra baccato, supra coarct-



tato, ad limbum plano patente scarioso. *Caulis subfrutescens interdum articulatus; folia alterna succulenta, aut nulla; flores terminales aut axillares.*

**CAROXYLUM**, Thunb. \* Calix (corolla Thunb.) 5-partitus, extus 2-squamosus (calix ejusd.), intus 5-appendiculatus (necrarium ejusd.). Stamina 5, lateri germinis inserta. Germen superum; stylus 1; stigmata 1-2. Semen 1 tunicatum spirale, appendicibus calicinis conniventibus tectum. *Arbor ramosissima ferè nuda, ramulis foliosis & floriferis. Anabasi affinis. Character ex Thunbergio. Generis dubii iterum observanda flaminum insertio & seminis structura.*

**SALSOLA**, L. \* **KALI**, T. \* *Soude*. Calix 5-partitus. Stylus 2-3-fidus; stigmata 2 aut 3. Semen cochleatum, tectum calice capsulari. *Caulis frutescens aut herbaceus; folia opposita aut alterna, teretia aut plana; flores terminales aut axillares, in quibusdam basi 3-bracteati, & 2-3-gyni. Genus fortè dividendum. Hujus congener Suæda Forsk. ex D. Vahl, & Chenolea Thunb. ex D. Lheritier, licet capsulâ 1-spermâ & semine non cochleato instructa ex Thunbergio.*

**SPINACIA**, T. L. \* *Epiners*. Dioïca. MASC. Calix 5-partitus. FÆM Calix 4-fidus. Styli 4. Semen tectum calice indurato, nunc rotundo, nunc 2-4-corni. *Flores glomerati axillares.*

**ACNIDA**, L. \* Dioïca. MASC. Calix 5-partitus, margine membranaceus. FÆM. Calix 2-partitus, involucri polyphylo cinctus. Styli 5. Semen calice succulento sulcato tectum. *Flores racemosi axillares.*

**BETA**, T. L. \* *Bette, Poirée*. Calix 5-partitus. Germen seminferum; styli 2. Semen reniforme, basi calicis capsulari involutum. *Caulis sulcatus; spicæ & paniculæ terminales & axillares, glomerulis constantes bi aut tri aut quadrisporis sessilibus, foliolo axillaribus.*

**CHENOPODIUM**, T. L. \* *Anserine, Patte-d'oye*. Calix 5-partitus. Stylus 2-fidus (rarò 3-fidus); stigmata 2 aut 3. Semen calice clauso angulato tectum. *Flores glomerati, paniculati.*

**ATRIPLEX**, T. L. \* *Arroche*. Calix 5-partitus. Stylus 2-fidus; stigmata 2. Semen calice clauso angulato tectum. Flores sceminei hermaphroditis mixti, calice 2-partito compresso. *Flores glomerati, paniculati; folia interdum subopposita; caulis interdum subfrutescens.*

I V. Semen tectum calice. Stamina pauciora quàm quinque.

**CRUCITA**, Loeß L. \* Calix 4-partitus, basi 3-bracteatus. Stamina 4. Stylus 2-partitus; stigmata 2. *Folia opposita; flores spicato-paniculati terminales.*



**AXYRIS**, L. \* Monoïca. MASC. Flores amentacei. Calix 3-partitus. Stamina 3. FÆM. Flores sparsi. Calix 5-partitus. Styli 2. Semen laciniis 3 calicinis tectum. *Caulis frutescens aut herbaceus; flores terminales aut axillares.*

**BLITUM**, L. \* Blète. Calix 3-partitus. Stamen 1. Styli 2. Semen calice baccato tectum. *Flores capitati ut & baccæ; capitula fragiformia, axillaria & terminalia.*

**CERATOCARPUS**, L. \* CERATOIDES, T. \* Monoïcus. MASC. Calix 2-partitus. Stamen 1 filamentum longo. FÆM. Calix 2-partitus, gemini adnatus. Styli 2. Semen calice 2-valvi 2-aristato tectum. *Caulis dichotomus; folia subulata pungentia; flores solitarii axillares.*

**SALICORNIA**, T. L. \* Salicorne. Calix 4-gonus ventricosus integer. Stamina 1 vel 2. Stylus 2-fidus; stigmata 2. Semen calice inflato tectum. *Caulis herbaceus aut frutescens, aphyllus, ramosus ramis oppositis, teres, articulatus articulis apice 2-dentatis, terminalibus floriferis; flosculi minimi sessiles, utrinque ternati. Confer cum Gneto quoad habitum subsimili.*

### V. Semen non tectum calice.

**CORYSPERMUM**, J. L. \* Calix 2-partitus. Stamen 1, rarius 2, 3, 4 aut 5. Styli 2. Semen ovale compressum, hinc planum, inde gibbum, margine acuto. *Flores axillares solitarii sessiles, superiores 1-andri. An semen perispermo instructum?*

Obs. Atriplici consociantur nexu naturali genera apetala hermaphrodita staminibus imo calici insertis & monosperma perispermo farinaceo corculum involvente, ideò discrepantia ab Urticis perispermo destitutis & diclinibus. An autem omnibus huic revocatis certò conveniat prædictus character? Intus iterum scrutanda semina, definientisque staminum situs. Spinacia aliæque diclines sed perispermo instructæ, inde Atriplicibus potius quam Urticis affines. Rivinia & congeneres hic præmixta naturalem constituunt seriem & fortè distinctum ordinem, non exclusa Phytolaccæ licet polyspermæ. Sectio secunda cæteris minis conveniens & recognoscenda. Tertia & quarta utraque naturalis, paucis tamen exceptis generibus minis notis.

## CLASSIS VII.

### PLANTÆ DICOTYLEDONES APETALÆ.

#### STAMINA HYPÖGYNA.

**CALIX** inferus, mono aut polyphyllus. Corolla plerumque nulla; interdum squamulæ hypogynæ petal-



loïdeæ, staminiferæ aut staminibus alternæ; interdum etiam tubus petaloïdeus hypogynus, non staminifer sæpè marcescens, aut staminifer è filamentorum coalitione factus. Stamina hypogyna, id est sub pistillo inserta, definita, filamentis distinctis aut rariùs monadelphis. Germen superum simplex; stylus unicus aut definitè multiplex aut nullus; stigma simplex aut multiplex. Semen unicum aut capsula supera, uni vel bilocularis, mono aut polysperma.

*Obs.* Insertio staminum hypogyna admittit calicem mono aut polyphyllum; admittit stamina definita aut indefinita; determinat germen superum; corollæ præsentiam aut defectum non statuit.

Non plurimum discrepat staminum ima perigynia ab eorundem hypogyniâ & utraque insertio interdum difficilè ab invicem discernenda. Affines ergò Atriplicibus Amaranthi quibus simul insuper corculum farinaceo typo circumvolutum. Amaranthis stamina nunc distincta nuda, nunc monadelpha, nunc squamis interpositis & petaloïdeis alternantia. Nascens sic perianthium interius petaloïdeum in Amaranthis, elongatur tubiforme in Plantaginibus, in Nyctaginibus extenditur, confirmatur in Plumbaginibus; in omnibus tamen marcescit more calicis: indè à corollæ naturâ abludens calicina pars rectiùs habendum est. Pauciores ex hâc classe eliminantur plantæ apetalæ ordinibus polypetalis rectiùs consociatæ, nempe Caryophylleis & vix Malvaceis. Cur in staminibus hypogynis multò rarior quàm in perigynis hæc Apetalarum ad Polypetalas accessio? Cur aliundè singuli hujus septimæ classis ordines quasi petalodes?

## ORDO . I.

### AMARANTHI, LES AMARANTES.

**CALIX** divisus aut partitus, basi sæpè squamis cinctus. Stamina definita nunc distincta nunc monadelpha; in quibusdam squamulæ filamentis alternæ; in



aliis vagina ex filamentorum coadunatione. Germen simplex; stylus aut stigma simplex, vel duplex, vel triplex. Capsula unilocularis, receptaculo libero, apice dehiscens aut circumscissa, mono aut polysperma. Corculum involvens farinaceum typum. Flores capitati aut spicati. Folia plerumque integra & acuminata, aliis alterna, aliis opposita, paucis stipulacea. Caulis in plurimis herbaceus. Sexus interdum distincti.

### I. Folia alterna, nuda.

**AMARANTHUS**, T. L. \* **ELITTUM**, T. \* *Amarante*. Monoïcus. Calix 5 aut 3-phyllus. MASC. Stamina 5 aut 3 distincta. FÆM. Styli 3; stigmata 3. Capsula 3-rostris, circumscissa, 1-sperma. *Flores glomerati axillares, aut paniculati terminales; caulis sæpè striatus. Species una foliis basi 2-spinosis.*

**CELOSIA**, L. \* **AMARANTHUS**, T. \* Calix 5-phyllus, extus 2-3-squamosus. Stamina 5 basi connata in tubulum. Stylus 1; stigma 1. Capsula circumscissa polysperma. *Flores glomerati in spicas aut paniculas, interdum compresso-cristatas.*

**ÆRUA**, Forsk. \* **ILLECEBRUM**, L. \* Calix 5-phyllus, extus 2-3-squamosus. Stamina 5, basi connata in tubulum inter filamenta fertilia dentatum seu filamentis sterilibus interpositis distinctum. Stylus 1; stigmata 2-3. Capsula 1-sperma. *Caulis sublignosus; flores glomerato-capitati, axillares & terminales, interdum dioici ex Forsk. Hinc referenda Linnæi Illecebra alternifolia.*

**DIGERA**, Forsk. \* Calix 5-phyllus extus 3-bracteatus; hujus laciniae 3 interiores in cylindrum conniventes. Stamina 5 filamentis distinctis. Stylus 1; stigmata 2. Capsula 1-sperma. *Flores spicato-paniculati. An congener Achyranthes muricata L.*

### II. Folia opposita, nuda.

**IRESENE**, L. \* Dioïca. Calix 3-phyllus, extus 2-squamosus. MASC. Stamina 5 distincta, squamulis 5 interpositis. FÆM. Stylus 0; stigmata 2. Capsula polysperma. *Flores paniculati, axillares & terminales.*

**ACHYRANTHES**, L. \* *Cadclari*. Calix 5-phyllus, extus 3-squamosus, squamis caliciformibus. Stamina 5, basi connata in tubulum integrum aut fimbriatum, (distincta squamulis interpositis ex Linn.) Stylus 1; stigma 1. Capsula 1-sperma. *Caulis frutescens aut herbaceus ramosus; spicae terminales; flores sessiles reflexi.*

**GOMPHRENA**, L. \* **AMARANTHOIDES**, T. \* *Amaranthine*. Calix sub5-phyllus, extus 2-squamosus, squamis magnis conniven-



ribus coloratis. Stamina filamentis omninò connatis in tubum dentatum, ad cuius faucem antheræ 5. Stylus 2-partitus; stigmata 2. Capsula 1-sperma circumscissa. *Flores capitati terminales & axillares. G. interruptæ calix tubulosus 5-fidus, flores oppositè spicato-paniculati : an genus diversum?*

ILLECEBRUM, L. \* Calix 5-phyllus, extus 3-squamosus. Stamina 5, basi connata in tubum urceolatum. Stylus brevissimus; stigma latius. Capsula 5-valvis 1-sperma. *Flores glomerati axillares & terminales; caules diffusi. Hujus congener Alternanthera Forsk. ex D. Vahl.*

### III. Folia opposita, stipulacea.

PARONYCHIA, T. \* ILLECEBRUM, L. \* *Panarine.* Calix 5-phyllus, foliolis sub apice acuminatis, intus coloratis. Stamina 5, squamulis 5 linearibus interjectis. Stylus 2-fidus; stigmata 2. Capsula 1-sperma 5-valvis, calice connivente tecta. *Caulis ramosus; flores glomerati axillares & terminales.*

HERNIARIA, T. L. \* *Turquette, Herniole.* Calix 5-partitus, intus coloratus. Stamina 5, squamulis 5 filiformibus interjectis. Styli 2; stigmata 2. Capsula 1-sperma non dehiscens, calice tecta. *Caulis ramosus repens; flores glomerati axillares.*

Obs. Maxima Amaranthorum & Caryophyllearum affinitas in perispermio farinaceo, in habitu generum oppositifoliorum; sed in his corolla polypetala, in illis nulla. An tamen magnum exindè discrimen? Genera quædam in Caryophylleis apetala, quædam in iisdem quasi squainifera mutato nomine petalorum quandoquæ basi coalitorum cum interjectis itaminibus, quædam demùm tum in Caryophylleis tum in Amaranthis stipulacea analogiam ordinis utriusque confirmant. Corollæ igitur præsentia aut defectus essentialem non semper exhibent characterem, nec apprimè naturalis petalodum & apetalorum ordinum discrepantia; quod aliis posthac exemplis patebit.

## ORDO II.

### PLANTAGINES, LES PLANTAINS.

CALIX sæpius quadripartitus. Tubus petaloideus, apice coarctatus & sæpius quadrifidus, corollam mentiens, sed marcescens nec deciduus, hypogynus. Stamina quatuor, filamentis longis exsertis, imo tubo infertis. Germen unicum; stylus unus; stigma simplex. Capsula circumscissa, uni aut bilocularis, loculis mono



aut polyspermis. Perispermum seminis nullum. Plantæ herbaceæ. Sexus interdum distincti.

**PSYLLIUM** T. \* **PLANTAGO**, L. \* *Pulicaire*. Capsula 2-locularis 2-sperma. *Caulis trichotomus ; folia opposita ; flores capitati terminales , singuli bracteati.*

**PLANTAGO**, T. L. \* **CORONOPUS**, T. \* *Plantain*. Capsula 2-locularis polysperma. *Folia omnia radicalia ; flores in scapis dense spicati , singuli bracteati.*

**LITTORELLA**, L. \* **PLANTAGO**, T. \* *Monoïca*. MASC. Calix 4-partitus. Tubus 3-fidus. Stamina 4. Germen abortivum. FÆM. Calix 3-partitus. Tubus 3-fidus. Stamina 0. Capsula 1-sperma. *Folia omnia radicalia ; flores masculi in scapis unifloris , feminei ad basim inter folia occulti subsessiles.*

Oss. Plantagines ab Amaranthis satis distinctæ tubo extrâ calicem exserto infra staminifero & præcipuè perispermi defectu , undè nec his nec Nyctaginibus verè confines.

## ORDO III.

### NYCTAGINES, LES NICTAGES.

**CALIX** tubulosus , corollæformis , extus nudus aut caliculo cinctus. Germen unicum ; stylus unicus ; stigma simplex. Stamina definita , inserta glandulæ germen ambientis , è receptaculo ortæ. Semen unicum , tum glandulâ , tum infimo calicis tubo persistentibus tectum. Corculum farinaceo typo circumpositum. Caulis frutescens aut herbaceus ; folia opposita aut alterna ; flores axillares & terminales.

**NYCTAGO**. \* **JALAPA**, T. \* **MIRABILIS**, L. \* **NYCTAGE**, Royen. \* *Nictage , Belle-de-nuit*. Calix exterior campanulato-patens , 5-fidus ; interior magnus ( corolla T. L. ) petaloïdeus infundibuliformis , basi ventricosus , ultra coarctatus , supra dilatatus & limbo patens , subinteger aut 5-dentatus. Germen semi tectum glandulâ ambiente ( filamentorum basi coalitorum tubus ex *Adans.* ). Stamina 5 , inserta glandulæ & agglutinata tubo calicino. Semen globosum basi calicis intimi coriaceâ tectum. *Radix tuberosa ; caulis herbaceus teres , sæpè trichotomus ; folia opposita ; flores terminales subcorymbosi. Genus affine Amaranthis & Caryophylleis semine farinaceo , Dipsaceis habitu & calice duplici ;*




*plurimis tamen discrepans signis, præcipuè insertione geminatâ in plantis insuetâ; indè difficillimè ordinandum.*

**BOERHAAVIA**, L. Calix simplex, minimus, medio coarctatus, limbo campanulatus. Stamina 1 aut 2. Semen minimum, rectum calicis basi angulatâ. *Caulis herbaceus aut frutescens; folia opposita, altero sæpè minori; flores umbellati; umbellæ graciles, axillares, pedunculatæ, interdum ramosæ, involucriatæ involucri simplici aut polyphyllæ. Affinis hinc Nyctagini, illinc Valerianæ?*

**PISONIA**, Pl. L. \* Calix (corolla Pl. L.) campanulatus aut infundibuliformis, sub5-fidus aut integer, basi nudus aut squa-2-5cinctus. Stamina sæpius 6, rarius 5-8, exserta antheris subrotundis, interdum abortiva. Germen 1; quandoque abortivum. Stylus 1; stigmata 1-2. Capsula aut bacca sub5-gona angulis scabris, 1-locularis 1-sperma non dehiscens. *Arbustula ramis reclinatis, spinosæ aut inermes; folia alterna aut subopposita; flores racemosi-corymbosi, axillares aut terminales, nunc hermaphroditi, nunc in distinctâ arbore masculi aut feminei. Fructus Boerhaaviæ, sed major. Corculum typo oblongo circumpositum. An pericarpium ab imo calice datum?*

**BUGINVILLÆA**, Commerf. \* Calix tubulosus basi subventricosus, medio coarctatus, limbo subinteger persistens. Stamina 8, filamentis longis non exsertis, disco infidentia. Germen superum, disco basi cinctum oblongum; stylus 1; stigma 1. Fructus... *Frutex spectabilis sempervirens & florens; folia alterna; spinæ axillares; pedunculi axillares & terminales 3-flori, pedicellis 1-bracteatis, bracteis flore multò majoribus, foliorum æmulis, pedicello & imo calici adnatis. Character ex sicco Commerf. specimine Brasiliæ. Nomen à D. de Bougainville itineris Commerf. soniani duce. Habitus Pisoniæ, flos non idem.*

**Obs.** Ex observatis in ordine & generibus stamina hypogyna interdum germi infero consociantur, & insolitum hunc consensum determinat persistentia imi perianthii in capsulam monospermam indurati. An autem perianthium illud omninò calicinum & ordo rectè dispositus inter Apetalas staminibus hypogynis? an potius pars perianthii superior decidua in corollam immutanda, undè corolla tunc monopetala & perigyna seu summo calici inserta staminibus hypogynis extra modum circumponeretur? Admissa hæc corolla Nyctagines admovent Dipfaccis & præcipuè Valerianæ Boerhaaviam extus æmulandi. In Valerianâ tamen stamina videntur verè epipetala, & corolla epigyna, & germen non rectum sed verius inferum, & insuper corculum absque perispermio aut typo centrali. Nyctagines ergo minus hinc affines ut & cæteris Dipfaccis similiter ferè constructis; ergo inter Monopetalas nondum componendæ.





## ORDO IV.

## PLUMBAGINES, LES DENTELAIRES.

**CALIX** tubulosus. Corolla mono aut polypetala hypogyna. Stamina definita, in aliis hypogyna, in aliis epipetala. Germen unicum superum; stylus unicus aut multiplex; stigma multiplex. Capsula monosperma basi multivalvis, calyptræformis. Semen rectum, receptaculo germinis insertum ope funiculi. Corculum oblongum planum, farinaceo perispermo cinctum. Caulis herbaceus aut suffrutescens. Folia alterna.

**PLUMBAGO**, T. L. \* *Dentelaire*. Calix 5-dentatus. Corolla 1-petala, infundibuliformis, 5-fida æqualis. Stamina 5, hypogyna, filamentis basi latiore germen ambientibus. Stylus 1; stigma 5. *Caulis herbaceus aut frutescens; folia semiamplexicaulia; flores spicati terminales.*

**STATICE**, T. L. \* **LIMONIUM**, T. \* Calix integer limbo plicato scarioso. Corolla 5-petala (rarius 1-petala 5-partita). Stamina 5, unguibus petalorum inserta. Styli 5; stigma 5. *In Limonio T. squamæ flores plurimos involvunt longâ serie dispositos & fasciculatos, paniculatim sparsos per caulem herbaceum aut frutescentem. In Statice T. folia omnia radicalia; scapi plures; flores in singulo scapo terminales, aggregati in calice communi imbricato scarioso, infra producti in scapi vaginam.*

**Obs.** Ex dictis p. 71 plerumque corolla monopetala est staminifera, & eadem polypetala plerumque non staminifera. Hic autem generalis insertionum modus partim subvertitur, nunc in quibusdam determinati ordinis generibus, nunc in integro ordine. Sic inter Leguminosas polypetalas staminibus instructas perigynis, stamina Trifolii pratensis sunt epipetala; sic Ericarum & Campanularum corolla monopetala non est staminifera; sic in Caryophylleis polypetalis stamina sæpè petalorum unguibus inferuntur. Nullo tamen in ordine duplex simul occurrit hæc insertionum exceptio, nisi in Plumbaginibus quarum genus aliud corollam polypetalam cum staminibus epipetalis, aliud monopetalam cum hypogynis exhibet. Undè duplicata hæc subversio mentiens naturæ lusum? An insertionum regulam infirmat omninò? an potius in ordine denegandum corollæ nomen perianthio huic inferiori, nunc monophyllo non staminifero, nunc polyphyllo staminifero, cujus quidem marcescentia calicinam indolem denuncia? an Statice petala filamentis Plumbaginis basi dilatatis assimilanda & ideo pro squamis aut staminum appendicibus habenda?



## CLASSIS VIII.

### PLANTÆ DICOTYLEDONES MONOPETALÆ.

#### COROLLA HYPOGYNA.

**C**ALIX monophyllus. Corolla monopetala, hypogyna seu inserta sub pistillo, regularis aut irregularis. Stamina definita, inserta corollæ, & ejusdem laciniis sæpius alterna, dum numero æqualia. Germen superum, simplex; stylus unicus (interdum nullus in Apocineis, cum germine duplici); stigma simplex aut divisum. Fructus superus, constans seminibus nudis aut sæpius pericarpio inclusis baccato vel capsulari, uni aut multiloculari.

*Obs.* Corolla, utpotè hypogyna, exigit germen superum; utpotè monopetala, calicem præscribit frequentius monophyllum, definit stamina, germinis & styli unitatem plerumque determinat, insertionem staminum sibi sæpius adscribit.

Tournefortiana methodus Monopetalas ab Apetalis & Polypetalis distinguens, indè cæteris visa est generatim simplicior, facilior ac naturæ accommodatior. Dum tamen corollas regulares ab irregularibus, infundibuliformes à campanulatis secernit autor & inferas consociat superis, tunc à recto devius naturales plurimum disturbat series in quibus corollæ situs semper conformis & forma sæpè varia. Ergò sepositis Apetalis & Polypetalis seorsim considerandæ Monopetalæ, præcipuè ex dictis p. 71; & in earum distributione, posthabitis instabilibus formis, præficiendus constans corollæ situs, triplex ab invicem omninò dissimilis (p. 71.), nempe hypogynus, epigynus & perigynus. De epigyno & perigyno posthàc agetur: nunc habenda ratio corollæ hypogynæ plurimos complectentis ordines in classem unicam rectè convocatos, non tamen faciliè distribuendos ac connectendos



itā ut seriem haud interruptam constituent. Horum primarii characteres ex semine bilobo, ex corollæ monopetalæ & stamini-feræ hypogyniā deducuntur; secundarii in diversis delitescunt partibus jam suprā memoratis & præcipuè in fructu cujus non tantum definiendus loculorum numerus, sed & situs seminum ac dissepimenti valvis adnati aut appliciti, iisdem paralleli aut oppositi: indè præsens instituta ordinum distributio, jam antea pluriès immutata, nunc iterum elaborata, tempore perficienda. Prostant primò fructus uniloculares & plerumque capsulares receptaculo seminifero centrali (Ord. 1) libero; dein iisdem biloculares dissepimento seminifero mediis valvis adnato ac opposito, tardius (2) aut citius (3-4) solubili, & receptaculo igitur gemino laterali valvisque medio seminiferis. Succedunt semina receptaculo non laterali sed inferiori & depresso infixa, nunc baccato inclusa pericarpio (4-5), nunc nuda (5-6). Continuatā serie receptaculum illud tunc centrale sensim prominet, limbo dilatato vicem & formam induens dissepimenti valvis paralleli, earundem marginibus adnati, medio insolubilis ac seminiferi in capsulā (7-8) aut baccā (8), utraq̃ue biloculari. Mutato habitu denuò depressum, seminibus obtegitur nudis (9) aut in baccā nucleatā reconditis. Rursus in pericarpio centrale ac septiferum, sed valvis non adnatum, limbo solubile, trigonum (10-11) in fructu triloculari, planum aut anceps (12) in biloculari, valvarum marginibus aut costæ mediæ apponitur. Ut receptaculo, sic & valvis interdum tribuitur dissepimenti munus, dum scilicet introflexæ fructum constituunt nunc simplicem (13) bilocularem, nunc duplicatum (14) loculis distinctis ac divaricatis. Sic ex interiore fructu, admissis tamen exceptionibus, depromitur ordinum character aliis etiam ditatus signis ex staminum numero, corollæ formā &c. desumptis: præeunt enim, paucis exceptis, stamina numero paria (Ord. 2-7) duo aut quatuor; subsequuntur eadem numero imparia, sæpius quinque (8-14) aut rarius plura (15). Corollæ etiam plurimæ regulares in Ordinibus 1, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15; irregulares in Ordinibus 2, 3, 5, 6, 7, 12. Regularium stamina harum laciniis numero æqualia & sæpius alterna, iisdem tamen opponuntur in *Lyfimachiarum* ordine cæterum uniloculari & propterea aliis



ordinibus præmisso. In Classis calce reponuntur Sapotæ solis Apocineis baccatis parumper consentientes, has inter & Guaiacanas mediæ, huc ideò relatae. Nondum in omnibus satis explorata feminis structura interior; perispermum generatim inest Ordinibus 4, 7, 8, 10? 14, 15; nullum extat in Ord. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 12; in cæteris non definitur: an ex ulteriore ejusdem examine nova posthac ordinum series instituenda?

Ord. 1. Lysimachia, 2. Pedicularis, 3. Acanthi, 4. Jasminæ, 5. Vitices, 6. Labiatae, 7. Scrophulariæ, 8. Solanæ, 9. Borraginæ, 10. Convolvuli, 11. Polemonia, 12. Bignoniæ, 13. Gentianæ, 14. Apocinæ, 15. Sapotæ.

## ORDO I.

### LYSIMACHIÆ, LES LISIMACHIES.

**CALIX** divisus. Corolla plerumque regularis, limbo diviso, sæpius quinquelobo. Stamina definita, sæpius quinque, rarius plura aut pauciora, corollæ lobis numero æqualia & iisdem opposita. Stylus unicus; stigma simplex aut rarius bifidum. Fructus unilocularis polyspermus, sæpè capsularis, receptaculo seminifero centrali libero. Caulis herbaceus. Folia opposita aut alterna.

#### I. Flores cauli insidentes.

**CENTUNCULUS**, L. \* **ANAGALLIS**, V. \* *Centenille*. Calix 4-fidus. Corolla rotata, 4-loba. Stamina 4. Stigma 1. Capsula globosa circumscissa. *Folia opposita & alterna; flores solitarii axillares, interdum 5-fidi 5-andri, & tunc Anagallidi congeneres.*

**ANAGALLIS**, T. L. \* *Mouron*. Calix 5-fidus. Corolla rotata 5-loba. Stamina 5. Stigma 1. Capsula globosa circumscissa. *Caulis 4-angulus; folia opposita; flores solitarii axillares.*

**LYSIMACHIA**, T. L. \* *Lisimachie*, *Corneille*. Calix 5-fidus. Corolla rotata 5-fida. Stamina 5. Stigma 1. Capsula globosa 10-valvis. *Folia opposita; flores axillares aut terminales, solitarii aut spicati, aut corymbosi.*

**HOTTONIA**, L. \* **STRATIOTES**, V. \* *Plumeau*. Calix 5-partitus. Corolla tubo brevi, limbo plano 5-loba. Stamina 5, non ex-



ferta (corollæ lobis opposita?). Stigma globosum. Capsula globosa, acuminata. *Herbæ aquaticæ; folia verticillata, pinnata aut dentata; flores solitarii axillares, aut verticillato-spicati terminales, involucris verticillorum polyphyllis.*

**CORIS**, T. L. \* *Corisc.* Calix ventricosus, apice 5-dentatus; in ambitu 5-fetosus, persistens. Corolla tubulosa 5-fida inæqualis. Stamina 5 (corollæ laciniis opposita?). Stigma 1. Capsula 5-valvis, calice tecta. *Caulis ramosissimus, humilis, basi sub-lignosus; folia linearia alterna; flores spicati terminales.*

**SHEFFIELDIA**, Forst. LS. \* Calix 5-fidus persistens. Corolla longior campanulata 5-loba. Stamina 5 fertilia, corollæ laciniis opposita; filamenta alia 5 sterilia, iisdem alternantia. Stigma capitatum. Capsula 5-valvis. *Herbula repens, habitu similis Peplidi portulæ. Character ex Forst. Austr. & L. Suppl.*

**LIMOSELLA**, L. \* **ALSINE**, T. \* **PLANTAGINELLA**, V. \* *Limoselle.* Calix 5-fidus persistens. Corolla minima, campanulata, 5-fida. Stamina 4. Stigma globosum. Capsula semitecta 2-valvis (2-locularis ex *Adans.*). *Plantulæ in humidis, diffusæ, radicales, foliis fasciculatis, ad axillas floriferis. An verè 2-locularis receptaculo ampliato, & indè affinium Scrophulariis? Species una 2-andræ.*

**TRIENTALIS**, T. \* *Trientale.* Calix 7-partitus. Corolla rotata 7-fida. Stamina 7. Stigma 1. Bacca exiucca, futuris dehiscens. *Numerus partium varius. Caulis simplex humilis; folia summa verticillata; flores pauci terminales, longè pedunculati.*

**ARETIA**, L. \* **AURICULA-URSI**, T. \* Calix 5-fidus persistens. Corolla tubo brevi, fauce coarctatâ, limbo 5-partito. Stamina 5 breviora. Stigma capitatum. Capsula 5-valvis, oligosperma. *Plantulæ repentes, densè foliosæ, floribus axillaribus subsolitariis.*

II. Flores scapo insidentes, umbellati involucro polyphyлло, aut rariùs solitarii. *Folia radicalia.*

**ANDROSACE**, T. L. \* **AURICULA-URSI**, T. \* *Androselle.* Calix 5-fidus persistens. Corolla hypocrateriformis 5-loba, fauce coarctatâ glandulosâ. Stamina 5. Stigma 1. Capsula globosa 5-valvis. *Scapi numerosi.*

**PRIMULA**, L. \* **PRIMULA-VERIS**, T. \* **AURICULA-URSI**, T. \* *Prime-vère, Oreille d'Ours.* Calix tubulosus 5-dentatus persistens (corollâ multò brevior in *Auricula-Ursi* T.). Corolla tubulosa 5-loba, fauce perviâ. Stamina 5. Stigma 1. Capsula apice 10-valvis. *Numerus partium in hortiis varius.*

**CORTUSA**, L. \* **AURICULA-URSI**, T. \* *Cortuse.* Calix 5-fidus persistens. Corolla rotata 5-loba, faucis annulo elevato. Stamina 5, antheris adnatis 2-lamellatis. Stigma 1. Capsula apice 5-valvis.

**SOLDANELLA**;



**SOLDANELLA**, T. L. \* *Soldanelle*. Calix 5-partitus. Corolla campanulata, ore lacero multifido. Stamina 5, filamentis antheras adnatas sagittatas superantibus, apice bifidis. Stigma 1. Capsula apice multivalvis.

**DODECATHEON**, L. \* *Girofelle*. Calix 5-fidus laciniis reflexis. Corolla rotata 5-fida, tubo brevi, laciniis longis retroflexis. Stamina 5; antheræ sagittatæ, conniventes. Stigma 1. Capsula oblonga, apice dehiscens. *Flores nutantes*.

**CYCLAMEN**, T. L. \* *Cyclame*, *Pain de Pourceau*. Calix 5-fidus. Corolla 5-fida, tubo globoso brevi, laciniis retroflexis. Stamina 5; antheræ conniventes. Stigma 1. Bacca globosa 5-valvis (testa putamine capsulari ex Linn.). Scapi 1-flori; *flores nutantes*.

### III. Genera Lysimachiis affinia.

**GLOBULARIA**, T. L. \* *Globulaire*. Calix tubulosus 5-fidus persistens. Corolla tubulosa, 5-loba, inæqualis, laciniis 2 superioribus minimis. Stamina 4, tubo inserta (laciniis alterna?). Germen superum; stylus 1; stigma 1. Semen 1, calice connivente tectum. Flores aggregati in calice communi polyphyllō hemisphærico suprâ receptaculum commune paleaceum. *Caulis herbaceus simplex, apice 1-florus; folia radicalia sæpè spatulata, emarginato-acuminata; caulina parva aut subnulla. Discrepat G. Alypum calice communi turbinato plurimum imbricato, corollâ ligulatâ 3-dentatâ, stigmate 2-fido, caule frutescente ramoso, habitu Proteæ: an genus diversum? Globularia a Monopetalis hypogynis & idèò à Lysimachiis distinctissima semine nudo & florum dispositione & habitu, indè Statice exilis similis non tamen affinis, similior fortè Proteis sed corollata, unica in suo ordine nondum cognito, huic tanquàm viciniore nunc adjuncta.*

**CONOBÆA**, Aubl. \* Calix tubulosus 5-dentatus, basi 2-bracteo-latus. Corolla tubulosa 2-labiata, superius erecta emarginata, inferius 3-loba inæqualis. Stamina 4 didynamia, antheris sagittatis. Stylus 1; stigma 2-lobum. Capsula pisiformis, calice cincta, 1-ocularis 4-valvis, polysperma receptaculo semini-fero centrali libero. *Herba repens; folia opposita; flores solitarii axillares pedunculati. Character ex Aubl. Guyan. t. 258.*

**TOZZIA**, L. \* Calix tubulosus brevis 5-dentatus. Corolla tubulosa limbo subæquali, suprâ 2-loba, infrâ 3-loba. Stamina 4 inæqualia. Stylus 1; stigma 1. Capsula minima sphaericea 2-valvis 1-sperma, calice tecta. *Herba erecta, basi caulis squamatus ut in Orobanche; folia opposita; flores solitarii axillares pedunculati. Affinis Conobæa, sed 1-sperma. Utrique discrepat à Lysimachiis flore irregulari 4-andro.*

**SAMOLUS**, T. L. \* *Samole*, *Mouron d'eau*. Calix 5-fidus semi-superus persistens. Corolla hypocrateriformis 5-loba; squa-



mulæ 5 filiformes introflexæ, è corollæ sinubus ortæ. Stamina 5, imæ corollæ inserta & ejusdem laciniis opposita. Germen semiinferum; stylus 1; stigma 1. Capsula semiinfera, 1-locularis, semis-valvis polysperma receptaculo libero. *Folia alterna; flores spicati axillares & terminales, pedicellis medio 1-squamulosis. Situs germinis obscurat insertionem corollæ, quæ ei puncto insidet, quo calix à germine dehiscit. An ea indè perigyna, & affinium Portulacis, licet 1-petala?*

**UTRICULARIA, L. \* LENTIBULARIA, T. V. \* Utriculaire.** Calix 2-partitus deciduus. Corolla vix tubulosa, irregularis 2-labiata, superius erecta integra staminifera, inferius major integra, palato cordato intus prominulo, basi calcarata. Stamina 2, filamentis incurvis, antheris connatis. Stylus 1; stigma 1. Capsula globosa, 1-locularis, polysperma, receptaculo centrali libero. *Herbæ paludosæ radicales, aut aquatiles liberæ; harum folia radiciformia, alterna, demersa, multifida, vesiculis numerosis instructa; illarum radicalia, alterna aut rarius opposita, integra aut dissecta; flores in scapo squamulis raris instructi, spicati aut rarius subsolitari, in U. minore vix calcarati. A Lysimachiis discrepat utpotè irregularis & 2-andra: an indè affinium Scrophulariis?*

**PINGUICULA, T. L. \* Grassete.** Calix 2-labiatus, supra 3-fidus; infra 2-fidus. Corolla irregularis, basi calcarata, fauce coarctata, limbo 2-labiata, superius 3-loba, inferius 2-loba brevior. Stamina 2 brevissima. Stylus brevis; stigma 2-lamellatum, antheras tegens. Capsula 1-locularis, polysperma, receptaculo centrali libero. *Folia radicalia pingua; scapus 1-florus; flos inversus. Multum affinis præcedenti.*

**MENYANTHES, T. L. \* NYMPHOÏDES, T. \* Méniante, Nymphaeu.** Calix 5-partitus, persistens aut deciduus. Corolla in *Ményanthe T.* infundibuliformis limbo patente 5-lobo æquali intus eleganter hirto, in *Nymphoïde T.* rotata tubo brevi, limbo patente 5-lobo, lobis margine ciliatis. Stamina 5 epipetala, corollæ laciniis alterna, antheris basi 2-fidis. Stylus 1; stigma capitatum 2-3-fulcum. Capsula ovata 1-locularis, intus ad parietes 2-3-placentaris, placentis feminiferis. *Herbæ aquaticæ; folia alterna petiolo vaginante, ternata, aut simplicia cordata; flores Nymphoïdis T. umbellati aut verticillati axillares, Ményanthis T. in scapo spicati. An genus cum Tournefortio dividendum? Differt à Lysimachiis staminum situ & capsulâ ad parietes seminiferâ, unde ordinibus subsequenibus affinium, ab iis tamen recedens fructu 1-loculari & flore 5-andro.*

**Obs.** Præcipuus veri ordinis sectiones duas complectentis character ex staminum situ, fructu uniloculari, & receptaculo centrali polyspermo deducitur. Genera subsequenta peculiaribus discrepant signis, nulli tamen alteri ordini affinia.



ORDO II.

PEDICULARES, LES PEDICULAIRES.

**CALIX** divisus, persistens, sæpè tubulosus. Corolla sæpiùs irregularis. Stamina definita. Stylus unicus; stigma simplex aut rariùs bilobum. Fructus capsularis bilocularis polyspermus, bivalvis, valvis nervo medio connatis in dissepimentum utrinque seminiferum vix solubile, margine liberis & dehiscens. Caulis plerumque herbaceus. Folia opposita aut alterna. Flores oppositi aut alterni, singuli unibracteati.

I. Stamina non didynama, duo aut plura.

**POLYGALA**, T. L. \* Calix 5-partitus, laciniis 2 longè majoribus alæformibus sæpè coloratis. Corolla convoluta in tubum suprà fissum, limbo 2-labiatum, labio superiore 2-partito fisso, inferiore concavo subtùs barbato aut imberbi, intùs obtegente stamina 8 in duas fascies collecta; antheræ 1-loculares. Stigma subbifidum. Capsula compressa obcordata. *Herbæ aut frutices; folia plerumque alterna; flores 1-3-bracteolati, alterni, laxè aut densè spicati, terminales. Fructus P. spinosæ baccatus & ramuli pungentes. Calix P. Hæstheriæ 5-partitus æqualis, corolla non fissa, germen 4-corne.*

**VERONICA**, T. L. \* *Véronique*. Calix 4-partitus, rarò 5-partitus. Corolla rotata 4-loba inæqualis. Stamina 2. Capsula obcordata aut rariùs ovata. *Herbæ aut rariùs suffrutices; plurimis folia opposita aut verticillata & flores spicati, terminales aut axillares, interdum tubulosi; paucioribus folia alterna, flores axillares solitarii.*

**SIETHORPIA**, L. \* Calix turbinatus 5-partitus. Corolla tubo brevi, 5-loba patens æqualis. Stamina 4, paribus remotis. Stigma capitatum. Capsula compressa orbicularis apice dehiscens. *Herbæ repens radicans; folia alterna; flores axillares subsolitarii pedunculati lutei.*

**DISANDRA**, L. \* Calix 5-8-partitus. Corolla tubo brevi rotata 5-8-loba æqualis. Stamina 5-8. Stigma 1. Capsula ovata. *Numerus partium varius, sæpè septenarius; flores interdum plures axillares. Cætera ut in Siethorpiâ omninò congeneri.*



## I I. Stamina quatuor didynama.

**OURISIA**, Commerf. \* Calix 5-lobus inæqualis, quasi 2-labiatus. Corolla campanulata, fauce ampliata, limbo 5-loba subæqualis. Stamina 4 didynama filamentis incurvis. Germen didymum; stylus 1; stigma capitatum. Capsula 2-locularis, quasi didyma, polysperma, 2-valvis, valvis dissepimento oppositis. *Herba Magellanica (eadem cum Chelone ruellioide LS. ex D. Vahl, sed non instructa filamentis quinto sterili); folia opposita, floralia bracteiformia, cætera ferè radicalia; flores solitarii axillares aut terminales, longè pedunculati. Character ex Commerf. descript. & ex sicco.*

**PIRIPEA**, Aubl. \* Calix 5-fidus, basi 3-bracteatus. Corolla duplò longior, tubulosa, fauce tuberculosa, limbo plano 5-loba inæquali. Capsula lateribus dehiscentibus, seminibus minutissimis placentæ affixis. *Folia alterna; flores alterni, spicati terminales. Character ex Aubl. Guyan. t. 253.*

**ERINUS**, L. \* **AGERATUM**, T. \* Calix 5-partitus. Corolla tubulosa, limbo 5-partito subæquali, lobis cordatis. Capsula ovata. *Folia plerumque alterna; flores axillares aut 1-bracteati, spicati terminales.*

**MANULEA**, L. \* **NEMIA**, Berg. \* Calix 5-partitus. Corolla tubulosa, limbo 5-partito tubulato, laciniâ infimâ distantiore. Antheræ inæquales. Capsula ovata. *Folia opposita aut alterna; flores bracteati, racemosi, terminales aut laterales. Statura Euphrasie ex Linn. Capsula ex Bergio bipartibilis, lobis introrsum longitudinaliter dehiscentibus: an inde affinior Gentianis?*

**CASTILLEIA**, Mut. LS. \* Calix compressus, hinc fissus. Corolla tubulosa compressa 2-labiata, superius canaliculata calice sustenta, inferius brevior 2-fida laciniis glandulosis tubulosis. Filamenta staminum quasi 2-anthera. Capsula ovata compressa. *Herbæ sublignosæ alternifoliæ; flores alternè spicati terminales bracteati. Character ex L. Suppl.*

**EUPHRASIA**, T. L. \* **PEDICULARIS**, T. \* *Eufraise*. Calix 4-fidus. Corolla tubulosa 2-labiata, superius emarginata, inferius 3-loba æqualis. Antheræ 2 inferiores altero lobo basi acuminatæ. Capsula ovata compressa. *Folia opposita aut alterna; flores bracteati axillaresve, in spicis terminalibus.*

**BUCHNERA**, L. \* Calix 5-fidus aut 5-dentatus. Corolla tubulosa siniformis, limbo 5-fido inæquali, lobis infimis cordatis. Capsula ovato-oblonga. *Folia opposita; flores spicati aut corymbosi terminales. Erino affinis.*

**BARTSIA**, L. \* **PEDICULARIS**, T. \* Calix 4-fidus inæqualis, apicibus coloratis. Corolla tubulosa 2-labiata, superius erecta integra, inferius reflexa 3-fida minima. Capsula ovata com-



pressa. *Folia alterna & opposita; flores alterni, bracteati, spicati terminales. An servandum genus aut sequentibus adjiciendum?*

**PEDICULARIS**, T. L. \* *Pédiculaire*. Calix ventricosus 5-fidus. Corolla tubulosa 2-labiata, superius galeata emarginata compressa angustior, inferius plana patens sub 3-loba, lobo medio angustiore. Capsula subrotunda, mucronata compressa, apice sæpè obliqua. *Folia opposita aut alterna, simplicia aut sæpius pinnata; flores oppositi aut alterni, bracteati, spicati terminales.*

**RHINANTHUS**, L. \* **PEDICULARIS**, T. \* **ELEPHAS**, T. \* *Cocrète, Crète de cocq.* Calix ventricosus 4-fidus. Corolla tubulosa 2-labiata, limbo dehiscens, superius galeata angustior (in *Elephante* T. angustissima proboscidea), inferius patula plana, 3-loba lobo medio latiore. Capsula compressa obtusa. *Folia opposita; flores oppositi, bracteati, spicati terminales.*

**MELAMPYRUM**, T. L. \* *Mélanpire, blé-vache.* Calix tubulosus 4 fidus. Corolla tubulosa limbo 2-labiata & compressa, superius galeata margine replicato, inferius sulcata 3-fida subæqualis. Capsula oblonga, obliquè acuminata, compressa loculis 1-spermis, seminibus oblongis. *Folia opposita; flores oppositi, bracteati, spicati terminales.*

### III. Genera Pedicularibus affinia.

**HYOBANCHE**, L. \* Calix 7-partitus, laciniis linearibus. Corolla tubulosa labiata, labio inferiore nullo, superiore fornicato emarginato. Stamina 4 didynama, imæ corollæ inserta; antheræ ovatæ nutantes. Stylus 1; stigma emarginatum. Capsula 2-locularis polysperma. *Caulis crassus squamulosus; spica carnosæ densæ terminalis, bracteis 1-floris imbricatis. Car. ex Linn. Habitus Orobanches, corolla diversa. Capsula rursùm introspicienda.*

**OBOLARIA**, L. Calix 2-partitus bracteiformis. Corolla campanulata 4 fida, laciniis 2-fidis. Stamina 4 didynama, ex divisis corollæ. Stylus 1; stigma 2-fidum. Capsula ovata 1-locularis 2-valvis polysperma, seminibus minutissimis. *Caulis simplex; folia opposita; flores spicati terminales, apice conferti. Habitus Orobanches. Caractèr ex Linnæo.*

**OROBANCHE**, T. L. \* *Orobanche.* Calix 3-bracteatus, nunc tubulosus 5-fidus inæqualis, nunc subnullus bracteis 2 interioribus latioribus 2-fidis calicem supplentibus. Corolla tubulosa ventricosa irregularis 2-labiata, suprâ concava emarginata, infrâ reflexa 3-fida inæqualis. Stamina 4 didynama, sub labio superiore. Germen basi glandulosum; stylus 1; stigma 2-lobum. Capsula acuminata 1-locularis 2-valvis polysperma, singulâ valvâ medio 2-placentari & seminiferâ, seminibus minutissimis. *Herbæ subcarnosæ rufescentes, parasiticæ plantarum radicibus innascentes; radix tuberosa, squamis imbricata;*



*calicis alternè squamulosus, sæpè simplex: flores bracteati, spicati terminales. Species quædam scapo nudo 1-floro, flore spathaceo affines Lathræis 1-floris. Thunbergius Phelypeæ nomine describit herbam Orobanche similem, unicaulem, aphyllam, squamulosam, dioicam apice florentum, calice 2-partito bracteiformi, corollâ 6-partitâ connivente ciliatâ pilosâ, filamento 1 hypogyno, antherâ clavatâ, germine supero, stylo 1, stigmate capitato, capsula columnari 7-valvi 7-loculari polyspermâ, columnâ intrâ fructum centrali: an planta verè corollata, aut verè 1-andra?*

**LATHRÆA, L. \* CLANDESTINA, T. \* Clandestine.** Calix campanulatus 4-fidus. Corolla tubulosa (magna ventricosa in *Phelypæi T*) 2-labiata, suprâ concava galeata, infrâ reflexa 3-fida (integra in *Amblaco T.*). Stamina 4 didynama, labio superiore recta; antheræ connexæ. Germen basi glandulosum; stylus 1; stigma truncatum nutans. Capsula calice recta, acuminata 1-locularis, elasticè 2-valvis, valvis seminiferis; semina pauca globosa. *Herbæ; quædam succulentæ & subterraneæ arborum radicibus innascentes, foliis squamiformibus confertim oppositis latentibus, floribus extrâ tellurem prominulis, bracteatis, solitariis aut oppositis spicatis; quædam exterraneæ, Orobanche similes. L. Phelypæa β L. eadem fortè cum Orobanche Ægynetiâ L. & genere distinguenda.*

*Oss.* Receptacula duo seminifera è mediis valvis prominentia & artè juncta, dissepimentum constituunt integrum nec nisi vetustate solubile; margines autem valvularum liberi prius utrinque dehiscunt: undè capsula bilocularis lateribus bivalvis. Talis inest primæ & secundæ sectioni, non verò tertiæ cujus receptacula minùs prominula non junguntur. Secunda ordini verè propria a primâ paululum discrepat habitu & staminum numero, affinior Acanthis dissepimento citiùs solubili distinctis. Tertia complectens Orobanchen & congenere parasiticas, à cæteris differt habitu & fructu ferè uniloculari ad parietem seminifero, nec germinationis modum etiam nunc observanti exhibuit; undè prius nulli fuerat ordini aut classi adjuncta & nunc etiam inter ambiguas annumeratur.

## ORDO III.

### A C A N T H I, L E S A C A N T E S.

**CALIX** divisus, persistens, sæpè bracteatus. Corolla plerumque irregularis. Stamina duo, aut quatuor didynama. Stylus unicus; stigma bilobum, aut rariùs simplex. Fructus capsularis, bilocularis, sæpè polyspermus, elasticè bivalvis, dissepimento valvis oppo-



sito, iisdem mediis innascente, scissili ab apice ad basim in receptacula duo utrinque seminifera & continua valvis indè semibilocularibus. Caulis herbaceus aut frutescens. Folia sæpius opposita. Flores sæpius oppositi.

I. Stamina quatuor didynama.

**ACANTHUS**, T. L. \* *Acante*. Calix 4-partitus, laciniis 2 lateralibus intimis brevibus, 2 extimis longis labiatus; 3-bracteatus bracteis oblongis acutis, intermediâ dentato-spinosâ. Corolla labiata, tubo brevi villis clauso, labio unico inferiore maximo 3-lobo. Antheræ conniventes oblongæ erectæ, antèrius villosæ; strigiliformes. Stigma 2-fidum. Capsula ovata loculis 1-2-spermis. *Herbæ caule simplici, foliis sæpè maximis & pinnatifidis; flores spicati terminales. Species quædam frutescentes spinosæ, foliis dentato-spinosis indivisis.*

**DILIVARIA**. \* **ACANTHUS**, L. \* Calix 4-partitus 3-bracteatus; laciniis & bracteis rotundatis & quasi imbricatis. Corolla labiata, tubo coarctato brevi squamulis clauso, suprâ denticulato, infrâ desinente in labium unicum maximum sub 3-lobum. Stigma 1. Antheræ & Capsula ut in Acantho. *Frutex spinosus ilicifolius; flores spicati axillares & terminales. Hinc Acanthus ilicifolius L. qui Dilivaria Luzonensibus ex Camellio.*

**BLEPHARIS**. \* **ACANTHUS**, L. Calix duplicatus, interior 4-fidus laciniis 2 multò majoribus, exterior 4-phyllus ciliatus; 3-bracteatus bracteis minoribus ciliatis. Corolla, antheræ, stigma & capsula Dilivariæ. *Herbæ foliis 4 verticillatis; flores solitarii axillares & terminales. Βλεφαρίς cilium, à bracteis ciliatis. Hinc Acanthus Maderaspatensis L.*

**THUNBERGIA**, LS. \* Calix duplex, exterior 2-phyllus, interior circiter 12-partitus brevior laciniis subulatis. Corolla campanulata, tubo ampliato, limbo 5-lobo æquali. Stigma 2-lobum. Capsula globosa rostrata loculis 2-spermis. *Herba Barleriae affinis, caule 4-gono; flores solitarii axillares. Caractèr ex L. Suppl.*

**BARLERIA**, Pl. L. \* *Barreliere, Colasseau*. Calix 4-partitus inæqualis, laciniis 2 lateralibus angustioribus, 2-bracteatus bracteis interdum spiniformibus. Corolla infundibuliformis 5-fida, laciniâ quintâ profundiore. Stamina 2, cæteris multò breviora. Stigmata 2, rarius 1. Capsula sub 4-gona, dissepimento absque unguibus dissiliente, loculis 1-2-spermis. *Suffrutices aut herbæ; foliorum axillæ in quibusdam spinosæ, spinis solitariis aut geminatis; flores axillares aut terminales.*

**RUELLIA**, Pl. L. \* *Crustolle*. Calix 5-partitus, sæpè 2-bracteatus. Corolla subcampanulata limbo 5-lobo inæquali. Sta-



mina biconjugata. Stigma 2-fidum. Capsula utrinque attenuata; dissepimento dentibus elasticis dehiscente; semina pauca. *Herbæ aut suffrutices; flores axillares aut terminales.*

## I. I. Stamina duo.

**JUSTICIA, L. \* ADHATODA, T. \* Carmantine.** Calix 5-partitus, aut 5-fidus, sæpè 3 bracteatus. Corolla tubo gibbo, limbo 2-labiato, suprâ emarginato, infrâ 3-fido. Filamenta 2 monanthera. Stigma 1. Capsula basi attenuata. *Herbæ aut frutices; sola rarò verticillata, rarissimè alterna; quorundam axillæ spinosæ; flores solitarii aut spicati, axillares aut terminales. Forma floris varia; species denuò observandæ.*

**DIANTHERA, L. \* Calix 5-partitus (3-bracteatus?).** Corolla tubo brevi, limbo 2-labiato, suprâ 2 fido, infrâ 3-partito lobo medio latiore. Filamenta 2, singula dianthera antheris alternè filamento adnatis. Stigma 1. Capsula compressa loculis 1-spermis, rariùs 2-spermis. *Justiciæ congener sed 4-andra; cætera similia. An servandum genus?*

*Oss.* Series apprimè naturalis, distinctissima dissepimento elasticè bipartito, hinc tetrandra affinis Melampyro & cognatibus inter Pedicularibus, inde Lilaci & Jasmineis capsularibus utpotè diandra. Flores plerumque bibracteati dum axillares, tribracteati verò dum spicati, bractea tertiâ foliæ floralis amulâ.

## ORDO IV.

### JASMINEÆ, LES JASMINÉES.

**CALIX** tubulosus. Corolla tubulosa regularis (in Fraxino nulla aut tetrapetala). Stamina plerumque duo. Stylus unicus; stigma bilobum. Fructus capsularis (Acanthorum more) aut baccatus, nunc bilocularis dispermus, nunc unilocularis uni, bi aut tetraspermus. Corculum rectum planum, sæpiùs perispermio carnosio involutum. Caulis frutescens aut rariùs arborescens ramis oppositis. Folia plerumque opposita. Flores oppositè paniculati aut corymbosi.

## I. Fructus capsularis.

**NYCTANTHES, L. \* Calix tubulosus integer.** Corolla tubulosa limbo 5-lobo, lobis obliquis obcordatis. Antheræ subæssiles



intra tubum. Capsulæ 2 ovatæ compressæ erectæ, hinc planæ & in unam coadunatæ, indè paululum convexæ, 1-loculares 1-spermæ non dehiscences; semina ovata plana, infimo loculo annexa. Rami 4-goni; pedunculi axillares & terminales multiflori, pedicellis 3-floris 2-bracteatis aut 5-floris 4-bracteatis; flores plures abortivi. Ad Mogorium repellendæ species Linnæanæ baccatæ. Scabrita L. eadem cum N. arbore tristi ex D. Vahl., licèt descriptione dissimilis.

LILAC, T. \* SYRINGA, L. \* Lila. Calix parvus 4-dentatus. Corolla tubulosa limbo 4-partito. Stamina intra tubum. Capsula ovata compressa 2-locularis, medio 2-valvis, 2-sperma; valvæ naviculares medio (ut in Acanthis) semiseptiferæ & ideò semibiloculares, septo bilamelloso & dehiscente bigeminæ. Flores oppositè paniculati terminales. HP. laciniata interdum 3-andra.

HEBE, Commerf. \* Calix 4-fidus. Corolla tubo brevi, limbo 4-lobo. Stamina oblonga, sub sinibus corollæ superioribus inserta. Stigma 1. Capsula ovata 2-valvis 2-locularis, valvarum marginibus introflexis loculos distinguentibus, receptaculo seminifero centrali stipitato. Semina... Frutex elegans Magellanicus, folia densè opposita; flores oppositi paniculati terminales. Character ex Commerf. mss., & specimine sicco. Deerant semina in capsulis vetustis. An V. Decussatæ L. omninò consimilis; an Scrophulariis affinior receptaculo centrali?

FRAXINUS, T. L. \* ORNUS, Dalech. \* Fresne. Calix 0 & corolla 0; aut calix 4-partitus & corolla 4-partita vel quasi 4-petala petalis longis ligulatis. Stamina 2 hypogyna; antheræ in apetalis sessiles, in corollatis filamentis longo impositæ. Stylus 1; stigma 2-fidum. Capsula plana linguiformis, basi 1-sperma; corculi perispermum corneum. Caulis arborescens, folia opposita, impari-pinnata aut rarissimè simplicia; flores paniculati terminales. Ornus 4-petala & hermaphrodita; Fraxinus apetala & polygama, floribus in alterâ plantâ hermaphroditis, in alterâ fœmineis. An genera distinguenda; an utpotè non monopetala, Aceribus approximanda, licèt perispermo destitutis?

## I I. Fructus baccatus.

CHIONANTHUS, L. \* Chionante. Calix 4-partitus. Corolla tubo brevissimo, limbo 4-partito, laciniis longis linearibus. Antheræ subsessiles tubo insertæ. Drupa fœta nuce striatâ 1-spermâ. Arbores; folia simplicia; flores (Fraxini Orni) corymbosi axillares & terminales, interdum 3-andri. Hujus congener Thouinia Thunb. cujus corolla quasi 4-petala tubo subnullo.

OLEA, T. L. \* O'livier. Calix parvus 4-dentatus. Corolla tubo brevi, limbo 4-fido, laciniis ovatis. Laciniæ stigmatibus emarginatæ. Drupa nuce 2-loculari 2-spermâ. Folia sempervirentia, rarissimè alterna; flores paniculati axillares aut terminales. O. Europææ semen 1 sæpè abortivum.



**PHYLLIREA**, T. L. \* *Filaria*. Calix minimus 4-dentatus. Corolla brevis 4-fida. Bacca 1-locularis 1-sperma. *Folia semper-virentia; flores fasciculati aut subpaniculati axillares. Stigma simplex crassiusculum ex Linnaeo.*

**MOGORIUM**. \* **NYCTANTHES**. L. \* *Mogori*. Calix 8-fidus. Corolla tubulosa, limbo 8-partito patente. Bacca sæpè didyma, 2-locularis 2-sperma. *Flores subcorymbosi terminales aut axillares, interdum 10-12-fidi. Huc referendæ Nyctanthidis species Linnaeanæ baccatæ.*

**JASMINUM**, T. L. \* *Jasmin*. Calix 5-dentatus aut 5-fidus. Corolla tubulosa, limbo 5-partito plano, laciniis obliquis. Stamina intra tubum. Bacca 2-locularis aut 2-cocca, loculis aut coccis 1-spermis; semina arillata. *Folia ternata aut subpinnata, in quibusdam alterna; pedunculi axillares aut terminales sub3-flori, aut trichotomè multiflori.*

**LIGUSTRUM**, T. L. \* *Troëne*. Calix minimus 4-dentatus. Corolla tubo brevi, limbo 4-fido patente. Bacca 1-locularis 4-sperma. *Folia interdum perennia; flores paniculati terminales, interdum 3-andri; baccæ nigrae.*

*Obs.* Jasmineæ capsulares Acanthis, baccatæ Viticibus confines, ab his & illis discrepant præcipuè corollâ regulari & perispermo. Utroque hoc signo Apocineis accedentia, recedunt staminum numero. Ab adjunctis antea Solaneis similiter corollatis dimoventur etiam utpotè diandrarum. Fraxinum diandram, oppositifoliam & Chionantho conterminam huc propterea revocavit noster B. Jussæus (& ipse Linnaeus in Ord. nat. 44), aliundè Aceribus habitu & nonnullis signis similem.

## ORDO V.

### VITICES, LES GATTILIERS.

**CALIX** tubulosus, sæpè persistens. Corolla tubulosa, limbo plerumque irregulari. Stamina sæpiùs quatuor didynama, rariùs duo aut sex. Stylus unicus; stigma simplex aut bilobum aut refractum irregulare. Semina definita, nuda aut sæpiùs pericarpio inclusa baccato vel rariùs capsulari. Caulis in plurimis frutescens, in paucis herbaceus. Folia sæpiùs opposita. Flores oppositè corymbosi, aut alternè spicati.

I. Flores oppositè corymbosi.

**CLERODENDRUM**, L. \* Calix campanulatus 5-fidus. Corolla tubo angusto, limbo 5-partito subæquali patente, laciniis se-



cundis. Stamina plurimùm exserta. Stigma 1. Bacca 1-sperma calice persistente magno cincta. *Frutices ; pedunculi axillares aut terminales , trichotomè multiflori.*

**VOLKAMERIA**, L. \* Calix turbinatus 5-fidus aut subinteger. Corolla longior limbo 5-partito subæquali patente, laciniis secundis. Stamina exserta secunda. Stigma 2-fidum inæquale. Bacca foeta nuce geminâ , utrâque 2-loculari 2-spermâ , aut quatuor nucibus 1-spermis. *Frutices ; basis petiolorum sæpè persistens ; pedunculi 3-flori terminales & axillares. Species una foliis ternis verticillatis.*

**ÆGIPHILA**, L. \* Calix parvus campanulatus 4-dentatus. Corolla longior, limbo plano 4-fido æquali. Stamina æqualia exserta. Stigmata 2, oblonga. Bacca 4-locularis 4-sperma, aut abortu 1-2-sperma, calice persistente basi cincta. *Frutices ; pedunculi trichotomè multiflori, suprâ-axillares. Huc referenda Knoxia secunda Brownæi.*

**VITEX**, T. L. \* *Gattilier.* Calix brevis 5-dentatus. Corolla tubo tenui longiore, limbo plano subbilabiato 6-lobo inæquali. Stigma 2-fidum. Bacca 4-locularis 4-sperma. *Frutices ; folia sæpè digitata, rariùs simplicia aut ternata aut pinnata ; flores verticillato-paniculati, sæpè terminales, pedunculis plerumque 3-floris. An verè congener V. pinnata L. alternifolia ?*

**CALLICARPA**, L. \* Calix campanulatus 4-fidus. Corolla limbo 4-fido. Stamina æqualia exserta. Stigma 1. Bacca 4-sperma. Semina callosa. *Frutices tomentosi ; flores subverticillati axillares, pedunculis dichotomè aut cymosè multifloris.*

**MANABEA**, Aubl. \* Calix turbinatus 4-dentatus. Corolla tubo brevi, limbo 4-fido æquali. Stamina exserta. Stigma 2-fidum. Bacca 2-locularis 2-sperma, calice cincta. *Frutex ; corymbi florum terminales aut suprâ-axillares. Character ex Aubl. Guyan. t. 23-25. Huc referenda Nuxia, genus Borbonicum Commerçonii ineditum, cui tamen ex Autore stigma 1, folia 3-4 verticillata ut & paniculæ.*

**PREMNA**, L. \* Calix campanulatus subbilobus. Corolla limbo 4-fido inæquali. Stigma 2-fidum. Bacca drupacea 4-locularis 4-sperma ; semina ossea. *Arbusculæ ; flores dichotomè aut trichotomè corymbosi terminales.*

**PETITIA**, Jacq. \* Calix parvus 4-dentatus. Corolla tubo longo, limbo 4-fido. Stamina breviora. Stigma 1. Drupa foeta nuce 2-loculari, 2-spermâ. *Arbuscula ramulis 4-gonis ; folia opposita ; flores oppositè paniculati axillares. Quarta pars interdum demitur. Character ex Jacq. Americ.*

**CORNUTIA**, Pl. L. \* Calix parvus 5-dentatus. Corolla multò longior, limbo 4-fido inæquali. Stamina quædam exserta. Stigma 2-fidum. Bacca 1-sperma, calice persistente cincta. *Frutices caule*



4-angulo; flores axillares aut terminales paniculati, pedunculis trichotomis. Hujus fortè congener Tittius Rumph. amb. 3. t. 20, cui tamen limbus corollæ 5-lobus.

**GMELINA**, L. \* Calix minimus 4-dentatus. Corolla basi tubulosa, fauce dilatata, limbo 4-fido 2-labiato, suprâ fornicato, infrâ 3-lobo brevior. Stamina filamenta 2 crassiora antheris bipartitis, 2 tenuiora antheris simplicibus. Stigma 1. Drupa globosa nuce 2-loculari 2-spermâ. *Arbores spinosissimæ, ramulis oppositis axillis divaricatis spinasformibus pungentibus, nudis aut foliosis; flores terminales. Habitus Catesbeæ; flos Digitalis, ex Commersonio inversus.*

**THEKA**, Malab. \* **TECTONA** LS. \* *Tek, Bois de Tek.* Calix campanulatus 5-6-lobus. Corolla tubo brevi, limbo patente 5-6-lobo crenato. Stamina 5-6. Stigma 2-3-fidum. Drupa intrâ calicem vesicarium amplum sicca spongiosa, foeta nuce 3-4-loculari 3-4-sperma. *Arbores ramulis 4-gonis; flores trichotomè paniculati aut corymbosi, terminales trichotomis 2-bracteatis.*

**AVICENNIA**, L. \* Calix 5-partitus, extûs 3-squamosus. Corolla tubo campanulato brevi, limbo 4-fido inæquali subbilabiato. Stamina 4. Stigma 2-fidum. Capsula coriacea 1-sperma 2-valvis, semine 4-lamelloso intrâ capsulam germinante. *Caractèr ex Linnæo & Jacq., iterùm observandus præcipuè in fructu Arbores radicibus repentibus & undiquè pullulantibus; pedunculi axillares aut terminales, simplices aut 3-partiti, floribus oppositè capitatis. Effigies staminis quinti corollæ impressa ex Jacq. Stamina interdum 5 ex Adansonia. Stamina 6 in Guapirâ Aubl. Guyan. t. 119, quæ Avicennia fortè congener & iterato examine hùc referenda. Forskalius in Sceurâ suâ hùc etiam revocandâ semen describit capsulâ destitutum & calice persistente capsulæformi tectum.*

## I I. Flores spicati, in spicis alterni.

**PETRÆA**, L. \* Calix magnus coloratus persistens, fauce 5-squamosâ, limbo 5-partito longo patente scarioso. Corolla calice minor, tubo brevi, limbo 5-lobo subæquali patente. Stamina non exserta. Stigma 1. Capsula 2-locularis 2-sperma, tecta imo calice squamis conniventibus clauso. *Frutex scandens; flores laxè spicati terminales.*

**CITHAREXYLUM**, L. \* *Guittarin, Bois de Guittare.* Calix campanulatus 5-dentatus aut subinteger. Corolla paulò longior, tubo supernè crassiori, limbo plano patente 5-lobo subæquali. Stamina non exserta; (rudimentum quinti staminis ex Linn.). Stigma capitatum. Bacca foeta nuce geminâ, utrâque 2-loculari 2-spermâ, aut abortu 1-spermâ. *Arbustulæ; petioli apice utrinque cicatricosi; folia quædam ferè alterna; flores laxè spicati, terminales aut axillares.*



**DURANTA**, L. \* Calix truncatus, sub 5-fidus. Corolla tubo sub-curvo, limbo 5-lobo subæquali. Stamina non exserta. Stigma 1. Bacca foeta 4 nucibus 2-locularibus 2-spermis, calice suprâ coarctato & persistente omninò tecta, certò non infera. *Frutices ramis 4-gonis; flores laxè spicati axillares aut terminales. Quibusdam spinæ axillares.*

**LIPPIA**, L. \* Calix (superus?) 2-4-5-fidus. Corolla tubo brevi, limbo 4-5-lobo inæquali. Stamina non exserta. Stigma 1. Capsula (infera?) 2-locularis 2-valvis 2-sperma. *Frutices foliis oppositis; flores spicato-capitati axillares, capitulis pedunculatis. Character ex L. n. & Jacq. An potius germen superum ut indicat habitus Lantanae similis? Ad Selaginum referenda ex D. Thunberg.*

**LANTANA**, L. \* **CAMARA**, Pl. \* Calix 4-dentatus brevis. Corolla limbo 4-lobo inæquali. Stamina intrâ tubum. Stigma refractum, unciforme, summo stylo velut obliquè adnatum. Drupa nuce 2-loculari 2-spermâ. *Frutices, rarius herbæ, caule 4-gono; flores in capitula axillaria & peduncula aggregati, singuli bracteati. Hujus congener Carachera Forsk. ex D. Vahl.*

**SPIELMANNIA**, Med. \* **LANTANA**, L. \* **OSTIA**, Adans. \* Calix 5-fidus. Corolla fauce barbata, limbo 5-lobo subæquali. Stamina intrâ tubum, æqualia. Stigma ut in Lantana. Drupa nuce 2-loculari 2-spermâ. *Frutex; folia superiora alterna, quibus axillares flores solitarii.*

**TALIGALEA**, Aubl. \* *Taligale*. Calix 4-5-fidus. Corolla fauce dilatata, limbo 5-fido inæquali. Stamina exserta didynama, antheris basi 2-fidis. Stigma 2-fidum. Bacca 1-locularis, foeta 2 officulis 1-spermis. *Herba; folia plerumque alterna; flores spicati terminales, singuli 1-bracteati bracteis foliorum æmulis. Character ex Aubl. Guyan. t. 252.*

**TAMONEA**, Aubl. \* **VERBENA**, L. \* Calix 5-fidus. Corolla limbo 4-lobo inæquali. Staminum filamenta non exserta, medio squamulosa; 2 minora sterilia. Stigma (4-fidum ex Aubl.). Bacca sicca, calice suprâ coarctato vesita; nux 4-locularis 4-sperma. *Herbæ; folia opposita; flores singuli bracteati, alterni in spicis axillaribus oppositis. Character ex Aubl. Guyan. t. 268. & ex specimine sicco. Habitus Verbenæ. Huc refer Verbenam lappulaceam L.*

**VERBENA**, T. L. \* *Verveine*. Calix 5-fidus. Corolla limbo sub-bilabiato 5-lobo inæquali. Stamina 4 didynama, aut 2 tantum, non exserta. Stigma obtusum. Semina 2-4 nuda, calice persistente tecta. *Herbæ aut rarius frutices; folia quorumdam ternata verticillata, cæterorum opposita; flores singuli bracteati, alterni spicati aut rarius capitati, spicis & capitalis terminalibus aut oppositis axillaribus. Semina connectit utriculis textis, drupæ tenuis instar, siccatione evanescens. Corolla V. longiflo & longior & stigma 2-lobum lobo altero obtuso, altero acuto.*

**PERAMA**, Aubl. \* Calix 4-partitus. Corolla tubulosa, limbo



4-lobo. Stamina 4, lobis alterna subæqualia. Stigma 1. Semina 2-4 nuda minima. *Herba hirsuta rufescens; folia opposita sessilia multinervia; flores capitati terminales singuli pedicellati, pedicello infra 1-bracteato; inde receptaculum commune quasi paleaceum. Character fructus ex sicco, cætera ex Aubl. Guyan. t. 18. Habitus Lippia.*

### III. Genera Viticibus affinia.

**ERANTHEMUM**, L. \* Calix 5-fidus. Corolla tubo filiformi; limbo parvo 4-5-partito plano. Stamina 2, antheris subsessilibus interdum exsertis. Stylus 1; stigma 1. Fructus... *Suffrutices aut herbae; folia opposita aut alterna; flores spicati terminales. An hinc revocandæ Selagines spicatæ, licet 4-andræ? An genus affine Piripæ & Manuleæ inter Pediculares?*

**SELAGO**, L. \* Calix tubulosus 4-fidus inæqualis. Corolla tubo brevi aut filiformi longiori, limbo 3-5-fido æquali aut inæquali. Stamina 4 inæqualia. Stylus 1; stigma 1. Semen 1-2, calice rectum. *Herbae aut suffrutices; folia alterna; flores in plurimis Eranthemo & Verbenæ affines, irregulares tubulosi 1-2-spermi, alternè spicati terminales, spicâ simplici aut multiplici; in paucis regulares tubo brevi 2-spermi subcorymbose terminales, forsan è genere & ordine depehendi.*

**HEBENSTRETIA**, L. \* Calix spathæformis emarginatus, subtus profundè fissus. Corolla tubulosa irregularis, labio unico superiore 4-fido. Stamina 4 inæqualia, per inferiorem corollæ rimam erumpentia. Stylus 1; stigma 1. Semina 2 hinc convexa striata, inde plana. *Herbae; folia alterna linearia; flores in spicis terminalibus bracteati sessiles subverticillati. Multum affinis Selaginibus spicatis & idè Verbenæ. An fructus potius 2-capsularis capsulis 1-spermis?*

**Obs.** Genera ordinis fruticosa baccata herbaceis gymnospermis habitu non similibus confociat Lantana hinc Citræxylo, Vitici &c. illinc melius Verbenæ affinis; nec obstat stigmatis & fructus diversitas. Gymnosperma ad Labiatas, baccata ad Ligustrum accedunt; ordo igitur inter Labiatas & Jasminicas medius. Genera ultima mono aut disperma, idè Verbenæ approximantur: an tamen fructus in iis capsularis, & inde quædam cum Pedicularibus affinitas?

## ORDO VI.

### LABIATÆ, LES LABIÉES.

**CALIX** tubulosus quinquesidus aut bilabiatus. Corolla tubulosa irregularis, sæpius bilabiata. Stamina



quatuor didynamia (nempè duo majora & duo minora) sub labio corollæ superiori inserta, aut duo tantum, cæteris duobus abortivis. Germen quadrilobum; stylus unicus, ex receptaculo intrà germinis lobos enatus; stigma bifidum. Semina quatuor nuda, erecta, basi affixa receptaculo, in calice persistente recondita; corculum absque perispermio. Caulis quadrangulus, oppositè ramosus, plerumque herbaceus aut interdum frutescens. Folia opposita. Flores oppositi, sæpè bracteati aut setis stipati, solitarii vel verticillati, vel corymbosi, vel spicati, terminales aut axillares.

I. Stamina duo fertilia, duo abortiva.

**LYCOPUS**, T. L. \* *Licope*. Calix tubulosus 5-fidus. Corolla tubulosa 4-loba subæqualis, lobo superiore latiore emarginato. Stamina distantia. *Flores axillares verticillati sessiles.*

**AMETHYSTEA**, L. \* Calix campanulatus 5-fidus. Corolla tubulosa subbilabiata 5-loba lobo infimo longiore concavo. *Flores corymbosi, axillares & terminales.*

**CUNILA**, L. \* *Coniela*. Calix cylindricus 10-striatus 5-dentatus. Corolla bilabiata, superius erecta plana emarginata, inferius 3-loba. Semina intrà calicem villis clausum. *Flores corymbosi aut verticillati, axillares & terminales.*

**ZIZIPHORA**, L. \* Calix cylindricus longus striatus hispidus 5-dentatus, fauce barbatus. Corolla tubulosa longa, limbo brevi 2-labiato, superius reflexo integro, inferius 3-loba. *Flores glomerati axillares aut terminales. Habitus Thymi.*

**MONARDA**, L. \* Calix cylindricus striatus 5-dentatus. Corolla cylindrica longior 2-labiata, superius recta angusta integra, involvens stamina, inferius reflexa latior 3-loba lobo medio longiore. *Flores axillares verticillati, aut capitati terminales.*

**ROSMARINUS**, T. L. \* *Romarin*. Calix apice compressus & 2-labiatus, suprà integer, infrà 2-fidus. Corolla longior 2-labiata, superius 2-partita, inferius 3-fida laciniâ mediâ maximâ. Stamina filamenta (simplicia cum dente ex Linn.) corollâ longiora. *Suffrutex; flores verticillato-spicati terminales.*

**SALVIA**, T. L. \* **SCLAREA**, T. \* **HORMINUM**, T. \* *Sauge, Sclarée, Orvale, Omin.* Calix subcampanulatus striatus 2-labiatus, suprà 3-dentatus, infrà 2-fidus. Corolla tubo ad faucem ampliata, limbo 2-labiato, superius fornicato emarginato,



inferiùs 3-lobo, laciniis lateralibus angustis, intermediâ majore subrotundâ. Stamina filamenta 2 transversim stipitata, suprâ stipitem proprium é corollâ enatum articulata ac versatilia, altero sine connata & antherâ sterili instructa, altero distincta & in antheram fertilem 1-locularem desinentia; his interjecta rudimenta 2 staminum sterilium minima glanduliformia pedicellata. *Herbæ aut suffrutices; flores 1-3, bractæ aut folio axillares, sæpè spicati. Filamenta staminum medio stipitata in Salviâ T., extrâ medium in Sclarcâ T. Corollæ labium superius in utraq; compressum falcatum, in Hormino T. concavum cochleariforme. Stylus S. Creticæ duplex in Labiatis insolitus, sed semina ejusdem abortiva.*

**COLINSONIA**, L. \* Calix 2-labiatus, suprâ 3-dentatus, infrâ 2-fidus. Corolla multò longior infundibuliformis, limbo 5-lobo inæquali, lobo inferiore longiore fimbriato. Semina 3 abortiva, 1 superstitè globoso. *Flores paniculati terminales.*

I I. Stamina quatuor fertilia. Corolla unilabiata, labio superiore subnullo.

**BUGULA**, T. \* **AJUGA**, L. \* *Bugle*. Calix 5-fidus subæqualis. Corolla tubulosa labiata, labio superiore minimo 2-dentato, inferiore 3-lobo, lobo medio magno obcordato. *Caulis repens radicans; flores verticillato-spicati terminales. Corolla B. orientalis resupinata.*

**TEUCRIUM**, T. L. \* **CHAMÆDRYS**, T. \* **CHAMÆPYTIS**, T. \* **POLIUM**, T. \* *Germandrée, Ivette*. Calix 5-fidus, campanulatus in *Teucro* T., tubulosus in cæteris. Corolla tubo brevi, labiata, labio superiore 2-partito laciniis ad latera reflexis, inferiore 3-lobo lobo medio majore; indè quasi 1-labiata labio inferiore 5-lobo. Stamina intrâ fissuram labii superioris exserta. *Suffrutices aut sapiùs herbæ; flores in Polio T. capitati terminales, in Teucro T. & Chamædri T. axillares aut terminales sparsi, ut & in Chamæpiti T. cui præterea calix infernè gibbus. T. campanulati corolla terminalis campanulata regularis 5-6-loba 5-6-andra, inferiores labiata. T. spinosi corolla resupinata, & foliorum axillæ spinosæ.*

I I I. Stamina quatuor fertilia. Corolla bilabiata. Calix quinquefidus.

**SATUREIA**, T. L. \* **CALAMINTHA**, T. \* **THYMBRA**, T. \* **THYMUS**, T. \* *Sarrièrè*. Calix striatus. Corolla limbo 5-lobo subæquali. Stamina distantia. *Flores verticillati in Thymbrâ T., capitati terminales in Thymo T., axillares pedunculati pedunculis*



*in Satureiâ T. 1-3-floris , in Calaminthâ T. multifloris ; folia quorundam punctata ; caules interdum sublignosi.*

**HYSSOPUS**, T. L. \* *Hyspe.* Calix substriatus. Corollæ tubus calici æqualis, limbus 2-labiatus supra brevis emarginatus, infra 3-lobus lobo medio majore obcordato crenato. Stamina distantia. *Pedunculi multiflori axillares. Corolla H. Lophanti resupinata. An verè congenit. H. nepetoides cujus flores densè spicati terminales, caulis altissimus, habitus dispar.*

**NEPETA**, L. \* **CATARIA**, T. \* *Cataire.* Corollæ tubus longus incurvus, faux patens, limbus 2-labiatus, supra emarginatus, infra 3-lobus lobis 2 lateralibus brevissimis reflexis, medio majore crenato concavo. Stamina approximata. *Flores verticillato-spicati aut paniculati terminales, pedunculis multifloris. Bractæ quarundam latiores, verticillis subjectæ.*

**PERILLA**, L. \* Calicis lacinia superior brevissima. Corolla ferè Nepetæ, lobo medio non crenato. Stamina distantia. Stylus 2-partitus. *Flores subspicati axillares.*

**LAVANDULA**, T. L. \* **STÆCHAS**, T. \* *Lavande, Spic, Stachas.* Calix ovatus dentatus bractea suffultus. Corolla resupinata, longior, limbo 5-lobo subæquali. Stamina non exserta. *Suffrutices aut herbe ; flores spicati terminales. Spica Lavandulæ T. simplex longior, Stæchadis T. densa brevior coronata comâ foliaceâ.*

**SIDERITIS**, T. L. \* **STACHYS**, T. \* **MARRUBIASTRUM**, T. \* *Crapaudine.* Corolla calici æqualis aut sæpius longior, limbo subæquali, supra 2-lobo, infra 3-lobo lobo medio latiore crenulato. Stamina non exserta. Stigma alterum longius brevior altero involutum. *Suffrutices aut herbe, plures canescentes ; flores verticillato-spicati terminales ; verticilli quorundam non bracteati, plurimorum cincti bracteis seu foliis floralibus cymbiformibus sæpè cristatis. Corolla Marrubiastrum T. vix calici æqualis, ejusdem labium superius in Sideritide T. erectum, in Stachy T. subforficatum.*

**MENTHA**, T. L. \* *Menthe.* Corolla calice paulò longior 4-loba subæqualis, lobo superiore latiore emarginato. Stamina distantia. *Herbe odoratissimæ ; flores verticillati axillares, aut verticillato-spicati terminales.*

**GLECOMA**, L. \* **CALAMINTHA**, T. \* *Terrette, Lierre terrestre.* Corolla calice striato duplò longior, labiata, superius 2-fida, inferius 3-fida lacinia mediâ majore emarginatâ. Antheræ paria in geminam crucem conniventes. *Herba repens ; flores axillares.*

**LAMIUM**, T. L. \* *Lamier.* Calix 5-dentatus aristatus, apice patens. Corolla longior, fauce inflatâ utrinque dentatâ dentibus reflexis, limbo labiato, supra forficato sæpè integro, infra brevior 2-lobo. *Folia floralia sæpè sessilia ; flores axillares sessiles s. verticillati, bracteis setaceis ; corolla sæpè pubescens in paucis ad limbum serrulata.*



**GALEOPSIS**, T. L. \* *Galéope*, *Chambre-le*. Calix 5-dentatus aristatus, interdum pungens. Corolla tubo brevi, fauce paululum dilatata 2-dentata, limbo labiato supra fornicato subcrenato, infra 3-lobo, lobis lateralibus parvis, medio majore emarginato crenato. *Flores verticillati axillares, bracteis subulatis. Corolla G. Galeobdolonis dentibus destituta.*

**BETONICA**, T. L. \* *Bétoine*. Calix 5-aristatus. Corolla longior, tubo incurvo, limbo labiato, supra erecto subrotundo integro, infra 3-fido, lacinula media latiore emarginata. *Caules sæpè simplices; flores verticillato-spicati terminales.*

**STACHYS**, T. L. \* **GALEOPSIS**, T. \* **BETONICA**, T. \* **MARRUBIASTRUM**, T. \* **SIDERITIS**, T. \* Calix angulatus 5-dentatus acuminatus. Corolla tubo brevi, labiata, supra fornicata emarginata, infra lateribus reflexa 3-fida, lacinia media majore emarginata. Stamina post deflorationem ad latus utrinque reflexa. *Flores axillares aut verticillato-spicati verticillis bracteatis, proximis aut distantibus. Corolla calice brevior in Marrubiastro T.; ejusdem labium superius in diversis diversum. Ramuli S. spinosæ apice pungentes.*

**BALLOTA**, L. \* **BALLOTE**, T. \* *Ballote*. Calix 5-gonus 10-fstriatus 5-dentatus, apice patens. Corolla longior, sæpè villosa, labiata, superius concava crenata, inferius 3-lobo lobo medio majore emarginato. *Flores axillares bracteati bracteis angustis, sessiles aut pedunculati pedunculis multifloris secundis.*

**MARRUBIUM**, T. L. \* **PSEUDODICTAMNUS**, T. \* *Mirrube*. Calix 10-fstriatus, in paucis 5-dentatus, in pluribus 10-dentatus denticulis alternis minoribus. Corolla calice paulò longior, labiata, superius angusta sæpius 2-fida, inferius 3-fida lacinia media latiore emarginata. *Flores verticillati sessiles, bracteis numerosis linearibus. Corollæ labium superius erectum & folia ovata in Marrubio T., idem fornicatum & folia cordata in Pseudodictamno T. cui præterea calix supra semina coarctatus limbo compresso. Labium idem in M. crispo integrum, in M. hispanico 3-4-fidum, memorante Linnæo.*

**LEONURUS**, L. \* **CARDIACA**, T. \* **MARRUBIASTRUM**, T. \* *Agripaume*. Calix 5-gonus 5-dentatus acuminatus. Corolla sæpè vix longior calice, labiata, superius villosa integra concava, inferius reflexa 3-partita subæqualis. Antheræ punctis nitidis adpersæ. *Flores axillares verticillati sessiles, verticillis multibracteatis sæpè numerosis, versus apicem sensim minoribus. Corolla Marrubiastri T. brevior, cæterorum varia.*

**PHLOMIS**, T. L. \* **LEONURUS**, T. \* Calix angulatus 5-dentatus. Corolla oblonga labiata, superius villosa fornicata compressa incumbens sub 2-fida, inferius 3-fida lacinia media majore 2-loba. Antheræ non punctatæ. *Suffrutices aut herbæ; flores verticillati axillares; verticilli sessiles multibracteati æquales aut*



rarius versus apicem inæquales. Leonuri T. calix 7-dentatus longior ut & labium corollæ superius.

**MOLUCELLA**, L. \* **MOLUCCA**, T. \* *Moluce'le*. Calix maximus turbinatus, limbo campanulatus dentato-spinosus, dente superiore remotiore. Corolla minor labiata, superius integra concava, inferius 3-fida lacinia mediâ productione emarginatâ. Flores axillares verticillati sessiles, bracteis subulatis spinosis. Calix M. spinosæ 7-dentatus spinosior.

I V. Stamina quatuor fertilia. Corolla bilabiata. Calix bilabiatus.

**CLINOPODIUM**, T. L. \* *Clinorode*. Calicis limbus suprâ 3-fidus, infrâ 2-partitus. Corolla fauce sensim ampliata, labiata, superius erecta emarginata, inferius 3-fida lacinulâ mediâ majore emarginatâ. (Stigma 1 ex Linn.). Flores axillares verticillati, multibracteati bracteis setaceis involucrentibus, aut (in C. rugoto) capitati axillares capitulis solitariis pedunculatis.

**ORIGANUM**, T. L. \* **MAJORANA**, T. \* *Origan*, *Marjolaine*. Calix inæqualis varius, nunc 2-labiatus aut 2-partitus, nunc sub 5-dentatus. Corolla tubo compresso, labiata, superius erecta emarginata, inferius 3-fida subæqualis. Flores dense spicati, bracteis ovatis imbricatis 1-floris coloratis. Spicæ plures eidem pedunculo axillari aut terminali innascentes, longiores in Origano T., breviores 4-gonæ in Majoranâ T., cui præterea calix suprâ fissus. Labium corollæ inferius in O. calcarato J. (Tourn. it. 1. p. 240. fig.) basi calcaratum calcare brevi, superius integrum.

**THYMUS**, T. L. \* **SERPILLUM**, T. \* **THYMBRA**, T. \* **CLINOPODIUM**, T. \* *Thim*, *Serpolet*. Calicis faux villis clausa, limbus labiatus, suprâ 3-dentatus, infrâ bifidus aut 2-fidus, (5-ferosus in Thymbrâ T.). Corolla brevis labiata, suprâ emarginata, infrâ 3-loba lobo medio latiore (emarginato in Clinopodio T.). Herbæ humiles odoræ; folia parva; flores glomerati axillares & sæpius terminales & calicis perennis, erectus in Thymo T., prostratus in Serpillo T.; iidem verticillati axillares in Thymbrâ T. perenni & Clinopodio T. annuo. Capitula T. cephalotos magna ut & bractæe florales. Stamina T. vulgaris jamdiu taleis non seminibus propagati sæpè sterilia.

**THYMBRA**, L. \* Calix Thymi, non intus villosus, sed extus utrinque lineâ villosâ exaratus. Corolla labiata, suprâ 2-fida, infrâ 3-fida subæqualis. Stylus semibifidus. Flores verticillato-spicati terminales. Habitus Thymi.

**MELISSA**, T. L. \* **CALAMINTHA**, T. \* *Mélisse*, *Citronelle*, *Calament*. Calix aridus, suprâ planus 3-dentatus, infrâ 2-fidus. Corolla labiata, superius subfornicata 2-fida, inferius 3-loba



lobo medio obcordato. *Herbæ aut rarò suffrutices ; flores axillares , brevius pedunculati in Melissâ T. , longius pedunculati pedunculis multifloris in Calaminthâ T. cujus insuper calix intus , ut in Thymo , villis clausus , memorante D. Lamark : an indè restituendum genus ?*

**DRACOCEPHALUM**, T. L. \* **MOLDAVICA**, T. \* **RUYSCHIANA**, Boerh. \* *Dracocephale*, Moldavie. Calix 5-fidus, 2-labiatus in *Moldavica* T., subæqualis in cæteris. Corolla fauce inflata, labiata, superius fornicata, integra in *Dracocephalo* T., emarginata in aliis, inferius 3-loba, laciniis lateralibus brevibus erectis, mediâ majore & productiore, integrâ aut 2-lobâ. *Herbæ aut rarò suffrutices ; flores verticillato-spicati terminales , aut pedunculi axillares uni vel multiflori , bracteati bracteis latis interdum ciliatis , in D. Virginiano angustis minimis.*

**HORMINUM**, L. \* Calix turbinatus striatus, suprâ 3-dentatus, infrâ 2-fidus. Corolla duplo longior cylindrica labiata, suprâ concava 2-fida, infrâ 3-loba. *Folia pleraque radicalia , caules simplices ; flores laxè verticillato-spicati. An Melissæ congener ?*

**MELITTIS**, L. \* **MELISSA**, T. \* *Melissot.* Calix turbinatus magnus 3-fidus, inæqualiter 2-labiatus, tubo corollæ amplior. Corolla duplò longior, magna, limbo dilatato patente labiato, suprâ integro plano, infrâ 3-lobo lobis magnis inæqualibus integris aut crenatis. *Flores 1-3 axillares , non bracteati.*

**GERMANEA**, Lamark. \* Calix parvus 5-fidus 2-labiatus, laciniâ unicâ superiore majore. Corolla labiata, resupinata, superius basi breviter calcarata, 3-loba lobo medio cordato longiore, inferius minor concava, integra aut undata. *Flores laxè verticillato-spicati terminales , & foliis supremis axillares.*

**OCIMUM**, T. L. \* *Basilic.* Calix labiatus, suprâ latior orbiculatus, infrâ 4-fidus. Corolla tubo brevi, labiata, resupinata, superius 4-loba æqualis, inferius longior indivisa crenata. Stamina filamenta declinata, quorum 2 breviora basi processum emittentia. *Herbæ aut suffrutices suaveolentes ; flores laxè verticillato-spicati terminales & axillares.*

**TRICHOSTEMA**, L. \* Calix labiatus, suprâ 3-fidus, infrâ brevior 2-fidus. Corolla tubo brevi, labiata, superius compressa falcata, inferius 3-loba lobo medio minimo oblongo. Stamina filamenta longissima incurva. *Pedunculi axillares & terminales , dichotomè multiflori. An verè congener T. brachiata cujus stamina non exserta & corolla superius 4-fida erecta , inferius indivisa longior deflexa ?*

**BRUNELLA**, T. \* **PRUNELLA**, L. \* *Brunelle.* Calix labiatus, suprâ planus truncatus 3-dentatus, infrâ 2-fidus angustior. Corolla labiata, superius concava integra aut 2-loba, inferius 3-loba lobo medio majore emarginato. Stamina filamenta apice 2-furca seu 2-dentata, dente altero antherifero, altero



nudo Stigma 2-fidum, aut rarius 4-fidum. *Calices sæpè simplicis; flores densè verticillato spicati terminales, bracteis verticillorum magnis ciliatis, aut laciniatis. Hujus verè congener ex D. Lamarck Cleonia L. discrepans stigmate 4-fido & bracteis laciniatis.*

SCUTELLARIA, L. \* CASSIDA, T. \* *Toque.* Calix brevissimus, labio utroque integro, squamulâ concavâ superius incumbente. Corolla multò longior, basi flexa, limbo labiata, superius compressa fornicata ad ortum 2-dentata, inferius latior emarginata. Stigma vix 2-fidum. Calix post florescentiam clausus, fovens semina. *Herbæ, quædam lignosæ; flores solitarii axillares nudi, aut spicati terminales bracteati, bracteis seu foliis floralibus 1-floris.*

PRASIUM, L. \* GALEOPSIS, T. \* Calix turbinatus labiatus, suprâ latior 3-fidus, infrâ 2-fidus. Corolla longior labiata, superius concava emarginata, inferius latior 3-fida laciniâ mediâ majore. Semina 4 baccata. *Frutices; flores 1-2 axillares non bracteati.*

PHRYMA, L. \* Calix cylindricus tenuis labiatus connivens, suprâ longior 3-fidus laciniis subulatis, infrâ 2-dentatus. Corolla longior labiata, superius brevis emarginata, inferius major 3-fida laciniâ mediâ productiore. Stigma minimum sub-2-fidum. Semen unicum ex Linn., calice tecum cernuo. *Flores oppositè spicati terminales; singulis bractæ 3 minimæ lineares. An verè 1-sperma: an indè affinium Verbenæ, licèt oppositiflora?*

*Obs.* Facilis ordo & apprimè naturalis, difficilis ideò generum distinctio ac distributio. Sectiones Tournefortius deduxit ex corollæ formâ, Linnæus ex formâ calicis, Adansonius ex bractearum præsentia aut defectu. Huic fortè postea assentiendum, posthabitis formæ signis plerumque inanibus; sed immutanda prius plura Linnæi genera & species iterum à Monographis observandæ omnes, quæ nunc interea secundum Linnæanam disponuntur seriem, diandris ad tetrandras revocatis.

## ORDO VII.

### SCROPHULARIÆ, LES SCROPHULAIRES.

CALIX divisus, sæpè persistens. Corolla sæpè irregularis, limbo diviso. Stamina sæpè quatuor didynama, rarius duo. Stylus unicus; stigma simplex aut bilobum. Fructus capsularis, bilocularis, apice aut penitus bivalvis, valvis (rarò bipartitis) intus nudis concavis, receptaculo centrali ad ambitum marginato utrinque seminifero,



dissepimenti vicem supplente, & valvis parallelo seu earundem marginibus circumapposito. Semina sæpè numerosa & minuta. Caulis herbaceus aut rariùs frutescens. Folia opposita aut alterna. Flores bracteati.

### I. Stamina quatuor didynamā.

**BUDDLEIA**, L. \* *Euleje*. Calix 4-fidus parvus. Corolla tubulosa aut subcampanulata, 4-fida. Stamina brevissima, non exserta. Stigma 1. Capsula oblonga, valvis bipartitis, inde 4-valvis. *Frutices ramis & foliis oppositis; flores terminales, spicati aut corymbosi aut capitati. Genus Viticibus habitu compar, fructu dissimile.*

**SCOPARIA**, L. \* Calix 4-fidus. Corolla tubo brevi, fauce hirsuta, limbo 4-lobo. Stamina 4, non exserta. Stigma 1. Capsula sphaericea. *Suffrutex; folia verticillata 3-4; flores axillares. Capsula sicca, contracto dissepimenti margine, 1-locularis.*

**RUSSELLIA**, Jacq. \* Calix 5-partitus, laciniis apice setaceis. Corolla tubulosa, fauce pilosa, limbo patente 2-labiato, supra emarginato, infra 3-lobo longiore. Stamina 4 didynamia, non exserta. Stigma 1. Capsula stylo acuminata (1-locularis ex Jacq.) 2-valvis polysperma. *Frutex sarmentosus, ramulis pendulis; folia opposita; pedunculi 2-3 flori axillares solitarii, pedicellis bracteatis. Character ex D. Jacquin Americ. Fructus iterum examinandus.*

**CAPRARIA**, L. \* Calix 5-partitus. Corolla campanulata, tubo brevi, limbo 5-fido subæquali. Stamina 4, subdidynamia. Stigma 2-lobum. Capsula acuminata, valvis margine introflexis, interdum 2-partitis. *Frutices aut herbae; folia verticillata 3, aut opposita, aut alterna; flores axillares.*

**STEMODIA**, L. \* Calix 5-fidus. Corolla tubulosa, limbo 4-lobo subilabiato. Filamenta 4, singula apice 2-fida & 2-antherifera; (antherae forsàn 1-loculares?). Stigma 1. Capsula oblonga, lateribus sulcata. *Frutex; folia alterna aut opposita; flores axillares solitarii 2-bracteati. Habitus Caprariae biflorae. Character ex Linnaeo.*

**HALIERIA**, L. \* Calix minimus 3-lobus inæqualis persistens. Corolla magna infundibuliformis, fauce ventricosa, limbo erecto obliquo 4-fido inæquali, laciniâ summâ majore emarginatâ. Stamina 4 didynamia. Stigma 1. Bacca (aut potius capsula subbaccata?) subrotunda, stylo acuminata, 2-locularis polysperma. *Frutex; folia opposita; pedunculi 1-2 axillares 1-flori. Habitus ordinis Viticum, sed fructus ut in Caprariâ & Scrophulariis acuminatus polyspermus & ideo fortè capsularis inâusque similis.*



**GALVEZIA**, Dombey. \* Calix 5-fidus parvus. Corolla tubulosa, basi subventricosa, limbo 2-labiato, suprâ 2-lobo, infrâ 3-partito. Stamina non exserta. Stigma 1. Capsula globosa. *Frutex ramosus; folia alterna; flores solitarii axillares. Character ex D. Dombey mss. & herb. Peruv. Nomen à D. Galvez in Hispaniâ Indiarum administro.*

**ACHIMENES**, Brown. \* Calix hirsutus, basi ventricosus, collo coarctatus, 5-fidus. Corolla tubulosa, hirsuta, basi gibba, limbo ringens 5-fida inæqualis. Stamina subdidynama; antheræ in stigma conniventes. Stigma 2-lobum. *Herbæ; folia opposita aut verticillata 3; flores axillares subsolitarii. Character ex Brownæo.*

**SCROPHULARIA**, T. L. *Scrophulaire*. \* Calix 5-lobus. Corolla globosa, limbo coarctato 2-labiato, suprâ 2-loba appendice intus sæpè interjecto, infrâ brevior 3-loba. Stigma 1. Capsula acuminata subrotunda, valvarum margine inferiore introflexo. *Herbæ aut frutices; caulis 4-angulus, folia sæpius opposita; pedunculi bi aut multiflori, in divisuris 2 bracteati, oppositi axillares, aut terminales spicati vel paniculati. Corolla ex Linnæo resupinata.*

**MATOUREA**, Aubl. \* Calix 4-partitus. Corolla tubulosa incurva, limbo bilabiato, suprâ erecto 2-fido, infrâ deflexo 3-fido inæquali. Stamina didynama. Stigma 2-lamellatum. Capsula (1-locularis ex Aubl., an potius 2-locularis?) 2-valvis polysperma receptaculo centrali seminifero. Semina minuta. *Herba ramis 4-gonis; folia opposita; flores axillares subsolitarii. Character ex Aubl. Guyan. t. 259.*

**DODARTIA**, T. L. \* Calix campanulatus brevis angulatus 5-dentatus. Corolla tubulosa, limbo 2-labiato, suprâ emarginato, infrâ latiore & longiore 3 fido. Stigma 2-fidum. Capsula globosa calice tecta. *Radix repens; caulis basi lignosus; folia rara, parva, distantia, inferiora opposita, superiora alterna; ramuli axillares; flores laxè spicati terminales bracteati.*

**GERARDIA**, Pl. L. \* Calix 5-fidus. Corolla tubulosa, limbo sub-2-labiato inæquali 5-lobo laciniis rotundatis aut obcordatis. Stamina 4 brevia. Stigma 1. Capsula 2-valvis (dissepimento valvis parallelo?). *In plurimis caulis erectus, folia opposita, flores solitarii axillares subcampanulati; in G. tuberosâ folia radicalia ut & spica, bractæ imbricatæ 1-floræ, corolla limbo rotato: an genus diversum?*

**CYMBARIA**, L. \* Calix 10-partitus inæqualis laciniis linearibus. Corolla tubo ventricoso, limbo 2-labiato, suprâ 2-partito reflexo, infrâ 3-lobo obtuso, palato prominulo. Stamina 4. Stigma 1. Capsula 2-valvis receptaculo centrali 4-angulo, angulis membranaceo-alatis, indè 2 aut 4-locularis (1-locularis ex Linn.). *Caulis subramosus ramis oppositis sterilibus; folia opposita; flores pauci, axillares subsolitarii magni; habitus Antirrhini.*



**LINARIA**, T. \* **ANTIRRHINUM**, L. \* *Linaire*. Calix 5-partitus. Corolla basi calcarata, tubo inflato, limbo 2-labiato, suprâ 2-fido reflexo, infrâ 3-fido, palato ad faucem prominulo. Rudimentum quinti staminis, vix conspicuum. Stigma 1. Capsula ovata, apice foraminulis dehiscens. *Folia sæpius alterna, in quibusdam inferiora opposita aut verticillata; flores axillares, aut sæpius bracteati spicati terminales. Species quædam palato destituta; quædam interdum, fecundatione hybridâ, corollis onustæ regularibus* (Peloria L.) 5-andris, basi 5-calcaratis, limbo 5-lobis, interea non fructifera, sed talis propagandæ.

**ANTIRRHINUM**, T. L. \* **ASARINA**, T. \* *Asarier*. Calix 5-partitus. Corolla basi gibba, tubo inflato, limbo 2-labiato, suprâ 2-fido reflexo, infrâ 3-fido, palato ad faucem prominulo. Rudimentum quinti staminis vix conspicuum. Stigma 1. Capsula basi inæqualis oblonga in *Antirrhino* T., aut subrotunda in *Asarina* T., apice foraminulis obliquè dehiscens. *Folia alterna, rarius inferiora opposita; flores spicati, singuli axillares.*

**HEMIMERIS**, L. \* Calix 5-partitus. Corolla rotata 5-loba inæqualis lobis medio excavatis nectariferis, laciniâ unâ majore obcordatâ. Stamina didynama antheris cordatis connatis. Stigma 1. Capsula loculo altero gibbosiore. *Folia opposita aut alterna. Affinis Antirrhino, sed corollâ discrepans. Stamina 2 aut 4. Character ex Linn. fil. Suppl.*

**DIGITALIS**, T. L. \* *Digitale*. Calix 5-partitus inæqualis. Corolla basi tubulosa, suprâ dilatata patens, limbo obliquè 4-lobo inæquali. Rudimentum staminis quinti vix conspicuum. Stigma simplex aut 2-lamellatum. Capsula ovata acuminata. *Folia alterna, flores spicati terminales. Species una fruticulosa.*

## I I. Stamina duo.

**PÆDEROTA**, L. \* Calix 5-partitus, laciniis linearibus. Corolla tubulosa ringens, limbo hiantè 2-labiato, suprâ integro aut emarginato, infrâ 3-fido. Filamenta staminum filiformia. Stigma 1. Capsula ovata 4-valvis. *Herbæ; folia opposita; flores axillares aut spicati terminales. Hujus congener Wulfenia Jacq. quæ discrepat foliis radicalibus confertis, caulinis minimis remotis, spicâ florum terminali distichâ secundâ, fauce corollæ barbata, staminibus non exsertis.*

**CALCEOLARIA**, Feuill. L. \* *Calceolaire*. Calix 4-lobus. Corolla tubo brevissimo, limbo 2-labiato, suprâ minimo, infrâ magno inflato concavo calceiformi, inflexo & in tubi faucem prono. Stamina breviter antheris recurvis. Stigma 1. Capsula conica, apice 4-valvis. *Herbæ; plurimis folia opposita, pediculi uni aut multiflori, axillares aut corymbi terminales; paucis Compositis, folia radicalia, scapi 1-2-flori.*



**BÆA**, Commerf. \* *Bæole*. Calix 5-partitus. Corolla tubo brevi, limbo patente 2-labiato, fuprà 3-lobo, infrà 2-partito. Stamina filamentis craffis arcuatis, antheris conniventibus. Stigma 1. Capsula longa corniculata contorta 2-locularis 4-valvis; valvæ feminibus emiffis contortæ. *Herba Indica; folia radicalia; fcapi uni aut multiflori, floribus subumbellatis. Character ex Commerf. mff. Loculos capsulæ duos non vidi, fed valvulas 4 introflexas intus polyspermas, receptaculo centrali nullo. An potiùs receptaculum 4-partitum in fingulas valvas irrepens, idem fortè in congeneribus? Habitus Calceolariarum acaulium.*

### III. Genera Scrophulariis affinia, oppositifolia.

**COLUMNÆA**, Pl. L. \* Calix 5-partitus villofus. Corolla multò longior, tubulofa incurva, extus villofa, bafi gibba, limbo 2-labiata, fuperiùs fornicata integra longior, inferiùs brevior 3-loba. Stamina 4 didynama antheris connexis. Stylus 1; stigma 2-fidum. Capsula globofa mollis 2-locularis polysperma, difsepimento carnofo feminifero. *Herba repens aut scandens, oppositifolia; flores axillares fubfolitarii. Achimeri congener ex Linn. fed calice & corollæ limbo difcrepans. An difsepimentum valvis parallelum?*

**BESLERIA**, Pl. L. \* Calix 5-partitus. Corolla tubulofa, bafi & apice gibba, limbo 5-lobo inæquali. Stamina 4 didynama. Germen bafi glandulofum; ftylus 1; stigma 2-fidum. Fructus mollis aut fubbaccatus 1-locularis polyspermus; femina nidulantia. *Character ex Linnæo. Herba aut frutices; folia oppofita; pedunculi axillares fæpè multiflori, 1-flori in B. cristatâ cui prætereà ex Jacq. Amer. calix cristatus, rudimentum quinti staminis, stigma capitatum, capsula coriacea 2-valvis, valvis intus lamellâ auctis. An inde difsepimenti & idèò capsulæ 2-locularis fufpicio? An difsepimentum carnofum?*

**CYRTANDRA**, Forft. \* Calix 5-fidus inæqualis. Corolla irregularis tubulofa incurva, fauce ampliata, limbo patens 5-loba inæqualis. Stamina 4, quorum 2 inferiora abortiva, 2 fuperiora fertilia filamentis flexis. Stylus 1; stigma 2-lamellatum. Bacca oblonga 2-locularis polysperma feminibus difsepimento carnofo utrinque convexo affinis. *Besleriæ affinis. Character ex Forft. defer. & icone.*

**GRATIOLA**, L. \* **DIGITALIS**, T. \* **MONNIERA**, Brown. \* *Græcole*. Calix 5-partitus, bafi 2-bracteatus. Corolla tubulofa ftriata fub2-labiata, fuperiùs 2-loba aut emarginata, inferiùs 3-fida æqualis. Staminum filamenta 4, 2 fertilia, 2 fæpiùs fertilia; rudimentum infuper staminis quinti. Stylus 1; stigma 2-lobum. Capsula ovata 2-locularis polysperma 2-valvis, valvis medio feptiferis, receptaculo feminifero centrali plano, valvularum feptis continuo. *Herba; folia oppofita; pedunculi fo-*



*litarii axillares 1-flori. Character G. officinalis indè Pedicularibus aut Bignoniis affinis, sed cæteris speciebus minus conveniens. Aliæ enim 2-andræ calice non bracteato, similiores Pæderotæ. Altera 4-andra fertilis (Monniera Brown.) corolla subæquali instructa, & dissepimento capsulæ valvis parallelo, in distinctum diversi ordinis genus idè resurgenda; sed antè scrutandus in vivis character Toreniæ, Vandelliæ, Linderniæ, Gratiolæ & Mimuli à Linnæo non satis distinctus, promiscuis omnium speciebus. Proptereà hic submissa exhibentur genera supradicta, nondum ordini in perpetuum adjecta.*

**TORENIA, L. \*** Calix tubulosus angulosus 2-fidus, laciniâ superiore 3-cuspidi. Corolla tubulosa limbo dilatato 4-lobo inæquali. Stamina filamenta 4, 2 breviora simplicia fertilia, 2 bifida longiora ramulo altero antherifero, altero sterili; antheræ geminatim connexæ. Stylus 1; stigma 2-fidum. Capsula 2-locularis polysperma dissepimento seminifero valvis parallelo. *Herbæ repentes; folia opposita; flores solitarii terminales aut axillares.*

**VANDELLIA, L. \*** Calix 4-partitus. Corolla tubulosa 2-labiata, superius integra, inferius 2-loba. Stamina 4 didynama, insertione inæqualia, antheris per paria connexis. Stylus 1, stigmata 2. Capsula 1-locularis polysperma. *Herba oppositifolia; flores solitarii axillares, non bracteati. Character ex Linnæo. Habitus Toreniæ & Vandelliæ, & indè capsula fortè 2-locularis.*

**LINDERNIA, L. \*** Calix 5-partitus. Corolla tubulosa 2-labiata, suprâ brevissima emarginata, infrâ 3-fida inæqualis. Stamina 4; horum 2 inferiora filamentum antheram superante, dentato. Stylus 1; stigma emarginatum. Capsula 2-locularis (1-locularis ex Linn.) 2-valvis polysperma, dissepimento seminifero valvis parallelo. *Herba oppositifolia; flores axillares subsolitarii.*

**MIMULUS, L. \*** Calix prismaticus 5-dentatus. Corolla tubulosa 2-labiata, superius 2-fida reflexa, inferius 3-fida, palato prominulo. Stamina 4 didynama; antheræ reniformes. Stylus 1; stigma 2-fidum. Capsula ovata 2-locularis polysperma 2-valvis, valvis nervo medio connexis. *Herbæ 4-gonæ oppositifoliæ; pedunculi solitarii axillares, sæpius 1-flori, non bracteati.*

**POLYPREMUM, L. \*** Calix 4-partitus. Corolla rotata 4-loba lobis obcordatis. Stamina 4 brevissima. Stylus 1; stigma 1. Capsula compressa emarginata, 2-locularis dissepimento contrario, 2-valvis polysperma. *Herba dichotoma oppositifolia, in dichotomiis 1-flora. Character ex Linnæo. Capsula rursùm intròspicienda.*

**MONTIRA, Aubl. \*** Calix 5-partitus patens. Corolla infundibuliformis, limbo patente 5-fido æquali. Stamina 4 didynama. Germen didymum; stylus 1; stigma sulcatum. Capsula didyma 2-locularis 4-valvis polysperma feminibus angulo loculorum inte-



riori affixis. *Herba 4-gona oppositifolia; pedunculiterminales 1-3-flori. Character ex Aubl. Guyan. t. 257. An Gentianis affinis?*

IV. Genera Scrophulariis affinia, alternifolia.

**SCHWALBEA**, Gron. L. \* Calix tubuloso-ventricosus, obliquè 4-fidus, laciniâ summâ breviorè, infimâ majore emarginatâ. Corolla tubulosa 2-labiata, superius integra fornicata, inferius 3-loba æqualis. Stamina 4 didynama. Stylus 1, stigma 1. Capsula... 2-locularis?... *Herba caule simplici, alternifolia; flores axillares. Character ex Linnæo.*

**SCHWENKIA**, Royen. L. \* Calix tubulosus firiatus 5-dentatus. Corolla tubulosa, fauce inflatâ plicis 5 glandulosis stellatim clausâ, limbo subæquali. Stamina filamenta 5, 2 superiora longiora fertilia, 3 brevia setacea sterilia. Stylus 1; stigma 1. Capsula compressa orbicularis, calice persistente ampliato longior, 2-locularis 2-valvis polysperma, receptaculo subglobofo. *Herba alternifolia, flores axillares; habitus Browalliae cui omninò affinis. Character ex Linnæo.*

**BROWALLIA**, L. \* *Broualle*. Calix tubulosus 5-fidus. Corolla tubulosa, limbo plano 5-lobo subæquali, lobo supremo majore. Stamina 4, quorum 2 longiora & antheris majoribus faucem corollæ plicatam claudentia. Stylus 1; stigma 4-lobum. Capsula 2-locularis polysperma, 2-valvis, valvis apice 2-fidis, dissepimento seminifero plano, valvis parallelo & ab iisdem mox & faciliè solubili (undè capsula 1-locularis ex Linn.). *Herbæ alternifoliae; flores axillares aut terminales. Habitus Solanearum. An verè congeneres B. alienata L. & B. humifusa Forsk., utraque oppositifolia?*

Oss. Ordinem constituunt genera capsularia bilocularia bivalvia dissepimento valvis parallelo, eorundem margini adnato, & personata id est corollâ irregulari instructa, quorum plurima tetrandra didynama, nonnulla diandra. *Buddleia* & congeneres, habitu similes *Viticibus*, sed capsulares polyspermae, valvis instruuntur sæpè bipartitis & ideo fructu quasi quadrivalvi aut quadripartito, sic quodammodo Labiatis affines. *Antirrhino* & *Digitali* cæterisque *Personatis* alternifoliis proximè accedunt *Verbascum* & aliæ *Solanearum* capsulares, quinario discrepantes staminum numero: indè in ordinum serie facilis à tetrandris præmissis ad pentandros subsequentes transitio. Quædam in ultimis sectionibus adjecta genera utpotè didynama & personata, sed nondum satis cognita, iterato tentabuntur fructus examine ut vera pateat horum affinitas.





## ORDO VIII.

## SOLANÆÆ, LES SOLANÉES.

**CALIX** plerumque quinquefidus aut quinquepartitus, sæpiùs persistens. **Corolla** plerumque regularis & quinquefida. **Stamina** sæpiùs quinque, inæ corollæ plerumque inserta. **Stylus** unicus; **stigma** simplex aut rariùs bisulcum. **Fructus** plerumque bilocularis polyspermus, nunc capsularis bivalvis dissepimento valvis parallelo ut in Scrophulariis, nunc sæpiùs baccatus, receptaculis seminiferis centralibus medio dissepimento oppositis, sæpè prominulis & baccam intùs bipartientibus in loculos interdum pluriès semidivisos. **Corculum** seminis farinaceo typo circumpositum. **Caulis** herbaceus aut frutescens. **Folia** alterna; in quibusdam floralia bina ex eodem puncto nascentia. **Flores** variè dispositi, sæpè extrà-axillares seu foliorum lateri juxtà-appositi & non ex axillis orti.

## I. Fructus capsularis.

**CELSIA**, L. \* **VERBASCUM**, T. \* Calix 5-partitus. Corolla rotata patens 5-loba inæqualis. Stamina 4 didynama, filamentis villosis. Stigma 1. Capsula 2-valvis. *Herbæ; folia simplicia aut pinnata; flores luxè spicati terminales, singuli 1-bracteati aut foliolo axillares. C. creticæ filamenta 2 glabra.*

**VERBASCUM**, T. L. \* **BLATTARIA**, T. \* *Molène, Blattaire.* Calix 5-partitus. Corolla rotata patens 5-loba inæqualis. Stamina 5 inæqualia, filamentis inclinatis basi villosis. Stigma 1. Capsula 2-valvis, ovata in *Verbascum* T., aut in *Blattaria* T. globosa. *Herbæ, pleræque tomentosæ; folia quorundam decurrentia, quorundam petiolus appendiculatus; flores Blattariæ T. spicati more Celsiæ, Verbasci T. spicato-paniculati bracteati, bracteis multifloris. In V. Myconi scapi 2-3-flori, & corolla 5-fida æqualis.*

**HYOSCYAMUS**, T. L. \* *Jusquiame.* Calix tubulosus 5-fidus. Corolla infundibuliformis, limbo patente obliquè 5-lobo inæquali. Stigma capitatum. Capsula ovata, utrinque compressa & sulco exarata, apice circumscissa seu operculata. *Herbæ; folia floralia sæpè geminata; flores solitarii axillares, sæpè secundi.*



NICOTIANA, T. L. \* *Tabac*. Calix urceolatus 5-fidus. Corolla multò longior infundibuliformis 5-fida regularis. Stigma emarginatum. Capsula 2-valvis. *Herbæ aut rarius suffruticosa; flores terminales spicati aut paniculati. Capsula Acanthi more dehiscens in N. urente indè fors. in non congeneri.*

DATURA, L. \* STRAMONIUM, T. \* Calix magnus tubulosus ventricosus 5-angularis apice 5-fidus, caducus basi orbiculatâ peltatâ persistente. Corolla maxima infundibuliformis, tubo longo, limbo 5-angulari 5-plicato 5-acuminato. Stigma 2-sulcum. Capsula echinata aut glabra, ovata 2-locularis, loculis dissepimento prominente bi aut multipartitis; semina reniformia. *Herbæ virescæ, aut rarius arbusculæ fruticesve interdum scandentes; folia quarundam geminata; flores, ut & ramuli, extrâ-axillares solitarii.*

## I I. Fructus baccatus.

TRIGUERA, Cav. \* Calix 5-fidus. Corolla campanulata irregularis, fauce dilatatâ, limbo subbilabiato plicato inæquali vix 5-lobo. Stamina filamenta brevissima, basi coalita in membranam epipetalam germi circumpositam; antheræ oblongæ apice poro germine dehiscences. Stigma capitatum. Drupa parva globosa calice arctè semitecta, 4-locularis loculis 2-spermis. *Herbæ; pedunculi extrâ-axillares 2-flori.*

JABOROSA. \* *Jaborose*. Calix brevis 5-fidus. Corolla multò longior tubulosa, limbo 5-fido. Stamina summo tubo inserta, filamentis planis. Stigma capitatum. Fructus... *Herbæ Bonarienses; folia radicalia; scapi 1-flori. Character ex siccis specim. herb. Commerf. Jaborose nomen Arabicum Mandragoræ quæ habitu similis & ferè congener.*

MANDRAGORA, T. \* ATROPA, L. \* *Mandragore*. Calix turbinatus 5-fidus. Corolla vix duplò longior, campanulata 5-fida. Stamina inæ corollæ inserta, filamentis basi dilatatis & conniventibus, apice filiformibus divaricatis. Germen basi 2 glandulosum; stigma capitatum fulcatum. Bacca globosa, receptaculis intus prominulis. *Herbæ macrorhizæ; folia radicalia; scapi inter folia conferti 1-flori.*

ATROPA, L. \* BELLADONA, T. \* *Belladone*. Calix 5-fidus. Corolla calice ultrâ duplum longior, campanulata 5-fida. Stamina filamenta filiformia; antheræ breves. Stigma capitatum 2-sulcum. Bacca subrotunda calici insidens. *Frutices aut herbæ caulescentes; folia sæpius geminata; flores extrâ-axillares, subsolitarii aut conferti.*

NICANDRA, Adans. \* Calix 5-angularis 5-partitus. Corolla major, campanulata vix 5-loba. Stamina filamenta filiformia, basi dilatata & suprâ germen conniventia; antheræ ovatæ. Bacca



sphæricea receptaculis prominentibus 5-locularis, exsucca, omnino tecta calice amplo 5-angulari angulis compressis. *Herba caulescens* (Atropa Physalodes L.) *ramosissima*; *folia quædam geminata*; *flores extrà-axillares solitarii*.

**PHYSALIS**, L. \* **ALKEKENGİ**, T. \* *Coqueret*. Calix 5-fidus. Corolla rotata 5-fida. Antheræ oblongæ conniventes. Stigma obtusum. Bacca globosa, calice ampliato vesicario tecta; semina plurima reniformia. *Frutices aut herbæ*; *folia quarundam geminata*; *flores extrà-axillares solitarii, aut plures juncti*.

**AQUARTIA**, Jacq. L. Calix campanulatus limbo 2-lobo magno. Corolla rotata tubo brevissimo, limbo 4-fido, laciniis linearibus oblongis. Stamina 4, filamentis brevibus, antheris longis apice 2-porosis. Stigma 1. Bacca pisiformis (1-locularis ex Jacq.). *Frutex inermis aut aculeatus, tomentosus, habitus Solani, sed 4-ander*; *folia quædam geminata*; *flores extrà-axillares*.

**SOLANUM**, T. L. \* *Morelle*. **LYCOPERSICON**, T. \* *Tomate*. **MELONGINA**, T. *Mélongène*. Calix 5-fidus. Corolla rotata, tubo brevi, limbo majore 5-fido patente. Antheræ oblongæ conniventes apice poro gemino dehiscentes. Stigma obtusum. Bacca subrotunda aut rarius oblonga, apice punctato. *Caulis herbaceus aut frutescens, inermis aut aculeatus aut raro spinosus*; *folia simplicia aut interdum impari-pinnata, in plurimis geminata*; *pedunculi solitarii aut plures, uni aut multiflori, extrà-axillares aut sparsi aut terminales*. *Fructus Melongenæ T. magnus, Lycopersici T. torulosus loculis semipartitis*. *Huic flos interdum 6-7-divisus, & ex Adans. antheræ connatæ, semina villosa*.

**CAPSICUM**, T. L. \* *Piment*. Calix, corolla, antheræ & stigma Solani. Bacca exsucca, polymorpha, seminibus compressis. *Suffrutices aut herbæ*; *folia geminata*; *flores extrà-axillares solitarii*; *semina piperita*.

**LYCIUM**, L. \* **JASMINOÏDES**, T. \* *Le Liciet*. Calix urceolatus brevis, 5-fidus aut 5-dentatus. Corolla longior tubulosa, limbo erecto 5-lobo aut plano 5-partito. Staminum filamenta basi tumida & villosa, mediæ corollæ infixæ, intrà limbum erectum latentia, suprâ planum exserta; antheræ subrotundæ. Stigma 2-sulcum. Bacca subrotunda; semina reniformia. *Frutices plerique spinosi, ramulis apice pungentibus*; *folia interdum fasciculata*; *flores axillares solitarii aut geminati*.

**CESTRUM**, L. \* **JASMINOÏDES**, T. \* *Cestreau*. Calix urceolatus brevis 5-dentatus. Corolla multò longior infundibuliformis, tubo gracili sensim dilatato, limbo plicato 5-fido. Staminum filamenta mediæ corollæ inserta, basi nuda & sæpè denticulata, non exserta; antheræ subrotundæ. Stigma obtusum. Bacca ovata, 2-locularis; semina subrotunda. *Frutices*; *pedunculi axillares multiflori*. *Corolla Jasmini sed 5-andra*. *Bacca 1-locularis ex Linn.*



## III. Genera Solaneis affinia.

**BONTIA**, Pl. L. \* Calix parvus 5-fidus persistens. Corolla multò longior tubulosa, limbo 2-labiato, supra erecto emarginato, infra revoluta hirsuto semi 3-fido. Stamina 4 didynamia (3 ex *Dill. l. lth.*). Stylus 1; stigma 2-lobum. Bacca olivæformis acuminata, intus tuberosa 2-locularis (osculo 1-nucleo foeta ex *Plum.*) loculis dissepimento elevato 2-partitis, singulo semiloculo 1-2-spermo. *Arbustula; folia alterna; flores solitarii axillares (an 5-andri filamento quinto sterili?). Character fructus ex sicco, undè Solaneis aut Scrophulariis affinis.*

**BRUNSFELSIA**, Pl. L. \* Calix campanulatus 5-dentatus brevis. Corolla magna infundibuliformis, tubo longissimo, limbo plano 5-lobo subæquali. Stamina 5 inæqualia, quorum 1 sterile; antheræ reniformes. Stylus 1; stigma capitatum. Bacca Ceraso major, 1-locularis ex *Linn.* (an potius 2-locularis?) polysperma receptaculo seminfero centrali caroso magno. *Arbustula; folia alterna; flores solitarii axillares aut plures terminales.*

**CRESCENTIA**, L. \* **CUJETE**, Pl. \* *Calebassier, Couis*. Calix 2-partitus æqualis deciduus Corolla magna subcampanulata tubo inæquali ventrico o incurvo, limbo erecto 5-fido inquali, laciniis dentato-sinuatis. Stamina 4 didynamia (interdum 5 ex *Jacq.*); antheræ incumbentes. Stylus 1; stigma capitatum, 2-lamellatum ex *Jacq.* Bacca maxima cucurbitina 1-locularis cortice solido, intus pulposa polysperma; semina numerosa, in pulpâ nidulantia subcordata 2-locularia. *Arbustula; folia magna alternè fasciculata, aut alterna; flores in trunco aut ramis subsolitarii. An verè congener C. Jasminoïdes Lamark dict. (Catesb. 1. t. 59.), cui calix tubulosus, corolla tubulosa Jasminoïdea, flores racematim terminales?*

**Obs.** Naturalis Solanearum series plurima complectitur genera, alia capsularia, alia baccata, ab invicem secedere nescia, quibus plerumque corolla regularis pentandra & fructus bilocularis & corculum perispermio instructum & folia alterna. Scrophulariis capsularia consentiunt dissepimento similiter valvis parallelo; accedunt baccata Borragineis & præprimis Cordiæ cæterisque habitu conformibus, sed oligospermis & perispermio destitutis. An rectè ordini insistant Crescentia, Brunfelsia & Bontia, quibusdam affines signis, quibusdam dispares: an eadem, an Solanæ omnes perispermio instructæ; an his Nolana affinior quam Borragineis? An iisdem addenda Solandra D. Banks, nondum in horto Parisiensi florida, sed habitu similis Daturæ arboreæ?





## ORDO IX.

## BORRAGINÆ, LES BORRAGINÉES.

**CALIX** quinquedivisus persistens. Corolla plerumque regularis. Stamina sæpius quinque. Germen simplex aut quadrilobum; stylus unicus; stigma bifidum aut sulcatum aut simplex. Semina sæpius quatuor, nunc inclusa pericarpio capsulari aut baccato, nunc nuda (gymnosperma *Linn.*) imo stylo obliquè applicita & calice persistente plerumque cincta. Corculum absque perispermo. Caulis in plurimis herbaceus, in paucis frutescens arboreusve. Folia alterna, sæpè aspera.

I. Fructus baccatus. *Caulis frutescens aut arboreus.*

**PATAGONULA**, L. \* Calix minimus 5-dentatus. Corolla rotata tubo brevissimo, limbo plano 5-partito. Antheræ subrotundæ. Stylus apice bis 2-fidus; stigmata 4. Capsula ovata acuminata insidens calici plurimum ampliato 5-partito. *Caracter ex Linnæo. Frutex Alaterni facie; flores subcorymbosi terminales. Stylus Cordiæ. An fructus verè capsularis?*

**CORDIA**, Pl. L. \* **SEBESTENA**, CB. \* *Sebestier*. Calix tubulosus apice dentatus. Corolla tubo æquali aut longiore, limbo 5-partito aut rarius 4-5-partito. Stamina 5, rarius 4-8, antheris oblongis. Stylus apice bis 2-fidus; stigmata 4. Drupa calici accreta, fœta nuce 4-loculari 4-spermâ, loculis sæpè 2-3 abortivis. *Arbores aut frutices; folia scabra; flores paniculati aut corymbosi, terminales & axillares, partium numero & formâ varii, in C. spinifloro campanulati. An genere distinguendæ species (C. myxa L.) quibus corolla limbo 6-8-dentato, 6-8-andra, & fructus intus pulposo-viscosus, abortu 1-2-spermus? An Aubletianæ species omnino congeneres?*

**EHRETIA**, L. \* *Cabrillet*. Calix 5-fidus. Corolla tubulosa limbo 5-lobo. Antheræ subrotundæ. Stylus 1; stigma 2-lobum. Bacca 4-locularis 4 spermâ, bipartibilis in 2 hemisphæria 2-locularia. *Arbores aut frutices; folia lævia aut scabra; flores paniculati terminales & axillares. E. Bourreria fructus scissilis in 4 partes, singulas 2-loculares 2-spermas.*

**MENAI**S, L. \* Calix 3-partitus persistens. Corolla hypocrateriformis, tubo longiore, limbo plano 5-partito. Antheræ subulatae subsessiles in fauce corollæ. Stylus 1; stigmata 2 oblonga.

Bacca



Bacca globosa 4-locularis 4-sperma. *Caracter ex Linn.; Frutex?.. folia integra aspera. An Ehretiaæ congener?*

**VARRONIA**, L. \* Calix tubulosus 5-dentatus. Corolla tubulosa limbo 5-partito patente. Antheræ incumbentes. Stylus 1; stigmata 4. Drupa calice tecta, fœta nuce 4-loculari 4-spermâ. *Frutices; folia sæpius scabra, interium subopposita, petiolo quandoque persistente & tunc spiniformi; pedunculi axillares aut terminales multiflori, floribus glomeratis aut spicatis spicâ clavatâ.*

**TOURNEFORTIA**, L. \* **PITTONIA**, Pl. \* Calix parvus 5-partitus. Corolla tubulosa, tubo infrâ globoso, limbo patente 5-fido. Stamina non exserta. Stylus 1. Stigma integrum. Bacca minima, obovata aut quandoque 4-torosa 2-partibilis, singulo hemisphærio intus osseo 2-loculari 2-spermo (rarius 3-4-spermo). *Frutices; folia sæpius scabra; flores cymosi, in spiculis secundi.*

I I. Fructus uni aut bicapsularis.

**HYDROPHYLLUM**, T. L. \* Calix 5-partitus. Corolla campanulata 5-fida, intus sulcata striis 5 melliferis marginatis, staminum filamenta amplexantibus. Stamina exserta, antheris oblongis incumbentibus. Stigma 2-fidum. Capsula globosa 1-locularis 1-sperma, feminibus 3 abortivis. *Herbæ; folia palmata aut semipinnata; flores corymbosi corymbis pedunculis terminalibus aut suboppositifoliis.*

**PHACELIA**. \* Calix 5-partitus. Corolla subcampanulata 5-fida, basi intus 5-sulcata, sulcis margine membranaceis filamentorum basin amplexantibus. Stamina exserta. Stylus brevis; Stigmata 2 longa. Capsula 2-locularis 4-sperma 2-valvis, valvis medio septiferis in singulo semiloculo 1-spermis. *Herba pubescens; folia alterna pinnata; flores secundi in spicis erectis fasciculatis terminalibus. Caracter ex prisco herbarii nostri specimine. Φακελος fasciculus.*

**ELLISIA**, L. \* Calix profundè 5-fidus. Corolla minor infundibuliformis 5-fida. Stamina non exserta, antheris subrotundis. Stigma 2-fidum. Capsula coriacea 2-locularis 2-valvis, calici stellato infidens; loculi 2-spermi, semine uno suprâ alterum. *Herba diffusa dichotoma; folia pinnatifida; pedunculi 1-flori, sæpè oppositifolii.*

**DICHONDRA**, Forst. \* Calix 5-partitus. Corolla subcampanulata patens 5-fida. Stamina 5. Germen didymum; styli 2; stigmata 2. Capsulæ 2 uniloculares 1-spermæ. *Caracter ex Forst. Austr. Cætera ignota. Genus recognoscendum.*

**MESSERSCHMIDIA**, L. \* *Arguze*. Calix 5-partitus. Corolla infundibuliformis aut hypocrateriformis, limbo 5-fido, plicato aut plano. Stamina non exserta, antheris subulatis erectis. Stigma capitatum. Capsula suberosa cylindrica, apice retusa



umbilico 4-dentato, 2-partibilis singulo hemisphærio 2-spermo  
feminibus ossis. *Herbæ aut frutices; pedunculi axillares & ter-  
minales multiflori.*

**CERINTHE**, T. L. \* *Melinet*. Calix 5-partitus. Corolla tubu-  
loso-ventricosa 5-fida, fauce nudâ. Antheræ erectæ, vix ex-  
fertæ. Stigma 1. Capsulæ 2 ossæ 2-loculares 2-spermæ. *Herbæ;  
folia glabra punctato-glandulosa; flores solitarii axillares & ter-  
minales.*

III. Fructus gymno-tetraspermus. Faux corollæ  
nuda. *Plantæ plerumque herbacæ & asperæ.*

**COLDENIA**, L. \* Calix 4-partitus. Corolla infundibuliformis, limbo  
patulo (4 lobo ex *Adans.*). Stamina 4. Germen 4-lobum; styli 4;  
stigmata 4. Fructus 4-capsularis scaber 4-rostratus, capsulis  
approximatis 1-spermis. *Herbæ procumbentes; flores axillares sub-  
sessiles. Character ex Linnæo. Species nova Peruviana habitu simil-  
lima, sed, teste Dombeyo, 5-andra 1-styla calice & corollâ 5-fidis:  
an verè congener; an indè Coldenia potius 5-andra?*

**HELIOTROPIUM**, T. L. \* *Héliotrope*. Calix tubulosus 5-den-  
tatus. Corolla hypocrateriformis 5-fida, dentibus 5 interjectis.  
Stigma emarginatum. *Flores spicati, in spicis secundi. H. Peru-  
vianum suffrutescens. H. parviflorum quandoque suboppositifolium  
& quasi angiospermum seminibus arctè junctis.*

**ECHIUM**, T. L. \* *Viperine*. Calix 5-partitus. Corolla tubo brevi,  
limbo ampliore campanulato, obliquè 5-lobo inæquali. Stigma  
2-fidum. *Flores spicati aut spicato-paniculati, in spiculis secundi.  
Species quædam suffrutescentes.*

**LITHOSPERMUM**, T. L. \* **BUGLOSSUM**, T. \* *Gremil*. Calix  
5-partitus. Corolla infundibuliformis parva 5-loba. Stigma 2-  
fidum. Semina nitida aut glabra. *Flores solitarii axillares, aut  
spicati-terminales bracteati; folia floralia interdum geminata. Species  
altera tantum 2-sperma, altera fruticosa. Hujus congener Arnebia  
Forsk. distincta stigmate 4-fido.*

**PULMONARIA**, T. L. \* *Pulmonaire*. Calix 5-gonus 5-fidus. Co-  
rolla infundibuliformis sub5-loba erecto-patens. Stigma emar-  
ginatum. *Flores subcorymbosi terminales, in P. maritimâ spicati.  
Quædam non asperifoliæ. Corollæ tubus in aliis calici æqualis, in  
aliis multò longior.*

**ONOSMA**, L. \* Calix 5-partitus. Corolla Symphyti, sed fauce  
nudâ. Stigma 1. *Flores axillares & terminales, subspicati secundi.*

I V. Fructus gymno-tetraspermus. Faux corollæ  
instructa quinque squamis calcarum instar cavis,



intrà corollam prominulis in ejusdem laciniarum  
basi , extrà hiulcis. *Herbæ plerumque asperifoliæ.*

**SYMPHYTUM** , T. L. \* *Consoude*. Calix 5-partitus. Corolla campanulato-ventricosa , limbo erecto subcoarctato 5-dentato. Squamæ oblongæ subulatæ conniventes. Stigma 1. *Flores sub-corymbosi terminales & axillares ; folia quorundam floralia geminata , caulina decurrentia.*

**LYCOPSIS** , L. \* **PULMONARIA** , T. \* **BUGLOSSUM** , T. \* **ECHIOIDES** , T. \* Calix 5-fidus. Corolla infundibuliformis , tubo incurvato , limbo brevi 5-lobo ; squamulæ convexæ conniventes. Stigma 2-fidum. *Flores solitarii aut subspicati , axillares aut terminales.*

**MYOSOTIS** , L. \* **LITHOSPERMUM** , T. \* *Scorpione* , Gremillet. Calix 5-fidus. Corolla hypocrateriformis tubo brevi , limbo plano 5-lobo , lobis emarginatis ; squamulæ convexæ conniventes. Stigma 1. Semina lævia aut scabra. *Flores sæpè spicato-secundi terminales.*

**ANCHUSA** , L. \* **BUGLOSSUM** , T. \* *Buglose*. Calix 5-fidus. Corolla infundibuliformis 5-loba erecto-patens ; squamulæ ovatæ prominulæ conniventes. Stigma emarginatum. Semina basi insculpta. *Flores axillares aut terminales , glomerati aut spicati secundi aut spicato-paniculati.*

**BORRAGO** , T. L. \* **CYNOGLOSSOIDES** , Isn. \* *Bourrache*. Calix 5-partitus. Corolla rotata 5-fida , plerumque patens ; squamulæ obtusæ emarginatæ. Stigma 1. Semina rugosa , calice connivente tecta. *Pedunculi axillares aut terminales uni aut multiflori. Antheræ B. officinalis oblongæ & intus imis insertæ filamentis ultra liberis styloideis. In Cynoglossoides folia inferiora opposita , calix angulatus erectus basi 5-auritus , corollæ limbus minus patens , staminum filamenta connata.*

**ASPERUGO** , T. L. \* *Rapette*. Calix 5-fidus inæqualis dentibus interjectis. Corolla tubo brevi 5-loba ; squamulæ convexæ conniventes. Stigma 1. Semina calice conduplicato ac compresso (in *A. Ægyptiacâ* ventricoso ) tecta. *Flores axillares ; folia floralia geminata.*

**CYNOGLOSSUM** , T. L. \* **OMPHALODES** , T. \* *Cinoglose*. Calix 5-partitus. Corolla infundibuliformis 5-loba brevis ; squamulæ convexæ conniventes. Stigma emarginatum. Semina depressa , inferiore latere affixa stylo , in *Cynogloss* T. plana aspera aut rarius lævigata , in *Omphalode* T. calathiformia lævia margine inflexo dentato. *Flores spicati aut glomerati , axillares aut terminales ; folia tomentosa aut glabra. Huc rectè Linnæus fil. Suppl. retulit Rinderam Pall. , distinctam seminibus planis lævibus.*



## V. Genera Borragineis affinia.

**NOLANA**, L. \* Calix basi turbinatus, limbo 5-partitus patens. Corolla campanulata sub 5-loba æqualis. Stamina 5 brevissima, antheris sagittatis. Germen quintuplex; stylus 1; stigma capitatum. Semina seu capsulae 5, cortice succulento quasi baccatae, singulae 2-4-loculares. *Herba prostrata facie Convolvuli; folia alterna, ut in Solaneis geminata; flores extra-axillares. Genus ordini affine fructu 5-capsulari, habitu & flore similis Solaneis aut Convolvulis.*

**SIPHONANTHUS**, L. \* Calix 5-partitus amplus. Corolla multo longior infundibuliformis tubo filiformi limbo 4-partito patente. Stamina 4. Germen 4-fidum; stylus 1; stigma 1. Baccæ 4 subrotundæ 1-spermae intra calicem. *Herba; folia subverticillata ternata; flores racemosi terminales. Character ex Linnaeo. An genus verè addendum Borragineis?*

**FALKIA**, LS. \* Calix 5-partitus. Corolla campanulata limbo ampliato 10-partito. Stamina 6 inæqualia. Germina 4; styli & stigmata 2. Semina 4 nuda, calice tecta. *Herba facie Convolvuli, sed fructu discrepans. Character ex Linn. Suppl. Genus inter Borragineas & Convolvulos medium, recognoscendum.*

Oss. Borragineæ gymnospermæ & capsulares inter se consentiunt, à baccatis diversæ tum habitu herbaceo, tum fructu partito. Has & illas commiscuit B. Jussæus noster & Linnaeus Ord. nat. 41. An instituendus Cordiarum novus ordo; an huic adjiciendæ Crescentia, Bontia aliæque inter Solaneas nunc dispositæ? An inde confirmanda Solanearum & Borraginearum affinitas recentius instituta? Quibusdam Borragineis folia floralia ut in Solaneis geminata & flores quasi extra-axillares. Ordo prius Labiatis adjectus quia similiter gymno tetraspermus, differt corollâ regulari pentandrâ, & floribus non oppositis, & foliis alternis sæpè asperis, & habitu non simili, & naturâ seminum quæ non verè nuda, sed crustâ quâdam arillæformi obducta, non basi infigantur infimo receptaculo, sed eidem centrali elevato latere apponuntur.

## O R D O X.

## CONVOLVULI, LES LISERONS.

**CALIX** quinquedivisus, sæpius persistens. Corolla regularis limbo sæpius quinquesido. Stamina sæpius quinque ima corollæ inserta & ejusdem laciniis alternata. Stylus unicus aut definitè partitus; stylo mul-



tiplici stigmata totidem simplicia, unico stigma simplex aut divisum. Fructus capsularis, sæpè trilocularis, rariùs bi aut quadrilocularis, loculis mono aut polyspermis; seminibus hylo inferiore notatis, subobseis & dissepimento centrali infrà affixis, valvis liberis margine appositis ad angulos dissepimenti; corculi arcuati (perispermo conclusi?) radícula inferior. Frutices aut sæpiùs herbæ, plures volubiles, plures lactescentes. Folia alterna aut rarissimè subopposita.

I. Stylus unicus.

**MARIPA**, Aubl. \* Calix obtusè 5-partitus, laciniis mutuò incumben-  
tibus. Corolla tubulosa, basi dilatata, limbo 5 fida. Stamina imo tubo inserta (lobis opposita ex Aubl. ic.); antheræ longæ sagittatæ. Stigma peltatum. Fructus... 2-locularis loculis 2-spermis. *Frutex sarmentosus scandens, ram sculis capreolatis; flores paniculati, terminales aut axillares pedunculis 1-bracteatis, pedicellis 2-bracteatis 2-3-floris. Character ex Aubl. Guyan. t. 91.*

**MOUROUCOA**, Aubl. \* *Mouroucou de Cayerne*. Calix 5 partitus connivens, laciniis 2 exterioribus cæteras obtegentibus. Corolla infundibuliformis limbo patente amplo 5-lobo. Stamina summo tubo inserta & opposita lobis; antheræ incumbentes. Stigma 2-lamellatum. Capsula calice semi cincta ovata coriacea fibrosa 3-locularis 3-sperma, loculo & semine uro sæpiùs abortivo. *Frutex sarmentosus (an lactescens?); pedunculi multiflori axillares. Character ex Aubl. Guyan. t. 54. An stamina verè lobis opposita?*

**RETZIA**, Thunb. \* Calix 5-partitus inæqualis. corolla tubulosa cylindrica apice 5-fida, intus & extus villosa. Stigma 2-fidum. Capsula oblonga 2-locularis 2-valvis polysperma. *Frutex subramosus (an lactescens?); folia subvericillata quaterna; flores bracteati terminales conferti. Convolvulo affinis, sed corollâ villosâ discrepans. Character ex Thunb. & Linn. Suppl.*

**ENDRACHIUM**. \* **HUMBERTIA**, Commerf. \* *Endrach de Madagascar*. Calix 5-partitus coriaceus. Corolla urceolata ventricosa extus sericea, limbo subintegro 5-plicato. Stamina exterta, imæ corollæ hinc affixa. Stigma 1. Capsula stipitata bacciformis ovata vix dehiscens basi umbilicata, 2-locularis loculis 2-spermis. *Arbor alternè ramosa; folia inferiora mox decidua, superiora conferta; pedunculi axillares solitarii 1-flori medio 2-bracteolati. Character ex Commerf. ic. & specim. sicco.*

**CONVOLVULUS**, T. L. \* *Liferon*. Calix 5-partitus. Corolla cam-



panulata aut rariùs infundibuliformis, limbo 5-plicato sæpiùs integro angulato, angulis acutis aut dentatis Stamina inæqualia, filamentis approximatis. Germen glandulæ hypogynæ semi-immersum; stylus 1; stigma 2-fidum. Capsula sæpè 3-locularis, rarò 2-4-locularis, loculis 1-2-spermis, quibusdam interdum abortivis. *Herbæ lactescentes, plurimæ volubiles; pedunculi axillares aut terminales, 1-flori 2-bracteati, aut multiflori. Species paucissimæ fruticulosæ.*

**IPOMÆA**, L. \* **QUAMOCLIT**, T. \* Calix 5-fidus. Corolla infundibuliformis longi limbo plicato 5-fido aut 5-dentato. Stigma capitatum. Capsula 3-locularis polysperma. *Herbæ volubiles lactescentes; pedunculi axillares aut terminales, uni aut multiflori, floribus distinctis aut aggregatis.*

## I I. Styli plures.

**EVOLVULUS**, L. \* Calix 5-partitus. Corolla rotata 5-fida. Styli 4; stigmata 4. Capsula 4-locularis 4-valvis (4-sperma?). *Herbæ .. an lactescentes? ...; quædam volubiles; pedunculi axillares uni aut multiflori. Character ex Linnaeo. E. nummulario styli 2 bifidi & lac nullum.*

**NAMA**, Brown. L. \* Calix 5-partitus, laciniis linearibus. Corolla tubulosa, limbo patulo 5-crenato. Styli 2; stigmata 2. Capsula oblonga 2-locularis 2-valvis polysperma seminibus dissepimento affixis. *Herba diffusæ; flores subsolitarii axillares. Character ex Brown. Jam. à Linnaeano diversus. Confer cum Evolvulo.*

**HYDROLEA**, L. \* Calix 5-partitus. Corolla rotata, tubo brevi, limbo patente 5-partito obtuso. Stamina imo tubo inserta; antheræ incumbentes. Styli 2; stigmata 2. Capsula 2-locularis 2-valvis polysperma dissepimento centrali seminifero. *Suffrutices aut herbæ; flores bracteati terminales aut axillares, solitarii aut subcorymbosi. Spinæ in H. spinosæ axillares & flores interdum 6-fidi 6-andri, & capsula quandoque 3-styla 3-locularis 3-valvis dissepimento 3-gono. Hujus congener Nama Zeylanica L. verè 1-petala limbo 5-partito & bilocularis, distincta caule herbaceo inermi. Congener etiam Steris javana L. baccata ex Burm. & Linn., sed eadem omninò cum Namâ supradictâ ex D. Smith.*

**SAGONEA**, Aubl. \* *Sagoune des Galibis*. Calix 5-partitus magnus. Corolla minor campanulata 5-fida. Stamina imo tubo inserta; antheræ oblongæ incumbentes, utroque fine 2-fidæ. Styli 3 (an stylus 3-fidus?); stigmata 3 capitata. Capsula 3-locularis circumscissa polysperma, seminibus minutis dissepimento centrali 3-gono affixis. *Herba erecta multicaulis; flores 2-4-axillares. Character ex Aubl. Guyan. t. III.*

**CRESSA**, L. \* **QUAMOCLIT**, T. Calix 5-partitus, laciniis mutuo incumbentibus, 2-bracteatus bracteis minimis. Corolla vix ca-



lice longior, tubulosa 5-fida. Stamina antheris subrotundis. Capsula 1-locularis 2-valvis, basi dehiscens, 1-sperma. *Herbæ ramosæ humiles; flores in ramulis terminales, subspicati foliolo axillares, aut glomerati tunc fortè non bracteati. Corculi perispermio subcorneo involuti radícula in lobos reflexa. An utpotè 1-sperma, Convolvulis minùs affinis; an semen geminum, altero abortivo?*

### III. Genera Convolvulis affinia.

**CUSCUTA**, T. L. \* *Cuscuta*. Calix turbinatus 5-fidus. Corolla globosa, fauce coarctata, limbo 5-fida, basi intùs 5-squamosa squamulis parvis 2-fidis. Stamina 5, corollæ fauci inserta, laciniis alterna, squamulis opposita. Styli 2 breves; Stigmata 2. Capsula sphæroïdea aut conica, basi circumscissa, indè calyptræformis, 2-locularis loculis 2-spermis; semina sphæricea imò dissepimento affixa suprà persistentem capsulæ basim peltatam; corculum seminis filiforme spirale typo (carnoso?) circumpositum. *Herbæ parasiticæ filiformes aphyllæ, ramis distantibus; flores passim in squamulæ axillâ capitati sessiles (in C. chinensi fasciculati pedunculis ramosis multifloris), interdum 4-fidi 4-andri. Corolla marcescens & circumscissa subsistit capsulam obtegens, infra simul persistente ejusdem basi circulari. Character ex C. Europæâ majore, an idem in aliis? Seminis immaturi corculum vidi altero fine crassiusculum & quasi clavatum, sed nondum in lobos partitum, quibus ex Linnaeo destituitur Cuscuta absque radice contra Solem volubilis, plantas conscendens & emissis exsugens vasculis. An semen potiùs 2-lobum; an corolla verè hypogyna; an genus rectè Convolvulis adjectum?*

**DIAPENSIA**, L. \* **ANDROSACE**, T. \* Calix 5-partitus extùs 3-squamosus. Corolla hypocrateriformis limbo 5-fido plano. Stamina 5, summo tubo inserta & lobis alterna. Stylus 1; stigma 1. Capsula 3-locularis 3-valvis polysperma. *Herba Sedi facie cespitosa, foliis ad radicem consertis; pedunculi scapiformes 1-flori. Ab Aretia discrepat præcipuè fructu 3-loculari & staminum situ. An verè Convolvulis adjicienda?*

**LOESELIA**, L. \* Calix tubulosus 4-fidus brevis persistens. Corolla 1-petala tubulosa brevis, limbo 5-partito, laciniis æqualibus, omnibus declinatis secundis. Stamina 4 didynama, laciniis opposita & contrario sensu secunda seu ascendentia. Stylus 1; stigma 1. Capsula 3-locularis polysperma. *Herba caule 4-gono, ramis oppositis; folia opposita, in ramulorum apice sensim majora & conserta; flores terminales. Character ex Linn. & ex Roym. Lugb. Genus in flore & fructu recognoscendum.*

*Obs.* Convolvuli Borragineis & Polemoniis affines corollâ regulari quinquesidâ pentandrâ & foliis alternis, ab his discrepant dissepimento valvarum marginibus non iisdem mediis applicito, ab illis fructu non gymnospermo. Præcipuus ordinis character in mutuo val-



varum & dissepimenti situ consistit. Genera quædam polystyla, à cæteris indè diversa, non tamen ex ordine eliminanda, peculiare exhibent signum in Monopetalis hypogynis plerumque monostylis. An in polystylis stylus non multiplex, sed potius basi simplex brevis & ultrà partitus?

## ORDO XI.

## POLEMONIA, LES POLÉMOINES.

**CALIX** divisus. Corolla regularis quinqueloba. Stamina quinque, medio corollæ tubo inserta. Stylus unicus; stigma triplex. Capsula calice persistente cincta, trilocularis trivalvis polysperma valvis medio intus septiferis, seu costâ prominente instructis, receptaculo seu dissepimento centrali trigono, valvularum septis angulatim applicito. Caulis herbaceus aut frutescens; folia alterna aut opposita; flores terminales aut axillares.

**PHLOX**, L. Calix 5-fidus aut 5-partitus connivens. Corolla tubulosa infundibuliformis, tubo longo, limbo plano 5-partito. Stamina inæqualia, non exserta, filamentis imo tubo insertis & eidem ultrà adnatis, antheris sagittatis. *Herbæ; folia opposita simplicia, floralia interdum alterna; flores subcorymbosi terminales. Habitus Saponariæ, sed flos 1-petalus.*

**POLEMONIUM**, T. L. \* *Polémoine*. Calix urceolatus 5-fidus. Corolla rotata, tubo brevi, limbo 5-lobo. Stamina filamenta basi latiora, antheræ incumbentes. *Herbæ erectæ; folia alterna pinnata; flores subcorymbosi terminales.*

**CANTUA**. \* *Cantu du Pérou*. Calix urceolatus 3-5-fidus. Corolla infundibuliformis tubo cylindrico limbo dilatato patente 5-lobo. Stamina filamenta æqualia, non dilatata, interdum exserta. Semina apice alata. *Frutices aut arbusculæ; folia alterna, sæpius simplicia; flores corymbosi terminales. Character ex siccis Jos. Jussai specimenibus Peruvianis Bignoniæ nomine inscriptis Huc referenda Ipomæa rubra L. s. frutex foliis pinnatifidis, floribus spicato-paniculatis, inter Polemonium & Cantuam media.*

**HOITZIA**. \* *Hoitzit du Mexique*. Calix tubulosus 5-fidus extus 5-6-bracteatus bracteis oblongis ferratis conniventibus. Corolla infundibuliformis longa, limbo 5-lobo subæquali minus patente. Stamina filamenta æqualia longa exserta. Germen 3-gonum; stylus 1; stigmata 3. Fructus... *Frutex Mexicanus;*



*folia alterna simplicia ferrata; flores solitarii axillares. Character ex sicco. A Cantuâ discrepat bracteis calicinis; fructus similis judicatur.*

Oss. Dissepimenti limbo apponitur in Convolvulis margo valvarum, in Polemoniis earundem costa media prominens. Uniformis insuper in cæteris signis Polemoniorum character. An tamen Phlox, utpotè oppositifolia & indè habitu similior Saponariæ & Caryophylleis, ordini verè conveniat? Seminibus alatis & fruticoso habitu Cantua Bignoniis accedit, ab iisdem dissimilis capsulâ triloculari & corollâ regulari omninò pentandrâ. Corculum Polemonii in perispermo corneo centrale, ex Bern. Jussæo.

## O R D O X I I.

## BIGNONIÆ, LES BIGNONES.

**C**ALIX divisus. Corolla sæpiùs irregularis, quadri aut quinqueloba. Stamina sæpiùs quinque, uno plerumque abortivo aut sterili. Stylus unicus; stigma simplex aut bilobum. Fructus bilocularis; nunc capsularis polyspermus omninò bivalvis, dissepimento feminifero valvis opposito aut parallelo & ab iisdem solubili; nunc coriaceo-ligneus, apice tantùm dehiscens oligospermus, dissepimento feminifero parietibus continuo non solubili & tunc sæpiùs utrinque prominulo in alam loculos bipartientem. Corculum feminis absque perispermo. Caulis herbaceus aut frutescens arboreusve. Folia opposita aut rariùs alterna.

I. Fructus capsularis bivalvis. Caulis herbaceus.

**CHELONE**, T. L. \* *Galane*. Calix 5-partitus 3-bracteatatus. Corolla basi tubulosa, fauce inflata, limbo 2-labiata, superiùs emarginata, inferiùs 3-fida. Stamina 4 didynama; filamentum quintum sterile, cæteris brevius. Stigma 1. Capsula ovata 2-locularis 2-valvis polysperma, valvis medio septiferis, receptaculo centrali valvularum septis applicito; semina numerosa margine membranacea. *Herba basi lignosa, oppositifolia; flores densè spicati terminales. Character ex C. glabrâ L. Huic à Linnæo adjungitur Pentstemon Mitch. distincti filamentum sterili cæteris longiore villoso, dissepimento valvis non septiferis parallelo, floribus paniculatis, pedunculis multifloris, divisuris bracteatatis: an genere & ordine distinguenda?*



**SESAMUM**, L. \* **DIGITALIS**, T. \* *Sesame*. Calix 5-partitus laciniâ summâ minore. Corolla tubo brevi, fauce campanulatâ magnâ obliquâ, limbo 5-fido, laciniâ infimâ longiore. Stamina 4 didynama; rudimentum quinti. Stigma 2-lamellatum. Capsula oblonga sub4-gona, 4-fulca 2-ocularis (4-ocularis ex Linn.) valvularum nervo medio intus prominulo septiformi, earumdem margine nonnunquam introflexo loculos infra bipartiente; semina numerosa, affixa receptaculo centrali gracili, valvularum septa connectenti. *Folia opposita aut sæpius alterna; pedunculi axillares solitarii 1-flori, basi 2-glandulosi, glandulis bracteatis.*

**INCARVILLEA**, \* Calix 5-fidus 3-bracteatus. Corolla basi tubulosa, fauce ventricosa, limbo 5-loba inæqualis. Stamina 4 didynama, antheris 2-lobis. Stigma 2-lamellatum. Capsula siliquæformis compressa longa angusta acuta 2-ocularis 2-valvis, dissepimento valvis opposito, polysperma seminibus alatis. *Herba Sinensis ramis alternis striatis; folia alterna pinnato-laciniata; flores laxissimè spicati terminales; corolla Digitalis; fructus ferè Catalpæ aut Fœnu-græci. Stamen quintum sterile non vidi. Character ex sicco specimine herbarii ad Bern. Jussæum missi anno 1743 à P. d'Incarville Jesuitâ apud Sinenses apothecico Botanices perito, cum adjunctis plurimis novarum specierum seminibus, præcipuè Asteris chinensis L. antehac Europæis incogniti.*

I I. Fructus capsularis bivalvis. Caulis arboreus aut frutescens.

**MILLINGTONIA**, LS. \* Calix campanulatus brevis 5-dentatus. Corolla infundibuliformis, tubo filiformi, limbo 4-partito æquali. Stamina 4 didynama, antheris 2-partitis seu basi extus dentatis (an quintum sterile?). Stigma 2-valve. Fructus siliquæformis? . . . *Arbor speciosa; folia (opposita?) impari-bipinnata; flores oppositè paniculati terminales; corolla Oviedæ longissima. Character ex Linn. Suppl.*

**JACARANDA**. \* **BIGNONIA**, L. \* Calix 5-dentatus. Corolla basi tubulosa, fauce dilatata, limbo 5-lobo inæquali. Stamina 4 fertilia; filamentum quintum sterile longius apice villosum (ut in Chelone). Stigma 2-lamellatum. Capsula compressa orbicularis lignosa, margine in 2 valvas solubilis, dissepimento carnosio valvis orbicularibus opposito; semina margine membranacea. *Arbores; folia opposita impari-bipinnata; flores paniculati. Hinc Bignonia cærulea L. & Jacaranda 2 Pisf. Bras.*

**CATALPA**. \* **BIGNONIA**, T. L. \* *Catalpa*. Calix 2-partitus. Corolla campanulata, tubo ventricoso, limbo 4-lobo inæquali. Stamina 2 fertilia; filamenta 3 sterilia. Stigma 2-lamellatum. Capsula siliquæformis longa cylindrica 2-valvis, dissepimento



valvis opposito; semina apice & basi membranaceo-papposa. *Arbores; folia simplicia terna verticillata; flores paniculati. Huc Bignonia Catalpa L. & B. longissima Jacq.*

**TECOMA.\* BIGNONIA, T. L.\*** Calix 5-dentatus. Corolla campanulata, limbo 5-lobo inæquali. Stamina 4 fertilia; filamentum quintum sterile. Stigma 2-lamellatum. Capsula filiquæformis longa cylindrica 2-valvis, dissepimento valvis opposito; semina margine membranacea. *Arbores aut frutices; folia opposita impari-pinnata aut digitata; flores paniculati. Huc Bignonia stans, B. radicans, B. 5-phylla L. & Tecomaxochitl Hern. Mex.*

**BIGNONIA, T. L.\*** *Bignone.* Calix dentatus subinteger. Corolla campanulata limbo 5-lobo inæquali. Stamina 4 fertilia; filamentum quintum sterile. Stigma 2-lamellatum. Capsula filiquæformis longa plana, aut ovata brevior, 2-valvis dissepimento plano valvis parallelo; semina margine membranacea. *Arbores aut frutices; folia opposita, nunc impari pinnata aut ternata, nunc conjugata petiolo 2-phylo inter foliola sæpè cirrhoso; flores paniculati. Huc revocantur Autorum Bignoniæ omnes dissepimento parallelo instructæ, iterùm observandæ & posthac denuò dividendæ ratione calicis simplicis aut duplicati, corollæ regularis aut irregularis, staminum sterilium aut fertile, fructus ossæi aut capsularis, filiquæformis aut ovati. Nonnullæ præterea species in herbariis novæ nondùm descriptæ, floratione conformes, simplicifoliæ foliis oppositis aut alternis, sed nondùm fructiferæ & ideo generibus cognitis nondùm certò adjiciendæ. B. sempervirens genere & ordine diversa, Apocineis addenda.*

III. Fructus coriaceo-ligneus apice dehiscens. Caulis herbaceus.

**TOURRETIA, Dombey.\* DOMBEYA, Lherit.\* Tourretie.** Calix 2-partitus, suprâ acuminatus angustior, infrâ latior 4-crenulatus. Corolla tubulosa, medio coarctata, limbo 1-labiato, labio superiore in cucullum producto. Stamina 4 didynama sub cucullo; antheræ 2-lobæ. Receptaculum germi suboppositum urceolatum. Stigma 1. Capsula ovata coriaceo-ligneæ, spinis uncinatis echinata, 2-locularis, apice 2-valvis, dissepimento prismatico centrali seminifero valvis mediis continuo, utrinque prominulo in alam loculos 2-partientem (indè 4-locularis); semina pauca compressa marginata. *Herba repens au scandens 4-gona dichotoma; folia opposita, dichotomè ternata, in dichotomiâ cincta (ut in Bignoniâ) cirrho ramoso; corona ciliaris in axillis caulem ambiens; flores spicati terminales, singuli 1-brachiolati, in spicæ apice neutri majores; capsula extus Xanthii, intus Martyniæ. Nomen à D. de La Tourrette Chloridis Lugdunensis & botanicarum Scholæ veteriniæ Lugdunensis prælectionum Autore.*



**MARTYNIA**, L. \* *Eicorre*. Calix 5-fidus, basi 3-bracteatus. Corolla irregularis subcampanulata, basi gibba & mellifera, limbo 5-loba inæqualis. Stamina 4 didynama, sæpius fertilia; rudimentum quinti staminis. Stigma bilamellatum. Capsula corticata lignosa, ovata aut longior, apice rostrato, rostro inflexo bicorni, brevi aut rarius longissimo, antèrius sulcato-dentata, sinistura 4 valvis, sed apice vix dehiscens; loculi 4 inferiores 1-spermi, 1 superior 4 spermus, dissepimento infra decussato, supra nullo. *Herba; folia opposita aut rarius alterna; flores spinosæ axillares aut terminales. Species una dianthera, antèrius cæteris abortivis. Fructu M. perennis ex Linnæo fortè inferus, hinc illa ad Gesneriam & Campanulas compellret.*

**CRANIOLARIA**, L. \* Calix spathæformis oblongus, hinc omninò fissilis, indè 2 bracteatus, pedunculo insuper 1-bracteato. Corolla intundibuliformis, tubo longo, fauce campanulatâ, limbo patente 4-loba inæquali. Stamina 4 didynama; rudimentum quinti staminis. Fructus ovatus, breviter 2-cornis ut in Martyniâ. *Herba dichotoma; flores in dichotomiis aut foliorum axillis subracemosi. Habitus & caracter Martyniæ, corolla longior tubulosa. An confusis speciebus unienda duo genera; an potius distinguenda fructu brevius aut longius rostrato? C. fruticosa L. cui germen inferum, ad Gesneriam & Campanulas depellenda.*

**PEDALIUM**, L. \* Calix 5-partitus. Corolla tubulosa, limbo campanulato 5-loba inæquali. Stamina 4 didynama, filamentis basi pilosis, antheris geminatim cruciatis, filamento quinto brevi sterili. Stigma 2-fidum. Nux suberosa 4-gona, angulis 4 spinosis, 2-ocularis dissepimento opposito, 2 sperma seminibus arillatis. *Herba trichotoma; folia opposita (alterna ex Burm. Ind. cujus species fortè diversa); flores axillares subsolitarii; fructus ferè Trapæ; habitus Martyniæ. Hujus congener aut genere proxima Planta Euphrasiæ affinis Pl. k. t. 373. f. 2. à Linnæo ad Torreniam malè relata, cui folia alterna, fructus 4-gonus non spinosus, cætera ferè conformia.*

**Obs.** Ordinis locus in Monopetalorum serie non certò definitus. Hinc stamine uno aborrivo corollaque irregulari ad tetrandros ordines revocatus, dissepimento fractus nunc opposito nunc parallelo Acanthis modò convenit, modò Scrophulariis, ab his tamen discrepans dissepimento valvis non adnato sed tantumdem opposito, ab illis eodem nec adnato nec bipartibil. Indè rectius, prætermisso staminis quinti abortu, ad Polemonia, Gentianas, Apocineas cæterosque pentandros ordines compellitur, habitu & fructu siliquæformi quasi folliculari & alatis seminibus similis Plumeriæ & Camerariæ aliisque Apocineis. Hæc de Bignoniis veris quarum generica distributio visa fuit opportuna ac utilis, ut diversus in diversis pateret dissepimenti situs. Genera quædam antèrius ac postèrius iisdem adjuncta in geminâ sectione, utpotè pentandra aut abortu tetrandra, nonnullis differunt signis iterum perpendendis & distinctos in posterum constituent ordines Bignoniis conterminos.



## O R D O X I I I.

## G E N T I A N Æ , L E S G E N T I A N E S.

**CALIX** monophyllus divisus persistens. Corolla regularis, sæpè marcescens, limbo partito aquali, lobis numero laciniarum calicis, sæpiùs quinque, interdum obliquis. Stamina totidem, mediæ aut summæ corollæ inserta; antheræ incumbentes. Stylus unicus, aut raro scissione duplex; stigma simplex aut lobatum. Capsula, simplex aut didyma, polyperma, bivalvis, uni aut bilocularis, valvis margine inflexis, in fructu uniloculari involutis, in biloculari planis & dissipientibus; semina minuta, receptaculo in valvis marginali inserta. Caulis herbaceus aut rariùs suffrutescens. Folia opposita, sæpiùs integra & sessilia; floralia nonnunquàm minora bracteiformia, floribus idè tunc quasi bibracteatis.

## I. Capsula simplex unilocularis.

**GENTIANA**, T. L. \* **CENTAURIUM MINUS**, T. \* *Gentiane*, *Centaure le*, *petite Centaurée*. Calix ferè 5-partitus. Corolla basi tubulosa, campanulata in *Gentiana* T., aut infundibuliformis in *Centaurio* T., limbo 5-fido, rariùs 4-fido, formâ variâ, laciniæ obtusæ aut acutæ, ciliatæ aut integræ, patentes aut erectæ, interdum lacinulis interjectis distinctæ Stamina 5, rariùs 4. Stylus 2-partitus; stigmata 2. Flores axillares aut terminales, solitarii aut fasciculati aut verticillati. An genus dividendum? An corculum perispermum involutum?

**VOHIRIA**, Aubl. \* Calix brevis 5-fidus, basi 2-3-squamosus. Corolla multò longior, tubulosa, basi & fauce dilatata, limbo patente 5-loba. Antheræ 5 subsessiles, tubo fauce insertæ. Stylus 1; stigma capitatum. *Hæc sem. subterranea*; folia inferiora subterranea carnosæ, superiora emersæ minù crassæ; flores 1-2 terminales, interdum 6-fidi 6-andri. Character ex A. bl. *Guyan.* t. 83. *Hæc conger Gentiana aphylla* Jacq. *Amer.* t. 60 f. 3., verè 1-stylis & oppositifolia, non subterranea sed in obscuris arborum cryptis vegeta.

**COUTOUBEA**, Aubl. \* Calix 4-fidus 3-bracteatus. Corolla longior, tubo brevi, limbo 4-fido. Stamina 4 filamentis basi



dilatatis; antheræ sagittatæ. Stylus 1; stigma 2-lamellatum. *Flores spicati axillares & terminales. Character ex Aubl. Guyan. t. 27-28. Hujus fortè congener Gentiana spicata L. habitu similis & certè 1-styla, sed 5-fida 5-andra.*

SWERTIA, L. \* GENTIANA, T. \* Calix ferè 5-partitus. Corolla rotata, tubo brevissimo, limbo plano 5-partito, laciniis lanceolatis, singulis basi intus gemino puncto ciliato instructis. Stamina 5 corollâ breviora. Germen desinens in stylum brevem stigmate duplici terminatum. *Flores axillares & terminales, pedunculis sæpè multifloris. Ex Linnæo corolla S. dichotomæ 4-fida, S. corniculatæ 4-fida inferiùs 4-calcarata.*

CHLORA, Renealm. Adans. L. \* CENTAURIUM MINUS, T. \* Calix 8-partitus. Corolla hypocrateriformis, tubo brevi, limbo 8-partito. Stamina 8 brevissima, fauci inserta. Stylus 1; stigma 4-fidum. *Flores terminales. Species una 12-fida 12-andra, altera foliis 4 verticillatis.*

## II. Capsula simplex bilocularis.

EXACUM, L. \* *Gentianelle*. Calix 4-partitus. Corolla tubo globoso, 4-loba. Stamina 4. Stylus 1; stigma 2-fidum. *Flores axillares aut dichotomè corymbosi terminales, in dichotomiis 1-flori. E. cordati LS. corolla 5-fida 5-andra.*

LISIANTHUS, Brown. L. \* Calix 5-partitus laciniis carinatis margine membranaceis. Corolla multò longior infundibuliformis, tubo intrâ calicem coarctato, fauce ampliata, limbo 5-fido. Stamina 5. Stylus 1; stigma capitatum 2-lobum. *Flores 1-2 terminales aut axillares. Character ex Brown. & Linn.*

TACHIA, Aubl. \* Calix tubulosus 5-dentatus. Corolla tubulosa, fauce parùm dilatata, limbo 5-fido. Stamina 4. Germen disco 5-glanduloso impositum; stylus 1 longus; stigma 2-lamellatum. *Frutex lutescens ramis oppositis 4-gonis sarmentosis; folia opposita; flores axillares solitarii. Character ex Aubl. Guyan. t. 29. An Apocineis affinior?*

CHIRONIA, L. \* Calix 5-fidus aut ferè 5-partitus. Corollæ tubus calici æqualis, limbus major 5-partitus. Stamina 5, antheris post deflorationem spiraliter contortis. Stylus 1 declinatus; stigma capitatum. *Flores axillares aut terminales. Species quædam suffrutescentes. Capsula interdum subbaccata.*

NIGRINA, L. \* MELASMA, Berg. \* Calix ventricosus 5-fidus. Corolla calice paulò longior, infundibuliformis, tubo brevi, limbo 5-lobo. Stamina 5 (4 ex Berg.), antheris basi 2-partitis. Stylus 1; stigma 1. *Herba siccatione nigrescens. Flores solitarii axillares longè pedunculati, pedunculo infrâ calicem 2-bracteato. Character ex Linn. & Berg. & Burm. prod. Cap. Congener Gerardia ex Linn. Suppl.*



## III. Capsula didyma bilocularis.

**SPIGELIA**, L. \* **ARAPABACA**, Pl. \* Calix 5-partitus Corolla infundibuliformis, limbo patens 5-fida æqualis. Stamina 5. Germen didymum; stylus 1; stigma 1. Capsula didyma 2-locularis quasi 2-cocca, 4-valvis polysperma seminibus angulo loculorum interiori affixis. *Herbæ; folia opposita (floralia in S. Anthelmia 4 verticillata); flores terminales bracteolati spicati aut cymosi, in spicis secundi.*

**OPHIORRHIZA**, L. \* Calix 5-dentatus. Corolla infundibuliformis, limbo patente 5-fido. Stamina 5. Germen 2-fidum; stylus 1; stigmata 2. Capsula mitræformis 2-loba lobis apice divaricatis, 2-locularis intus dehiscens, polysperma. *Herbæ; folia opposita; flores bracteolati, dichotomè cymosi terminales aut axillares, in spiculis secundi.*

## I V. Genus affine Gentianis.

**POTALIA**, Aubl. \* Calix 4-partitus erectus turbinatus, laciniis 2 interioribus, 2 extrimis, 2-squamosus. Corolla tubo brevissimo, limbo 10-partito, laciniis longis erectis obliquis, latere imbricatis. Stamina 10, antheris longis, filamentis brevibus basi coalitis. Stylus 1, stigma peltatum striatum. Capsula subcarnosa cerasiformis 3-locularis polysperma. *Herba amara sub-lignosa nodosa resinosa; folia ad nodos superiores opposita longissima, petiolis subvaginantibus; flores trichotomè corymbosi terminales, divisuris membranulâ vaginatis. Character ex Aubl. Guyan. t. 151. An capsula verè 3-locularis? An Convolvulis aut Apocineis affinior? Hujus omninò congener planta Madagascariensis innominata Commerf. herb.*

*Obs.* Ordo inter pentandros annumerandus, licèt staminum numero interdum varius, Apocineis apprimè conveniens, ab iisdem distinctus valvis in unicam capsulam approximatis, non divaricatione geminum constituentibus folliculum. Hujus ergò præcipuus character in valvarum introflexione repositus, quâ fructus indiscriminatim uni aut bilocularis evadit. An huc revocandæ *Houstonia*, *Monniera* & *Rapua*.

## O R D O X I V.

## A P O C I N E Æ, LES A P O C I N É E S.

**CALIX** quinquedivisus. Corolla regularis quinqueloba lobis sæpius obliquis, nunc nuda, nunc intus



aucta appendicibus quinque formâ variis. Stamina quinque, imæ corollæ inserta, ejusdem lobis alterna, filamentis sæpè brevibus, nunc distinctis nunc rariùs in tubum germi arctè circumpositum coadunatis; antheræ biloculares apice in membranam aut filum productæ. Germen simplex aut geminum, receptaculo sæpè glanduloso impositum; stylus unicus, interdum brevissimus aut subnullus, germi duplicato ut & simplici infixus & quasi articulatus; stigma capitatum obsoletum. Fructus in monogynis baccatus aut rarò unicapsularis, plerumque bilocularis polyspermus; in digynis bifollicularis, folliculis conjugatis, membranaceo-capsularibus oblongis aut rariùs subbaccatis brevioribus, intus longitudinaliter dehiscentibus unilocularibus polyspermis quorum semina mutica aut papposa, imbricatim multiplici serie affixa receptaculo laterali libero hinc seminifero, indè ad parietem folliculi internam, quâ parte dehiscit, applicito. Corculum planum, in perispermo tenui carnosum. Herbæ aut frutices arboreæve, plerumque lactescentes. Folia opposita aut alterna; glandulæ axillares subciliares, interdum vix conspicuæ.

I. Germen duplex. Fructus bifollicularis. Semina non papposa.

VINCA, L. \* PERVINCA, T. \* *Pervenche*. Calix 5-partitus persistens. Corolla hypocrateriformis tubo longo, fauce 5-gonâ, limbo plano obtusè 5-lobo. Antheræ membranaceæ. Stylus 1; stigma urceolatum & subtus peltato-orbiculatum. Folliculi erecti conniventes oblongi angusti; semina oblonga nuda. *Suffrutices, quidam non lactescentes, quidam caulibus diffusis; folia opposita; flores axillares.*

MATELEA, Aubl. \* Calix 5-partitus. Corolla tubo brevi, limbo 5-partito patente. Antheræ subsessiles, in capitulum 5-gonum connatæ. Styli 2; stigmata 2 latiora incurva. Folliculus 1, altero sæpius abortivo, longus verrucosus 5-gonus acutus; semina plana, margine crenata. *Herba multicaulis nodosa; folia ad nodos villosos opposita, infra desuper 2-glandulosa, petiolo pariter ad basim 2-glanduloso; flores axillares, alternatim & laxè spicato-corymbosi, singuli bracteolati. Character ex Aubl. Guyan. t. 109.*

OCHROSIA. \* Calix minimus 5-dentatus. Corolla tubulosa infundibuliformis,



infundibuliformis, limbo 5-partito patente. Stylus 1; stigma incrassatum. Folliculi divaricati drupacei ovati, singuli nucis fœti 2-loculari (receptaculo seminitero in dissepimentum immutato?) in singulo loculo 2-3-spermâ; semina inæqualia plana, apice vix membranacea. *Arbuscula Borbonica* Bois jeune dicta; folia 3-4 verticillata; flores dichotomè corymbose axillares aut terminales. Car. & r. ex Commerf. & ex specimine sicco. Affinis *Tabernæmontanæ* & *Rauwolfiæ*. Oïpos luteus.

**TABERNÆMONTANA**, Pl. L. \* Calix 5-fidus aut 5-partitus deciduus. Corolla longa infundibuliformis limbo plano 5-lobo. Antheræ acuminatæ conniventes. Germen basi 5-glandulosum glandulis 2-fidis. Stylus 1; stigma capitatum (rubus orbiculatum in *T. Amsoniæ* L.). Folliculi divaricati horizontales ventricosi acuminati, intus pulposi; semina rugosa pulpæ immersa. *Arbusculæ aut suffrutices*; folia opposita aut rariis ternis; pedunculi multiflori axillares aut terminales. Calix *T. grandifloræ* magnus, laciniis 2 exterioribus majoribus cordatis. Hujus congener *Pandacaqui* Sonner. Guin. 49. t. 19., ad *Chiococcam* à *Linnaeo* fil. Suppl. malè relata.

**CAMERARIA**, Pl. L. \* Calix 5-fidus minimus. Corolla infundibuliformis cylindræa, basi & apice ventricosa, limbo plano 5-partito. Stamina filamenta basi appendiculata; antheræ conniventes apice 2-fetosæ. Stylus brevis (0 ex *Linnaeo*); stigma capitatum 2-fidum. Folliculi divaricati horizontales compressi, obtusè 3-lobi, quasi hastati, lobis 2 brevibus, intermedio multò longiore; semina compressa, apice membranacea. *Arbores aut frutices ramis dichotomis*; folia opposita (in *C. latifoliâ* transverim pulchrè striata, ut in *Calophyllo*); flores axillares aut terminales. Caractèr ex *Jacq. Americ.*

**PLUMERIA**, T. L. \* *Frangipanier*. Calix parvus obtusè 5-fidus. Corolla infundibuliformis, tubo longo sensim ampliato, limbo obtusè 5-partito patente (erecto in *P. pudicâ* L.). Antheræ conniventes exsertæ. Stylus vix ullus; stigma bifidum. Folliculi deorsum flexi, longi ventricosi; semina margine membranaceo alata. *Arbores aut arbusculæ*; folia alterna integra magna; flores subcorymbose terminales, plures abortivi.

II. Germen duplex. Fructus bilocularis. Semina papposa.

**NERIUM**, T. L. \* *Laurelle, Laurose, Laurier-rose*. Calix 5-partitus parvus persistens. Corolla infundibuliformis oblonga, limbo obtusè 5-partito, laciniis basi intus appendiculatis; appendices supelatae 2-fidæ, faucem coronantes. Antheræ conniventes sagittatæ, apice in filum desinentes. Stylus 1; stigma truncatum orbiculo insidens. Folliculi erecti conniventes longi acuminati;



semina oblonga papposa. *Arbusculæ aut frutices ; folia opposita aut 3 verticillata ; flores subcorymbosi terminales. N. oleander non lactescit.*

**ECHITES**; Jacq. L. \* **APOCINUM**, Pl. \* Calix 5-partitus parvus. Corolla infundibuliformis limbo plano 5-fido. Antheræ rigidæ acuminatæ convergentes. Germinis receptaculum 5-glandulosum. Stylus 1 ; stigma capitatum 2-lobum. Folliculi longissimi ; semina pappo longo. *Frutices , plurimi volubiles , quidam non lactescentes ; folia opposita ; pedunculi axillares aut terminales uni aut multiflori , floribus umbellatis aut corymbosis aut spicatis. Character ex Jacq. Amer. Corollæ forma varia & tubus interdum ventricosus ; ejusdem lacinia in E. caudatâ longæ ligulatæ.*

**CEROPEGIA**, L. \* **APOCINUM**, T. \* Calix minimus 5-dentatus persistens. Corolla basi ventricosa, supra tubulosa, limbo 5-dentata aut 5-fida non patens. Antheræ parvæ. Stylus vix ullus ; stigmata 2. Folliculi recti cylindracei longissimi ; semina papposa. *Plantæ volubiles ; folia opposita ; pedunculi axillares & terminales, nunc 2-3-flori, nunc umbellatim multiflori.*

**PERGULARIA**, L. \* Calix 5-fidus persistens. Corolla hypocrateriformis tubo cylindrico, limbo obtusè 5-partito plano ; squamulæ 5 semisagittatæ, apice mucronatæ, basi dentatæ. Antheræ sessiles stigmati immersæ. Stylus 0 ; stigma truncatum magnum. Folliculi ... *Frutices volubiles ; folia opposita ; flores subcorymbosi axillares. Character ex Linnæo. Genus denuò examinandum. An verè congener Asclepias cordata Burm. Ind. t. 27. f. 2.*

**STAPELIA**, L. \* **ASCLEPIAS**, T. \* Calix 5-fidus parvus persistens. Corolla rotata magna plana, laciniis basi latis, acuminatis ; stellula duplex, utraque 5-fida, ambiens organa genitalia. Staminum filamenta plana ; antheræ filamentis adnatæ. Styli 0 ; stigmata 2 obsoleta. Folliculi oblongi subulati ; semina papposa. *Plantæ succulentæ seu pingues, caule angulato aphylo tuberculis acuminatis obsito ; pedunculi 1-2 tuberculo axillares 1-flori. Interdum orbiculus planus stellalis subjectus. Character ex Linnæo.*

**PERIPLOCA**, T. L. \* **APOCINUM**, T. \* Calix minimus 5-fidus persistens. Corolla rotata plana 5-partita, coronâ urceolatâ 5-fidâ faucem ambiente, 5 setas seu aristas exferente. Staminum filamenta conniventia. Stylus 1 ; stigma capitatum 5-gonum, glandulis 5 stipitatis instructum. Folliculi oblongi ventricosi ; semina papposa. *Frutices , plurimi scandentes ; folia opposita ; flores subcorymbosi, axillares aut terminales.*

**APOCINUM**, T. L. \* *Apocin.* Calix 5-fidus minimus persistens. Corolla campanulata semi 5-fida lobis revolutis ; corpuscula 5 glandulosa germen ambientia. Antheræ conniventes, basi 2-fidæ. Stylus vix ullus ; stigma 1 latum. Folliculi longi acuminati ; semina pappo longo. *Frutices , plerique erecti ; folia opposita ; flores corymbosi aut paniculati, axillares aut terminales. Species una*



*muscicapa, muscarum proboscide inter antheras immissa glutinosa nectare detentâ.*

**CYNANCHUM, L. \* APOCINUM, T. \* PERIPLOCA, T. \*** Calix 5-dentatus minimus persistens. Corolla tubo brevissimo, laciniis limbi longis linearibus, coronâ cylindraceâ oblongâ erectâ dentatâ faucem ambiente. Stamina ut in Asclepiade. Stylus vix ullus; stigmata 2. Folliculi oblongi acuminati; semina papposa. *Frutices aut suffrutices, plerique volubiles; folia opposita; flores axillares aut terminales, in spicas aut corymbos aut umbellulas dispositi. C. viminale aphyllum.*

**ASCLEPIAS, T. L. \* APOCINUM, T. \*** Calix 5-fidus, parvus persistens. Corolla obtusè 5-partita, plana aut reflexa; squamæ 5 ejusdem laciniis alternæ, staminum tubo extûs insertæ. genitalibus appressæ, in cucullum convolutæ & è medio cucullo corniculum exferentes. Staminum filamenta coadunata in tubum crassum 5-gonum, germina arctè involvens, ex imâ corollâ enatum, suprâ clausum stigmate truncato & ipsi quasi continuum, in angulis 5-sulcatum, in faciebus 5-antheriferum; antheræ subsessiles medio tubo extûs insertæ erectæ 2-loculares, polline vacuæ, apice membranaceæ, corollæ laciniis alternæ. Stylus 0; stigma peltatum 5-gonum, tubo suprâdicto impositum, ex foveolis 5 angularibus emittens corpuscula 5 ovata minima, antheris alterna, & ideò corollæ laciniis opposita, 2-valvia, valvis latere productis infrâ 2-cornia; cornua hæc exilia propendentia basi subulata, medio geniculata, ultrâ spatulata & granulata (ex concreto polline facta?); horum singulum in proximo vicinioris antheræ loculum immersum, undè 1 corpusculum antheris 2 commune & 1 anthera corpusculorum 2 particeps. Folliculi oblongi acuminati, sæpè ventricosi; semina papposa. *Frutices aut herbæ erectæ; folia opposita aut alterna; pedunculi solitarii axillares, umbellatim multiflori, umbellis involucri polyphyllio cinctis. Organa generis sexualia descripsit D. Kolreuter; descripsere etiam in dissertationibus nondum editis jamdudum Tournefortius & posthac DD. Desfontaines, Descomet, Richard, de naturâ, usu & nomine partium inter se dissentientes. An corpuscula 2-cornia verè mascula; an à stigmate, an ab antheris, an ab utrisque orta; an horum cornua verè è polline ut in Orchidibus concreto; an ideò seminalis aura ex cornibus in corpuscula fluens, inde valvis distractis depluens in subteriores tubi rimas, ancipite ductu ad germina incarcerationa defertur? An potius circumscripto sexu, non pro polline tantum, sed pro antheris etiam habenda corpuscula quorum valvulis contrahunt distrahuntve cornua, vectum elasticorum more sæpè muscicapa, non aliis nata laboribus? An tubus staminibus omninò proprius & à stigmate verè distinguendus? An demùm rectè assignata partium nomina?*



## III. Germen simplex. Fructus baccatus aut rarius capsularis.

**AMBELANIA**, Aubl. \* Calix 5-partitus brevis. Corolla tubulosa cylindrica, fauce angustior, limbo 5-partito obliquo undulato. Stamina brevissima, antheris sagittatis. Stylus 1; stigma ovatum, orbiculo plano insidens, apice 2-cuspidatum. Capsula ovata carnosissima magna 2-locularis polysperma, feminibus dissepimento gracili affixis, lato-compressis asperis. *Arbustula lactescens; folia opposita; pedunculi axillares aut terminales, 3-4-flori 1-bracteati. Character ex Aubl. Guayan. t. 104.*

**PACOURIA**, Aubl. \* Calix sub5-partitus persistens. Corolla tubo brevi, limbo 5-partito undulato, obliquatim contorto. Stamina brevissima, antheris cuspidatis. Stylus 1; stigma Ambelaniae. Bacca pyriformis magna intus pulposa & polysperma, feminibus magnis duris angulatis, in pulpâ nidulantibus. *Frutex lactescens ramis sarmentosis nodosis; folia ad nodos opposita; flores racemosi axillares, racemi pedunculo longo, cirrhi instar volubili. Character ex Aubl. Guayan. t. 105. An Ambelaniae congener?*

**ALLAMANDA**, L. \* **ORELIA**, Aubl. \* Calix 5-partitus. Corolla infundibuliformis magna tubo longo, fauce ampliata, limbo patente amplo 5-fido. Stamina faucibus inserta, antheris subsessilibus sagittatis. Discus sub germine annularis; stylus 1 longus; stigma erectum, orbiculo duplici bis peltatum, medio coarctatum. Capsula coriacea ovata compressa magna, undique aculeis longis echinata, 1-locularis 2-valvis polysperma, feminibus orbiculatis margine membranaceis, duplici ordine incumbentibus, valvarum margini affixis. *Frutex lactescens sarmentosus nodosus; folia ad nodos 3-4 verticillata; flores dichotomè corymbosi axillares, in dichotomiis bracteati. Character ex Linn. & Aubl. Guayan. t. 106.*

**MELODINUS**, Forst. LS. \* Calix 5-partitus persistens. Corolla tubulosa limbo 5-partito obliquo, coronâ ad faucem 5-fidâ lacerâ (cum limbi laciniis alternante ex Forst.) Stamina brevissima. Stylus 1 (2-partibilis ex Forst.); stigmata 2. Bacca globosa 2-locularis, intus pulposa & polysperma, dissepimento carnosissimo, feminibus compressis. *Frutex scandens; folia opposita integra; flores ... Rauvolfiae affinis. Character ex Forst. & L. Suppl.*

**GYNOPOGON**, Forst. \* Calix 5-fidus minimus persistens. Corolla tubulosa, intus villosa, ad faucem coarctata, subtus dilatata, limbo obliquo 5-partito. Antheræ subsessiles sagittatae. Stylus 1; stigma didymum villosissimum. Bacca pedicellata pisiformis coriacea, foeta nuce cartilagineâ sub2-loculari sub2-spermâ. *Folia verticillata aut opposita. Character ex Forst.*

**RAUVOLFIA**, Pl. L. \* Calix 5-dentatus minimus persistens.



Corolla tubulosa, basi globosa, limbo 5-partito. Stamina brevia. Stylus 1 brevis; stigma capitatum. Drupa subglobosa hinc sulcata, foeta nuce (geminâ 1-loculari in *R. canescenie* ex Jacq.) 2-loculari 2-spermâ. *Frutices erecti; folia verticillata quaterna; flores sæpè terminales corymbosi.*

OPHIOXYLON, L. \* Calix 5-dentatus minimus. Corolla tubulosa filiformis, medio incrassata, limbo 5-partito. Stamina brevia. Stylus 1; stigma capitatum. Bacca didyma 2-locularis 2-sperma. *Frutex; folia 3-4 verticillata; flores glomerati terminales; masculi hermaphroditis mixti, tantum 2-andri, coronâ ad tubi faucem cylindricâ integrâ, germine nullo.*

CERBERA, L. \* AHOUAÏ T. \* *Ahouaï.* Calix 5-partitus patens. Corolla infundibuliformis, tubo clavato, fauce 5-angulari 5-dentatâ, limbo magno 5-partito obliquo. Antheræ conniventes. Stylus 1; stigma 2-lobum. Drupa magna, latere sulcata ac 2-punctata, foeta nuce ossifera 4-valvi 2-loculari 2-spermâ. *Arbores; folia alterna; flores sæpè terminales, subcorymbosi.*

CARISSA, L. \* ARDUINA, L. \* *Calac.* Calix 5-fidus aut 5-partitus parvus. Corolla multò longior tubulosa, sub fauce paululum ventricosa, limbo 5-fido. Stamina non exserta. Stylus 1; stigma simplex aut sub2-fidum. Bacca parva sphaericea 2-locularis loculis 1-2-spermis aut polyspermis, feminibus compressis dissepimento affixis. *Frutices ramis dichotomis; spinæ in dichotomiâ & in ramulis oppositæ, interdum floriferæ pedunculorum instar; folia opposita integra cum spinis decussata; pedunculi 1-2-flori aut multiflori, axillares aut terminales; bacca Carissæ L. geminata ex Linn. sed certius simplex ex Rumph. 7. t. 25. Hujus ergo congeneres Arduina L. distincta loculis 1-spermis & Antura Forst. cujus loculi 2-spermi.*

#### IV. Genera Apocineis affinia, non lactescentia.

STRYCHNOS, L. \* IGNATIA, LS. \* ROUHAMON, Aubl. \* *Vomique, Noix vomique.* Calix 5-partitus aut 5-fidus deciduus. Corolla tubulosa, limbo patente 5-fido aut 5-partito. Stamina 5. Stylus 1; stigma crassiusculum. Bacca globosa parva aut magna, cortice sæpius crustaceo fragili, 1-locularis intus pulposa, polysperma (1-sperma in *S. Potatoria* LS.) feminibus orbiculatis, aut in *Ignatiâ* LS. variè angulatis, receptaculo centrali impositis; corculum feminis tenue planum in apice perispermi cornei magni. *Arbores aut arboresculæ, non lactescentes, valdè amaræ; quædam cirrho (Rheed. Mal. 8. t. 24.) instructæ; rami oppositi teretes, apice acuminati; folia integra 3-5-nervia opposita, petiolis lineolâ junctis; flores corymbosi axillares & terminales, interdum 4-andri in Caniram Rheed. Mal. 1. t. 37. Fructus in Ignatiâ pyriformis extus drupaceus & intus subosseus polyspermus, 2-spermus capsularis parvus in Rouhamon Aubl. Guyan. t. 36. cujus*



*insuper ex Autore calix 4-fidus basi 2-squamosus, corolla 4-fida 4-andra intus villosa, foliorum axillæ sæpè cirrhosæ. Genus Carissæ paululum affine.*

**THEOPHRASTA, L. \* ERESIA, Pl. \* Coquemolliér.** Calix 5-lobus persistens. Corolla campanulata brevis, 5-loba æqualis. Stamina 5 brevia. Stylus 1; stigma 1. Capsula pomiformis magna tenuis & fragilis, 1-ocularis intus subpulposa polysperma, seminibus subrotundis, receptaculo centrali libero cylindrico affixis; corculum in perispermo albido corneo. *Arbusecula caule simplici; folia confertim subverticillata, maxima longa coriacea dentato-spinosa; (spinulæ axillares minimæ verticillatæ cauli appressæ mox caducæ, ex D. Lahaye apud Domingenses Parocho); flores inter folia conferto-corymbosi terminales; fructus & semina ferè Strychni.*

**ANASSER. \*** Calix parvus 5-fidus. Corolla longior urceolata 5-loba intus villosa. Stamina 5, laciniis corollæ alterna. Stylus 1; stigma didymum. Capsula oblonga 2-valvis, polysperma, valvis introflexis & receptaculis 2 oblongis centralibus feminiferis approximatis dissepimentum simul constituentibus, inde 2-ocularis. *Frutex Borbonicus (an lactescens?); folia opposita, inferiora caduca quibus axillares flores corymbosi. Character ex Commerf. specim. sicco innominato. Genus fructu 2-placentali & quasi 2-folliculari folliculis connexis subsimile plantæ Rumphianæ 7. t. 7. fortè congeneri & Anasser dictæ.*

**FAGRÆA, Thunb. \*** Calix campanulatus 5-partitus, laciniis apice membranaceis. Corolla infundibuliformis tubo palmari sensim dilatato, limbo contorto 5-partito. Stamina 5, tubo inserta. Germen superum; stylus 1; stigma peltatum. Bacca ovata carnosæ epidermide tecta, 2-ocularis polysperma seminibus globosis. *Frutex sub4-gonus; folia opposita; pedunculi terminales umbellatim 3-flori, pedicellis 2-bracteatis. Character ex D. Thunb. Act. Holm., cujus icon stipulas exhibet foliis intermediis: an inde suspicio germinis inferi, & ideò cum Gardeniâ & Rubiaceis affinitas?*

**GELSEMIUM. \*** Calix 5-dentatus parvus. Corolla multò longior, infundibuliformis, limbo patente 5-lobo subæquali. Stamina... (4 ex Linn.). Stylus 1; stigma... Capsula parva ovata, compresso-plana, 2-ocularis, quasi 2-follicularis, medio sulcata, 2-valvis; valvæ carinatae margine inflexo constituentes dissepimentum & ideò singulæ 1-oculares polyspermæ, tardiùs ab invicem solubiles; semina plana, apice membranacea, valvularum marginibus annexa. *Frutex (an lactescens?); folia opposita; glandulæ minimæ ciliatæ axillares, observante D. de Ramatuelle; flores axillares & terminales, lutei; fructus Coutareæ sed superus. Hæc Bignonia sempervirens L. quæ Gelseminum... &c. Carexb. 1. t. 53. Genus affine quidem Bignoniis, sed affinius Apocineis, distinctum tamen capsulâ simplici: an verè 4-andrum?*



Oss. Ordo naturalis facile definiendus, tum in caractere generali, tum in generum signis. Pluribus Monopetalis conveniens corollâ pentandrâ quinquefidâ regulari, discrepat ab iisdem succo lacteo & perispermio & limbo corollæ sæpè obliquo, & præcipuè fructu bifolliculari. Peculiaris staminum character in Asclepiade & Cynancho, iterum inquirendus in aliis ut ex partium collatione vera omnium patefcat natura. Genera baccata bilocularia à follicularibus non discedunt, ceterum similia & nullatenus aliis ordinibus pentandris addenda. Strychnos & congenere non Apocineis omninò consociandæ, licet quibusdam signis analogæ, sed in posterum numero adauctæ novum constituent ordinem inter Apocineas & Sapotas medium.

## O R D O X V.

## S A P O T Æ , L E S S A P O T I L L I E R S.

**CALIX** divisus persistens. Corolla regularis, cujus lacinia nunc divisuris calicinis numero æquales & simul appendicibus totidem interioribus alternæ, nunc duplæ appendicibus nullis. Stamina corollæ laciniis opposita & numero æqualia, aut dupla appendicibus tunc antheriferis. Germen unicum; stylus unicus; stigma plerumque simplex. Fructus baccatus aut drupaceus, uni aut multilocularis, loculis monospermis. Semina ossea nitida, hylo laterali notata. Corculum seminis planum, carnosio perispermio obvolutum. Caulis frutescens aut arborefcens. Folia alterna, sæpius integra. Flores plurimi axillares, pedunculis unifloris. Plantæ lactescentes.

**JACQUINIA**, L. \* Calix 5-partitus. Corolla campanulato-ventricosa, limbo 10-fido, cujus lacinia 5 alternæ & internæ breviores. Stamina 5. Bacca 1-sperma; semen subrotundum cartilagineum. *Arbusculæ aut frutices (lactescentes?); folia subopposita aut verticillata.*

**MANGLILLA**. \* *Manglille du Pérou*. Calix minimus 5-partitus. Corolla rotata 5-partita. Stamina 5, antheris sessilibus. Stylus 0; stigma crassiusculum. Drupa globosa 1-locularis 1-sperma. *Frutex Peruvianus; folia alterna; flores plurimi axillares. Character ex D. Dombey cui Duhamelia dicitur.*

**SIDEROXYLUM**, L. \* *Argan*. Calix 5-fidus. Corolla rotata 5-fida; appendices 5. Stamina 5 (interdum 10, appendicibus



tunc antheriferis). Drupa foeta nuce 1-spermâ (aut 5-spermâ?): Corolla appendicibus variè constructis nunc 10-fida 5-andra, nunc 5-fida 10-andra. Species quædam spinescentes, quædam semper-virentes.

**BASSIA**, L. \* *Illipé*. Calix 4-partitus coriaceus. Corolla campanulata limbo 8-partito. Stamina 16, gemino ordine. Drupa carnosula lactescens, 5-sperma, feminibus sub3-gonis oblongis.

**MIMUSOPS** L. \* Calix 8-partitus, gemino laciniarum ordine. Corolla 8-partita laciniis integris aut 3-partitis: appendices 8, squamiformes parvæ. Stamina 8. Drupa 1-2-sperma. *Hujus congener Binectaria Forsk. ex D. Vahl.*

**IMBRICARIA** Commerf. \* *Natte*, *Bois de Natte*, *Bardottier*. Calix 8-partitus coriaceus, gemino laciniarum ordine. Corolla rotata, 8-partita, laciniis multifidis; appendices 8 filiformes inflexæ. Stamina 8. Pomum 8-loculare 8-spermum, loculis & feminibus 4 aut pluribus sæpè abortivis; semina cicatriculo notata, irregularia. *Caracter ex Commerf. mss. & speciminibus siccis Borbonicis. Hinc speciem retulit 1-spermam quæ Mimusopi affiniore. Imbricaria seu imbricibus conficiendis utilis.*

**CHRYSOPHYLLUM**, L. \* **CAINITO**, Pl. \* *Caimitier*. Calix 5-partitus. Corolla campanulata 5-partita (aut 5-loba) patens. Stamina 5. Stigma sub5-fidum. Bacca magna globosa 10-locularis 10-sperma; semina compressa, cicatriculâ notata.

**LUCUMA** \* Calix 5-partitus. Corolla ovata, medio ventricosa 5-fida erecta, intus aucta 5 squamis. Stamina 5, squamis alterna. Pomum mammosum 10-loculare carnosum, loculis 1-spermis, quibusdam abortivis, feminibus 1-4 persistentibus, rotundis aut angulatis. *Caracter ex J. Justo & D. Dombey Peruv. Lucuma nomen vernaculum. Hinc Achras mammosa L.*

**ACHRAS**, L. \* **SAPOTA**, Pl. \* *Sapotillier*. Calix 6-partitus gemino laciniarum ordine. Corolla campanulata, limbo 6-fido, ad faucem aucta squamulis 6 emarginatis. Stamina 6. Pomum globosum carnosum 12-loculare 12-spermum; semina compressa, hylo longitudinali notata.

### Genera Sapotis affinia.

**MYRSINE**, L. \* Calix 5-partitus parvus persistens. Corolla 5-fida connivens. Stamina 5 brevia, epipetala, corollæ laciniis opposita. Stylus 1; stigma magnum lanigerum exsertum. Bacca foeta nuce 5-loculari 5-spermâ. *Suffrutex lactescens; folia alterna subserrata; flores plurimi axillares. Caracter ex Linnaeo.*

**INOCARPUS**, Forst. I.S. \* Calix 2-fidus. Corolla tubulosa 5-fida, laciniis longis linearibus. Stamina 10, duplici serie tubo inserta; antheræ subsessiles, non exsertæ. Stylus 0; stigma concavum. Drupa magna subcompressa ovata, apice incurva, foeta



nuce fibrosâ reticulatâ 1-spermâ. *Arbor; folia alterna integerrima venosa; flores spicati axillares, in spicis alterni bracteati. Character ex Forst. & L. Suppl. & ex Thunb. diff. qui Gajanum Rumph. 1. t. 65. tamquam synonymum adjicit.*

**OLAX**, L. \* Calix crateriformis integer. Corolla tubulosa, fauce 4-appendiculata appendicibus unguiculatis, limbo 3-lobo subæquali. Stamina 3, tubo inserta & appendicibus alterna. Stylus 1; stigma 1. Fructus... *Arbor Zeylanica glandifera, ramis alternis; folia alterna integerrima; pedunculi axillares brevissimi subramosi. Character ex Linnaeo.*

**LEEA**, Royen. L. \* Monoïca. Calix campanulatus 5-fidus. Corolla tubulosa brevis, limbo 5-fido æquali; squamulæ interiores alternæ, apice 2-fidæ. MASC. stamina 5, imæ corollæ inserta, squamulis interjecta. Stylus 1; stigma 1. Germen abortivum. FEM. Squamulæ eadem duplicatæ, interiores (staminum rudimenta?) minores. Germen superum; stylus 1; stigma lacerum. Fructus... globosus 6-ocularis 6-spermus. *Suffrutices; folia alterna pinnata; stipula sub foliis simplex semilunaris; flores corymbosi terminales. Character ex Linnaeo. Quædam generis signa Sapotis communia, quædam diversa. L. æquata Aquiliciæ congener ex Thunbergio.*

**Obs.** Ordo monopetalus regularis, sæpè pentandrus, baccatus? perispermio instructus & lactescens, indè cognatus Apocineis baccatis quæ discrepant utpotè non multiloculares, sæpè polyspermæ & oppositifoliæ. Guaiacanis in nonâ classe subsequenteribus ut & Sapotis bacca datur multilocularis loculis monospermis & perispermum idem & corolla regularis monopetala staminifera & folia alterna floresque axillares, sed diversa in his & illis corollæ insertio. Sapotis habitu similes Ilex & congeneres pariter alternifoliæ & axillifloræ & baccatæ, in singulo loculo monospermæ & ferè monopetalæ, sed Rhamnis affiniores corollâ profundè partitâ veriùs polypetalâ, staminibus & petalis invicem alternantibus, pedunculis multifloris & foliis stipulaceis: indè quædam Sapotarum cum Rhamnis analogia habitu sat simili confirmata.

## CLASSIS IX.

### PLANTÆ DICOTYLEDONES MONOPETALÆ.

#### COROLLA PERIGYNA.

**CALIX** monophyllus, interdum profundè partitus. Corolla perigyna seu inserta calici, monopetala aut



interdum profundè partita & quasi polypetala, regularis aut rariùs irregularis. Stamina corollæ aut calici inserta, definita aut rariùs indefinita. Germen simplex, superum aut inferum; stylus sæpè unicus; stigma simplex aut divisum. Fructus superus aut inferus, baccatus aut capsularis, uni aut multilocularis.

*Obs.* Corolla utpotè monopetala & perigyna, bis determinat calicem monophyllum; ut perigyna tantum, admittit germen cum calice supero inferum simplex, cum infero superum simplex aut multiplex, propriæque variat insertionis gradum ab imâ calicis parte ad summam, indè modò germini supera, modò infera; ut monopetala duntaxat, germen indicat unicum; stylum frequentius simplicem, stamina sæpiùs definita & sæpiùs epipetala.

Præmissâ in Monopetalis corollarum hypogynarum serie, nunc dicendum de perigynis quæ inverso præcedentium more indiscriminatim superæ sunt aut inferæ, staminiferæ aut non staminiferæ. Diversus primò corollæ perigynæ situs: ea quippè nunc imò inserta calici propè germinis basim, infera habetur ac ferè hypogyna ut in Diospyro, Kalmiâ, Ericâ &c.; nunc supera ac quasi epigyna summo insigitur calici cujus pars inferior germini adnata cum ipso concrescit, ut in Campanulâ, Vaccinio, Halesiâ &c. Corolla hæc omninò infera in Rhododendris, semper supera in Campanulaceis, partim infera & partim supera in Guaiacanis & Ericis. Facilius igitur, eâ mediante, progressio à corollis hypogynis ideò inferis ad epigynas certò superas. Hæc de corollæ situ: dispar etiam situs staminum quæ aut corollæ monopetalæ inseruntur servatâ lege communi, aut eâdem infirmatâ quandoque innascuntur calici sub corollâ versùs punctum quo calix à germine discedit. Ambigua indè nonnunquàm insertio partium ac difficilè statuenda, ad hypogynam aut perigynam vergens, quæ tunc analogiâ auxiliante conjectatur deducta ex notiore in plantis confinibus eâdem insertionem. Cur autem generalis subvertitur in perigynis insertionum modus; cur prætereâ more appendicis calicinæ marcescens persistit corolla monopetala non staminifera, ut in Ericis & Campanulaceis? An insertio ambigua marcescentiam determinat aut ab eâ deducitur; an in iisdem ordini-



bus verè immutatur corollæ indoles & ideò faciliùs deſcendantur in exortu ſtamina , ſalvâ tunc lege quæ corollas monopetalas ſtaminibus plerumque ſubjicit ? Altera in perigynis lex infringitur quæ corollis monopetalis ſtamina ſæpiùs conſociat definita : dantur enim indefinita in Hopeâ , Symploco & aliis inter Guaiacanas recensitis ; ſed corolla in iis profundè partita , ideò quaſi polypetala ut in Malvaceis , legem penès reſtituit. Quædam aliæ plantæ pseudo-polypetalæ in Rhododendris , Ericis & Campanulaceis extant , iis ordinibus cæterùm affines nec proptereâ diſtrahendæ , quæ tantummodò quamdam Polypetalorum cum Monopetalis analogiam indicant.

Quadruplex in claſſe dinumeratur ordo ſufficientibus ſignis designatus. Fructus in Guaiacanis ſuperus aut inferus , ſæpè baccatus loculis monospermis ; in Rhododendris capſularis ſuperus loculis polyspermis , valvis margine introflexis ; in Ericis capſularis aut baccatus , ſuperus aut inferus , loculis polyspermis , valvis medio ſeptiferis ; in Campanulaceis capſularis inferus lateribus dehifcens loculis polyspermis. Hinc omninò eliminandæ Cucurbitaceæ antea claſſi adjectæ , ſed verè apetalæ & diclines , ideò ad decimam quintam depellendæ.

## O R D O I.

## G U A I A C A N Æ , L E S P L A Q U E M I N I E R S .

**C**ALIX monophyllus , apice diviſus. Corolla imo aut ſummo calici inſerta , monopetala lobata aut profundè partita. Stamina corollæ inſerta , nunc definita & ejuſdem diviſuris numero æqualia aut dupla , nunc indefinita filamentis ſæpè baſi monadelphis aut polyadelphis. Germen in plurimis ſuperum , in paucis inferum aut ſemiinferum ; ſtylus unicus ; ſtigma ſimplex aut diviſum. Fructus ſuperus aut quandoque inferus , capſularis aut ſæpiùs baccatus , multilocularis loculis monospermis. Corculum ſeminis planum in perispermo carnoſo. Caulis fruteſcens aut arboreſcens ; folia alterna ; flores axillares.



## I. Stamina definita.

**DIOSPYROS**, L. \* **GUAÏACANA**, T. \* **EBENUS**, Commerf. \* *Plaqueminer, Ebenier.* Calix 4-6-fidus sæpè urceolatus. Corolla imo calici inserta, urceolata 4-6-fida. Stamina 8-16 brevia, antheris interdum effœtis, imæ corollæ inserta. Germen superum; stylus brevis, 4-fidus; stigmata 4, quandoque 2 fida. Bacca supera, calici patenti insidens aut eodem cupulæformi infrà cincta, sæpè magna, 8-12-locularis 8-12-sperma; semina compressa amygdaliformia. *Arbores aut frutices; flores axillares subsessiles, in distinctâ arbore alii masculi germine abortivo & filamentis 8 diantheris, alii fœminei germine fertili & filamentis 8 monantheris effœtis, loculis in fructu quibusdam interdum abortivis. An species quædam verè polyandra?*

**ROYENA**, L. \* Calix urceolatus 5-fidus. Corolla imo calici inserta, urceolata brevis 5-loba. Stamina 10, filamentis brevibus corollæ insertis. Germen superum desinens in stylos 2; stigmata 2. Capsula supera 4-fulca 1-locularis 4-valvis; nuces 4 trigonæ arillo obvolutæ. *Arbusculæ; flores axillares sæpè pedunculati, interdum fœminei antheris effœtis.*

**POUTERIA**, Aubl. \* Calix 4-partitus persistens. Corolla imo calici inserta, tubuloso-ventricosa, 4-fida sinibus 1-fetosis. Stamina 4, imæ corollæ inserta. Germen superum; stylus 1; stigma 4-fidum. Capsula ovata hispida, 4-valvis, singulis valvis intus semine 1 amygdaliformi arillato instructis. *Arbor ramis apice foliosis; pedunculi 2-3, sæpè axillares 1-flori. Caract. ex Aubl. Guyan. t. 33. An corculum perispermio instructum?*

**STYRAX**, T. L. \* *Aliboufier.* Calix urceolatus integer aut 5-dentatus. Corolla imo calici inserta, tubo brevi, limbo 3-7-partito. Stamina 6-16, filamentis basi coalitis & corollæ tubo insertis; antheræ oblongæ erectæ. Germen superum; stylus 1; stigma 1. Drupa supera, exsucca coriacea, fovens nucem 1 ossream 1-spermam sphaericam aut nuces 2 hinc convexas inde planas. *Arbores aut frutices; flores axillares aut & terminales solitarii aut fasciculati. An genus potiùs polypetalum indeque Meliis affine?*

**HALESIA**, Ell. L. \* Calix minimus 4-dentatus. Corolla magna, campanulato-ventricosa, ore sub 4-lobo. Stamina 12-16, filamentis basi in tubum connatis & corollæ adnatis; antheræ oblongæ erectæ. Germen inferum; stylus 1; stigma 1. Nux corticata oblonga 4-gona angulis alatis, stylo persistente acuminata, 4-locularis (2-locularis ex Linn.) 4-sperma, loculis 2-3 sæpè abortivis. *Character ex Ellisio. Frutices; pedunculi plures axillares 1-flori. Fructus alæ in H. tetrapterâ æquales, in H. dippterâ 2 oppositæ cæteris minores.*



## I I. Stamina indefinita.

**ALSTONIA**, Mut. LS. Calix imbricatus squamis 4-5 interioribus & maioribus. Corolla tubo brevi, limbo 8-10-partito æquali, laciniis alternis interioribus. Stamina numerosa, imbricatim tubo inserta, exteriora longiora. Germen superum; stylus 1; stigma capitatum. Fructus.... *Frutex habitu Thæ*; *flores plurimi axillares. Character ex L. Suppl. An corculum perispermio inclusum?*

**SYMPLOCOS**, Jacq. L. \* Calix 5-fidus parvus. Petala 5, basi in tubum coalita, apice patentia. Stamina numerosa sub 3-4-plici serie tubo corollæ in orbem accreta, inferiora breviora; antheræ subrotundæ. Germen superum; stylus 1; stigma sub 3-fidum. Fructus.... *Arbuseula. Character ex Jacq. & Linn. An huc rectè retulit Linnaeus Confer Loeft. it. 309, cui calix tubulosus 2-dentatus, petala 4, stamina 20 in 4 fasciculos digesta? An Ciponimæ congener? An corculum perispermio inclusum?*

**CIPONIMA**, Aubl. \* Calix 5-fidus villosus. Corolla tubulosa longior, limbo 5-partito patente. Stamina plurima, duplici ordine inserta faucibus corollæ, inæqualia, filamentis basi coalitis, antheris subrotundis. Germen superum aut semisuperum; stylus 1; stigma capitatum. Bacca infera pisiformis, intra coronantes calicis lacinias prominula, foeta nuce 5-loculari 5-spermâ. *Arbuseula ramulis villosis; folia juniora villosa; flores axillares bracteati. Character ex Aubl. Guyan. t. 226 & ex sicco. Confer cum Symploco & Hopeâ. An corculum perispermio inclusum?*

**PARALEA**, Aubl. \* Calix 4-fidus. Corolla crassa tubo brevi; limbo 4-fido. Stamina 18, inæ corollæ inserta; antheræ subrotundæ non exsertæ. Germen... Fructus... *Arbor; flores glomerati axillares subsessiles, fortè masculi, bracteis distincti. Character ex Aubl. Guyan. t. 231. Confer cum Ciponimâ.*

**HOPEA**, Gard. L. \* Calix campanulatus 5-fidus. Petala 5, staminum fasciculis connexa. Stamina plurima, filamentis in 5 corpora connatis. Germen inferum, stylus 1 sensim incrassatus persistens; stigma 1. Drupa sicca oblonga calice coronata; nux glabra 3-locularis, loculis 2 sæpè abortivis. *Arbor tinctoria; flores axillares, foliis præcociore, in spicam brevissimam dispositi. Character ex Linn. An præmissa quædam genera huc referenda? An corculum perispermio inclusum?*

*Oss.* Saporis proxima Diospyros utpotè frutescens alternifolia axilliflora, monopetala definitè staminifera, monostyla, baccata germine supero & loculis monospermis seminibusque perispermio instructis; sed discrepat insertione corollæ perigynâ. Plurima igitur, ipsâ mediante, inter Sapotas & Guaiacanas inest affinitas & naturali conjugantur nexu duæ classes. Guaiacanis adjuncta Styrax Halesiam & Hopeam cate-



rasque polyandras secum trahit, quas tamen signa quædam ad Polypetalas repellunt non procul à Meliis : hæc igitur scrutanda iterum genera, definiendusque in iis corollæ modus, habitâ ratione numeri staminum & eorundem monadelphix aut polyadelphix.

## ORDO II.

### RHODODENDRA, LES ROSAGES.

**CALIX** divisus persistens. Corolla imo calici inserta, nunc monopetala lobata, nunc quasi polypetala limbo profundè partito. Stamina definita distincta, in monopetalis corollæ inserta, in polypetalis immediatè imo calici infixa. Germen superum; stylus unicus; stigma simplex, sæpè capitatum. Capsula supera multilocularis multivalvis, valvis utroque margine introflexo singulis loculum constituentibus polyspermum, & axi centrali annexis; semina minuta. Caulis fruticosus aut suffrutescens. Folia alterna, aut rariùs opposita; juniora in plurimis margine revoluta.

#### I. Corolla monopetala.

**KALMIA**, L. \* Calix 5-partitus. Corolla campanulata patens; limbi margine erecto sub5-fido, intrâ marginem intus 10-foveata, extus 10-papillaris. Stamina 10, imæ corollæ inserta, filamentis recurvis, antheris in foveas immerfis. Capsula 5-locularis. *Flores spicati aut subcorymbosi, axillares aut terminales, pedicellis longis 1-floris basi 3-bracteolatis. Folia K. angustifoliæ subverticillata, juniora margine revoluta.*

**RHODODENDRUM**, L. \* **CHAMÆRHODODENDROS**, T. \* *Rosage.* Calix 5-partitus. Corolla subinfundibuliformis, limbo patente 5-lobo. Stamina 10 declinata. Capsula 5-locularis. *Flores axillares aut terminales, spicati aut subcorymbosi, pedicellis longis 1-floris basi bracteolatis. Gemmæ in plurimis terminales imbricatæ.*

**AZALEA**, L. \* **CHAMÆRHODODENDROS**, T. \* *Azalée.* Calix 5-partitus. Corolla infundibuliformis aut campanulata, 5-fida inæqualis. Stamina 5, sub pistillo inserta. Capsula 5-locularis. *Flores axillares aut terminales, subsolitarii aut racemosi, bracteolati. Folia A. procumbentis opposita, margine revoluta.*



## I I. Corolla subpolypetala.

**RHODORA**, L. \* Calix minimus 5-dentatus. Corolla 2-petala oblonga connivens; petalum superius profundè partitum lobis angustis, quasi 2-petalum; inferius latius, apice 3-lobum. Stamina 10, disco hypogyno aut calicino inserta; filamenta æqualia declinata; antheræ didymæ poro gemino suprâ dehiscences. Capsula 5-locularis ex *Duham.* *Habitus Azalæ*; folia juniora revoluta; flores fasciculati terminales. *Caracter ex vivo.* Genus priscum Linnæi, ab eodem recentius omissum, idem cum *Chamærhododendro* *Duham.* *Sem. app.* 10. t. 27. f. 2.

**LEDUM**, L. \* Calix minimus 5-dentatus. Petala 5. Stamina 10, antheris oblongis erectis. Capsula stylo acuminata 5-locularis. *Folia margine revoluta & subtus luteo-tomentosa; flores spicato-corymbose terminales, pedicellis longis 1-floris basi bracteatis.*

**BEFARIA**, Mut. L. \* Calix subventricosus 7-fidus. Petala 7 (hypogyna ex *Linn.*). Stamina 14, alterna minora; antheræ incumbentes. Stigma crassiusculum 7-striatum. Bacca exsucca, stylo acuminata, calice cincta, 7-gona, 7-locularis. *Flores terminales congesti aut racemosi. Caracter ex Linn. & LS. An affinior Ericis?*

**ITEA**, L. \* Calix minimus 5-fidus. Petala 5. Stamina 5; antheræ incumbentes. Capsula stylo mucronata, 2-locularis 2-valvis. *Flores spicati terminales.*

*Obs.* Fructus capsularis, semper superus, valvis dehiscens, in loculis polyspermus, à Guaiacanis abundè discernit *Rhododendra*. Hæc aliundè plurimum *Ericis* affinia, discrepant antheris non bicornibus & præcipuè valvis fructus introflexis. Genera polypetala ab ordine non dimovenda, *Monopetalarum* & *Polypetalarum* cognationem confirmant.

## O R D O I I I.

## E R I C Æ , L E S B R U Y E R E S.

**CALIX** monophyllus persistens, nunc superus, nunc sæpius inferus profundè partitus. Corolla monopetala, interdum profundè partita, summo aut sæpius imo calici aut glandulæ calicinæ inserta, sæpè marcescens ac persistens. Stamina definita distincta, ibidem inserta, aut rariùs ex imâ corollâ enata; antheræ sæpè basi bicornes. Germen superum aut rariùs inferum; stylus



unicus; stigma sæpiùs simplex. Fructus superus aut inferus, multilocularis polyspermus, baccatus aut sæpiùs capsularis multivalvis, valvis medio septiferis & axi centrali infrà affixis; semina plerumque minuta. Caulis fruticosus aut suffrutescens aut herbaceus. Folia alterna, aut opposita, aut verticillata.

### I. Germen superum.

**CYRILLA**, Gard. L. \* Calix minimus 5-partitus. Corolla parva 5-partita marcescens. Stamina 5 non exserta; antheræ cordatæ. Stigma 2-fidum. Capsula stylo mucronata 2-locularis 2-valvis. *Frutex ramis fasciculatis aut subverticillatis, verticillis distantibus; folia alterna; spicæ floram summis ramulis intermixtæ. An valvæ fructûs medio septiferæ?*

**BLÆRIA**, L. \* Calix 4-partitus laciniis linearibus. Corolla campanulata tubo cylindraceo, limbo 4-lobo. Stamina 4; antheræ oblongæ emarginatæ non 2-cornes, sæpè exsertæ. Capsula 4-angularis 4-locularis angulis dehiscens; semina pauca. *Suffrutices Erica facie; folia 4 verticillata minuta; flores capitati terminales aut sparsi.*

**ERICA**, T. L. \* *Bruyère*. Calix 4-partitus, interdum duplicatus. Corolla campanulata, sæpè ventricosa, 4-fida. Stamina 8; antheræ 2-cornes aut emarginatæ, exsertæ aut latentes. Stigma sub4-lobum. Capsula 4-locularis 4-valvis, calice cinctâ. *Suffrutices; folia minuta, opposita aut verticillata aut sparsa; flores axillares aut terminales, variè dispositi.*

**ANDROMEDA**, L. \* **ERICA**, T. \* *Andromède*. Calix minimus 5-partitus. Corolla campanulata aut globosa, 5-fida laciniis reflexis. Stamina 10 non exserta. Capsula 5-locularis 5-valvis. *Suffrutices; folia alterna aut rariùs opposita, in A. marianâ margine revoluta; flores axillares aut terminales.*

**ARBUTUS**, T. L. \* **UVA URSI**. T. \* *Arbousier, Bufferoie*. Calix minimus 5-partitus. Corolla ovata, limbo parvo 5-fido revoluta. Stamina 10 non exserta. Bacca 5-locularis loculis in *Arbuto* T. polyspermis, in *Uva ursi* T. 1-spermis. *Frutices aut suffrutices; folia alterna; flores axillares aut terminales, subracemosi. Receptaculum germinis 10-punctatum. Bacca A. Unedonis granulata Fragarioides.*

**CLETHRA**, Gron. L. \* Calix 5-partitus. Corolla 5-partita, quasi 5-petala petalis basi latis. Stamina 10 non exserta. Stigma sub3-lobum. Capsula subrotunda calice cinctâ 3-locularis apice 3-valvis. *Frutices; folia alterna; flores spicati axillares & terminales, singuli 1-bracteolati.*

**PYROLA;**



**PYROLA**, T. L. \* *Pyrola*. Calix minimus 5-partitus. Corolla 5-partita, quasi 5 petala connivens petalis basi latis. Stamina 10 non exserta. Stigma 5-crenulatum. Capsula 5-locularis 5-valvis. *Suffrutices aut herbæ; folia alte nuda aut subv. ciliolata, pleræque redicallia; flores 1-bracteolati terminales, spicati aut rarius umbellati vel foliarii.*

**EPIGÆA**, L. \* Calix 5-partitus, caliculo 3-phyлло cinctus seu 3-bracteatus. Corolla hypocrateriformis, basi tubulosa, limbo patente 5-partito. Stamina 10 non exserta, inæ corollæ inserta; antheræ oblongæ. Stigma tub. 5-fidum. Capsula 5-locularis 5-valvis, receptaculo 5-partito. *Suffrut. repens semper-virens; folia æterna; flores bracteolati, dense racemosi, axillares & terminales.*

**EPACRIS**, Forst. LS. \* Calix 5-partitus. Corolla infundibuliformis, tubo in limbum 5-fidum ampliato. Stamina 5 brevia, tubo inserta; antheræ non 2-cornes. Germen squamulis 5 minimis infra cinctum. Capsula 5-locularis 5-valvis. *Frutices aut herbæ; folia imbricata aut sparsa; flores subsolitarii aut racemosi. Character ex Forst. & L. Suppl.*

**GAULTHERIA**, Kalm. L. \* **VITIS IDEA**, T. \* Calix campanulatus 5-fidus, extus 2-squamosus. Corolla ovata, limbo tub. 5-fido revoluta. Stamina 10, inæ corollæ inserta, filamentis hirsutis, antheris apice 2-cornibus; squamulæ 10, filamentis interjectæ minimæ, germen cingentes. Capsula 5-locularis 5-valvis, testâ calice baccato, suprâ pervio. *Suffrutex humilissimus; folia alterna aut fasciculata; flores axillares subsolitarii.*

**BROSSÆA**, Pl. L. \* Calix 5-fidus laciniis oblongis. Corolla corollæ, calici æqualis, apice angustata & truncata, limbo integro aut crenulato. Stamina 5. Capsula 5-tulca 5-locularis testâ calice persistente ampliata carnosâ connivente, 5 fissuris pervio. *Frutex multicaulis; folia alterna; flores solitarii axillares aut 2-3 terminales, pedicellis 2-bracteatis. Character ex Plum. & Linn. An stamina perigyna & 2-cornia; an germen semiinferum; an valvæ fructibus medio septiferae?*

## I I. Germen inferum aut semiinferum.

**ARGOPHYLLUM**, Forst. LS. \* Calix semisuperus 5-fidus. Petala 5 aut corolla 5-partita; tubus interior (nectarium Forst.) 5-gonus pyramidatus apice angustior truncatus & limbo fimbriatus. Stamina 5 intrâ tubum, calici inserta brevia, non 2-cornia. Germen semiinferum. Capsula calici accreta, 3-locularis trifariam dehiscens. *Frutex sericeus nitidus; folia alterna; flores paniculati axillares. Character ex Forst. & L. Suppl. Genus recognoscendum.*

**MÆSA**, Forsk. \* Calix semisuperus 5-dentatus, squamulâ duplici



infra persistente cinctus. Corolla campanulata 5-fida. Stamina 5 (corollæ inserta?) breviora; antheræ ovatae. Germen semiinferum. Bacca semiinfera globosa, stylo acuminata, laciniis calicinis conniventibus supra tecta, 1-locularis polysperma, seminibus receptaculo centrali affixis. *Arbuscula; folia alterna; flores bracteolati, alternè paniculati, axillares & terminales. Character ex Forsk. Hinc referenda Bæobotrys Forst., ipso suadente Forstero. An fructus utriusque verè 1-locularis? Confer etiam Aucubam Thunb. habitu non prorsus ab similem, sed quibusdam signis diversam.*

**VACCINIUM**, L. \* **VITIS IDÆA**, T. \* **OXYCOCCUS**, T. \* *Airelle; Myrtille, Canneberge*. Calix superus 4-dentatus aut integer. Corolla campanulata 4-fida laciniis reflexis (4-partita omnino reflexa in *Oxycocco* T.). Stamina 8, non epipetala, quandoque exserta; antheræ 2-cornes & dorso 2-aristatae. Germen inferum. Bacca parva infera globosa umbilicata, 4-locularis oligosperma. *Frutices aut suffrutices gemmacei, squamis gemmarum sæpe persistentibus in ramulorum basi; folia alterna, in quibusdam sempervirentia; flores pedicellati, solitarii axillares aut plurimi terminales bracteati, interdum 5-fidi 10-andri. Corculum seminis Oxycocci tenue, in perispermio carnosio centrale: an idem in cæteris?*

### III. Genera Ericis affinia.

**EMPETRUM**, T. L. \* *Camarine*. Dioicum. Calix 3-partitus persistens. MASC. Petala 3 marcescentia. Stamina 3, filamentis longis, antheris brevibus 2-partitis. FÆM. Germen superum depressum; stylus 0 aut brevissimus; stigmata 9, reflexo-patentia. Bacca orbiculata depressa, 9-sperma seminibus in orbem dispositis. *Character ex Linnæo. Suffrutices; folia conferta, alterna aut subverticillata, minima, margine integro revoluta subtilius concava; flores sessiles, axillares aut terminales. Vidi in E. nigro flores nunquam masculos, interdum fæmineos filamentis 3 sterilibus, sæpe hermaphroditos filamentis unico fertili. E. album verè dioicum ex D. Correa, & fructu 3-spermo instructum ex Clusio. Hinc eliminandum E. pinnatum Lamark Dict. Ancistro & Cliffortiæ affine. An contrà hinc revocanda Grubbia Berg. Cap. frutex ramis oppositis, foliis oppositis linearibus margine revolutis, floribus sessilibus axillaribus, cui ex Bergio calix 2-phyllus 2-3-florus, petala 4, stamina 8, germen 1, stylus 1, stigma 1, receptaculum proprium hirsutum? In specimine ejusdem fructifero vidi duntaxat nucem subbaccatam compressam, calice 2-phyllis infra cinctam, supra villosam, stylis 2-3 distantibus totidemque loculis 1-spermis uno ordine dispositis instructam: an flores verè distincti & fructus coadunati?*

**HUDSONIA**, L. \* Calix 3-partitus connivens tubulosus oblongus. Corolla 0 (Petala 5 minima ex Berg.). Stamina 15 non exserta; antheræ subrotundæ. Germen superum; stylus 1;



stigma 1. Capsula cylindrica, calice brevior 1-locularis 3-valvis 3-sperma. *Suffrutex Ericæ facie, ramosissimus; folia subulato-acerosa, subimbricata, in ramulis hirsuta & confertiora, undè q. aff. gemmae terminales; pedunculi è gemmis axillares filiformes 1-flori, basi multibracteolati. Character ex Linnæo & Berg. act. Holm. 1778.*

Obs. Ericarum sectio duplex, altera germine infero Rhododendris affinis, sed dispar antheris & septo valvarum medio, altera germine infero similior Campanulaceis, ab iis tamen discedens habitu & defectu succi lactei & antheris & fructu non lateribus dehiscente. In plerisque generibus licet monopetalis stamina non corollæ sed calici innascuntur, irriti insertionum staminearum regimine generali; sed tunc corolla non staminifera plerumque marcescit, tardiusque decidua appendicem calicis internam quadamtenus mentitur, staminei oneris facilius immunem. Numerum partium corollæ quandoque minoris esse momenti in ordine definiendo comprobant genera quædam polypetala, verè Ericoidea & hinc dimoveri nescia. Empetro & Hudsoniæ habitus pariter Ericoideus, sed nondum certus character. Semina in integro ordine enucleanda, ut de perispermi præsentia aut defectu constet.

## ORDO IV.

### CAMPANULACEÆ, LES CAMPANULACÉES.

**CALIX** superus limbo diviso, rarò semiinferus. Corolla summo calici inserta, sæpiùs regularis limbo diviso, plerumque marcescens. Stamina ibidem inserta sub corollâ, hujus laciniis plerumque alterna & numero æqualia, sæpiùs quinque, antheris distinctis aut interdum coalitis. Germen inferum, aut rarò semiinferum, suprâ glandulosum; stylus unicus; stigma simplex aut divisum. Capsula infera aut rarò semiinfera, plerumque trilocularis, interdum bi quinque aut sexlocularis, sæpiùs polysperma & lateribus dehiscens; semina angulo loculorum interiori affixa. Herbæ aut rariùs frutices, lactescentes. Folia sæpiùs alterna. Flores distincti aut rariùs in calice communi aggregati.

#### I. Antheræ distinctæ.

**CERATOSTEMA.** \* Calix turbinatus 5-fidus, laciniis magnis. Corolla coriacea, tubuloso-cilindrica, limbo 5-fido erecto. Sta-



mina 10 perigyna, filamentis brevibus, medias intercidentibus antheras longissimas erectas apice attenuato 2-furcas. Stigma 1. Capsula?... calicinis laciniis coronata, subtomentosa, 5-torosa, 5 locularis polysperma. *Frutex* (an l. et scens?); folia coriacea sessilia; flores coriacei magni, laxè spicati terminales pedicellis bracteatis. *Caract. ex sicco* Jos. Jussæi specimine Peruviano quoad fructum immaturo. Genus hinc *Vaccinio* & *Ericis*, indè *Campanuli* affine. Στεμα Κεφατος stamen cornutum. Hujus fortè congener *Chupalon* planta Peruviana à D. la Condamine delineata, memorata ab Adansonio, & p. 624 ad Ant. Jussæum missâ tantummodò innotescens Europæis, cui ex icone cal. x superus 5-dentatus, corolla supera tubulosa subcylindrica limbo coarctata 5-dentata, stamina 10 epipetala filamentis brevibus, antheræ longæ erectæ à basi 2-partiæ, alteræ inf. longiores, germen semiinferum, stylus 1 longus, stigma sub 5-fidum, bacca infera pomiformis 5-locularis polysperma, caulis subfrutescens, folia alterna, flores plurimi axillares & terminales latè rubentes, bracteis magnis concoloribus cincti; discrepat præcipuè dentibus calicis, staminum formâ & situ, & fructu baccato: an affinior, *Vaccinio* & *Ericis*?

**FORGESIA**, Commerf. \* Calix turbinatus 5-fidus. Corolla 5-partita, quasi 5-petala petalis basi latè junctis, acutis, intus furfuraceis. Stamina 5; antheræ oblongæ filamentis adnatæ. Stigma 2 lobum. Capsula semiinfera 2-locularis polysperma, apice 2-valvis & stylo 2-partito persistente acuminata. *Arbor* (non lactescens?); folia coriacea; flores laxè racemosi terminales & axillares, pedunculis & pedicellis bracteatis; fructus rarissimè 3-styli & 3-loculares. *Caract. ex Commerf. mss. & herb. Borb.* Affinis Campanulaceis utpotè 1-petala, *Onagris* aut & *Heuchera* inter *Saxifragas* utpotè polypetala & 2-styla. Nomen à D. Desforges insulæ Borbonicæ gubernatore, Commerf. laboris fautore.

**MINDIUM**. \* Calix 8-fidus. Corolla campanulata 8-fida. Stamina 8. Stigma 8-radiatum. Capsula 8-locularis polysperma, calicinis laciniis coronata. Flores laxè spicati terminales. *Habitus Campanulæ*, sed diversus partium numerus. In *Dalech. Hist. app. p. 33* delineatur dictum à *Rauvolfio* *Mindium Rhazis*.

**CANARINA**, L. \* **CAMPANULA**, T. \* Calix 6-fidus. Corolla campanulata 6-fida. Stamina 6 filamentis basi latioribus. Stigma 6-partitum. Capsula 6-locularis. Folia opposita; flores in ramulorum dichotomiâ terminales solitarii.

**CAMPANULA**, T. L. \* *Campanule*. Calix nunc 5-fidus, nunc 10-fidus laciniis 5 reflexis. Corolla campanulata 5-fida. Stamina 5, filamentis basi latioribus; antheræ longiores erectæ. Stigma 3-partitum. Capsula 3-locularis, rariùs 5-locularis, formâ varians. *Herbæ* aut rariùs suffrutescentes; flores bracteati, nunc axillares solitarii aut fasciculati, nunc terminales spicati aut paniculati aut rariùs solitarii. Corolla C. pentagoniæ rotata. Eadem irregularis in C. *Erino* cui insuper stigma 1 & capsula apice dehiscens, & folia floralia op-



*posita. An genus dividendum ratione laciniarum calicis & loculorum capsulæ?*

TRACHELIUM, T. L. \* Calix 5-fidus. Corolla infundibuliformis, tubo longo, limbo 5-lobo Stamina 5, filamentis non basi dilatatis. Stigma globosum. Capsula 3-locularis. Flores corymbosi terminales bracteolati.

ROELLA, L. \* Calix turbinatus 5-fidus laciniis magnis dentatis. Corolla infundibuliformis limbo 5-partito. Stamina 5, filamentis basi latioribus. Stigma 2-fidum. Capsula cylindrica 2-locularis, calicinis laciniis coronata. Folia ciliata, circa florem conferta bractearum inter; flores terminales aut axillares, solitarii.

GENERIA, Pl. L. \* Calix 5 fidus. Corolla tubo crassiusculo incurvo & suprâ coarctato, fauce infundibuliformi, limbo 5-lobo, laciniis 2 superioribus concavis, 3 inferioribus planis patentibus. Stamina 4 didynama. Stigma capitatum. Capsula subrotunda 2-locularis, calice coronata. Herbae aut frutices; pedunculi axillares multiflori, floribus bracteatis. Hujus congener Cranio-laria fruticosa L. & fortè Martynia perennis L. licet oppositifolia.

CYPHIA, Berg. \* LOBELIA, L. \* Calix turbinatus limbo 5-partito. Corolla 5-partita, quasi 5-petala petalis basi latis conniventibus, apice patentibus. Stamina 5, filamentis pilosis basi coalitis, antheris oblongis. Stigma truncatum pubescens, hinc cernuum. Fructus... Radix tuberosa; caulis herbaceus simplex; folia digitata aut lobata; flores spicati terminales 1-bracteati, bractea lobatâ. Character ex Bergio. Hinc Lobelia bulbosa L.

SCÆVOLA, L. \* LOBELIA, Pl. \* Calix 5-fidus. Corolla irregularis tubulosa, suprâ longitudinaliter fissa, limbo 5-fido inæquali, laciniis infrâ secundis. Stamina 5. Stylus per corollæ fissuram erumpens; stigma villosum complanatum. Drupa subrotunda nuda aut calicinis laciniis coronata, foeta nuce rugosâ 2-loculari 2-spermâ Frutices (non lactescentes?); folia crassiuscula, petiolo villis axillaribus instructo, inferiora decidua vestigiis persistentibus; flores 2-bracteati dichotomè corymbosi axillares, dichotomiis 2-bracteatis. Hujus congener Bela-modagan Rheed. Mal. 4. t. 59.

PHYTEUMA, L. \* RAPUNCULUS, T. \* Calix 5-fidus. Corolla rotata, tubo brevissimo, laciniis 5 longis linearibus. Stamina 5. Stigma 3-partitum. Capsula 3-locularis. Flores nunc sparsi, nunc sæpius in caule simplici densè capitati aut spicati terminales, singuli bracteolari ut in Plantagine. P. spicatae stigma 2-partitum & capsula 2-locularis.

I I. Antheræ connatæ.

LOBELIA, L. \* RAPUNTUM, T. \* TRACHELIUM, T. \* Calix 5-dentatus. Corolla irregularis, suprâ longitudinaliter fissa,



limbo 2-labiato 5-fido inæquali, suprâ 2-partito, infrâ 3-fido majore. Stamina 5, antheris in tubum connatis. Stigma simplex hispidum. Capsula 2-3-locularis, apice dehiscens. *Caulis prostratus aut erectus, interdum suffrutescens; flores 2-bracteolati solitarii axillares, aut 3 bracteolati laxè spicati terminales. L. longifloræ corolla longissima tubulosa, stigma 2-fidum.*

**JASIONE**, L. \* **RAPUNCULUS**, T. \* Calix 5-fidus. Corolla rotata, tubo brevissimo, laciniis 5 longis linearibus. Stamina 5, antheris in tubum coalitis. Stigma 2-fidum. Capsula 5-gona 2-locularis, calice coronata. Flores aggregati in calice communi polyphyлло suprâ receptaculum nudum. *Caules sæpè simplices. Capitula terminalia solitaria; flores centrales sæpè abortivi stigmate indiviso. Habitus Scabiosæ.*

**Obs.** Genuinus ordo affinis hinc Ericis mediante Ceratostemate, inde Onagris juvante Cyphia aut Saxifragis favente Forgefiâ. A prioribus discrepat præcipuè fructûs dehiscentiâ laterali & antherarum formâ, à cæteris corollâ monopetalâ, ab omnibus succo lacteo. Petala Forgefiæ & Cyphiæ basi latâ juncta, non ut in Saxifragis & Onagris unguiculata, corollam velût monopetalam indicant. Campanulacæ Cichoraceis subsequentiis similes utpotè alternifoliæ, lactescentes, monopetalæ germine infero, quædam floribus aggregatis & antheris connatis, dissident ab iisdem corollæ formâ & insertione perigyna, staminibus non epipetalis, fructu capsulari polyspermo.

## CLASSIS X.

### PLANTÆ DICOTYLEDONES MONOPETALÆ.

#### COROLLA EPIGYNA. ANTHERÆ CONNATÆ.

**FLORES** tubulosi, aggregati sæpiùs plures in calice communi (indè *compositi* dicti), suprâ receptaculum commune, nudum aut paleis pilisve tectum. Calix proprius nullus (nisi talis rectiùs habeatur cuticula feminis & pappus ipsi sæpè continuus). Corolla monopetala, tubulosa, epigyna seu pistillo imposita, in aliis flosculosa seu limbo regulari sæpiùs quinquefido, in aliis ligulata seu limbo producto in ligulam lateralem, apice integram aut dentatam. Stamina de-



fnita, sæpiùs quinque, filamentis distinctis & corollæ insertis, antheris in tubum coalitis (in ultimâ Corymbiferarum serie tantummodò approximatis). Germen inferum simplex, impositum receptaculo communi; stylus unicus, trajiciens antherarum tubum; stigma sæpè bipartitum, rarò simplex. Semen unicum, nudum, aut coronatum pappo. Corculi perispermo destituti radícula inferior. Flores in eodem calice nunc flosculosi omnes, nunc omnes ligulati, nunc radiati seu centrales flosculosi, marginales ligulati.

*Obs.* Corolla monopetala indicat stylum unicum, stamina epipetala & definita; eadem epigyna determinat germen inferum, calicem proprium (dum adest) germi accretum ideoque monophyllum superum. Calix germi infero non staminifero deficiens exigit corollam adstantem, monopetalam, epigynam & staminiferam.

Antherarum coalitio præcipuum dat in classe characterem, non tamen in omnibus eundem absolutè. Non coalescunt enim, sed approximantur tantùm in quibusdam generibus inter Compositas & Dipsaceas mediis, ad Corymbiferarum calcem repositis usquedùm novum fortè constituent ordinem. Divisionum characteres in Compositis Tournefortius à corollæ formâ, Linnæus à sexuum præsentia aut defectu deprompserat, uterque deflectens à naturâ quæ sæpè radiatis flosculosos assimilât flores, nec separat genera ob merum staminum aut pistilli abortum. Naturæ accommodatior Vaillantii distinctio in Cichoraceas, Cinarocephalas & Corymbiferas, cæteris præponenda, usquedùm sincerior altera innotuerit. Cichoraceæ omninò ligulatæ, ab aliis indè distinctissimæ. Cinarocephalæ omninò flosculosæ (capitatæ ex Linn.) calice communi imbricato, receptaculo testò, stigmate articulatò & semine papposo. Corymbiferae nunc omninò flosculosæ (discoideæ ex Linn.), nunc flosculosæ simul & ligulatæ, calice vario, receptaculo testò aut nudo, stigmate non articulatò, semine nudo aut papposo. Admissi tamen characteres non satis in-



terdum Cinarocephalas à Corymbiferis secernunt, sed his addendus habitus in Cinarocephalis uniformis, in Corymbiferis varius. An Corymbiferarum ordo posthac in plures dividendus?

Flores omnes hermaphroditi Polygamiam æqualem Linnæi constituunt, hermaphroditi foemineis mixti Polygamiam superfluum, iidem mixti neutris Polygamiam frustraneam, masculi foemineis mixti Polygamiam necessariam, calices juncti uni aut multiflori Polygamiam segregatam, iidem distincti uniflori Monogamiam. Antheræ in omnibus connatæ Syngenesiam produnt diversas connectentem in eadem classe Linnæanâ Polygamias.

## ORDO I.

### CICHORACEÆ, LES CHICORACÉES.

**FLORES** ligulati omnes & hermaphroditi. Calix communis varius. Ligula apice integræ aut dentatæ. Singulis stigma duplex. Semen nudum aut papposum. Receptaculum nudum aut tectum nilis vel paleis. Plantæ lactescentes, herbacæ sæpè caulescentes. Folia alterna. Flores plerumque lutei.

I. Receptaculum florum nudum. Semen non papposum.

**LAMPSANA**, T. V. \* **LAPSANA**, L. \* *Lampsan.* Calix 8 phyllus connivens erectus, caliculatus caliculo brevi, multiflorus. Semina non involuta.

**RHAGADIOLUS**, T. V. \* **LAPSANA**, L. \* *Ragadiole.* Calix caliculatus caliculo brevi, 5-8-phyllus oblongus, 8-12-florus, foliolis semina marginalia complectentibus & tunc simul in stellam divaricatis. Semina centralia 3-4, interdum abortiva.

II. Receptaculum nudum. Semen papposum, pappo piloso.

**PRENANTHES**, V. L. \* **CHONDRILLA**, T. \* **LACTUCA**, T. \* Calix 4-5-phyllus connivens cylindricus sub 5-florus, caliculatus caliculo brevi. Pappus plerumque sessilis. Flores quarundam non lutei. Genus vix à Chondrillâ distinctum.



**CHONDRILLA**, T. V. L. \* *Chondrille*. Calix sub8-phyllus connivens cylindricus 10-12 florus, caliculatus caliculo brevi. Pappus stipitatus. *Seminis apex denticulatus*.

**LACTUCA**, T. V. L. \* *Laituë*. Calix polyphyllus imbricatus inæqualis subcylindricus aut interdum basi subventricosus, margine squamarum scarioso. Pappus stipitatus. *Flores quarundam non lutei*.

**SONCHUS**, T. V. L. \* **LACTUCA**, T. \* *Laitron*. Calix polyphyllus imbricatus, inæqualis, basi ventricosus. Pappus plerumque sessilis. *Flores quorumdam non lutei*.

**HIERACIUM**, T. V. L. \* **DENS LEONIS**, T. \* *Epervière*. Calix polyphyllus imbricatus inæqualis ovatus. Pappus sessilis. *Species quædam (Dens leonis, T.) foliis radicalibus & scapis uni aut multifloris; quædam caliculatæ caliculo longo, Crepidi fortè affiniore*.

**CREPIS**, L. \* **HIERACIOÏDES**, V. \* **HIERACIUM**, T. \* **CHONDRILLA**, T. \* *Crepid.* Calix simplici serie polyphyllus, caliculatus caliculo brevior, sæpè patente & interdum deciduo. Pappus (stipitatus ex Linn.) plerumque sessilis. *Flores quarundam non lutei. Pappus interdum plumosus, interdum quasi stipitatus semine superius attenuato, ut in C. alpina, C. foetida &c. Species iterum examinandæ omnes, & quædam aliò depellendæ*.

**DREPANIA**. \* **CREPIS**, L. \* **HIERACIUM**, T. V. \* Calix multiplici serie polyphyllus squarrosus, squamis setaceis sparsis, exterioribus longioribus & maturitate falcato incurvis. Semina apice brevissimè ciliata & 2-4 aristata (aristis subplumosis?). *Flores sulphurei aut in disco nigrescentes. Huc referenda Crepis barbata L. quæ Hieracium proflerum falcatum CB. T. Δρεπανή falx, à squamis falcatis*.

**HEDYPNOIS**, T. \* **HYOSERIS**, L. \* **RHAGADIOLOÏDES**, V. \* **ZACINTHA**, T. V. \* Calix simplici serie polyphyllus, caliculatus caliculo brevi, maturitate torosus, squamis semina marginalia anplexantibus & extus gibbis, nunc in sphæram conniventibus, nunc patulis. Semina marginalia apice ciliata aut subnuda, centralia coronata pappo setaceo aut piloso, interdum deciduo. *Hujus congeneres Hyoserides caulescentes L. & Crepis Rhagadioloïdes L. & Lapsana Zacintha L. cui pappus brevissimus deciduus*.

**HYOSERIS**, L. \* **DENS LEONIS**, T. \* **TARAXACONASTRUM**, V. \* Calix simplici serie polyphyllus, caliculatus caliculo brevi. Pappus sessilis aristatus, pilis basi cinctus, in seminibus marginalibus vix involutis tantum 3-setosus. *Folia radicalia; scapi 1-flori H. foetidæ semina nuda, pappo forsan deciduo*.

**TARAXACUM**, Hall. \* **DENS LEONIS**, T. V. \* **LEONTODON**, L. \* *Dissentit*. Calix simplici serie polyphyllus, caliculatus caliculo sæpè squarroso. Pappus stipitatus. *Folia radicalia; scapi 1-flori*.



### III. Receptaculum nudum. Semen papposum ; pappo plumoso.

LEONTODON, L. \* DENS LEONIS, T. \* TARAXACONOÏDES, V. \* Calix polyphyllus subimbricatus, aut simplici duplicive serie subæqualis & caliculatus. Pappus sessilis. *Folia radicalia & scapi 1-flori. Receptaculum L. aurei villosum, L. hispidi quasi alveolatum. Semina quorundam marginalia non pappo sed membranulâ coronata. L. autumnale caulescit, Scorzonera affinius.*

PICRIS, L. \* HIERACIUM, T. \* HELMINTHOTHECA, V. \* Calix simplici serie polyphyllus, caliculatus caliculo brevi polyphylo. Semina transversim striata. Pappus sessilis. *Herba aspera.*

HELMINTIA. \* HELMINTHOTHECA, V. \* HIERACIUM, T. \* PICRIS, L. \* Calix simplici serie 8-phyllus, caliculatus caliculo amplo 5-phylo. Semina transversim striata. Pappus stipitatus. *Herba asperrima quæ Picris echioïdes L.*

SCORZONERA, T. V. L. \* SCORZONEROÏDES, V. \* CREPIS, V. \* SONCHUS, T. \* *Scorzonère.* Calix polyphyllus imbricatus, inæqualis, squamis margine membranaceis. Pappus sessilis. *Folia plurimarum integra, quarundam (Scorzoneroïdes V.) laciniata; quarundam flores non lutei. An Leontodon autumnale L. congener aut affine? An genere distinguendæ S. tingitana & S. picroïdes habitu diversæ (Crepis V.), quibus pedunculus sub calice turbinatus cavus & semina transversim striata & præcipuè pappus pilosus.*

TRAGOPOGON, T. V. L. \* *Cercifis, Salsifis.* Calix simplex 8-partitus æqualis. Pappus sessilis. *Habitus Scorzonera; flores quorundam non lutei; quorundam folia radicalia & scapi 1-flori.*

UROSPERMUM, Scop. \* TRAGOPOGONOÏDES, V. \* HIERACIUM, T. \* TRAGOPOGON, L. \* *Barbouquine.* Calix 1-phyllus urceolatus 8-fidus. Semina transversim sulcata; pappus stipitatus stipite corniformi fistuloso infra ventricoso non deciduo. *Huc referantur Tragopogon Picroïdes L. & T. Dalechampii L. Huic ligulæ sulphuræ 5-denticulatæ dentibus fuscis, exteriores extus purpurascens.*

### IV. Receptaculum paleaceum aut pilosum. Pappus plumosus aut pilosus.

GEROPOGON, L. \* TRAGOPOGON, T. V. \* Calix simplex polyphyllus æqualis. Pappus radii 5-aristatus, disci plumosus. Receptaculum paleaceum. *Habitus Tragopoginis; flores plerumque non lutei.*

HYPOCHÆRIS, V. L. \* HIERACIUM, T. \* Calix polyphyllus imbricatus inæqualis. Pappus stipitatus plumosus. *Folia pleræque radicalia & caules subnudi.*



SERIOLA, L. \* ACHYROPHORUS, V. \* HIERACIUM, T. \*  
 Calix simplex polyphyllus subæqualis. Pappus plumosus, stipitatus aut semini supra attenuato insidens. Receptaculum paleaceum.

ANDRYALA, L. \* ERIOPHORUS, V. \* HIERACIUM, T. \*  
*Andriale*. Calix simplex multipartitus subæqualis, rotundatus, interdum squamulis paucis cinctus. Pappus pilosus sessilis. Receptaculum pilosum. *Herbæ tomentosæ*.

V. Receptaculum paleaceum. Pappus aristatus aut dentatus aut nullus.

CATANANCHE, T. V. L. \* *Cupidone*. Calix polyphyllus imbricatus scariosus. Pappus sessilis 5-aristatus. *Folia plerumque radicalia & nervosa graminea; caules subnudi. C. cæruleæ flores cærulei. C. græca L. quæ Scorzonera T., Scorzonera verè congener.*

CICHORIUM, T. V. L. \* *Chicorée*. Calix duplex, interior 8-partitus erectus, exterior 5-partitus brevior apice patens. Semina coronata margine sub5-dentato. *Flores cærulei aut albi, foliolo axillares, 1-6 glomerati sessiles, uno interdum longè pendunculo.*

SCOLYMUS, T. V. L. \* Calix polyphyllus imbricatus ovatus, squamis acutis conniventibus. Pappus nullus. Paleæ receptaculi 3-dentatæ. *Flores bracteati, bracteis pinnatifido-spinosis; habitus Cardui.*

Obs. Ordo Cichoracearum apprimè naturalis à Vaillantio in Actis Acad. Paris. 1721 elaboratus, idem cum Semiflosculosis Tournefortii & cum Polygamiâ æquali semiflosculosâ Linnæi. Sectiones Vaillantii à receptaculo & pappo fortè minùs naturales, utiles tamen & propterea servandæ. Generum distinctio à calicis structurâ & pappi fulcro præcipuè eruitur. Campanulaceis affinis ordo ex supra memoratis p. 166, & ideò corollæ epigynæ perigynas superas rectè subsequuntur.

## ORDO II.

### CINAROCEPHALÆ, LES CINAROCEPHALES.

FLORES flosculosi omnes, nunc omnes hermaphroditi, nunc neutri aut rariùs fœminei hermaphroditis mixti. Calix communis multiplici serie polyphyllus imbricatus squamis spinosis aut inermibus.



Receptaculum commune tectum pilis aut sæpiùs paleis. Flosculi neutri sæpè irregulares, hermaphroditi quinquesidi regulares pentandri. His stigma simplex aut bifidum, sæpè stylo inarticulatum. Semen papposum, pappo sessili piloso aut plumoso. Caulis herbaceus, aut rarò frutescens. Folia alterna, spinosa aut inermia. Flores colore varii, terminales aut rariùs axillares.

I. Cinarocephalæ veræ. Squamæ calicis spinosæ.

**ATRACTYLIS**, L. \* **CARLINA**, T. \* **CNICUS**, T. \* Flores hermaphroditi. Calix ovatus connivens squamis integris acuminatis, caliculatus caliculo distincto longiore polyphyлло, foliolis pinnatifido-spinosis. *Ex Linnæo in pluribus corollæ marginale, ligulæformes & hermaphroditæ, antheris tamen quandoque effæri nullo tunc comitante stylo nec stigmate; pappus omnium plumosus & receptaculum villosum. Species una oppositifolia ex eodem: an rectè? Genus recognoscendum.*

**CNICUS**, T. L. \* **CARDUUS**, T. \* **CIRSIIUM**, T. \* Flores hermaphroditi. Calix squamis indivisis acuminato-spinosis, cinctus squamis pluribus à basi distinctis, foliaceis subspinosis. *Herbæ inermes aut spinosæ. C. acarna Carthamo congener. Species quædam Carduo, quædam Serratulæ affines. Genus deletum à D. Larmark.*

**CARTHAMUS**, T. L. \* **CNICUS**, T. \* *Carthame.* Flores hermaphroditi. Calix squamis interioribus simplicibus acuminatis aut spinosis, exterioribus basi arctis, apice foliaceo divaricatis & margine dentato aut sinuato spinosis. *Herbæ spinosæ aut mites, quædam calice subinermi minùs congeneres. Semen C. tinctorii nudum pappo mox deciduo. Flosculi radiales ex Hallero neutri aut abortientes in C. lanato & C. cretico indè ad Calcitrapam depellendis & Calcitrapæ benedictæ affinioribus.*

**CARLINA**, T. L. \* *Carline.* Flores hermaphroditi. Calix squamis exterioribus sinuato-spinosis basi conniventibus & apice divaricatis, interioribus sæpè simplicibus acutis, intimis multò longioribus scariosis ligulæformibus coloratis & radium mentientibus. *Herbæ humiles, quædam acaules & grandifloræ; folia sæpè pinnatifido-spinosa.*

**ARCTIUM**, Dalech. Larmark. \* **BERARDIA**, Vill. \* Calix magnus, duplici aut triplici serie polyphyllus æqualis, squamis acuminatis subinermibus, interioribus glabris, exterioribus lanuginosis. Semina prismatica; pappus densus plumosus, basi intortus. Receptaculum foveolis minimis alveolatum & denticulis intermixtis exasperatum. *Herba humillima tomentosa caule 1-floro; folia pleraque radicalia; flos magnus Cinaræ; semen Carlinae; receptaculum ferè Onopordi.*



**CINARA**, T. L. \* *Artichaut*, *Cardon*. Flores hermaphroditi. Calix maximus ventricosus, squamis numerosis, apice 1-spinosis basi carnosus. Receptaculum magnum carnosum tetolum. *Folia maxima Acanthi pinnatifido-spinosa*. Genere omnino distinguenda C. humilis cui flos radicalis & squamæ calicinae inermes apice ciliato-palmatæ ut in *Jacée*.

**ONOPORDUM**, V. L. \* **CARDUUS**, T. \* *Onoporde*. Flores hermaphroditi. Calix magnus ventricosus, squamis numerosis undique prominentibus, apice 1-spinosis. Receptaculum favosum seu foveolis seminum numerosis alveolatum, nudum pilis forsan pressione abortivis. *Caulis altissimus; folia maxima Acanthi, spinosa sæpè tomentosa*.

**CARDUUS**, T. L. \* **CIRSIIUM**, T. \* *Chardon*. Flores hermaphroditi. Calix squamis apice 1-spinosis. *Folia spinosa aut subinermia, decurrentia aut sessilia*. An dividendum genus in *Carduum pappo piloso*, & *Cirsium pappo plumoso*? C. marianus squamis margine spinosis, inde *Carthamo* congener ex D. Lamark.

**LAPPA**, T. \* **ARCTIUM**, L. \* *Bardane*, *Glouteron*. Flores hermaphroditi. Calix iphæriceus squamis subulato-spinosis, apice in hamum inflexis. *Folia magna inermia; flores subcorymb si. Arctium personata L. ad Carduum depellenda ex Jacq.*

**CROCODILIUM**, V. \* **CENTAUREA**, L. \* **CARDUUS**, T. \* **JACEA**, T. \* Flores centrales hermaphroditi, marginales neutri. Calix squamis simplicibus apice 1-spinosis. *Folia simplicia aut pinnatifida*. Huc referendæ *Centaureæ* 56-66 *Linnæi syst. ed. 14.*

**CALCITRAPA**, V. \* **CENTAUREA**, L. \* **CARDUUS**, T. \* **CNICUS**, T. V. \* *Chaussétrape*. Flores centrales hermaphroditi, marginales neutri. Calix squamis apice spinoso-pinnatis, seu desinentibus in spinam lateribus dentato-spinosam aut ciliatam. *Folia simplicia aut pinnatifida, interdum decurrentia*. Huc referendæ *Centaureæ* 45-55 *Linn. syst.* An tamen genere distinguenda C. benedicta L. seu Cnicus V. cui calix lanatus involucri polyphylo arte cinctus?

**SERIDIA**. \* **CENTAUREA**, L. \* **CARDUUS**, T. \* Flores centrales hermaphroditi, marginales neutri. Calix squamis apice spinoso-palmatis. *Folia simplicia aut rarius pinnatifida, interdum decurrentia*. Huc referendæ *Centaureæ* 38-44 *Linn. syst.*

I I. Cinarocephalæ veræ. Squamæ calicis inermes.

*Plantæ plerumque etiam inermes.*

**JACEA**, T. \* **CENTAUREA**, L. \* *Jacée*. Flores centrales hermaphroditi, marginales neutri disco subæquales. Caulis squamis apice ciliatis. *Species quædam suffruticosæ; folia simplicia aut pinnatifida*. Huc referendæ *Centaureæ* 7-26 *Linn.*, exceptis *Cyanis* sequentibus.



**CYANUS**, T. \* **CENTAUREA**, L. \* *Bluet, Barbeau, Aubifoin.* Flores centrales hermaphroditi, marginales neutri disco multò majores, difformes, & in infundibulum limbo multifidum definientes. Calix squamis apice ciliatis. *Folia simplicia. Hujus congeneres Centaureæ 9. 13. 14. 15. Linn. syst.*

**ZOEGEA**, L. \* Flores centrales hermaphroditi, marginales neutri, difformes, in ligulam producti. Calix squamis exterioribus ciliatis, interioribus longioribus scariosis integris. Pappus setaceus. Receptaculum setosum. *Flores lutei.*

**RHAPONTICUM**, V. \* **CENTAUREA**, L. \* **CENTAURIUM**, T. \* **JACEA**, T. \* Flores centrales hermaphroditi, marginales neutri. Calicis squamæ apice aridæ scariosæ. *Folia simplicia aut pinnatifida, interdum decurrentia. Hujus congeneres Centaureæ 27-37. Linn. syst.*

**CENTAUREA**, L. \* **CENTAURIUM MAJUS**, T. \* **CYANUS**, T. \* *Centaurée, Ambrette.* Flores centrales hermaphroditi, marginales neutri. Calicis squamæ simplices. *Folia simplicia aut pinnata. Hic sistendæ Centaureæ 1-6. Linn.*

**PACOURINA**, Aubl. \* Flores hermaphroditi. Calix sphaericeus magnus, multiplici serie imbricatus inæqualis, squamis rotundatis. Flosculorum tubus basi angustior. Pappus pilosus. Receptaculum carnosum paleaceum, paleis semina superantibus. *Caulis ramosus erectus; foliorum petiolus marginatus amplexicaulis; flores solitarii sessiles oppositifolii. Character ex Aubl. Guyan. t. 316.*

**SERRATULA**, L. \* **JACEA**, T. \* *Sarrête.* Flores hermaphroditi. Calix oblongus cylindricus, squamis muticis. Flosculorum tubus apice ventricosus. Stigmata 2. Pappus pilosus aut plumosus. Receptaculum paleaceum *Genus cent. recedendum. Flosculi S. coronatæ fæminei ex Linn. Species quædam receptaculo nudo, nempe S. noveboracensis, S. præalta, S. glauca, S. squarrosa &c., idè ex ordine depellendæ & Eupatorio aut Cacaliæ affiniores. S. arvensis spinosam Carduo rectè adjicit D. Lamark. & Cnicum Centauroïdem, Cn. cernuum consociat Serratulæ utpotè inermes. A Serratulâ tamèn fortè secernendi calices ampli sphaericei & interdum scariosi, quales in supradiçtis aliisque hermaphroditis, præterea Rhapontico aut Centaureæ similibus.*

**PTERONIA**, L. \* **PTEROPHORUS**, V. \* Flores hermaphroditi. Calix oblongus, sæpè cylindricus, squamis inæqualibus Pappus subplumosus aut rarò setaceus. Receptaculum setosum setis multipartitis, aut paleaceum. *Suffrutices; folia minuta, quorundam opposita; flores terminales. Character ex Linnæo Species quædam (an omnes, an oppositifoliæ tantum?) receptaculo certè nudo, sed semine papposo simul & villis vestito numerosis setis receptaculi mentientibus, indè affiniores Eupatorio cui præterea habitu & foliorum oppositione & calice conveniunt, semine villoso discre-*



*pantes. An cætera in receptaculo setosæ ad Serratulam aut Stæhelinam compellendæ?*

**STÆHELINA**, L. \* Flores hermaphroditi. Calix oblongus cylindricus, squamarum inæqualium apice colorato. Antheræ caudatæ. Stigmata 2. Pappus ramosus. Receptaculum brevissimè paleaceum. *Caracter ex Linnao. Frutices aut herbæ. Genus ulteriori examine Serratulæ partim adjiciendum.*

III. Cinarocephalæ anomalæ. Calices uni aut pauciflori aggregati.

**JUNGIA**, LS. \* Calices partiales multiflori, floribus flosculosis hermaphroditis, polyphylli, 3-4 in calice communi polyphylo. Flosculus singulus limbo 2-labiatus, suprà dentatus, infrà 2-fidus. Stigmata 2. Semen papposum, pappo sessili plumoso longo. Receptaculum paleaceum, paleis calici æqualibus. *Caulis lignosus; folia alterna; flores congesti paniculati terminales. Caracter ex Linn. Suppl.*

**NASSAUVIA**, Commerf. \* Calices 4-5-flori floribus flosculosis hermaphroditis, duplicati, intus 5-phylli, extus 3-phylli minores. Singulus flosculus sub 2-labiatus, hinc 3-dentatus, inde 2-fidus. Stigmata 2. Pappus seminum 4-5-setosus setis albidis, caducus. Receptaculum nudum. *Herba Magellanica exquisitè odora, foliis alternis subimbricatis cristatis obiecta; spica simplex densissima capitata terminalis, multibracteata bracteis seu paleis singulis calices plurimos obtegentibus, exterioribus calicem communem mentientibus. Caracter ex Commerf. qui Nassauviam dixit ab ill. Principe de Nassau itineris & excursionum in Magellaniâ Botanicarum comite.*

**GUNDELIA**, T. L. \* Calices suprà receptaculum commune sphæriceum paleaceum aggregati, capitati, bracteis obvallati, singuli 1-phylli dentati 4-angulares subcarnosi 5-flori floribus flosculosis, 5 foveolis apice dentatis excavati pro flosculorum insertionem. Flosculus 1 centralis hermaphroditus, 4 marginales masculi. Semen non papposum, calice persistente tectum. *Herba lactescens; folia alterna spinosa, floralia decurrentia; flores terminales; habitus Cardui.*

**ECHINOPS**, L. \* **ECHINOPUS**, T. \* *Echinope*. Calices 1-flori flore flosculoso hermaphrodito, angulati oblongi, squamis numerosis inæqualibus infrà ciliatis imbricati, & extus basi multifetosi, aggregati in capitulum globosum suprà receptaculum commune globosum subnudum, cinctum quandoque squamulis reflexis minimis calicem communem mentientibus. Stigma duplex. Semen villosum, apice ciliatum, calice persistente cinctum. *Herbæ, quædam altissimæ; folia alterna spinosa pinnatifida; capitula sæpè solitaria terminalia. An congener Echi-*



nopus... *Plum. sp. 11. ic. 123. f. 1. seu E. fruticosus Linn. spec. ab eodem omiffus in ed. post., frutex à Rotbollo Rolandra dictus, cui folia alterna integra subtus argentea, flores conglobati axillares, finguli calice glumaceo & ex Rotb. corolli 4-fidâ 4-andrâ instructi?*

**CORYMBIUM, L. \*** Calix 1-florus flore flosculofo, 2-phyllus glumaceus longus connivens cylindricus, caliculatus caliculo brevissimo 4-5-phyllo. Stigma 2-fidum. Semen oblongum villosissimum coronatum caliculo urceolato paleaceo. Receptaculum nudum. *Caulis pedalis subignosus; folia radicalia graminea longa multinervia coriacea; caulina squamiformia rara; flores distincti corymbosi axillares & terminales. Genus nulli verè affine, nisi fortè Echinopi pariter 1-spermo, sed habitu diversissimum: an Seriphio similis?*

**SPHÆRANTHUS, V. L. \*** Calices multiflori floribus flosculosis 5-phylli aggregati in capitulum sphæriceum, suprâ receptaculum commune globosum squamosum seu paleaceum, cinctum calice polyphyllo brevi. Flosculi centrales 2-3 hermaphrodito-masculi 5-di stigmate simplici, marginales 5-10 foeminei 3-dentati stigmate duplici. His semen oblongum nudum. Receptaculum parziale nudum. *Herbæ; folia sæpius decurrentia; capitula terminalia aut axillaria. Congener Polycephalos Forsk. An S. africanus Burm. Ind. ex genere & ordine depellendus?*

**Obs.** Ordo certè naturalis, sed in speciebus diligenter elaborandus ab Autore monographo ut stabilior series certioraque eruantur genera. Hæc à Tournefortio in *Inst. Bot.* facta, à Vaillantio in *Act. Paris.* 1718 aucta ac divisa pluribus adhibitis signis, à Linnæo dein contracta neglectis plerumque signis Vaillantianis, ab Hallero, Scopio, Lamark aliisque recentioribus iterum mutata, universam ordinis exigunt investigationem atque àm nova præferantur. Hic ergo pleraque Linnæi genera manent intacta, tempore partim convellenda. Opportuna tamen ac facilis visa fuit generica partitio Centauræ numerosas in definitis sectionibus species complectentis, quâ peractâ spinosæ Cinarocephalæ ab inermibus secerantur divisione naturali & quadam series instituitur à recto miris aliena. An potius delectanda ex receptaculo setoso aut paleaceo, ex pappo plumoso aut piloso, ex stigmate simplici aut gemino? An receptacula quælibet nuda ex ordine eliminanda; an contra quadam admittenda cæteris faventibus signis, ut in Eupatorio, Xeranthemo, Chuquiragâ &c.? An idem de generibus margine ligulatis præterea similibus, quorum ligulæ hermaphroditæ, ut Barnadesia & fortè Marisia? An Anactylis & Zoëgea, utraque ligulata sed præterea Cinarocephalis omninò conformis, ab his tamen removenda? An huic revocandum Xeranthemum T. à congeneribus Linnæanis plerisque distinctum receptaculo paleaceo? Genera anomala ordini adjecta nec huic nec sequenti omninò conveniunt, inter utrumque media.



## O R D O I I I.

## C O R Y M B I F E R Æ , L E S C O R Y M B I F È R E S .

**FLORES** vel flosculosi omnes , vel radiati , id est flosculosi in disco & ligulati in radio. Flosculosi plerumque hermaphroditi omnes ; interdum centrales hermaphroditi , marginales fœminei aut neutri ; rariùs centrales masculi , marginales fœminei. Radiati nunquam hermaphroditi omnes , sed nunc sæpè flosculis hermaphroditis & ligulis fœmineis aut rariùs neutris , nunc interdum flosculis masculis & ligulis fœmineis instructi. Calix communis monophyllus aut polyphyllus , simplex aut caliculatus seu cinctus caliculo exteriori aut imbricatus , multiflorus aut rarò pauciflorus vel uniflorus , receptaculo communi nudo aut pilis vel paleis flores distinguentibus tecto. Flosculi sæpiùs quinquefidi , rariùs tri aut quadrifidi. Ligulæ apice integræ aut dentatæ. Stamina in fœmineis & neutris nulla , in hermaphroditis & masculis quinque , rariùs quatuor , antheris in tubum coalitis (rarissimè distinctis & approximatis , ut in *Kuhniâ* , *Artemisiâ* & *Corymbiferis anomalis* .). Stigma stylo continuum , hermaphroditis & fœmineis floribus duplex , masculis simplex , neutris simplex aut nullum. Semen nudum aut coronatum pappo. Herbæ aut quandoque frutices suffruticesve. Folia in plurimis alterna , in paucis opposita. Florum discus plerumque luteus ; radius sæpè concolor , nonnunquam discolor.

I. Receptaculum nudum. Semen papposum. Flores flosculosi. ( *In Mutisiâ , Barnadesiâ , Leyserâ flores radiati* ),

**KUHNIA** , L. \* Flores flosculosi. Calix imbricatus oblongus cylindricus , circiter 10-15-florus. Antheræ distinctæ cylindricæ. Stigmata longa. Pappus plumosus. *Caracter ex Linnao. Flores subcorymbosi terminales. Habitus Eupatorii , sed folia alterna &c.*



*antheræ distinctæ insigni ordinis exceptione. Hæc etiam extus similes Serratulæ receptaculo nudo instructæ.*

**CACALIA**, T. L. \* **KLEINIA**, L. \* *Cacalie*. Flores flosculosi. Calix simplex oblongus, basi caliculatus. Pappus pilosus. Flores interdum purpurascens aut albidus. Calix Kleiniae cylindricus & folia succulenta teretia & caulis frutescens. *Cacalia herbacea foliis planis non succulentis & calice campanulato: huic habitu similis Serratula noveboracensis L. An genus dividendum; an Senecioni affine?*

**EUPATORIUM**, T. L. \* *Eupatoire*. Flores flosculosi. Calix imbricatus inæqualis oblongus cylindricus pauciflorus. Pappus plumosus. Caulis frutescens aut herbaceus, interdum scandens; folia in plurimis opposita, in paucis verticillata aut alterna; flores sæpè corymbosi terminales aut axillares, purpurascens. Species quædam Linnæana calice polyphyllis simplicibus non imbricatis, *Cacaliæ* affiniores ex D. Lamark; quædam pappo piloso. An congener *Critonia* Brown. Jam. t. 34. f. 1., cui ex Autore calix 4-florus, pappus ramosus, cætera similia?

**AGERATUM**, L. \* Flores flosculosi, flosculis 4-fidis. Calix duplici serie polyphyllus oblongus subæqualis. Pappus 5-aristatus. Folia inferiora opposita; flores corymbosi terminales non lutei.

**ELEPHANTOPUS**, V. L. \* Flores flosculosi, laciniis flosculorum oblongis. Calix imbricatus oblongus cylindricus, circiter 4-florus. Pappus setaceus. Caulis sublignosus; involucra 3-phylla 3 calices colligentia, nunc magna cymbiformia, laxissime corymbosa & longè pedicellata, nunc minora bracteiformia axillaria, sessilia & spicata. Flores ligulati ex Linnæo.

**CHUQUIRAGA**. \* Flores flosculosi, flosculis numerosis longissimis, limbo subintegris. Calix magnus turbinatus, imbricatus squamis numerosissimis, exterioribus sensim minoribus. Antheræ longæ basi 2-setæ. Stigma 1? Pappus plumosus longus. Receptaculum villosum. Frutex ramosus, foliis Rusci rigidis acuminatis alternis densè imbricatis; flores in ramulis solitarii terminales. *Mutisiæ* affinis sed non radicata: an *Cinarocephalis* affinior? Character ex Jesso Jos. J. Jassai specimine Peruviano Chuquiraga vernaculè dicto.

**MUTISIA**, LS. \* Flores radiati; flosculi longi 2-3-fidi laciniis dentatis; ligulæ longæ, filamentis 2-3 sterilibus instructæ. Calix longus cylindricus, imbricatus squamis inæqualibus. Pappus plumosus longus. Frutices scandentes, glabri aut tomentosi; folia alterna, nunc simplicia apice cirrhoso, nunc sæpius pin-nata *Viciæ* instar, rachi in cirrhum desinente, foliolis inferioribus stipulæformibus; pedunculi 1-flori axillares aut terminales; calix Scoxeneræ; semper flore habitus *Viciæ*. Peruvianis Guariruma vernaculè dicitur ex Jos. Jassao. Affinis hinc Chuquiragæ, inde Barnadesiæ.

**BARNADESIA**, LS. \* Flores radiati; flosculi 3-4, limbo 5-par-



tito erecto; ligulæ plures hirsutæ, fissæ, hermaphroditæ. Calix imbricatus squamis pungentibus, multiplici serie inæqualibus. Pappus disci setosus spiralis, radii plumosus. Receptaculum villosum. *Frutex ramis & foliis alternis simplicibus basi 2-spinosis; flores terminales paniculati. Character ex Linn. Suppl. Ligulæ hermaphroditæ in ordine insignes, fortè potius posculi fissi: an indè genus Atractylidi & Zoegæ inter Cinarocephalas affine & iis approximandum unà cum Chuquiragâ & Matissâ, receptaculo nudo incassum reluctante?*

**XERANTHEMUM, T. L. \* ELYCHRYSUM, T. \*** Flores flosculosi, marginales pauciores fœminei. Calix imbricatus inæqualis, squamis scariosis, interioribus disco longioribus membranaceis nitidis, radium coloratum constituentibus. Pappus plumosus aut pilosus, rariùs setaceus. *Suffrutices aut herbæ; folia alterna, sæpè tomentosa; flores terminales; calix persistens; squamæ radiales colore variæ; habitus Gnaphalii. Pappus 5-setaceus & receptaculum paleaceum in X. annuo L. (an & in aliis?) seu Xeranthemo T. indè affiniori Cinarocephalis & Stæhelinæ. An indè dividendum genus collato in omnibus caractere, restituendumque Elychrisi nomen speciebus Gnaphaloideis in receptaculo nudis huic à Linnæo malè consociatis?*

**GNAPHALIUM, L. \* ELYCHRYSUM, T. \*** *Gnaphale.* Flores flosculosi, fœminei hermaphroditis mixti & corollulis integris vix manifestis instructi. Calix imbricatus inæqualis, squamis rotundis scariosis coloratis. Pappus plerumque plumosus, interdum capillaris. *Suffrutices aut herbæ; folia alterna sæpè canescentia; flores sæpè terminales, glomerati aut corymbosi; calix persistens squamis luteis aut albis. G. arborei receptaculum lanatum. species una dioïca insigni exceptione.*

**FILAGO, T. L. \*** Flores flosculosi, sæpiùs hermaphroditi 4-fidi 4-andri (centrales masculi & marginales fœminei ex Linn.). Calix 5-gonus imbricatus. Semen plerumque papposum pappo plumoso brevi. Semina marginalia paleis calicinis distincta. *Herbæ canescentes, vix à Gnaphalio distinctæ & eidem consociatæ à DD. Scopoli, Lamark &c.; flores sæpè glomerati terminales, interdum orbe foliaceo cincti. Stella foliacea terminalis T. Leontopodii ex Scopoli continet in capitulo centrali flosculos hermaphroditos 5-fidos, in ambientibus flosculos alios fœmineos 4-fidos, alios neutros paleis distinctos.*

**LEYSERA, L. \*** Flores radiati. Calix imbricatus scariosus inæqualis. Pappus flosculorum setosus brevissimus, aristis 5 plumosis cinctus, ligularum setosus simplex. Receptaculum in disco nudum, in radio paleaceum paleis brevibus semina marginalia involucrantibus. *Suffrutices habitu Gnaphalii; folia linearia; flores terminales. Ex Linnæo congener Callicornia Burm. Ind. cujus ligulæ 3-fidæ & pappus plumosus non paleaceus, indè similior Par-*



*disio? An congener etiam L. paleacea cujus receptaculum omninò paleaceum & pappus membranaceus non plumosus?*

**SHAWIA**, Forst. \* Flos flosculosus 5-fidus. Calix imbricatus cylindricus, 5-6 squamosus squamis interioribus longioribus, (1-florus?), receptaculo nudo. Stigma 2-fidum. Semen 1 oblongum pappo piloso infrà pubescente. *Flores paniculati. Character ex Forst. Austr.*

**SERIPHIMUM**, L. \* *Armoselle*. Flos flosculosus 5-dentatus. Calix 1-florus, duplicatus, uterque 5-phyllus, exterior tomentosus, interior glaber scariosus. Pappus plumosus aut nullus, fortè mox deciduus. *Character ex Linnaeo. Suffrutes Ericæformes, foliis minimis; flores axillares aut terminales sæpè glomerati.*

**STÆBE**, L. \* **CONYZA**, T. \* Flores flosculosi. Calices 1-flori, 5-phylli foliolis æqualibus erectis, aggregati in calice communi subrotundo imbricato suprà receptaculum commune paleaceum. Stigma 2-fidum. Pappus plumosus. *Plantæ Ericæformes foliis minimis; capitula Conyzæ terminalia. An paleæ receptaculi pro squamis calicum partialium extrinis habendæ? An verè congener S. Gnaphalodes dissimilis habitu & calice communi 5-phyllis?*

**CONYZA**, T. L. \* **ELYCHRYSUM**, T. \* *Conyzæ*. Flores flosculosi, marginales 3-fidi fœminei. Calix imbricatus, subrotundus aut cylindricus. Pappus pilosus. *Frutices aut herbæ; folia in paucis decurrentia; flores sæpè corymbosi aut paniculati terminales. An verè congener C. Anthelminthica cujus flores subsolitarii, flosculi fortè omnes hermaphroditi observante D. Desfontaines, & calicis foliola longitudine æqualia, interiora latiora, exteriora linearia caliculiformia?*

**BACCHARIS**, L. \* **CONYZA**, T. \* *Baccante*. Flores flosculosi, fœminei hermaphroditis mixti & corollulis integris vix conspicuis instructi. Calix imbricatus cylindricus. Pappus pilosus. *Frutices aut rariùs herbæ; flores sæpè corymbosi. Genus vix à Conyzâ distinctum.*

**CHRYSOCOMA**, L. \* **CONYZA**, T. \* *Chrysocome*. Flores flosculosi. Calix imbricatus hemisphæricus. Stylus brevis. Pappus pilosus. *Suffrutes aut herbæ; flores plerumque corymbosi terminales. An C. oppositifolia verè congener? C. graminifolia radiata ligulis brevissimis: an ideò Solidagini aut Erigero affinior?*

**I I.** Receptaculum nudum. Semen papposum. Flores radiati. *in Tussilagine & Senecione flores partim radiati.*

**ERIGERON**, L. \* **VIRGA AUREA**, T. \* **ASTER**, T. \* Flores radiati ligulis linearibus numerosis. Calix oblongus imbricatus inæqualis. Pappus pilosus. *Ligulæ in aliis albidæ aut purpurascentes, luteæ in aliis quarum insuper antheræ nonnunquam basi 2-setosæ. Inulas indicant.*



**ASTER**, T. L. \* **VIRGA AUREA**, T. \* *Aster*. Flores radiati, ligulis pluribus quàm 10, lanceolatis. Calix imbricatus squamis inferioribus patulis. Pappus pilosus. *Flores paniculati aut corymbosi; ligulæ violaceæ aut purpurascens aut albidæ. Species paucissima fruticulosæ. A. alpini caulis simplex 1-florus.*

**SOLIDAGO**, L. \* **VIRGA AUREA**, T. \* *Verge d'or*. Flores radiati, ligulis circiter 5. Calix imbricatus inæqualis connivens rectus. Pappus pilosus. *Herbæ sæpè clava; flores paniculati; ligulæ luteæ, in S. bicolore tantum albidæ.*

**INULA**, L. \* **ASTER**, T. \* *A. Inée*. Flores radiati ligulis numerosis. Calix imbricatus, squamis patulis, exterioribus majoribus. Antheræ basi 2-setæ. Pappus pilosus. *Flores lutei axillares aut terminales, sæpè corymbosi. Caulis l. pinifoliæ frutescens.*

**PERDICIUM**, L. \* Flores radiati; flosculi 2-labiati labio inferiore 2-fido, exteriori 3-dentato; ligulæ apice 3-dentatæ, basi intus 2-dentatæ. Calix oblongus imbricatus inæqualis. Pappus pilosus. *Suffutices aut herbæ. Genus recognoscendum.*

**TUSSILAGO**, T. L. \* **PETASITES**, T. \* *Tussilage, Pétasite*. Flores radiati in *Tussilagine T.*, aut flosculosi in *Petasitide T.*, flosculis marginalibus fœmineis limbo integris & stylo appressis. Calix simplex polyphyllus æqualis. Pappus pilosus frigitatus. *Folia plerumque radicalia; scapi 1-flori, aut caules simplices foliosi foliis sæpè squamiformibus, uni aut multiflori. Flores foliis sæpè præciores; quorundam flosculi fœminei in ligulas quandoque producti.*

**BRACHYGLOTTIS**, Forst. \* Flores radiati, ligulis paucis brevibus recurvis 3-dentatis. Calix polyphyllus connivens cylindricus æqualis. Pappus plumosus. *Caracter ex Forst. Austr.*

**SENECIO**, T. L. \* **JACOBÆA**, T. \* *Séneçon, Jacobée*. Flores flosculosi in *Senecione T.*, aut radiati in *Jacobæa T.*, ligulis aut flosculis marginalibus fœmineis. Calix simplex, quasi monophyllus, erectus conicus, basi caliculatus seu cinctus squamulis apice sphacelatis aut nigrescentibus, maturatione reflexus. Pappus pilosus. *S. frutices aut sæpius herbæ; folia integra aut pennatifida; ligulæ quorundam rubentes, quorundam brevissimæ ferè flosculosæ, unde Jacobæa Senecionis congener.*

**CINERARIA**, L. \* **JACOBÆA**, T. \* Flores radiati, ligulis numero foliolorum calicis. Calix simplex polyphyllus æqualis. Pappus pilosus. *Folia integra aut rarius pennatifida; species plures tomentosæ; quædam in calicis basi 2-3-squamulosæ, ut in Senecione. Ligulæ cæruleæ in C. Amelloide præterea oppositifoliæ & fortè non congeneri.*

**OTHONNA**, L. \* **JACOBÆA**, T. \* Flores radiati, flosculis masculis, ligulis fœmineis. Calix 1-phyllus subcylindricus aut patens, apice 8-14-dentatus aut 8-14-fidus. Pappus pilosus aut subnullus.



Receptaculum quandoque villosum. *Species quædam suffruticosæ; folia simplicia aut pinnata.*

**VIDELTA**, L'Herit. \* Flores radiati; flosculi centrales masculi, ambientes hermaphroditi; ligulæ circiter 12 fœminæ. Calix duplex, exterior 3-partitus magnus laciniis cordatis, interior 12-fidus laciniis longis lanceolatis ferratis, alternis duplò minoribus. Receptaculum in centro 3-gonum subnudum seu rudimentis feminum breviter papposis tectum, ad margines solubile in 3 pericarpia subossæ 3-gona, singula imo foliolo calicino exteriori imposita triplicique hinc cincta interioris calicis laciniâ, plurimis excavata loculis clausis, totidemque referta seminibus oblongis pappo ciliari rigido extrâ prominulo coronatis. *Herba ramosa, apice pubescens; folia alterna, ferè succulenta; flores solitarii terminales lutei. Receptaculum pappo seminum prominulo quasi setaceum.*

**TAGETES**, T. L. \* *Æillet d'Inde*. Flores radiati, ligulis paucis brevibus latis. Calix 1-phyllus tubulosus, limbo dentatus. Pappus 5-aristatus. *Herbæ plerumque graveolentes; folia sæpiùs opposita, pinnata pellucido-punctata; flores terminales, facillè pleni.*

**PECTIS**, L. \* Flores radiati, ligulis 5 brevibus. Calix 5-phyllus connivens cylindricus. Pappus aristatus. *Folia opposita integra, sæpè linearia & punctata; flores axillares aut terminales.*

**BELLIUM**, L. \* **BELLIS**, T. \* Flores radiati, flosculis 4-fidis, ligulis 10-12. Calix simplex polyphyllus æqualis patens. Semina coronata limbo 8-phyllis & pappo interiore 8 aristato. *Folia radicalia; scapi 1-flori; ligulæ albidæ. Habitus Bellidis.*

**DORONICUM**, T. L. \* *Doronic*. Flores radiati. Calix polyphyllus, foliolis duplici ordine æqualibus. Semina flosculorum papposa pappo piloso, ligularum nuda. *Species aliæ canlescentes floribus terminalibus aut axillaribus, aliæ pauciores scaposæ scapis 1-floris & ligulis albidis.*

**ARNICA**, L. \* **DORONICUM**, T. \* Flores radiati; flosculi sæpè 3-fidi; ligulæ filamentis 5 sterilibus (in *A. montanâ* nullis) instructæ. Calix Doronici. Semina omnia papposa, pappo piloso. *Species aliæ canlescentes, aliæ plures scaposæ, scapis 1-floris interdum oppositè 2-phyllis; flores lutei. An A. Gerbera verè congener?*

**GORTERIA**, L. \* Flores radiati ligulis neutris. Calix imbricatus iræqualis squamis setaceis rigidis. Pappus lanatus aut pilosus. *Character ex Linneo. Frutices aut herbæ; flores terminales. Genus recognoscendum, species dissonas fortè complectens. An Arnica affinis G. rigens cui folia radicalia & scapi 1-flori. G. fruticosa Linn. spec., ab eodem dein Atractylidi consociata, pappo & receptaculo utroque paleaceo infra distinguitur nomine Agriphylli. Caules G. ciliaris quasi cancellati foliis ciliato-spinosis appressis imbricatis.*



III. Receptaculum nudum. Semen nudum seu non papposum. Flores radiati.

**OSTEOSIERMUM**, L. \* **MONILIFERA**, V. \* *Portecollier*. Flores radiati, flosculis masculis, ligulis fœmineis.. Calix simplex polyphyllus æqualis. Semina globosa ossea colorata. *Caulis sæpè frutescens; flores sæpè terminales subsolitarii aut corymbosi. Receptaculum seminibus globosis marginatum, indè quasi moniliferum.*

**CALENDULA**, L. \* **CALTHA**, T. \* *Souci*. Flores radiati; flosculi centrales masculi, ambientes hermaphroditi; ligulæ fœmineæ. Calix simplex polyphyllus æqualis. Semina sæpè membranacea; marginalia diversa ab interioribus, incurva sub ligulis luteis in *C. Europeis*, aut in *C. Africanis* cordato-plana sub ligulis albo-violaceis. *Flores sæpè solitarii terminales. Species una fruticulosa.*

**CHRYSANTHEMUM**, T. L. \* **LEUCANTHEMUM**, T. \* *Chrysène, Marguerite*. Flores radiati. Calix hemisphæricus imbricatus, squamis interioribus membranaceis. *Caulis simplex aut ramosus; folia simplicia aut pinnata; flores terminales, solitarii aut corymbosi; squamæ calicinæ oblongæ in Leucanthemo T., ovatæ scariosæ in Chrysanthemo T.; hujus ligulæ luteæ aut lutescentes, illius albæ aut purpurascences: an indè genera cum Tournefortio distinguenda? Species una suffrutescens. Ligulæ nullæ & flosculi omnes hermaphroditi 5-fidi 5-andri in C. flosculoso fortè non congeneri. Calicem C. Balsamitæ confer cum Matricariâ.*

**MATRICARIA**, T. L. \* **CHAMÆMELUM**, T. \* *Matricaire*. Flores radiati. Calix hemisphæricus imbricatus squamis acutis. *Folia pinnata aut rariùs simplicia; flores terminales, corymbosi aut subsolitarii; ligulæ sæpiùs albæ, rarò abortivæ, numerosæ lineares in M. Asteroïde cui semen apice 5-dentatum ex Linneo.*

**BELLIS**, T. L. \* *Pâquerete*. Flores radiati. Calix hemisphæricus simplex polyphyllus æqualis. *Folia radicalia; scapi 1-flori; ligulæ albæ aut purpurascences.*

**CENIA**, Commerf. \* **COTULA**, T. L. \* Flores radiati, flosculis 4-fidis, ligulis circiter 20 brevissimis. Calix turbinatus, sub receptaculo vacuus, limbo brevi 8-fido. Semina compressa. Receptaculum convexum. *Plantula (Cotula turbinata L.) foliis bininnatifidis; pedunculi terminales longi 1-flori. Kero: vacuus, à calice vacuo.*

**LIDBECKIA**, Berg. \* **COTULA**, L. \* Flores radiati, flosculis 4-fidis 4-andris, ligulis longis emarginatis. Calix multipartitus hemisphæricus æqualis. Semina angulata. *Folia pinnatifida; flores solitarii terminales; habitus Othonnæ pectinatae. Character ex Bergia. Hinc Cotula stricta L.*



I V. Receptaculum nudum. Semen nudum seu non papposum. Flores flosculosi.

**COTULA**, V. L. \* Flores flosculosi; centrales 4-fidi 4-andri; marginales foeminei, plerumque vix manifesti. Calix polyphyllus hemisphaericus. Semen apice marginatum. *Folia saepe pinnato-multifida; flores terminales. Hinc eliminandæ Cotula radiata Linnæi.*

**ADENOSTEMMA**, Forst. \* Flores flosculosi. Calix polyphyllus æqualis hemisphaericus. Corollulae minimæ, intus villosæ. Stigmata longa. Semen apice 3-glandulosum aut 3-appendiculatum. *Caracter ex Forst. Austr. t. 45.*

**STRUCHIUM**, Brown. \* Flores flosculosi. Calix imbricatus patens. Flosculi centrales 4-fidi, marginales 3-fidi. Semen coronatum tubulo 4-crenato. *Flores glomerati axillares. Caracter ex Brown. Jam. t. 34 f. 2. Confer cum Grangeâ. An Ethulia sparganophora L. hujus congener?*

**GRANGEA**, Adans. \* Flores flosculosi, marginales foeminei 3-dentati. Calix imbricatus patens. Semen apice marginato-dentatum. Receptaculum hemisphaericum. *Flores solitarii terminales aut axillares. Hujus congeneres Artemisia Mideraspata & A. minima L.: an etiam Ethulia divaricata L. & Sphaeranthus Africanus Burm. Ind. t. 60 f. 2?*

**ETHULIA**, L. \* Flores flosculosi. Calix polyphyllus simplex æqualis. Semen apice marginatum. *Flores corymbosi terminales, purpurei. Caracter E. Conyzoidis quæ eadem cum Kahiriâ Forsk. ex D. Vahl. An affinium Grangeæ E. divaricata, Struchio E. sparganophora cui flores glomerati axillares & calix imbricatus & semen apice quasi vittatum?*

**CARPESIUM**, L. \* **CONYZOÏDES**, T. \* Flores flosculosi, marginales foeminei. Calix imbricatus hemisphaericus squamis exterioribus longioribus bracteiformibus patulis. *Flores solitarii terminales. Habitus Conyzæ.*

**HIPPIA**, L. \* Flores flosculosi, centrales masculi, marginales foeminei. Calix imbricatus hemisphaericus. Semen compressum marginatum. *Frutices aut herbæ; folia pinnatifida aut simplicia; flores corymbosi aut solitarii.*

**TANACETUM**, T. L. \* *Tanaïse*. Flores flosculosi; marginales saepe 3-fidi foeminei, rarius 5-fidi hermaphroditi. Calix imbricatus hemisphaericus. Semen apice submarginatum. *Folia simplicia aut pinnata; flores saepe corymbosi terminales. An Chrysanthemum flosculosum L. hujus congener?*

**ARTEMISIA**, T. L. \* **ABROTANUM**, T. \* **ABSINTHIUM**, T. \* *Armoise, Aurone, Absinthe*. Flores flosculosi, foeminei hermaphroditis mixti & corollulis integris vix conspicuis instructi. Calix subrotundus imbricatus, squamis rotundatis conniven-



tibus coloratis (viridibus in *Abrotano* T.). Antheræ vix coarctatæ. Semina nuda. Receptaculum nudum, aut in *Absinthio* T. villosum. *Suffrutices aut herbæ. Folia sæpè multifida, in Absinthio incana; flores sæpè paniculati.*

V. Receptaculum paleaceum. Semen nudum seu non papposum. Flores plerumque radiati, rarò flosculosi. *Tarchonanto, Caleæ & Athanasie pappus brevis.*

**TARCHONANTHUS**, V. L. \* **CONYZA**, T. \* *Tarconante*. Flores flosculosi. Calix monophyllus turbinatus, circiter 7-fidus. Flosculi extus pilosi, à basi staminiferi. Germen minimum inferum. Semen nudum (an potiùs coronatum pilis corollam vestientibus?). Receptaculum pilosum. *Frutex canescens; folia tomentosa integerrima; flores paniculati terminales. Character ex sicco, confirmandus in vivo. Germen ex Linnæo superum.*

**CALEA**, L. \* Flores flosculosi. Calix imbricatus laxus. Pappus pilosus. *Character ex Linnæo. Folia alterna aut opposita; flores solitarii aut plures terminales.*

**ATHANASIA**, L. \* **SANTOLINA**, T. \* **GNAPHALIUM**, T. \* *Athanasie*. Flores flosculosi. Calix imbricatus ovatus. Pappus pilosus pilis brevissimis. *Suffrutices aut herbæ; folia indivisa aut multifida; flores sæpè corymbosi aut glomerati terminales, rariùs subsolitarii. Athanasia habitu similis Santolinæ & etiam Absinthio; hinc ergò reponenda, reluctante licèt pappo seminis piloso. Idem de Tarchonantho & Caleæ. Pappus nullus in A. maritimâ quæ verum Gnaphalium T. fortè addendum Santolinæ.*

**MICROPUS**, L. \* **GNAPHALODES**, T. \* Flores flosculosi, centrales 10 masculi, radiales 5 fœminei (corollulis destituti?). Calix duplex, uterque 5-phyllus. Receptaculum in disco nudum, in radio paleaceum. Semina paleis aut squamis calicinis conduplicatis involuta. *Herbulæ lanatæ Filaginoideæ; flores axillares. An Gnaphalio approximandum genus?*

**SANTOLINA**, T. L. \* *Santoline*. Flores flosculosi. Calix imbricatus inæqualis hemisphæricus. *Suffrutices aut herbæ; folia in aliis simplicia tuberculosa minima, in aliis bipinnata; flores sæpè in ramulis solitarii terminales. An hujus congener Athanasia maritima L. habitu tamen & floribus corymbosis dissimilis?*

**ANACYCLUS**, L. \* **COTULA**, T. \* Flores flosculosi, marginales 5-10 fœminei limbo integro. Calix imbricatus inæqualis hemisphæricus. Semina latere membranacea, apice emarginata. *Folia multifida; flores terminales. Habitus Anthemidis.*

**ANTHEMIS**, L. \* **CHAMÆMELUM**, T. \* **BUPHTHALMUM**, T. \* **COTULA**, T. \* *Camomille*. Flores radiati, ligulis lanceolatis numerosis. Calix imbricatus subæqualis hemisphæricus. *Folia*



*sæpè multifida ; flores sæpè in ramulis terminales ; ligulæ altæ aut luteæ , rarò nullæ. A. Matricariâ discrepat receptaculo paleaceo. Calix A. arabicæ quasi bracteis obvallatus.*

**ACHILLEA**, L. \* **MILLEFOLIUM**, T. \* **PTARMICA**, T. \* *Millefolle*. Flores radiati, ligulis 5-10 obcordatis brevibus. Calix imbricatus inæqualis ovatus. *S. frutices aut sæpius herbæ ; folia Millefolii T. multifida , Ptarmicæ T. lanceolata serrata ; flores sæpè corymbosi terminales ; ligulæ in aliis luteæ ; in aliis albæ aut rariùs purpurascens.*

**ERIOCEPHALUS**, L. \* Flores radiati, flosculis paucis masculis, ligulis circiter 5 fœmineis brevibus obovatis 3-fidis. Calix duplex, exterior 5-phyllus, interior 5-fidus; densa inter utrumque lanugo. Semina lanata, non papposa. Paleæ receptaculi ciliato-lanuginosæ. *Frutices ; folia crassiuscula , linearia , integra aut divisa ; flores corymbosi aut paniculati terminales.*

**BUPHTALMUM**, L. \* **ASTEROIDES**, T. \* **ASTERISCUS**, T. \* Flores radiati. Calix duplici aut triplici serie imbricatus, squamis subæqualibus & radio brevioribus in *Asteroïde T.*, aut extimis longioribus & radium superantibus in *Asterisco T.* Semina tum flosculorum, tum præcipuè ligularum lateribus submembranacea, supra marginato-dentata. *Frutices aut herbæ ; folia opposita aut alterna ; flores sæpè terminales. An species oppositifoliæ frutescentes alternifoliis herbaceis verè congeneres ?*

**OSMITES**, L. \* Flores radiati, ligulis neutris. Calix imbricatus, interdum scariosus. Semina apice marginata. *S. frutices alternifolii ; flores terminales.*

**ENCELIA**, Adans. \* Flores radiati, ligulis ovatis neutris. Calix polyphyllus simplex æqualis. Semina ovata compresso-plana, margine eleganter villosa, apice emarginata, singula paleâ membranaceâ conduplicatâ inclusa. *Caulis sublignosus ; folia alterna 3-nervia ; flores pedunculati axillares aut terminales sub-solitarii.*

**SCLEROCARPUS**, Jacq. \* Flores radiati, flosculis circiter 12, ligulis 3 brevissimis subintegris neutris. Calix circiter 6-phyllus; folia 2-3 exteriora majora, caulinis conformia; 3 interiora parva squamiformia, ligulis apposita. Semina ovata subcompressa; horum singulum paleâ involutum conduplicatâ indurata ventricosâ, intus dehiscente, supra acuminatâ. *Herba sublignosa foliis alternis 3-nerviis ; flores solitarii terminales.*

**UNXIA**, LS. \* Flores radiati, flosculis 5 masculis, ligulis 5 fœmineis. Calix 5-phyllus æqualis 10 florus. Semina ovata dura, squamis calicinis involuta. Paleæ receptaculi prætereâ nullæ. *Herba dichotoma oppositifolia, foliis tomentosis sub 5-nerviis ; flores in dichotomiis solitarii. Character ex Linn. Suppl. & x sicco.*

**FLAVERIA**. \* Flores flosculosi. Calix 3-4-phyllus connivens æqualis pauciflorus. Semina oblonga striata, squamis calicinis sæpius involuta. Paleæ receptaculi prætereâ nullæ. *Frutices fo-*



liis oppositis 3-nerviis; flores minimi glomerati terminales, glomerulis in specie Chiloenſi (Milleria Chiloenſis H. R. P.) capitatis, in Peruvianâ à Dombeyo datâ ſpicatis. Carac̃ter ex ſiccis. Genus à Milleriâ diverſum ligulæ deſectū, ab Eupatorio ſeminibus nudis; unâ ſpecie Chiloenſis à Vaillantio dictâ Eupatorio-phalacron & Eupatorioides à Feuilleo Chil. 18. t. 14., quo teſte apud Chiloenſes in tincturis flavis uſurpatur. Confer Stæhelinoïdem Lœſt. diſtinctam caule herbaceo, floribus 1-2 axillaribus & præcipuè receptaculo paleaceo.

**MILLERIA**, L. \* Flores radiati, floſculis 2-4 masculis, ligulâ 1 fœmineâ brevi. Calix 3-5-florus 3 phyllus, foliolis 2 majoribus oppoſitis, tertio medio minore paleæformi. Semen 1 oblongum complanatum, calice connivente tectum. Paleæ receptaculi prætereâ nullæ. *Herbæ oppoſitifoliæ, foliis 3-5-nerviis; flores terminales aut axillares, glomerati aut oppoſitè corymboſi.*

**SIGESBECKIA**, L. \* Flores ſemiradiati, ligulis circiter 5 ſecundis. Calix duplicatus, exterior 5-phyllus patens, interior polyphyllus 5-angularis ſubæqualis. Semina anguloſa paleis involuta. *Herbæ oppoſitifoliæ foliis aſperis ſub3-nerviis; flores pedunculati terminales & axillares. S. occidentalis 1-ligulata, indè Milleriæ affinis.*

**POLYMNIA**, L. \* Flores radiati, floſculis masculis, ligulis 5-10 fœmineis 3-dentatis. Calix duplex, exterior 4-5-phyllus major patens, interior 10-phyllus foliolis (ligularum paleæ?) concavis. Semina obovata. *Herbæ ſubliгноſæ aſperifoliæ; folia oppoſita aut alterna; flores terminales. Hujus non congener Wedelia Jacq.*

**BALTIMORA**, L. \* Flores radiati, floſculis 10-12 masculis, ligulis 5 fœmineis. Calix ſimplex polyphyllus cylindricus. Semina 3-quetra. *Herba 4-gona oppoſitifolia, foliis aſperis 3-nerviis; flores ſubpaniculati terminales.*

**ECLIPTA**, L. \* **BIDENS**, T. \* Flores radiati, floſculis 4-fidis 4-andris, ligulis anguſtiſſimis numeroſis. Calix duplici ſerie polyphyllus ſubæqualis. Semina compreſſa. *Herbæ oppoſitifoliæ foliis aſperis ſub3-nerviis; flores pedunculati axillares & terminales. Hujus congener Micrelium Forſk. ex D. Vahl.*

**VI. Receptaculum paleaceum. Semen apice dentatum aut paleaceum. Flores in plurimis radiati, in paucis floſculofi. Receptaculum Helenii ſubnudum.**

**SPILANTHUS**, L. \* Flores floſculofi, ſæpè 4-fidi 4-andri. Calix duplici ſerie polyphyllus ſubæqualis hemiſphæricus ſquamis non divaricatis. Semina apice 2-fetofa, fetis minimis deciduis. *Herbæ oppoſitifoliæ; flores ſolitarii axillares aut ſæpiùs terminales; receptaculum ſæpè conicum. An Bidens nivea L. congener?*



**BIDENS**, T. L. \* Flores flosculosi 5-fidi, quidam interdum in ligulam producti & sæpè tamen staminiferi. Calix duplici serie polyphyllus inæqualis, foliolis exterioribus sæpè longioribus, difformibus & patulis. Semina apice 2-dentata, nonnunquam 3-4-dentata, dentibus subulatis persistentibus. *Herbæ aut raro frutices; folia sæpius opposita, interdum pinnata; flores axillares aut terminales. An congener Laxmannia Forst. arborea, foliolis calicis exterioribus brevioribus & flosculis 4-fidis 4-andris distincta?*

**VERBESINA**, L. \* **BIDENS**, T. \* Flores radiati, ligulis paucis. Calix duplici serie polyphyllus subæqualis, aut rariùs 1-phyllus multipartitus. Semina apice 2-3-dentata, dentibus subulatis persistentibus. *Herbæ aut frutices; folia aspera, opposita aut rariùs alterna; flores axillares aut terminales. Bidenti affinis sed radiata.*

**COREOPSIS**, L. \* **BIDENS**, T. \* **CORONA SOLIS**, T. \* Flores radiati, ligulis neutris. Calix simplici serie polyphyllus æqualis erectus, sæpè caliculo patente polyphyлло brevior cinctus. Semina compressa, margine membranacea, apice 2 dentata, dentibus subulatis. *Herbæ erectæ; folia sæpius opposita, in quibus an multifida; flores axillares & sæpius terminales; ligulæ quarundam albidæ.*

**ZINNIA**, L. \* Flores radiati, ligulis paucis, integris persistentibus emarcidis. Calix oblongus cylindricus imbricatus inæqualis, squamis rotundatis. Semina compressa, apice 2-dentata dentibus subulatis persistentibus. *Herbæ sæpius oppositifolia; flores solitarii terminales; ligulæ coccineæ aut luteæ. Plantæ interdum luxuriantes calicibus 2-3 concretis & foliis subverticillatis.*

**BALLIERIA**, Aubl. \* Flores flosculosi, 7 centrales masculi, 7 marginales foeminei. Calix 4-5-phyllus æqualis. Corollulæ masculæ basi angustiores. Semina (Silphii) ovata, compresso-plana, apice 2-cornia. *Herba multicaulis; folia ad caulum nodos opposita aspera; flores oppositè paniculati terminales. Character ex Aubl. Guyan. t. 317. An affinium Ivæ & Clibadio?*

**SILPHIUM**, L. \* Flores radiati, flosculis masculis, ligulis foemineis. Calix imbricatus squarrosus squamis latis. Semina ovata magna compresso-plana, apice emarginata & 2-cornia. *Herbæ sæpius altissimæ, caule cylindrico aut angulato; folia sæpius opposita, rariùs alterna aut verticillata; flores axillares & terminales.*

**MELAMPODIUM**, L. \* Flores radiati, flosculis masculis, ligulis 5-8 foemineis. Calix 5-phyllus patens. Semina coronata squamulâ cordatâ involutâ & connivente. *Herbæ oppositifolia; flores terminales aut axillares. Genus recognoscendum In M australis semine Forskalius pilos hamatos, non squamulam describit.*

**CHRYSOGONUM**, L. \* Flores radiati, flosculis masculis, ligulis 5 foemineis. Calix 5-phyllus patens. Semina coronata squamulâ 3-dentatâ, singula paleis 4 conniventibus cincta,



nempè 3 angustissimis & 1 latiore. *Herba oppositifolia ; flores sæpè terminales.*

**HELIANTHUS**, L. \* **CORONA SOLIS**, T. \* *Soleil*. Flores radiati, flosculis medio ventricosis, ligulis neutris. Calix magnus imbricatus squarrosus. Semina apice 2-paleacea paleis acuminatis deciduis. Receptaculum planum. *Herba sæpè altissima ; folia aspera, opposita aut alterna ; flores axillares aut terminales, interdum maximi, disco nonnunquam subfusco.*

**HELENIUM**, L. \* **CORONA SOLIS**, T. \* Flores radiati. Calix simplex multipartitus subæqualis. Semina villosa, caliculo 5-dentato subulato coronata. Receptaculum sphæriceum, medio nudum, margine paleaceum. *Herba altissima Helianthi facie ; folia alterna decurrentia ; flores subcorymbosi terminales. An receptaculo subnudo affinior Doronico aut Inulæ ?*

**RUDBECKIA**, L. \* **CORONA SOLIS**, T. \* Flores radiati, ligulis neutris. Calix duplici serie polyphyllus subæqualis patens. Semina apice marginata, margine membranaceo 4-dentato. Receptaculum conicum. *Herba alternifolia, quædam aspera ; flores sæpè terminales ; discus interdum subfuscus ; ligulæ quarundam luteo-croceæ, in R. purpureâ purpurascens.*

**TITHONIA**, Font. \* Flores radiati, ligulis neutris. Calix gemino ordine polyphyllus subæqualis connivens cylindricus, squamis acutis. Flosculorum basis ventricosa. Semina apice 5-paleacea. *Herba alternifolia ; flores solitarii terminales. Caractèr ex D. Desfontaines Aët. Paris. extr. Vol. XII.*

**GALARDIA**, Foug. \* *Galardienne*. Flores radiati, ligulis neutris apice latioribus 3-fidis. Calix duplici serie polyphyllus subæqualis patens. Semina turbinata, apice 8-paleacea, paleis basi latis scariosis, apice subulatis. Receptaculum planum. *Herba alternifolia, basi ramosa ; flores solitarii terminales longè pedunculati, disco subfusco, ligulis basi rubris, apice luteis. Elegantem plantam descripsere DD. Fougèroux in Aët. Paris. 1786. & Lamark. Dict. 2. p. 590.*

**WEDELIA**, Jacq. \* **POLYMNIA**, L. \* Flores radiati, ligulis 2 lobis. Calix simplex 4-phyllus magnus. Semina coronata pappo seu caliculo campanulato 10-dentato. *Frutex scandens ; folia opposita scabra ; pedunculi 1-flori terminales subsolarii ; paleæ ligularum majores calicem interiorem metientes. Caractèr ex Jacq. Amer.*

**OEDERA**, L. \* Flores radiati. Calix communis imbricatus squamis numerosis subæqualibus parentibus & disco longioribus, complectens supra receptaculum commune paleaceum calices plures ipso breviores, inæqualiter imbricatos subcylindricos paucifloros, intus paleaceos, quasi semiradiatos ligulis hinc brevibus non exsertis, indè longioribus & calici communi æqualibus. Semina coronata caliculo brevi paleaceo. *Suffrutices ; folia opposita, subimbricata, squamiformia ; capitulum simplex terminale.*



**AGRIPHYLLUM.** \* **CROCODILODES**, Adanf. \* Flores radiati; flosculi profundè 5-fidi; ligulæ neutrae antheris effœtis instructæ absque stylo. Calix triplici ordine polyphyllus squarrosus, squamis dentato-spinosis, exterioribus reflexis. Receptaculum paleis infrà coalitis alveolatum, alveolis 1-floris 1-spermis. Semina turbinata villosa, coronata paleis plurimis brevibus. *Frutex canescens; folia Ilicis dentato-spinosa, alterna; flores in ramulis terminales. Hinc referendus Carthamus... Walth. Hort. 13. 1. 7. à Linnæo nunc Gorteria fruticosa, nunc Atractylis oppositifolia dictus. Ἀλρία Ilex, Φύλλον folium.*

**VII. Receptaculum paleaceum. Semen papposum, pappo plumoso aut piloso aut aristato. Flores sæpiùs radiati.**

**ARCTOTIS**, L. \* **ARCTOTHECA**, V. \* Flores radiati, flosculis sæpè masculis, ligulis fœmineis aut rariùs neutris. Calix imbricatus inæqualis hemisphæricus, squamis interioribus apice scariosis. Semen villosum coronatum pappo 5-phyllo. Receptaculum in aliis villosum, in aliis paleaceum. *Herbæ aut rariùs suffrutices; folia simplicia aut multifida; flores terminales. Species quædam habitu similes Calendulæ, quædam Anthemidi. Genus minùs naturale & plantas dissimiles complectens, in vivis recognoscendum.*

**TRIDAX**, L. \* Flores radiati ligulis 3-partitis. Calix imbricatus cylindricus. Pappus setaceus multiradiatus simplex. *Herba repens oppositifolia; flores solitarii terminales, radio flavo. Character ex Linnæo.*

**AMELLUS**, L. \* Flores radiati, ligulis 2-3-dentatis. Calix imbricatus cylindricus. Pappus pilosus. *Folia opposita; flores terminales. An verè congener A. umbellatus habitu diversus?*

**PARDISIUM**, Burm. \* Flores radiati, ligulis 3-dentatis linearibus. Calix imbricatus foliolis lanceolatis. Stylus semibifidus. Pappus plumosus. *Folia radicalia; scapi 1-flori. Character ex Burm. Ind. prod. p. 26.*

**CERUANA**, Forsk. \* Flores radiati ligulis angustis 3-dentatis. Calix polyphyllus æqualis connivens cylindricus. Semina cuneiformia compressa, coronata denticulis setâ terminatis. *Herba diffusa; flores alii sessiles axillares, alii pedunculati terminales pedunculo 3-bracteato. Character ex Forskalio.*

**VIII. Corymbiferae anomalæ, antheris non coalitis sed tantummodò approximatis. Calix monoïcus.**

**IVA**, L. \* **CONYZA**, T. \* **TARCHONANTHOS**, V. \* Flores flosculosi, centrales masculi, marginales 5 fœminei corollulis minimis vix conspicuis. Calix 3-5-phyllus æqualis. Recepta-



culum paleaceum. Semina non papposa. *Frutices aut herbæ; folia aspera 3-nervia, opposita aut interdum alterna; flores spicati aut paniculati, axillares aut terminales; fœminei ex Linnaeo 2-styli & apetal.*

**CLIBADIUM**, Allam. L. \* Flores flosculosi, centrales masculi pedicellati, marginales 3-4 fœminei sessiles. Calix imbricatus. Receptaculum... Drupæ umbilicatæ 1-spermæ. *Folia opposita scabra; pedunculi oppositi; corollæ albæ; drupæ virides. Character ex Allamando & Linnaeo.*

**PARTHENIUM**, L. \* **PARTHENIASTRUM**, Niss. \* **HYSTEROPHORUS**, V. \* Flores radiati, flosculis masculis, ligulis 5 brevibus fœmineis. Calix hemisphæricus simplex 5-phyllus æqualis. Receptaculum paleaceum. Semina non papposa. *Herbæ; folia alterna simplicia aut pinnatifida; flores corymbosi terminales.*

**I X.** Corymbiferæ anomalæ, antheris approximatis non coalitis. Calices dioïci.

**AMBROSIA**, T. L. \* *Ambrosie*. Monoïca. MASC. Calix 1-phyllus hemisphæricus receptaculo nudo, multiflorus. Flosculi tubulosi 5-fidi 5-andri, stylo & stigmate unico. FÆM. Calix 1-phyllus integer, ventre extus 5-dentato aut 5-tuberculoso. Huic corolla 0, germen superum, styli 2 basi juncti, stigmata 2, semen 1 calice indurato persistente nuciformi tectum. *Frutices aut herbæ assurgentes; folia aspera, inferiora nonnunquam opposita, superiora sæpius alterna; flores longè spicati terminales & axillares, superiores in spicâ masculi, inferiores pauciores fœminei glomerati glomerulis 2-5-floris 3-bracteatis. An flosculi masculi pro calicibus apetalis in involucri communi aggregatis potius habendi? Indè genus Urticis & præcipuè Cannabi affine ut & sequentia.*

**XANTHIUM**, T. L. \* *Lampourde*. Monoïcum. MASC. Calix polyphyllus patens subæqualis, multiflorus hemisphæricus, receptaculo paleaceo minimo. Flosculi tubulosi 5-fidi 5-andri. FÆM. Calix oblongus 1-phyllus, apice divisus, extus muricatus, intus 2-locularis. Germen 1 in singulo loculo, tectum non inferum; stylus 1; stigmata 2 longa. Semen magnum oblongum. Drupa ex calice persistente sicca muricata apice sæpius 2-rostris, 2-locularis, 2-sperma. *Herbæ lappaceæ aut frutices; folia alterna subaspera, in X. spinoso utrinque spinâ magnâ 3-partitâ quasi stipulata; flores spicati axillares & terminales, spicâ brevi suprâ masculâ, infrâ fœmineâ. X. fruticoso LS. habitus & spica Ambrosiæ, sed fructus muricatus 2-spermus.*

**NEPHELIUM**, L. \* Monoïcum. Calix 1-phyllus campanulatus. Corolla 0. MASC. Calix 5-dentatus. Stamina 5, antheris basi 2-partitis. FÆM. Calix 4-dentatus. Germina 2; singulis styli 2; Stigmata 2. Drupæ 2 siccæ ovatæ muricatæ 1-spermæ. *Folia alterna impari-pinnata; flores racemosi racemo monoïco. Character ex*



*Linnaeo. An genus affine Xanthio, licet calicibus masculis 1-floris; an inde confirmanda flosculorum Ambrosiæ & Xanthii indoles calicina & triplicis generis affinitas cum Urticis?*

*Obs.* Huc revocantur Radiatæ omnes & Flosculosæ plures Tournefortii quæ separari nequeunt, invicem valdè affines, ut Bidens & Verbesina, Anacyclus & Anthemis &c., interdum etiam congeneres ut in Tusſilagine, Senecione &c. Divisiones à receptaculo & pappo huc admiſſæ eadem ac in Cichoraceis exhibent commoda & vitia, & etiam majora ob generum copiam. Non tamen præponenda ſeries Linnaæana à ſexuum præſentiâ aut abortu deducta quæ plantas congeneres frequenter diſſociat. An altera inſtituenda diſtributio naturæ magis conſentanea, in quâ Eupatoria, Aſteres, Matricariæ, Helianthi, genera que iſtis affinia certis diſtinguantur caracteribus indagandis? An aptior diviſio à corollularum formâ, numero & colore, ab inſertione foliorum, à conformi demum habitu & plurimis ideò collectis ſignis? Omnes tamen recognoscendæ prius ſpecies ac mutuò conferendæ. Interea in præſenti diſtributione præſciuntur genera Cinarocephaliſ affiniora utpotè flosculoſa ſemine pappoſo & calice imbricato, ſed diſcrepantia præcipuè receptaculo nudo. Ordinem abſolvunt plantæ antheris diſtinctis inſignitæ, inde Diſſaceis proximæ. Radiatæ nunc flosculoſis conſociantur in ſeſtione individuâ, nunc faciliùs ſeparantur cæteris minùs obſtantibus cauſis, & nonnullis exceptionibus admiſſis. Seſtio ſexta quali ſuperflua, præcedenti fortè addenda niſi attentiori examine in diverſas jam exiſtentes diſpertiat. Hæc de generum diſtributione: ſequentia inſuper ſedulò notanda. 1º. Flosculi ſæpiùs hermaphroditi, ligulæ ſæpiùs fœmineæ, tales habeantur dum aliis non designantur ſignis à ſexu depromptis. 2º. Obſervante Bern. Juſſæo, flosculi quidam fœminei tubuloſi capillares, breves apice integro, ſtylum ultra prominulum arcuè complectuntur ita ut cum ipſo quaſi coaleſcant nec diſtinguantur niſi oculo armato & admotâ acu partes diſcernente; unde à Linnaeo germina quædam dicuntur nuda & apetala in Gnaphalio, Artemiſiâ, Baccharide, Cotulâ &c. 3º. Exceptiones in ordine inſignes ſunt antheræ diſtinctæ in Kuhnîâ & Artemiſiâ & Corymbiferis anomalis, ligulæ hermaphroditæ in Barnadeſiâ, corollæ defectus in fœmineis floribus Micropi, Ambroſiæ &c., germen ſuperum in quibuſdam anomalis & fortè in Tarchonanthe, flores dioici in Gnaphalio dioico, monoici in Ambroſiâ & conſinibus. 4º. ſigna ambigua ſunt receptaculum ſemipaleaceum, ſemina pappoſa nudis adjuncta, pappi plumoſi ſimul ac ſetoſi, fortuita ligularum in flosculos & frequentior Hortulanique notiſſima flosculorum in ligulas mutatio.





## CLASSIS XI.

## DICOTYLEDONES MONOPETALÆ.

## COROLLA EPIGYNA. ANTHERÆ DISTINCTÆ.

**C**ALIX proprius monophyllus superus. Corolla monopetala, rarissimè polypetala petalis basi latâ junctis, epigyna seu pistillo imposita, sæpè regularis. Stamina definita, filamentis corollæ insertis, antheris distinctis. Germen simplex inferum; stylus sæpè unicus, interdum multiplex aut nullus; stigma simplex aut divisum. Semen inferum, vel sæpiùs fructus inferus, capsularis aut baccatus uni aut multilocularis, mono aut polyspermus.

*Obs.* Antherarum distinctio classem à præcedenti scernit, classium multiplicandarum causâ institutam, aliundè similem mutuo sexuum situ quorum alter alteri mediatè subicitur interpositâ corollâ. Iisdem prætereà consociatis generalibus signis, corolla monopetala & epigyna exigit pariter germen inferum simplex, & stylum sæpè unicum, & stamina definita epipetala, & calicem proprium monophyllum cum germine concreascentem ideòque superum. Triplex hùc accersitur ordo foliorum oppositione conformis: Dipsacæ floribus sæpè aggregatis monospermis, corculo assurgente, perispermo nullo; Rubiacæ sæpiùs dispermæ aut biloculares multilocularesve, capsulares aut baccatæ, perispermo corneo magno corculum parvum complectente, calice sæpiùs infrâ nudo, foliis plerumque vaginâ aut stipulâ mediante junctis; Caprifolia demùm calice sæpiùs bracteato aut caliculato, baccata mono aut polysperma, corculo minimo in cavitate perispermi carnei magni contento, foliis nec vaginantibus nec stipulatis. Dipsacæ Corymbiferis anomalis accedunt; genera quædam in Caprifoliis pseudopolypetala umbelliflora



& alternifolia Umbelliferis indè assimilantur : sic decima classis duodecimæ connectitur ; sic à Monopetalis ad Polypetalas facilis progressio.

## O R D O I.

### DIPSACEÆ, LES DIPSACÉES.

**CALIX** simplex aut duplicatus. Corolla tubulosa, limbo diviso. Stamina definita. Stylus unicus ; stigma simplex. Capsula plerumque monosperma non dehiscens habitu seminis nudi, rarissimè bi aut trilocularis loculis monospermis. Corculi perispermo destituti radícula superior. Caulis plerumque herbaceus. Folia opposita aut rariùs verticillata. Flores in paucis distincti, in plurimis aggregati suprà receptaculum commune paleaceum, intra calicem communem polyphyllum.

#### I. Flores aggregati.

**MORINA**, T. L. \* *Morine*. Calix proprius duplex, exterior inferus tubulosus dentato-spinosus inæqualis, interior superus bilobus persistens. Corolla tubo longo, limbo 2-labiato, suprà 2-lobo, infrà 3-lobo. Stamina 2 exserta. Stigma 1. Semen ovatum calice interiore coronatum. *Folia 4 verticillata sinuato-spinosa ; flores densè verticillati axillares, verticillis in spicam terminalem dispositis.*

**DIPSACUS**, T. L. \* *Cardiure*. Calix proprius duplex, uterque superus vix prominulus & subinteger. Corolla tubo brevi, limbo 4-lobo. Stamina 4 exserta. Stigma 1. Semen oblongum angulosum calice utroque coronatum. Calix communis multiflorus polyphyllus foliolis disco sæpè longioribus. Receptaculum conicum paleaceum, paleis rigidis flores plerumque superantibus. *Herbæ aculeatæ aut asperæ ; folia interdum basi connata ; capitula terminalia.*

**SCABIOSA**, T. L. \* *Scabiense*. Calix proprius duplex, uterque superus, variè divisus & persistens. Corolla tubo oblongo, limbo 4-5-lobo sæpè inæquali. Stamina 4 exserta. Stigma emarginatum. Semen utroque coronatum calice, interiore aristato aut rariùs plumoso, exteriori sæpè membranaceo scarioso. Calix communis multiflorus, simplici aut multiplici serie po-



lyphyllus, æqualis aut inæqualis, hemisphæricus disco sæpè non longior. Receptaculum convexum sæpiùs paleaceum. *Folia simplicia aut pinnatifida; flores sæpè terminales. Species quædam fruticæscentes. Calix proprius exterior, interdum ut in Morinâ quasi inferus semini circumpositus, non cum ipso concrescens.*


**KNAUTIA**, L. \* **SCABIOSA**, V. \* Calix proprius duplex, uterque superus, exterior denticulatus aut subinteger, interior urceolatus minimus limbo ciliatus aut plumosus. Corolla tubo oblongo, limbo 4-fido inæquali, lacinia exteriori majore. Stamina 4. Stigma 2-fidum. Semen calice ciliato aut papposo coronatum. Calix communis pauciflorus, simplici serie polyphyllus connivens cylindricus, flosculis æqualis. Receptaculum minimum pilosum. *Flores terminales.*

**ALLIONIA**, L. \* Calix proprius simplex superus subinteger. Corolla infundibuliformis sub 5-loba. Stamina 4 exserta. Stigma multifidum. Semen angulatum, vix coronatum. Calix communis 5-phyllus æqualis 3-florus. *Flores axillares aut terminales. Habitus Boerhaaviæ, & folia similiter opposita altero minore.*

## I I. Flores distincti.

**VALERIANA**, T. L. \* **VALERIANELLA**, T. \* *Valériane, Mâche.* Calix simplex superus 5-6-dentatus, aut marginatus subinteger maturatione in pappum plumosum evolvendus. Corolla tubulosa basi calcarata aut gibba, limbo 5-fido æquali aut rariùs inæquali. Stamina sæpè 3, rariùs 1-2 aut 4. Stigmata 1-3. Semen papposum, aut capsula 2-3-locularis 2-3-sperma apice nuda aut calicinis dentibus coronata. *Flores plerumque corymbosi terminales, in V. dioicâ declines, in Valerianâ T. longiores calcarati 1-spermi semine papposo, in Valerianella T. breviores vix calcarati 2-3-spermi capsula non papposâ. An genus dividendum?*

**Obs.** Ordo præcedenti conterminus floribus aggregatis monopetalis epigynis, discrepans antheris non coalitis & radiculâ corculi superiore. Nyctaginibus componitur habitu & aliis nonnullis signis, cæterum ex observatis pag. 91 diversus, præcipuè staminibus epipetalis & defectu typi in semine centralis. An membranâ seminis interior crassiuscula pro perispermo habenda, & ideò Dipsacæ perispermo instructæ? An, ut in Morinâ & Scabiosis quibusdam, sic & in cæteris Dipsacæis veris calix proprius exterior non superus, sed rectiùs inferus semini arctè circumpositus? Certior his solutis exsurget ordinis character & affinitas. An huic omninò coordinanda Valeriana cui flores distincti & calix proprius simplex & fructus interdum di aut trispermus? Quædam Valerianæ species habitu & fructu dispermo Sherardiam & Asperulam æmulantur, Dipsacæasque Rubiaceis approximant.





## ORDO II.

## RUBIACEÆ, LES RUBIACÉES.

**C**ALIX monophyllus, superus simplex, limbo diviso, aut rariùs integro. Corolla regularis, plerumque tubulosa, limbo diviso. Stamina definita, quatuor aut quinque, rariùs plura, tubo corollæ inserta, ejusdem laciniis alterna & numero aequalia. Germen inferum; stylus unicus aut rarissimè duplex; stigma plerumque duplex. Fructus nunc dicoccus coccis monospermis non dehiscentibus & semina nuda mentientibus, nunc monocarpus capsularis aut baccatus, sæpè bilocularis loculis mono aut polyspermis, interdum uni aut multilocularis, limbo calicis persistente coronatus, aut eodem caduco nudus. Corculum oblongum tenue perispermo magno corneo laterali involutum. Caulis herbaceus aut frutescens arboreusve. Folia in paucis verticillata, in plurimis opposita petiolis basi junctis mediante sæpiùs stipulâ simplici aut rariùs vaginâ ciliatâ.

I. Fructus dicoccus dispermus. Stamina sæpiùs quatuor. *Folia plerumque verticillata; caulis plerumque herbaceus.*

**SHERARDIA**, L. \* **APARINE**, T. \* Calix 4-dentatus. Corolla infundibuliformis 4-fida. Semina 2 oblonga, coronata, hinc plana, inde convexa. *Flores axillares aut terminales. Species una suffrutescens.*

**ASPERULA**, L. \* **GALLIUM**, T. \* **APARINE**, T. \* **CRUCIATA**, T. \* *Aspérule*. Calix 4-dentatus. Corolla infundibuliformis 4-fida (rarò 3-fida & 3-andra). Baccæ 2 siccae globosæ, non coronatæ, coalitæ 1-spermæ. *Flores terminales aut axillares. Folia superiora A. cynanchicæ opposita.*

**GALLIUM**, T. L. \* **APARINE**, T. \* *Cailleraut, Galiet, Gratte-ron*. Calix 4-dentatus. Corolla rotata 4-fida (rarissimè 3-fida 3-andra). Semina 2 subrotunda, lævia in *Gallio T.*, aut as-



pera in *Aparine* T., non coronata. *Herbæ glabræ aut asperæ; flores terminales sæpè corymboso-paniculati, aut axillares.*

**CRUCIANELLA**, L. \* **RUBEOLA**, T. \* *Crucianelle*. Calix 2-fidus. Corolla filiformis tubulosa 4-fida (rarò 5-fida 5-andra). Semina 2 oblonga, non coronata. *Folia sæpè linearia; flores bracteati densè spicati terminales, aut rariùs corymbosi.*

**VALANTIA**, T. L. \* **CRUCIATA**, T. \* *APARINE*, T. \* *Croisette*. Calix subinteger. Corolla plana 4-partita, vix tubulosa. Semen sæpè unicum globosum, altero abortivo. Flores masculi intermixti 3-4-fidi 3-4-andri, pistillo abortivo. *Herbæ læves aut asperæ; flores axillares; folia plerumque 4 verticillata, nonnunquàm maturatione in caulem reflexa.*

**RUBIA**, T. L. \* *Garence*. Calix 4-dentatus. Corolla campanulata 4-fida, interdum 5-fida 5-andra. Baccæ 2 subrotundæ glabræ. *Herbæ asperæ aut læves; flores corymbosi axillares & terminales.*

**ANTHOSPERMUM**, L. \* Calix minimus 4-dentatus. Corolla (calix ex Linn.) tubo brevi, limbo 4-partito. Fructus oblongus in 2 semina partibilis. *Frutex; folia linearia verticillata; flores axillares. Genus ex Linnæo dioicum & apetalum calice 4-fido, sed certius hermaphroditum floribus masculis & fæmineis commixtis & 1-petalum observato infra corollam calice minimo. Character ex Bern. Jussæo.*

II. Fructus dicoccus dispermus. Stamina quatuor; rariùs quinque aut sex. *Folia sæpiùs opposita, mediante vaginâ ciliatâ; caulis plerumque herbaceus.*

**HOUSTONIA**, Gron. L. \* Calix 4-dentatus. Corolla infundibuliformis 4-fida. Stamina 4 minima. Germen superum ex Linn. Capsula didyma 2-ocularis 2-valvis 2-sperma. *Flores terminales. H. purpureæ germen certè inferum. An idem verè superum in H. cæruleâ indè ad Gentianas rejiciendâ?*

**KNOXIA**, L. \* Calix 4-fidus. Corolla tubulosa filiformis, limbo 4-fido. Stamina 4. Semina 2 subrotunda acuminata, hinc plana, indè 3-striata, axi filiformi suprâ annexa. *Flores alternè spicati terminales.*

**SPERMACOCE**, L. \* Calix 4-dentatus. Corolla infundibuliformis 4-fida. Stamina 4. Capsulæ 2 connatæ oblongæ, singulæ 1-spermæ apice 2-cornes. *Flores axillares interdum verticillati, aut capitati terminales. An fructus potiùs monocarpus? Species quædam suffrutescentes.*

**DIODIA**, Gron. L. \* Calix 2-fidus. Corolla tubulosa infundibuliformis 4-fida. Stamina 4. Capsula ovata 4-gona coronata 2-ocularis 2-valvis, 2-sperma. *Herba procumbens; flores solitarii axillares.*



**GALOPINA**, Thunb. \* Calix integer non prominens (o ex Thunb.). Corolla 4-fida laciniis revolutis. Stamina 4 antheris oblongis erectis. Styli 2. Fructus minimus partibilis in 2 semina subglobosa mucicata. *Flores oppositè & laxè paniculati terminales. Character ex Thunb. Diff.*

**RICHARDIA**, Houtt. L. \* Calix 6-fidus. Corolla cylindracea infundibuliformis 6-fida. Stamina 6. Stigmata 3. Semina 3 conniventia, supernè latiora. *Herba 4-gona; flores capitati terminales & axillares.*

**PHYLLIS**, L. \* Calix 2-fidus. Corolla 5-partita. Stamina 5. Styli 2. Semina 2 oblonga conniventia, hinc plana, inde convexa, supernè latiora & axi filiformi centrali annexa. *Frutex; folia 3 verticillata; flores corymbosi terminales & axillares.*

III. Fructus monocarpus bilocularis polyspermus.  
Stamina quatuor. *Folia opposita; caulis herbaceus frutescens.*

**HEDYOTIS**, L. \* Calix 4-fidus. Corolla infundibuliformis 4-fida. Capsula globoso-didyma coronata 2-ocularis polysperma, transversim dehiscens. *Herbæ aut suffrutices; flores terminales aut axillares.*

**OLDENLANDIA**, Pl. L. \* Calix 4-fidus. Corolla 4-fida, vix tubulosa. Capsula coronata parva 2-ocularis polysperma inter dentes calicinos dehiscens. *Herbæ, quædam sublignosæ; pedunculi terminales aut axillares, uni aut multiflori; folia basi juncta vaginâ ciliari.*

**CARPHALEA**. \* Calix turbinatus 4-fidus, laciniis oblongis spatulatis scariosis persistentibus. Corolla tubo filiformi longo, fauce ventricosâ intus hirtâ, limbo 4-partito, laciniis angustis. Antheræ subsessiles oblongæ, fauci insertæ. Stigma acutum? Capsula calice coronata, 2-ocularis polysperma, 2-valvis dissepimento valvis opposito bipartibili & iisdem semiseptiferis continuo. *Frutex aridus hyssopifolius; flores oppositè corymbosi terminales. Habitus Serissæ; calix Petreæ. Character ex sicco Commerstonii specimine Madagascariensi innominato. Καρχαλέος aridus. Confer cum Serissâ.*

**COCCOCIPSILUM**, Brown. \* Calix 4-fidus laciniis linearibus. Corolla infundibuliformis 4-loba. Capsula coronata succulenta pisiformis 2-ocularis polysperma seminibus dissepimento affixis. *Herba; folia stipulacea; flores axillares aut terminales. Character ex Brown. Jam. 144. t. 6. f. 2.*

**GOMOZIA**, Mut. LS. \* Calix integer non prominens (o ex LS.). Corolla tubo filiformi brevi, limbo campanulato 4-fido. Bacca 2-ocularis polysperma. *Herba diffusa; flores solitarii terminales sessiles. Car. ex LS. Confer Soldanellam... Feuill. Peruv. 1. t. 44.*



**NACIBEA**, Aubl. \* **MANETTIA**, Mut. L. \* Calix 4-8-fidus. Corolla tubulosa fauce coarctata, limbo 4-partito intus hirsuto. Capsula coronata ovata compressa 2-valvis, valvis navicularibus margine introflexis, quasi 2-capsularis & ideo 2-locularis (1-locularis ex Linn.), polysperma, feminibus orbiculatis margine membranaceis, columellæ oblongæ intrâ singulam valvam centrali annexis. *Herbæ volubiles aut reclinatæ; pedunculi solitarii axillares multiflori, pedicellis oppositis 1-bracteatis. Character ex Aubl. Guyan. t. 37. Hujus congener Manettia L. licet descriptione paulò diversa.*

**TONTANEA**, Aubl. \* Calix 4-fidus. Corolla infundibuliformis 4-fida. Antheræ exsertæ. Bacca parva coronata ovata 2-locularis 2-partibilis polysperma feminibus marginatis dissepimento (parallelo ex Aubl. ic.) affixis. *Herba repens radicans; pedunculi axillares multiflori. Character ex Aubl. Guyan. t. 42. Confer Sicelium Brownæi.*

**PETESIA**, Brown. L. \* **LYGISTUM**, Brown. \* Calix 4-dentatus. Corolla infundibuliformis 4-loba. Bacca globosa coronata 2-locularis polysperma. *Character ex Linnæo. Frutices; pedunculi axillares bi aut multiflori. Ex Browneo bacca Lygisti 4-locularis 4-sperma, Petesiæ 2-locularis 2-sperma: genus ergò recognoscendum. Calix P. stipularis 5-fidus. An congener Poutaletsje Rheed. Mal. 4. t. 57. Lawsoniæ adjectum à Linnæo?*

**FERNELIA**, Commerf. \* Calix 4-fidus laciniis subulatis. Corolla parva 4-loba, tubo brevi. Bacca pisiformis coronata vix carnosa, polysperma 2-locularis; receptaculum feminiferum centrale dissepimenti medio deficientis vicem supplens, & eodem marginali ex fructûs parietibus prominulo zonatim cinctus. *Arbuscula buxifolia, Mauritanis faux Buis dicta; flores subsolitarii axillares. Character ex Commerf. & ex sicco. Randiæ affinis, sed 4-andra.*

**CATESBÆA**, L. \* Calix minimus 4-dentatus. Corolla magna infundibuliformis, tubo longissimo sensim dilatato, limbo 4-lobo. Stamina longissima, imæ corollæ inserta; antheræ oblongæ exsertæ. Stigma 1 ex Linn. Bacca pruniformis coronata, polysperma (1-locularis ex Linn.) 2-locularis dissepimento & receptaculo ut in Ferneliâ dispositis. *Frutex buxifolius spinosissimus, spinis & foliis decussatim oppositis; flores solitarii axillares penduli.*

IV. Fructus monocarpus bilocularis polyspermus.

Stamina quinque. *Folia opposita; caulis sæpè frutescens.*

**RANDIA**, Houst, L. \* Calix 5-fidus. Corolla tubulosa, fauce non dilatata, limbo 5-fido. Antheræ intrâ faucem subsessiles.



Bacca sicca cerasiformis, vix coronata (1-locularis ex Linn.), 2-locularis more Ferneliæ, polysperma. *Arbusculæ aut frutices, in extremis ramulis sæpè spinosi, quidam buxifolii; spinæ 4 verticillatæ, aut sæpius 2 oppositæ cum foliis decussatæ; flores axillares subsolitarii aut plures terminales. Hujus congener Mussænda spinosa L.*

**BELLONIA**, Pl. L. \* Calix 5-fidus laciniis lanceolatis. Corolla rotata, tubo brevi, limbo plano obtusè 5-partito. Antheræ conniventes vix exsertæ. Stigma 1. Capsula turbinata, calicinis laciniis conniventibus rostrata, 1-locularis polysperma. *Frutex ramis nodosis, ad nodos foliosis; folia aspera; pedunculi multiflori axillares & sæpius terminales. Character ex Linnaeo. Genus recognoscendum; an verè Rubiaceum? An stipulæ foliis interjectæ?*

**VIRECTA**, LS. \* Calix 5-fidus dentibus interjectis. Corolla infundibuliformis limbo 5-partito. Antheræ intrâ tubum, conniventes. Capsula angulata coronata hispida, 1-locularis polysperma; receptaculum interius carnosum, obtectum una serie seminum. *Herba Surinamensis Mercurialis facie; pedunculi in ramulorum dichotomiâ terminales 2-flori. Character ex Linn. Suppl. Natibæ fortè affinis, sed 5-andra. An capsula verè 1-locularis?*

**MACROCNEMUM**, Brown. L. \* Calix turbinatus 5-dentatus. Corolla campanulata 5-loba. Stamina imo tubo inserta; antheræ intrâ faucem. Capsula turbinata 2-locularis polysperma, seminibus imbricatis. *Frutex; flores paniculati. Character ex Linn.*

**BERTIERA**, Aubl. \* Calix turbinatus 5-dentatus. Corolla tubulosa, fauce hirsutâ, limbo 5-fido. Antheræ subsessiles vix exsertæ. Bacca pisiformis coronata 2-locularis polysperma, dissepimento seminifero. *Frutex; flores racemosi terminales bracteolati. Character ex Aubl. Guyan. t. 69. Species Commersoniana congener, ab eodem Zaluzania dicta exhibet in singulis capsulæ subbaccatæ loculis receptaculum seminiferum prominulam dissepimento affixum.*

**DENTELLA**, Forst. \* Calix 5-fidus sub limbo coarctatus. Corolla infundibuliformis, limbo erecto 5-fido, laciniis 3-dentatis, dente medio productiore. Stamina filamenta breviora; antheræ oblongæ non exsertæ. Capsula pisiformis coronata, 2-locularis polysperma receptaculis seminiferis intrâ loculos prominulis. *Planta repens. Character ex Forst. Austr. t. 13.*

**MUSSÆNDA**, Herm. L. \* Calix 5-fidus laciniis linearibus. Corolla infundibuliformis, tubo longo vix suprâ dilatato, limbo plano 5-partito. Antheræ oblongæ intrâ tubum subsessiles, non exsertæ. Capsula ovata membranacea, apice nuda aut coronata, 2-locularis polysperma, receptaculo seminifero elevato loculos bipartiente; semina ideò quadrifariam disposita, numerosa minutissima. *Frutices, plerique hirsuti; flores sæpè corymbosi terminales bracteati; corolla sæpè extus hirsuta. Hic sola sistenda.*



*M. frondosa* L. *cujus inf per lacinia una calicina persistens cæteris deciduis, producta in folium amplum petiolarum caulinis conforme, sed discolor & 5-7-nerve. Generi adjicienda Landia Commers Herb. distincta calicinis laciniiis æqualibus, in alterâ specie deciduis, in alterâ persistentibus; & fortè Sipanea Aubl. Guyan. t. 56, dissimilis capsulâ minimâ siccâ 2-valvi, coronatâ laciniiis calicinis æqualibus.*

**CINCHONA**, L. \* *Quinquina*. Calix turbinatus 5-dentatus. Corolla tubulosa, limbo 5-fido erecto intus hirsuto, aut 5-partito parente longiore & angustiore glabro. Stamina filamenta oblonga, medio tubo inserta; antheræ longæ, in corollis hirsutis latentes, in glabris plurimum exsertæ. Stigma clavatum sub2-fidum. Capsula oblonga coronata 2-valvis, 2-ocularis valvis margine introflexo dissepimentum conficientibus, quasi 2-capsularis iisdem maturatione divaricatis intusque dehiscen-  
tibus; semina in singulo loculo plurima compressa marginata, receptaculo centrali oblongo affixa. *Arbustulae; flores in C. officinali & affinibus hirsuti corymboso-paniculati terminales, in C. Caribæa glabri longiores axillares subsolitarii.*

**TOCOYENA**, Aubl. \* Calix turbinatus 5-dentatus. Corolla tubulosa longissima, tubo supra dilatato, limbo 5-partito. Antheræ intra faucem subsessiles vix exsertæ. Stylus sub stigmate 2-lamellato fusiformis incrassatus. Capsula subbaccata ovata coronata 2-ocularis polysperma feminibus pulpâ obductis. *Planta sublignosa; flores 2-bracteati conferti terminales. Character ex Aubl. Guyan. t. 50.*

**POSOQUERIA**, Aubl. \* Calix turbinatus 5-dentatus. Corolla tubulosa longissima, fauce villosa parum dilatata, limbo 5-partito patente, laciniiis longis angustis. Antheræ exsertæ filamentis brevibus intra faucem infixæ. Stigma sub3-fidum. Bacca oviformis magna coronata succulenta polysperma. *Frutex; pedunculus terminalis multiflorus, floribus tubo ad medium incurvo semipendulis. Character ex Aubl. Guyan. t. 51. An stylus potius 2-fidus; an fructus 2-ocularis?*

**RONDELETIA**, Pl. L. \* Calix 5-fidus. Corolla infundibuliformis, apice ventriculosa, limbo obtusè 5-partito plano. Antheræ non exsertæ. Bacca subrotunda coronata 2-ocularis polysperma, apice bifuriâ dehiscens. *Arbustulae aut frutices; flores corymbosi terminales. Species quædam ex Jacq. & Linn. in singulo loculo 1-spermæ, hinc eliminandæ.*

**GENIPA**, T. L. \* *Génipayer*. Calix turbinatus margine integro. Corolla calice duplò longior, cylindrica limbo patente 5-partito magno. Antheræ in fauce sessiles longæ exsertæ. Bacca magna ovata carnosâ, apice attenuato truncata 2-ocularis polysperma. *Arbor; folia magna; flores subcorymbosi terminales.*

**GARDENIA**, Ell. L. \* Calix 5-dentatus aut 5-fidus, laciniiis interdum obliquatis. Corolla infundibuliformis tubo sæpè longo, limbo plano 5-9-fido. Stamina 5, antheris sessilibus, intra



faucem latentibus aut parùm exsertis. Bacca ficca 2-4-locularis polysperma, feminibus numerosis duplici serie dispositis in singulo loculo. *Character ex Linn. Suppl. Arbores aut frutices; flores subsolitarii terminales aut axillares. Genus in vivis recognoscendum. Calix G. Thunbergiæ spathæformis hinc semisfissus, inde 5-8-fidus laciniis spatulatis, corollæ limbus 8-10-partitus, stamina 8-10, germen apice tuberculatum, stigma 5-fulcatum, bacca 4-locularis: an genere diversa? Species una gummoso-resinosa. Quasdam spinescentes à Linnæo fil. Suppl. huc relatas repellit D. Lamarck ad Canthium & Randiam, simul Gardeniæ adjiciens Linnæi Mussændas omnes.*

**PORTLANDIA**, Brown. L. \* Calix magnus 5-fidus. Corolla maxima infundibuliformis sensim dilatata, limbo 5-fido. Stamina 5 imo tubo inserta; antheræ longæ erectæ vix exsertæ. Stigma 1. Capsula obovata 5-angularis 5-ftriata, apice retusa & basibus laciniarum calicinarum coronata, 2-locularis polysperma, ab apice ad basim 2-valvis, valvis (ut in Acantho) medio semiseptiferis, dissepimento igitur iisdem continuo & bipartibili; semina compressa subrotunda. *Arbuscula grandiflora; pedunculi axillares sæpè 3-flori. P. hexandra Coutareæ nomine infra descripta. An genere etiam distinguenda P. tetrandra LS. cui corollæ limbus 4-lobus & stamina 4 & fructus longior 4-gonus (in Combesonii specimine immaturus, sed eodem docente 4-locularis) & cætera similia?*

V. Fructus monocarpus bilocularis polyspermus. Stamina sex aut plura. *Folia opposita; caulis frutescens aut arboreus.*

**COUTAREA**, Aubl. t. 122. \* **PORTLANDIA**, Jacq. L. \* Calix 6-fidus laciniis subulatis deciduis. Corolla magna infundibuliformis, fauce incurva ventricosa, limbo 6-fido. Stamina 6 imo tubo inserta; antheræ longæ lineares exsertæ. Stigma 1 fulcatum. Capsula obovata compresso-plana, utrinque medio sulcata, vix coronata, 2-locularis polysperma 2-valvis, valvis carinatis margine inflexo dissepimentum constituentibus minimum mox iisdem dehiscentibus solubile; semina orbiculata, margine membranacea, imbricata, affixa receptaculo parvo valvularum marginibus conniventibus apposito & iisdem distractis deciduo. *Arbor; pedunculi sæpè 3-flori, axillares & terminales; flores basi 2-bracteati, interdum ex Aubl. 7-fidi 7-andri. Huc Portlandia hexandra L. Fructus Gelsemii sed inferus, Cinchonæ sed compressus, Nacibæ affinior.*

**HILLIA**, Jacq. L. \* Calix oblongus 6-fidus laciniis erectis. Corolla tubulosa longissima, fauce parùm ampliata, limbo patente magno acutè 5-partito. Antheræ 6, intrà faucem sub-



sessiles non exsertæ. Stigma capitatum. Fructus... oblongus compressus 2-locularis polyspermus. *Frutex parasiticus; flores solitarii terminales, foliis floralibus minoribus cincti. Character ex Jacq.*

**DUROIA**, Ls. \* Calix cylindricus truncatus. Corolla tubulosa cylindrica limbo obtusè 6-partito patente. Antheræ 6 oblongæ, intrâ tubum sessiles. Stigmata 2. Pomum magnum globosum, limbo calicino persistente umbilicatum, pilosum, polyspermum, seminibus planis duplici serie dispositis. *Arbor; flores terminales sessilis congesti, multi abortientes aut masculi; fructus esculentus (an 2-locularis?). Character ex Linn. Suppl.*

V I. Fructus monocarpus bilocularis dispermus. Stamina quatuor. *Folia opposita; caulis plerumque frutescens.*

**CHOMELIA**, Jacq. \* Calix tubulosus parvus 4-fidus. Corolla tubo longo gracili, limbo 4-fido patente. Drupa coronata, foeta nuce 2-loculari 2-spermâ. *Arbustula ramosissima & spinosissima, spinis ramusculorum axillaribus, ramorum sparsis; folia in ramulis terminalia; pedunculi solitarii axillares sæpè 3-flori.*

**PAVETTA**, Rheed. L. \* Calix minimus 4-dentatus. Corolla tubo gracili, limbo acutè 4-partito patente. Antheræ extrâ faucem subsessiles. Bacca pisiformis, 1-locularis ex Linn., 2-sperma feminibus hinc planis inde convexis. *Frutex; flores corymbosi aut conferti terminales. Character ex Linn. An congener Coffea paniculata Aubl. Guyan. t. 58. quæ 4-andra 2-sperma?*

**IXORA**, L. \* Calix minimus 4-fidus. Corolla tubo longo gracili, limbo obtusè 4-partito. Antheræ ad faucem subsessiles exsertæ. Bacca 2-locularis loculis 2-spermis. *Character ex Linnaeo. Frutices; flores terminales corymbosi aut conferti; fructus I. Coccineæ ex Rheedio 1-2-4-spermus, I. americanæ ex Browneo 1-spermus: genus ergò recognoscendum, à Pavettâ non satis distinctum. Hujus congener Lonicera corymbosa L.*

**COUSSAREA**, Aubl. \* Calix 5-dentatus. Corolla tubo brevi, limbo acutè 4-partito. Antheræ oblongæ, ad faucem subsessiles exsertæ. Stigma 4-5-fidum. Bacca parva 1-locularis; testa intus 1-sperma semine coriaceo. *Frutex; flores sæpè terminales. Character ex Aubl. Guyan. t. 38. An stigma verè 5-fidum; an fructus potius 2-spermus semine uno abortivo? Planta Commersonii Madagascariensis habitu similis fructum exhibet compressum subdidymum 2-locularem 2-spermum.*

**MALANEA**, Aubl. \* Calix minimus 4-dentatus. Corolla parva rotata tubo brevi, limbo 4-fido. Stamina exserta. Bacca (Berberidis) parva ovata coronata, foeta nuce 2-loculari 2-spermâ. *Frutex scandens ramis sarmentosis, ramulis pendulis; foliorum margo integer revolutus; flores in extremis ramulis spicati axillares, in*



*spicâ passim glomerati. Character ex Aubl. Guyan. t. 41. Confer cum Antirheâ.*

**ANTIRHEA**, Commerf. \* Calix minimus 4-dentatus. Corolla parva 4-loba patens, tubo brevi. Antheræ oblongæ subseffiles non exsertæ. Drupa minima ovata coronata, foeta nuce ossæ 2-loculari 2-spermâ. *Frutex ramosus; folia 3-4 verticillata, nervorum præcipuorum axillis subtus glandulosi & porosi; pedunculi axillares & terminales multiflori, floribus cymosis. Character ex Commerf. Adversus sanguinis profluvia feliciter in inf. Borbonicâ usurpantur, idè dictâ Bois de Loiseau nomine inventoris. Aut contra, fæo fluo. Affinis Psychotriæ sed 4-andra, affinior Malinæ sed drupacea antheris non exsertis & floribus cymosis. An servandum genus?*

VII. Fructus monocarpus bilocularis dispermus.  
Stamina quinque. *Folia opposita; caulis frutescens aut arboreus.*

**CHIMARRHIS**, Jacq. \* Calix integer. Corolla tubo brevi, limbo 5-fido patente, laciniis extus medio hirsutis. Stamina summo tubo inserta, filamentis basi hirsutis. Capsula subovata coronata 2-locularis 2-sperma 2-valvis, valvis apice 2-fidis. *Arbor Martinicensibus Bois de Riviere dicta; flores parvi racemoso-cymosi axillares & terminales; capsulæ parvæ. Character ex Jacq. Americ. An stipulæ foliis interjectæ?*

**CHIOCOCCA**, Brown. L. \* Calix 5-dentatus. Corolla infundibuliformis limbo 5-partito reflexo. Stamina non exserta. Bacca coronata subrotunda compressa, siccatione substriata, 2-sperma. *Species altera frutescens spicis florum axillaribus, altera arborescens paniculâ terminali.*

**PSYCHOTRIA**, L. \* **PSYCHOTROPHUM**, Brown. \* Calix 5-dentatus. Corolla tubulosa 5-fila. Stamina non exserta. Bacca parva coronata, subrotunda aut ovata, siccatione sulcata 2-sperma, seminibus hinc planis, inde convexis. *Frutices aut repentes herbæ; flores racemosi aut conferti terminales, in P. carthagenensi Jacq. interdum 6-7 fidi 6-7-andri. Fructus extus Antirheâ, sed intus Coffiæ. An separandæ species herbacæ habitu dissimiles?*

**COFFEA**, L. \* **COFFE**, Rai. \* *Caffeyer*, Caffè. Calix minimus 4-dentatus. Corolla tubulosa, oblonga subinfundibuliformis, limbo plano 5-partito. Stamina exserta. Bacca cerasiformis aut rarius oblonga, umbilicata non coronata, 2-locularis seu 2-arillata arillis 1-spermis; semina hinc plana sulcata, inde convexa. *Arbustulæ; flores 2-4 axillares subseffiles. Non congener C. occidentalis L. jam alibi Ixora Americana à Linnæo dicta, cui flores paniculati 4-fidi 4-andri & fructus 1-spermus. Coffea paniculata Aubl. Guyan. t. 58. tetrandra & Pavettæ affinior.*

**CANTHIUM**, Lamark. \* **GARDENIA**, LS. \* *Canti de l'Inde.*



Calix 5-fidus. Corolla tubulosa brevis 5-fida patens. Stamina non exserta. Stigma capitatum. Bacca ovata coronata, aut subrotunda nuda 2-locularis 2-sperma, feminibus hinc planis sulcatis, indè convexis. *Frutices spinosissimi, spinis & foliis decussim oppositis; flores subsessiles, axillares & terminales, interdum 6-8-fidi 6-8-andri. Hæc Gardenia spinosa LS. & Tsi-ru-kara seu Canti Rheed. Mal. 5. t. 37. Character ex D. Lamark Dict.*

RONABEA, Aubl. \* Calix minimus 5-dentatus. Corolla oblonga subinfundibuliformis limbo 5-fido patente. Stamina non exserta. Bacca minima ovata non coronata, fœta 2 nucibus 1-spermis hinc planis, indè convexis. *Frutices; flores minimi axillares, pedicellis basi 2-bracteolatis. Character ex Aubl. Guyan. t. 59. Confer cum Pæderiâ.*

PÆDERIA, L. \* Calix parvus 5-dentatus. Corolla infundibuliformis 5-loba, intus hirsuta. Antheræ oblongæ subsessiles non exsertæ. Bacca parva ovata fragilis 2-sperma. *Frutices sarmentosi, sexuum abortu plerumque dioici; flores racemosi axillares. Character ex Linn. & Rumph. Amb. 5. t. 160. Hujus congener Danaïs Commerf.*

COPROSMA, Forst. LS. \* Calix minimus 5-fidus. Corolla infundibuliformis 5-fida. Antheræ oblongæ. Stylus profundè 2-partitus. Bacca subovata pulposa 2-sperma, feminibus hinc planis, indè convexis. *Frutices; folia opposita, stipulâ mediante; pedunculi axillares uni aut multiflori; flores interdum 6-7-fidi 6-7-andri, quidam masculi, quidam fœminei. Character ex Forst. & Linn. Suppl. Fructus ex Linn. superus, ex Murray syst. ed. 14. inferus. Genus affine hinc Phyllidi, indè Pæderiæ.*

SIMIRA, Aubl. \* Calix minimus 5-dentatus. Corolla parva tubulosa 5-loba. Stamina summo tubo inserta. Bacca parva ovata coronata 2-locularis 2-sperma. *Arbor; flores minimi racemosi terminales. Character ex Aubl. Guyan. t. 65. Huic habitu & caractere similis Mapouria ejusd. t. 67, fructu tamen adhucdum ignoto, & caule frutescente. An congener etiam Palicourea ejusd. t. 66. frutex corollis majoribus incurvis 5-fidis, staminibus non exsertis?*

VIII. Fructus monocarpus multilocularis loculis monospermis. Stamina quatuor aut quinque aut plura. *Folia opposita; caulis sæpè frutescens.*

NONATELIA, Aubl. \* Azier. Calix parvus 5-dentatus. Corolla tubulosa limbo 5-fido. Stamina 5 exserta aut latentia. Bacca parva sphaericea striata coronata 5-locularis 5-sperma. *Frutices aut herbæ; flores paniculati terminales, nudi aut 2-4-bracteolati. Character ex Aubl. Guyan. t. 70-74.*



**LAUGERIA**, Jacq. L. \* Calix minimus limbo subintegro. Corolla tubo gracili oblongo, limbo 5-lobo plano. Antheræ 5, subsessiles non exsertæ. Stigma capitatum. Drupa pisiformis non coronata, foeta nuce 5-fulcatâ 5-loculari 5-spermâ. *Frutices spinosi aut inermes; flores racemosi axillares. Character ex Jacq. Americ.*

**ERITHALIS**, Brown. L. \* Calix minimus 5-dentatus. Corolla 5-partita tubo brevi, laciniis recurvis. Stamina 5 exserta. Stigma acutum. Bacca pisiformis coronata 10-striata 10-locularis 10-sperma. *Arbusculæ; flores corymbosi axillares & terminales. Ex Jacq. flores plurimi 6-fidi 6-andri & numerus seminum varius: an idè hæc referenda Plathura sequens habitu simillima?*

**PSATHURA**, Commerf. \* Calix minimus 6-dentatus. Corolla campanulata 6-loba intus barbata, tubo subnullo. Stamina 6. Stigma 3-4-lamellatum. Drupa ficca (Coriandri) striata coronata 6-locularis 6-sperma, feminibus hinc concavis, indè convexis. *Arbuscula ramis nodosis fragilibus, indè Bois cassant Bourboniensibus dicta; flores corymbosi terminales. Character ex Commerf. & ab ipso fragilis. Confer cum Erithali.*

**MYONIMA**, Commerf. \* Calix minimus, limbo subinteger. Corolla tubo brevi, limbo obtusè 4-partito. Stamina 4, antheris oblongis exsertis. Stigma crassiusculum. Bacca ficca cerasiformis depressa non coronata, foeta nuce 4-loculari 4-spermâ, feminibus hinc concavis, indè convexis. *Arbuscula; pedunculi 1-3-flori in summis ramulis terminales & axillares. Bourboniensibus dicitur Bois de Rat, quia fructus muribus grati. Mus mus, & vni profum. Character ex Commerf. & ex sicco.*

**PYROSTRIA**, Commerf. \* Calix minimus sub4-dentatus. Corolla subcampanulata patens semis-fida, fauce tomentosâ. Stamina 4. Stigma capitatum. Fructus pyriformis parvus 8-striatus non coronatus, foetus 8 nucibus 1-spermis. *Arbusculæ; pedunculi axillares uni aut multiflori. Numerus loculorum interdum varius; stipulæ foliorum calicæ. Pyrostria à Pyro striato. Character ex Commerf. & Comersonio.*

**VANGUERIA**, Vanguier, *Voa-vanguier de Madagascar.* Calix minimus 5-dentatus patens. Corolla parva campanulato-globosa 5-fida, intus hirta. Stamina 5, antheris oblongis vix exsertis. Stigma simplex. Bacca pomiformis umbilicata non coronata, 5-locularis 5-sperma feminibus amygdalinis. *Arbuscula; flores corymboso-cymosi axillares. Character ex Commerf. & Comersonii descr. & icone.*

**MATHIOLA**, Pl. L. \* Calix oblongus margine integro. Corolla tubo gracili longo, fauce in infundibulum dilatatâ, limbo integro repando. Stamina 5 non exserta. Stigma crassiusculum. Drupa cerasiformis depressa umbilico coronato, foeta nuce 6-loculari 6-spermâ. *Arbor ramis apice foliosis; folia magna as-*



*petala; pedunculi axillares multiflori, floribus cymosis bracteatis, pluribus abortivis. Character floris ex Plum. & Linn., fructus ex sicco. Genus in vivo recognoscendum, Guettardæ affine.*

**GUETTARDA, L. \*** Calix oblongus margine integro inæquali. Corolla tubulosa longa subinfundibuliformis, limbo obtusè 8-partito patente. Antheræ 8 oblongæ subsessiles non exsertæ. Stigma clavatum. Drupa sicca subrotunda apice retusa, umbilicata non coronata, ficcatione 6-torosa, fœta nuce sinuosâ 6-loculari 6-spermâ. *Arbores; folia magna; pedunculi longi axillares solitarii, apice multiflori, floribus dichotomè cymosis, singulis 1-bracteatis, quibusdam masculis seu sterilibus. Character ex sicco. Numerus partium & loculorum varius. Huc referenda Cadamba Sonner. Ind. 2. p. 228. t. 128. quæ Rava-pu Rheed. Mal. 4. t. 48. à Linnæo dicta Nyctanthes hirsuta. An omninò congener G. coccinea Aubl. Guyan. t. 123. cui ex Autore calix 5-fidus, corolla 6-andra 6-fida non patens, stigma 6-sulcum, bacca cerasiformis 6-locularis, testa in singulo loculo fragilis polysperma seminibus minutis, flores dichotomè corymbosi 2-bracteati, cætera similia? An Hameliæ affiniôr; an inter utrumque media utpotè 6-andra?*

**IX. Fructus monocarpus multilocularis loculis polyspermis. Stamina quinque aut plura. Folia sæpiùs opposita; frutices aut herbæ.**

**HAMELIA, Jacq. L. \*** Calix parvus 5-fidus. Corolla tubulosa oblonga 5-gona limbo 5-fido. Stamina 5, medio tubo inserta; antheræ oblongæ. Stigma obtusum. Bacca ovata sulcata, apice retusa & coronata, 5-locularis polysperma feminibus minutis. *Frutices; folia 3 verticillata; flores corymboso-cymosi terminales. Guettarda coccinea Aubl. hujus ferè congener.*

**PATIMA, Aubl. \*** Calix limbo integro 5-gono. Corolla... Stamina... Stigma... Bacca infera sphaericea coronata 4-6-locularis polysperma, feminibus in pulpâ nidulantibus. *Herba oppositifolia, stipulâ utrinque mediâ; fructus axillares pedunculati. Character ex Aubl. t. 77. Genus cerè monopetalum & Rubiaceum, in vivâ tamen recognoscendum.*

**SABICEA, Aubl. \*** Calix oblongus 5-fidus. Corolla tubo longo gracili, limbo acutè 5-partito. Antheræ 5 subsessiles, latentes aut vix exsertæ. Stigma 5-partitum. Bacca pisiformis coronata 5-locularis loculis polyspermis. *Frutices volubiles; flores axillares subsessiles bracteati. Corolla S. asperæ interdum 4-fida 4-andra & bacca 3-4-locularis. Character ex Aubl. Guyan. t. 75-76.*





X. Flores aggregati suprâ receptaculum commune, aut rariùs coadunati. *Folia opposita; arbores aut frutices, rariùs herbæ.*

MITCHELLA, L. \* Flores 2 coadunati. Singulis calix 4-dentatus, alteri hinc adnatus. Corolla infundibuliformis tubo cylindrico, limbo 4-partito patente intus hirto. Stamina 4 vix exserta. Stigma 4-fidum. Bacca ex germinum coalitione didyma 4-sperma. *Herba repens; flos geminatus terminalis, aut rariùs axillaris.*

CANEPHORA. \* Flores 3-6 intrâ calicem communem subsidum, sessiles squamulis distincti. Singulis calix 5-6-fidus. Corolla parva campanulata 5-6-loba. Antheræ 5-6 oblongæ sessiles. Stigma 2-fidum. Fructus... pisiformis coronatus 2-spermus. *Frutex; pedunculi axillares solitarii, à basi ad apicem incrassati, desinentes in calicem communem calathiformem. Character ex Commersonii specimine Madagascariensi innominato. Κανίφορος, calathum ferens. Confer cum Farameâ.*

PATABEA, Aubl. \* Flores capitati, bracteis distincti, capitulo extus squamoso. Calix 4-dentatus. Corolla tubulosa 4-fida. Antheræ 4 subsessiles. Fructus... *Frutex ramis sparsis; capitula terminalia solitaria subsessilia. Character ex Aubl. Guyan. t. 43. Hujus congener aut genere proxima Lonicera bubalina LS. arbuscula verè Rubiaceæ stipulata; cû flores capitati terminales involucri polyphyllo 4-6-phylo, calix 5-fidus, corolla Symphiti 5-fida 5-andra non patens, capsula 2-locularis coronata.*

EVEA, Aubl. \* Flores 8-10 parvi aggregati suprâ receptaculum paleaceum, cinctum involucri 4-phylo cujus foliola 2 exteriora latiora. Calix proprius turbinatus 4-dentatus. Corolla infundibuliformis 4-fida. Antheræ 4 oblongæ subsessiles non exsertæ. Fructus... *Frutex ramis 4-gonis; capitula axillaria solitaria. Character ex Aubl. Guyan. t. 39.*

TAPOGOMEA, Aubl. \* Involucrum 2-partitum, sæpè magnum, complectens flores plurimos aggregatos suprâ receptaculum paleaceum, & squamis seu calice communi polyphyllo aut multipartito cinctos. Calix proprius minimus 5 dentatus. Corolla parva subinfundibuliformis 5-loba. Antheræ 5 subsessiles non exsertæ. Bacca minima ovata, apice glandulosa, foeta 2 nucibus 1-spermis, hinc planis, inde convexis. *Frutices aut herbæ sublignosæ; capitula sæpè terminalia. Character ex Aubl. Guyan. t. 60-63. An congener Carapichea ejusd. t. 64 cui involucrum exterius 2-phyllum, interius 2-phyllum, stamina exserta, fructus capsularis, cætera similia, habitus T. violaceæ. Affines etiam Morinda muscosa Jacq. Amer. t. 45, & frutex Commersonii Mauritianus*  
cujus



*capitula globofo-capitati, involucro cymbiformi diphylo cincti, longè pedunculati axillares.*

**MORINDA**, V. L. \* *ROYOC*, Pl. \* *Royoc*. Flores in globum densè collecti suprà receptaculum (nudum?) sphæricum. Calix proprius vix 5-dentatus. Corolla tubulosa subinfundibuliformis 5-fida patens. Antheræ lineares subsessiles. Bacca angulata, ab adjacentibus undique compressa, apice retusa umbilicata, 2-sperma seminibus hinc planis, indè convexis. *Arbores aut frutices; capitula sæpius axillaria aut oppositifolia. Receptaculum fortè paleaceum deciduo palearum apice. Congener Pada-vara Rheed. Mal. 7. t. 27.*

**NAUCLEA**, L. \* Flores in globum densè collecti suprà receptaculum sphæricum villosum. Singulis calix subinteger aut vix 5-dentatus. Corolla tubulosa gracilis 5-fida. Antheræ 5 in fauce subsessiles vix exsertæ. Stigma crassiusculum. Capsula sub3 gona, ab adjacentibus undique compressa, 2-locularis 2-sperma non dehiscens. *Arbor; capitula terminalia aut axillaria, longè pedunculata; pedunculi medio 2-4-squamulosi. Hujus congener Lunis uncatus Rumph. Amb. 5. t. 34, ut & Ourouparia Aubl. Guyan. t. 68 cui præterea sæpius spinæ aduncæ oppositæ, foliis decussatim interpositæ.*

**CEPHALANTHUS**, L. \* **PLATANOCEPHALUS**, V. \* *Céphalante*, Bois à bouons. Flores ut in Naucleâ globofo-capitati, receptaculo villoso. Singulis calix angulatus 4-fidus. Corolla tubulosa gracilis 4-fida. Stamina 14 brevissima, parum exterta. Stigma globosum. Semen 1 ex Linn. angulatum lanuginosum, aut ex DD. Adans. & Lamarck capsula 2-locularis 2-sperma. *Cætera ut in Naucleâ.*

## XI. Genera Rubiaceæ fructu nondum satis determinato.

**SERISSA**, Commerf. \* Calix 4-5-fidus. Corolla brevis 4-5-fida. Antheræ 4-5 sessiles. Germen inferum; stylus 2-fidus. Fructus... *Frutex, idem cum Spermacoce fruticosa HRP. & Lycio foetido IS.; folia Myrtoidea, vaginâ ciliatâ inferius junctâ; flores minimi axillares.*

**PAGAMEA**, Aubl. \* Calix turbinatus 4-dentatus. Corolla tubo brevi, limbo 4-lobbo villoso. Antheræ 4 sessiles non exsertæ. Germen semiinferum; stylus à basi 2-fidus. Bacca calici immersa 2-locularis, foeta 2 officulis itidem 2-locularibus 2-spermis, uno nonnunquam abortivo. *Frutex; stipulae vaginantes; flores laxè spicati axillares & terminales. Character ex Aubl. Guyan. t. 44. An officula verè 2-locularia?*

**TARAMEA**, Aubl. Calix turbinatus 4-dentatus. Corolla tubu-



losa; limbo 4-fido. Stamina 4 non exserta. Germen inferum; stylus 1; stigma 2-lobum. Fructus 2-locularis ... *Frutices; stipulæ foliis interpositæ; pedunculi terminales multiflori. Character ex Aubl. Guyan. t. 40.*

**HYDROPHYLAX, LS.** \* Calix 4-fidus, laciniis oblongis marginatis persistentibus. Corolla infundibuliformis fauce barbata, limbo angulato 4-lobo. Stamina 4 exserta, summo tubo infixæ. Germen inferum; stylus 1; stigmata 2. Fructus oblongus 1-spermus non dehiscent, 4-angularis aut angulis 2 oblitteratis anceps; semen lineare convolutum. *Herba facie Arenariæ rubræ, repens articulata oppositifolia, articulis vaginatis; flores sæpè axillares. Character ex Linn. Suppl. Genus recognoscendum, præcipuè in fructu.*

**Obs.** Rubiacearum designatio facilis: nondum floridæ dignoscuntur foliis herbarum verticillatis, aut fruticum sæpè oppositifoliis stipulâ vel vaginâ mediante; florentes exhibent corollam monopetalam epigynam definite staminiferam antheris distinctis; in fructiferis herbaceis fructus extat sæpè didymus dispermus; in fructiferis arboreis aut frutescentibus fructus sæpè bilocularis bi aut polyspermus, rariùs multilocularis; in omnibus perispermum seminis corneum. Ordo plurima complectens genera, dividendus faciliè non ratione numeri staminum, sed ratione fructus didymi in Rubiâ, in Coffeâ dispermi, polyspermi in Cinchonâ, multilocularis in Guettardâ. Hinc seminibus quasi nudis Diplaseas, indè faciliùs toto habitu Caprifolia contingit vix ab iis distinctus. Umbelliferis etiam accedit perispermio ferè consimili & fructu quorundam dispermo nudo & corollâ Phyllidis 5-partitâ quasi 5-petalâ, & ejusdem axi inter semina centrali. An genera quædam ut Virecta, Bellonia &c. verè unilocularia polysperma & omnimodè Rubiaceæ? An Richardia verè trisperma? An ordini adjicienda Amaioa Aubl. cujus habitus omninò Rubiaceus, fructus bilocularis polyspermus, sed flos nondum observatus, & Strumpfia Jacq. L. habitu similis sed pentapetala antheris connatis ac baccata monosperma?

## ORDO III.

### CAPRIFOLIA, LES CHEVREFEUILLES.

**CALIX** monophyllus superus, sæpè basi caliculatus aut bibracteatus. Corolla in plurimis monopetala regularis aut irregularis, in paucis polypetala petalis basi latâ junctis. Stamina definita, sæpiùs quinque, in monopetalis epipetala alterna, in polypetalis nunc epigyna corollæ alternantia, nunc medio petalo affixa. Germen inferum; stylus sæpè unicus, interdum nullus; stigma



unicum aut rarius triplex. Fructus inferus, baccatus aut quandoque capsularis, uni aut multilocularis, loculis mono aut polyspermis. Corculum feminis in cavitate supernâ parvâ perispermi solidi magni. Caulis frutescens arboreusve, raro herbaceus. Folia in plurimis opposita, in paucis alterna; stipulae nullae foliis interjectae.

I. Calix caliculatus. aut bracteatus. Stylus unicus.  
Corolla monopetala.

**LINNÆA**, Gron. L. \* **CAMPANULA**, T. \* Calix 5-fidus, caliculo 4-partito inæquali hispido. Corolla turbinata subcampanulata 5-loba. Stamina 4 didynama. Stigma globosum. Bacca minima ovata sicca caliculo cincta, 3-locularis loculis 2-spermis. *Herba repens sempervirens oppositifolia; surculi erecti, apice nudi & 2-flori. An fructus verè 3-locularis?*

**TRIOSTEUM**, L. \* Calix 5-fidus, laciniis lanceolatis persistentibus, basi bracteatus. Corolla vix calice longior, tubulosa 5-loba inæqualis. Stamina 5 non exserta. Stigma crassiusculum. Bacca coronata obovata 3-locularis 3-sperma. *Herbae erectae; foliorum petioli infra juncti; flores plurimi axillares sessiles.*

**OVIDEA**, L. \* **VALDIA**, Pl. \* Calix campanulatus patens 5-fidus persistens, basi bracteatus. Corolla tubo longissimo gracili supra dilatato, limbo brevi 3-loba subæquali. Stamina 4 longissima exserta. Stigma 2-fidum. Bacca (infera?) globosa 2-sperma. *Caracter ex Linnæo. Frutices foliis oppositis, dentato-spinosis aut inermibus; pedunculi multiflori, in specie inermi axillares, in spinosâ dense & oppositè corymbosi terminales. Germen inferum ex Linnæo; an potius superum & inde major cum Viticibus & Volkameriâ affinitas?*

**SYMPHORICARPOS**, Dill. \* **LONICERA**, L. \* Calix parvus 4-dentatus, basi bracteolatus. Corolla tubulosa brevis 5-fida subæqualis. Stamina 5 brevissima, vix exserta. Stigma globosum. Bacca coronata ovata parva 4-locularis 4-sperma, loculis interdum 2 abortivis. *Frutex; pedunculi dense multiflori axillares; flores minimi. Hic sistenda Lonicera Symphoricarpos Lin.; cætera ejusdem species in distinctis generibus infra memoratae. Ad Rubiacas repellenda L. corymbosa Ixora fortè congener, & L. bubalina LS. Patabea proxima.*

**DIERVILLA**, T. \* **LONICERA**, L. \* Calix oblongus 5-fidus basi bracteatus. Corolla duplò longior infundibuliformis 5-fida patens. Stamina 5 exserta. Stigma capitatum. Capsula oblonga acuta non coronata, 4-locularis polysperma seminibus minutis.



*Frutex; pedunculi multiflori axillares & terminales. Huc Lonicera Diervilla L.*

**XYLOSTEON**, T. \* **CHAMÆCERASUS**, T. \* **LONICERA**, L. \*  
*Camérifier. Flores duo eidem pedicello infidentes. Calix singulis 5-dentatus, basi bracteatus, alteri proximus aut eidem omninò adnatus. Corolla infundibuliformis aut campanulata, 5-fida aut 5-loba subæqualis in *Xylosteo* T., irregularis 2-labiata in *Chamæceraso* T. Stamina 5 extrà tubum prominentia. Stigma crassiusculum. Calicibus junctis baccæ 2 basi connatæ 2-loculares polyspermæ, aut coadunatæ in unicam suprà 2-umbilicatam. Frutices erecti; pedunculi 2-flori axillares solitarii. Huc referendæ *Lonicera* 7-12 *Linnæi syst. ed.* 14.*

**CAPRIFOLIUM**, T. \* **PERICLYMENUM**, T. \* **LONICERA**, L. \*  
*Chevrefeuille. Calix 5-dentatus basi bracteatus. Corolla tubulosa longa 5-fida, subæqualis in *Periclymeno* T., irregularis 2-labiata in *Caprifolio* T. Stamina 5 corollæ æqualia. Stigma globosum. Bacca 3-locularis polysperma. Frutices caule volubili; folia quorundam basi connata; flores sessiles, capitati terminales, aut verticillati axillares verticillis 6-floris. Huc referendæ *Lonicera* 1-6 *Linn. syst.**

I I. Calix caliculatus aut bracteatus. Stylus unicus.  
 Corolla subpolypetala.

**LORANTHUS**, L. \* **LONICERA**, Pl. \* Calix subinteger, basi cinctus caliculo subsimili. Corolla 6-partita aut 6-petala, petalis basi conniventibus & interdum subcoalitis, apice divaricatis. Stamina 6, petalis opposita & iisdem versùs apicem inserta. Stigma obtusum. Bacca non coronata, 1-sperma; seminis apex ex *Jacq.* tectus glutine radiculam intùs productam obvolvante. *Caracter ex Linnæo. Frutices plurimi parasitici; folia plerisque crassiuscula, sæpè opposita, nonnunquàm alternà; flores axillares aut rarius terminales, corymbosi aut spicati aut pedicellis 1-floris infidentes, quidam 5-petali 5-andri, quidam verè 1-petali petalis infra coalitis, in L. Europæo dioici. Ex Jacq. antheræ 3 alternæ in L. unifloro effactæ, in L. pedunculato apice 2-appendiculatæ & sæpè steriles. Hujus congenere Itri-canni Rheed. Mal. 10. t. 3-5. An genus dividendum ratione numeri staminum, speciebus 6-andris restituendum *Lonicera* nomen perperam immutatum, & *Lorantho* adjiciendæ species 5-andræ? His accedit *Glutago Commersi* frutex parasiticus, idem fortè cum L. spicato L., cui ex Autore calix vix 5-dentatus basi 2-appendiculatus, corolla primò tubulosa, dein latere fissa & in ligulam expansa planam (indè *Scævola* similis) apice 5-fidam 5-andram laciniis antheriferis revolutis, bacca intùs glutinosa 1-sperma, cætera similia.*

**VISCUM**, T. L. \* *Gui.* Dioicum. Calix margine integro vix



prominulo. Petala 4 (calix ex Linn.) parva basi latiore juncta. MASC. Antheræ sessiles, mediis petalis insertæ. FÆM. Germen inferum, apice marginatum; stylus minimus; stigma capitatum. Bacca parva non coronata, 1-sperma. *Frutices aut suffrutices parasitici; quidam aphylli ramis compressis quasi articulatis, ut in V. opuntioide L. & in V. tænioide Commers. cujus articuli breviores creberrimi; cæterorum folia opposita crassiuscula, rarissimè alterna; flores axillares, subsessiles aut spicati, bacca quorundam intus glutinosa. Corollæ præsentia ex staminum situ & generum confinium analogiâ concluditur.*

**RHIZOPHORA**, L. \* **MANGLES**, Pl. \* *Manglier*, Palétuvier. Calix 4-12-fidus, basi 2-bracteatus. Petala 4-12, plana aut conduplicata, basi lata, laciniis calicinis alterna. Stamina totidem aut dupla, petalorum unguibus seorsim aut conjugatim inserta. Germen inferum; stylus 1; stigmata 2. Fructus inferus aut semiinferus, 1-locularis 1-spermus capsularis, primò clausus, dein ad apicem foratus, femine intus germinationem inchoante & radicula ruptis involucris ultrà modum producta in clavum longissimum. *Arbusculæ maritimæ ramis multoties ralicantibus latè protensæ; rami sæpè oppositi; folia in plurimis opposita, integra & coriacea, juniora revoluta & more Ficus bracteata bracteis caducis; pedunculi axillares aut terminales, sæpè dichotomi & biflori, in dichotomiis articulati & 2-bracteati; fructus cernui. Character specierum varius: in R. Gymnorhizâ calix 10-12-fidus, petala seu squamulæ 10-12 conduplicatæ quasi 2-valves, singulæ intus 2-andræ, delineante Rheedio 6. t. 31. & observante D. Bruguières. in R. Mangle calix 4-fidus, petala 4 intus villosa plana, singula 2-antherifera. Fructus (idem cum calicis disco) in plurimis intrâ lacinias calicinas prominulus & semisuperus, in paucis omninò inferus. Peculiaris omnium germinatio: seminis maturi radícula intus jam germinans elongatur in clavum mox aperto fructu exertum, qui infrâ calici seu fructui immersus calyptrâque propriâ interiore obvolutus, suprâ nudus, nutatione pendulus, lapsu calyptram cum calice deferens, in limo rectâ defigitur; habituque inverso dum clavi radicatur aduncus apex (Rumph. 3. t. 72.) defidens humi, basis denudata & ascendens gemino stipata cotyledone parvo & mox deciduo in caulem superius producit. Character ex siccis quarundam speciminibus. Hinc distrahenda R. caseolaris L. Sonneratiæ inter Myrtos affinior.*

III. Calix bracteatus. Stylus nullus; stigmata tria. Corolla monopetala.

**VIBURNUM**, T. L. \* **TINUS**, T. \* **OPULUS**, T. \* *Vierne*, Mancienne, Obier, Laurier-Tin. Calix parvus 5-fidus, basi bracteolatus. Corolla parva campanulata 5-fida. Stamina 5, ejusdem laciniis alterna. Stylus 0; stigmata 3. Bacca 1-sperma, coronata in Tino T., in cæteris nuda. *Frutices; folia opposita, basi*



*nuda; flores umbellato-corymbosi terminales, in Tino & Viburno T. hermaphroditi omnes, in Opulo T. marginales neutri diffformes & multò majores.*

**HORTENSIA**, Commerf. \* Calix 5-partitus magnus corollæ-formis (corolla Commerf.), laciniis ovatis unguiculatis perfistentibus. Corolla 5-partita minima (nectarium Commerf.) laciniis squamiformibus. Stamina 10, corollâ paulò longiora, caduca; antheræ subrotundæ. Germen...; styli 3 brevissimi mammillares; stigmata... Fructus... *Frutex coronarius cæspitosus, Opuli facie; folia opposita nuda; flores corymbosi terminales numerosi magni, Opulinis neutris extus similes pariterque in hortis neutri. Vernaculè dicta Rose du Japon, in picturis Japonicis & Sinenfibus sæpè repræsentatur. Caractèr ex Commerf.*

**SAMBUCUS**, T. L. \* Sureau, Yeble. Calix parvus 5-fidus. Corolla rotata urceolaris 5-loba. Stamina 5, lobis alterna. Stylus 0; stigmata 3. Bacca subrotunda 3-sperma, vix coronata. *Frutices aut arbusculæ; folia opposita, impari-pinnata aut bipinnata, in paucis 2-stipulacea, in plurimis basi 2-glandulosa glandulis stipitatis; flores umbellato-corymbosi terminales.*

I V. Calix simplex. Stylus unicus. Corolla poly-petala.

**CORNUS**, T. L. \* Cornouiller. Calix 4-dentatus. Petala 4 parva, basi latiora. Stamina 4 iisdem alterna; antheræ incumbentes. Stylus 1; stigma 1. Drupa parva, non coronata, fœta nuce 2-loculari 2-sperma. *Arbusculæ aut frutices; folia opposita basi nuda, in unicâ specie alterna; flores in aliis corymbosi terminales foliis tardiores, in aliis præcociores umbellati aut capitati involucri communi 4-phylo, interdum magno colorato. Corculum seminis longum, perispermio carnosso involutum.*

**HEDERA**, T. L. \* Lierre. Calix 5-dentatus dentibus deciduis. Petala 5, basi lata. Stamina 5, iisdem alterna; antheræ incumbentes basi 2-fidæ. Germen semiimmersum calici; stylus 1; stigma 1. Bacca globosa 5-sperma, limbo calicino latè coronata & intrâ coronam prominula. *Frutices sarmentosi ramis muros & arbores scandentibus, passim radicantibus; folia alterna semper-virentia, petioli basi dilatati; flores umbellati terminales, involucri minimo multidentato; semina quædam sæpè abortiva; corculum seminis longum, radicula gracili assurgente, intrâ perispermum carnosum solidum. H. quinquefolia L. ad Vites repellenda.*

**Obs.** Quadruplex ordinis sectio ab invicem dissimilis, in quadruplici forsân ordine posthâc distribuenda. Caprifolia vera Rubiaceis ætiora iisdem subjiciuntur; non tamen in iis certò constat existentia.



perispermii. Illud in integro ordine carnosum corculo oblongo assurgenti circumpositum dicitur ab Adansonio : sic in Corno habetur ; an & tale in Caprifolio ? Diversum certè in Viburno & Triosteo quorum corculum, ut in Umbelliferis minimum, latet in supernâ perispermii solidi magni cavitare ; nondum innotuit in Loranthis quorum germinatio intrâ fructum sæpè inchoatur. Nec tantum semine discrepant memoratæ sectiones : corolla Viburni & Caprifolii monopetala, sed hujus stigma simplex, illius multiplex ut in Umbelliferis : Rhizophora & Cornus utraque polypetala, sed stamina petalis opposita Rhizophoram abundè secernunt tum à Corno, tum & à Caprifolio & Viburno in quibus organa suprâdicta alternantur. An sectiones polypetalæ, indè classibus sequentibus affiniores, ad easdem repellendæ non obstante staminum epigyniâ in perigyniam superam facilè immutandâ, dum stamina scilicet inserta puncto quo calix superus à germine discedit, mixtam ex pistillo & calice ducunt originem ? An potius corollæ polypetalæ pro monopetalis profundè partitis rectius habendæ, cum petala basi latiora simul decidant in Corno & in quibusdam Loranthis certò coalescant. Præterea Loranthus Caprifolio, Cornus Viburno extus similes, ab his procul dimoveri nequeunt, & Polypetalas annectunt Monopetalis, mediante præprimis Hederâ quæ umbelliflora & alternifolia hinc Cornis umbellatis & alternifoliis accedit, indè plurimum convenit Araliis subsequens solo discrepans stylo simplici & fortè corculo majore,





## CLASSIS XII.

## PLANTÆ DICOTYLEDONES POLYPETALÆ.

## STAMINA EPIGYNA.

**C**ALIX monophyllus superus. Corolla polypetala, petalis definitis, impositis pistillo seu limbo glandulæ germen obtegentis. Stamina definita, distincta, ibidem inserta, totidem quot petala & iisdem alterna. Germen inferum simplex; styli plures definiti; stigmata totidem. Semina totidem nuda, aut rariùs inclusa pericarpio loculis totidem distincto. Corculum minimum oblongum in apice perispermi lignei. Flores umbellati (indè *Umbelliferi* dicti), id est, innixi pedicellis pluribus unifloris ex eodem puncto productis. Umbella nuda aut cincta involucro polyphylo, nunc simplex, nunc composita ex umbellulis seu umbellis minoribus, nudis aut involucello cinctis.

*Obs.* Ex staminum epigyniâ concluduntur germen inferum simplex, calix superus ac monophyllus, definitus staminum numerus, corolla non staminifera ideòque, dùm adest, plerumque polypetala, petala similiter epigyna ac sæpiùs staminibus numero æqualia & alterna.

Umbelliferarum series apprimè naturalis, omnibus accepta; character generalis simplex ac facilis, difficilis generum distinctio ac distributio. Seminum forma, involucrorum præsentia aut defectus, petalorum color, florum dispositio, diversa methodicis Autoribus signa præbuere divisionum quibus ad nutum usi sunt. Singulis sua laus debetur, sed nondùm placita Umbelliferarum fuit instituta methodus: tantæ molis est genera ordinum verè naturalium sedulò distinguere, suisque locis aptè disponere.



Utiquedum igitur nova prodeat methodus cæteris nitidior ac sincerior, standum distributioni Arredianæ ab involucris mutuatae licet in pluribus infidæ, servandaque Linnæi nomina & signa generica huic accommodata, quorum plura subinde mutabuntur, adjectis novis observationibus. Satis fit Aralias ab Umbelliferis veris, seu semina pericarpio inclusa à nudis nunc separari. Ex suprædictis p. 215 Araliæ ab Hederâ & Corno inter Caprifolia recensitis discrepant stylo multiplici; affines Sambuco utpotè similiter baccatæ polystylæ & polyspermæ, distinguuntur tantum corollâ polypetalâ, foliis alternis & perfectioribus umbellis; plurimis etiam Rubiaceas attingunt signis p. 210. Rectè igitur memoratos subsequuntur ordines, in Polypetalarum fronte constitutæ & Monopetalis proximæ.

## O R D O I.

## A R A L I Æ, L E S A R A L I E S.

**CALIX** margine integer aut dentatus. Petala & stamina definita. Styli & stigmata plura. Fructus baccatus aut rariùs capsularis, multilocularis loculis numero styli, monospermis. Caulis arboreus aut frutescens aut herbaceus. Folia alterna, sæpè composita, petiolo infrà vaginante; flores umbellati, involuocrati aut rariùs nudi.

**GASTONIA**, Commerf. \* Calix margine elevato integro. Petala 6 basi lata, rariùs 5. Stamina 12, rariùs 10, ad petalum quodlibet binata breviora. Styli 10-12, minimi basi juncti; stigmata 10-12. Capsula... 10-12-locularis. *Arbores; folia crassiuscula impari-pinnata foliolis 2-3-jugis, impari interdum deficiente aut caduco; flores racemoso-umbellati & umbellulati numerosissimi, involucris & involucellis nullis, interdum in arbore vetustâ 5-petali 15-andri, in juniore 10-petali 10-andri.* Character ex Commerf. qui frustum immaturum vidit. Nomen Borboniensibus vernaculum Bois d'éponge à cortice arborum spongioso. Gastonia à Gastone Principe Ludovici XIII fratre, Botanices & Morisonii Patrono, horti Blesensis conditore, qui primus initiandam curavit universam Historiæ naturalis Ichniographiam, dein Regiis auspiciis & sumptibus etiam nunc continuatam in Museo Regio.



**POLYSCIAS**, Forst. \* Calix 5-8-denticulatus. Petala sæpè 8; rariùs 5-7, patentia. Stamina totidem, antheris 4-sulcis. Styli 0; stigmata sæpè 4, rariùs 3-5. Bacca globosa, coronata calice & stigmatibus, sæpè 4-locularis; femina 3-quetra. *Arbor? ... folia pinnata; umbella maxima verticillato-prolifera, umbellulis terminalibus multiradiatis planis (involucris nullis?).* *Caracter ex Forst. Austr. t. 32. Confer cum Gastoniâ.*

**ARALIA**, T. L. \* *Aralie*. Calix 5-dentatus. Petala 5. Stamina 5. Styli & stigmata 5. Bacca coronata 5-locularis. *Arbores aut frutices aut herbæ; folia 1-2-3-pinnata, rariùs simplicia; flores umbellati & umbellulati involucrati.* *A. arborea L. 1-styla ideò Hederæ affinior ex D. Lamark; an & A. racemosa pariter 1-styla sed stigmate diviso. Confer cum Gastoniâ A. capitata Jacq. t. 61 & A. palmata Lamark 8-12-locularem quæ folium Polypi Rumph. 4. t. 43., cum Cussoniâ A. umbelliferam ejusd. seu Pseudo-fantalum Rumph. 2. t. 12., cum Aquiliciâ Nalugu Rheed. Mal. 2. t. 26 à Linnæo A. chinensi adjectum.*

**CUSSONIA**, LS. \* Calix margine dilatatus 5-dentatus. Petala 5 trigona. Stamina 5. Styli 2. Fructus 2-locularis 2-coccus margine coronatus. *Frutices; folia digitata; flores spicati aut racemoso-umbellati.* *Caracter ex L. Suppl. Genus vix à Panace distinctum cui, si servetur, referendæ Panaces frutescentes Linn. & L. Suppl., P. undulata Aubl. Guyan. t. 360, & Unjala Rheed. Mal. 7. t. 28 licet à Rheedio 1-sperma dicta, & fortè Aralia umbellifera Lamark.*

**PANAX**, L. \* **ARALIASTRUM**, V. \* *Gin-seng*. Calix 5-dentatus. Petala 5. Stamina 5. Styli 2. Bacca cordata umbilicata 2-locularis. Flores in distinctâ plantâ masculi calice non dentato. *Herbæ; caulis simplex, medio verticillatim 3-phyllus, apice 1-umbelliferus; folia digitata; umbellula involucrata; flores interdum ex Bern. Jussæo 3-styli 3-spermi Confer Cussoniam & species adjectas.*

**OBS.** Araliæ Umbelliferis naturali nexu consociatæ, discrepant seminibus in pericarpio reconditis, non nudis; Corno & Hederæ affines, stylo multiplici distinguuntur.

## ORDO II.

### UMBELLIFERÆ, LES OMBELLIFERES.

**CALIX** integer aut quinquedentatus. Petala quinque. Stamina quinque. Styli & stigmata duo. Fructus bipartibilis sectione perpendiculari in semina duo, formâ varia, superiùs propendentia ex axe centrali filiformi



sæpè bipartito. Flores dispositi in umbellulas, & umbellulæ sæpiùs in umbellas, utrasque involuocratas aut nudas, in plurimis regulares, in paucis anomalas. Caulis sæpè herbaceus, rarò frutescens. Folia alterna, petiolo vaginante, simplicia aut sæpiùs composita & pluriès divisa. Florum color in plurimis albus aut interdùm purpurascens, in paucis luteus. *Lagoëcia monostyla & monosperma.*

I. Umbelliferæ veræ. Umbellæ & umbellulæ sæpiùs nudæ.

**LEGOPODIUM**, L. \* **ANGELICA**, T. \* *Podagraire*. Calix integer. Petala ovata inflexa. Fructus ovato-oblongus striatus. *Folia inferiora biternata, caulina ternata, superiora subopposita. Pimpinellæ congener ex D. Lamark.*

**PIMPINELLA**, L. \* **TRAGOSELINUM**, T. \* *Boucage*. Calix integer. Petala inflexo-cordata subæqualia. Stigmata subglobosa. Fructus ovato-oblongus. *Folia pinnata, umbellæ antè florescentiam nutantes. Involucellum P. Anisi 3-phyllum dimidiatum. P. dioïcæ planta altera mascula, altera feminea aut sæpè hermaphrodita. An restituendum Tragoselini nomen?*

**CARUM**, L. \* **CARVI**, T. \* *Carvi*. Calix integer. Petala carinata inflexo-emarginata inæqualia. Fructus ovato-oblongus striatus. *Involucrum 1-phyllum. Flosculi quidam centrales abortivi. Semen 5-jugatum 4-sulcum.*

**APIUM**, T. L. \* *Perfil, Ache*. Calix integer. Petala subrotunda inflexa æqualia. Fructus ovatus striatus. *Flores lutescentes; involucrum 0 aut 1-phyllum laterale; involucellum in A. Petroselino minutum, 3-phyllum, dimidiatum seu foliolis secundis.*

**ANETHUM**, T. L. \* **FÆNICULUM**, T. \* *Anet, Fenouil*. Calix integer. Petala integra involuta. Fructus subovatus compressus striatus. *Flores lutei; folia multifida. Semen 5-jugatum, jugis marginalibus Anethi T. membranaceis, Fœniculi T. nudis.*

**SMYRNIUM**, T. L. \* *Maceron*. Calix integer. Petala acuminata, carinata subinflexa. Fructus subovatus striatus. *Flores lutei; folia caulina simplicia aut ternata; flosculi centrales in quibusdam abortivi. Semen dorso 3-jugatum, lateribus contractum, jugis marginalibus conniventibus.*

**PASTINACA**, T. L. \* *Panais*. Calix integer. Petala integra involuta. Fructus compresso-planus ellipticus. *Flores lutei; folia pinnata. P. opopanax involuocrata & involucellata ex D. Gouan, fortè Laserpitio congener. P. oleracea interdùm involucellata. Jugalibus marginalia subalata, dorsalia subnulla ex Cussonio.*



**THAPSIA**, T. L. \* *Thapsie*. Calix integer. Petala lanceolata incurva. Fructus oblongus membranâ longitudinali cinctus. Flores lutei; folia 2-3 pinnata. Juga seminis compressi lateralia secundaria alata, cætera subnulla ex Cuss.; inde *Laserpitio* adjicienda T. *asclepium* L. cui juga 4 secundaria alata, & flores albi. T. trifoliatam L. jugis 5 primariis alatis instructam generico Cnidii nomine distinguit Cussonius, ex ipso propterea congenerem Selino Monnieri, licet non involucrem.

## II. Umbelliferæ veræ. Umbellæ nudæ; umbellulæ involucrellatæ.

**SESELI**, L. \* **FENICULUM** T. \* *Seseli*. Calix integer. Petala inflexo-cordata. Fructus ovatus parvus striatus. Umbellulæ breves globosæ. Folia 1-2-pinnata linearia; involucellum aliis 1-3-phyllum minimum, aliis polyphyllum majus, in S. *Hippomarathro* basi subcoactum; umbellæ sæpè rigidula, in S. *Turbith* foliolo involucrellata.

**IMPERATORIA**, T. L. \* *Impératoire*. Calix integer. Petala inflexo-emarginata subæqualia. Fructus subrotundus compressus, medio gibbus, margine cinctus. Folia ternata, floralia subopposita; involucellum 1-2-phyllum minimum. Juga seminis compressi 2 marginalia alata, 3 dorsalia nuda ex Cuss.

**CHÆROPHYLLUM**, T. L. \* **MYRRHIS**, T. \* *Cerfeuil*. Calix integer. Petala inflexo-cordata, exteriora paulò majora. Fructus oblongus laevis. Involucellum sæpè sub 5-phyllum foliolis concavis reflexis, rariis 7-9-phyllum ut in C. *colorato* L. seu *Linderæ Adans.*; flosculi centrales plerumque abortivi, fertiles in C. *arborescente* L.

**SCANDIX**, T. L. \* **MYRRHIS**, T. \* **CHÆROPHYLLUM**, T. \* Calix integer. Petala inflexo-emarginata, extimo majore. Fructus oblongus subulatus. Involucellam sæpè 5-phyllum, quandoque 2-3-7-phyllum; flosculi centrales interdum abortivi; semina aspera aut glabra, in S. *odoratâ* majora 5-costata, in *Scandice* T. 5-lineata & superius longè rostrata. An genus dividendum, restituendaque *Tournefortiana* nomina?

**CORIANDRUM**, T. L. \* *Coriandre*. Calix 5-dentatus. Petala inflexo-cordata, in disco æqualia, in radio inæqualia extimis omninò aut partim majoribus. Fructus extus testaceus, in C. *sarivo* sphaericus, in C. *testiculato* didymus aut dicocus. Huic involucellum nullum, illi 3-phyllum dimidiatum; utrique involucrum unifolium, raro nullum, & flosculi centrales abortivi, & odor gravis.

**ÆTHUSA**, L. \* **CICUTA**, T. \* **MEUM**, T. \* Calix integer. Petala inflexo-cordata inæqualia. Fructus ovato-subrotundus striatus. Umbellulæ interiores breviores; Mei T. folia 2-3-pinnata tenuissimè dissecta; ejusdem involucrum 1-2-phyllum longum dimidiatum. Semina 5-jugata 4-sulca, in *Æ. Cynapio* breviter subovata.



in Æ. Bunio longiora & rariora, in Meo T. multò majora & qualia in Ligustico : an inde genus reformandum?

**CICUTARIA**, Riv. Lamarck. \* **CICUTA**, L. \* **ANGELICA**, T. \* Calix integer. Petala ovata inflexa subæqualia. Fructus subovatus sulcatus. Umbellulae æquales & involucello polyphylllo breviores in C. virosâ, inæquales eodem longiores in aliis; semina 5-jugata 4-sulca. Folia C. bulbiferæ graciliora multipartita interdum opposita, & bulbuli axillares. Herbae aquaticæ noxiæ.

**PHELLANDRIUM**, T. L. \* Calix 5-dentatus. Petala cordato-inflexa. Fructus ovatus lævis, calicinis dentibus & stylis coronatus. Involucellum 7-phyllum; centrales flosculi minores. Semina P. mutellinæ sulcata, P. aquatici striata aut lineata; hæc species 3-pinnatifolia aquatica noxia, illa in pascuis montanis frequens innoxia aromatica 2-pinnatifolia.

### III. Umbelliferæ veræ. Umbellæ & umbellulæ involuocratæ.

**ÆNANTHE**, T. L. \* Calix 5-dentatus. Petala disci inflexo-cordata subæqualia, radii maxima difformia. Fructus subovatus calice coronatus sessilis. Umbellæ pauciradiatæ; umbellulæ globosæ flosculis sæpè sessilibus, in radio sterilibus; involucri & involucella polyphylla. Herbae noxiæ, plurimæ aquaticæ, quædam radicibus tuberosis suprâ attenuatis, quædam caule fistuloso striato. Involucrum 0 in Æ. fistulosâ & Æ. crocatâ, 1-2-phyllum in Æ. globulosâ. Umbellulæ radiales in Æ. proliferâ masculæ pedunculatæ, centrales frugiferæ sessiles.

**GINGIDIUM**, Forst. \* Calix 5-dentatus. Petala lanceolata, inflexo-cordata. Fructus calice coronatus ovatus, seminibus 4-striatis. Umbellæ inæquales; umbellulæ paucifloræ, flosculis disci abortivis; involucrum utrisque 6-phyllum. Character ex Forst. Austr. t. 21.

**CUMINUM**, CB. L. \* **FÆNICULUM**, T. \* *Cumin*. Calix integer. Petala inflexo-emarginata subæqualia. Fructus ovatus striatus. Umbellæ & umbellulæ sæpè 4-partitæ, involucri & involucello sæpè 4-phyllis, foliolis interdum 3-fidis. An calix 5-aristatus partim persistens? Semen 4 jugis secundariis asperis instructum ex Cuss.

**BUBON**, L. \* **APIUM**, T. \* **FERULA**, T. \* Calix sub5-dentatus. Petala lanceolata inflexa. Fructus ovatus striatus villosus. Involucrum 5-phyllum; involucella polyphylla. B. Galbani frutescentis semen compressum marginatum, dorso 3-jugatum & involucrum polyphyllum.

**SISON**, L. \* **SIUM**, T. \* **FÆNICULUM**, T. \* **CARVI**, T. \* *Sison*. Calix integer. Petala lanceolata inflexa. Fructus ovatus striatus. Umbellæ pauciradiatæ involucri 3-4-phylllo aut rarius nullo; um-



*bellulæ paucifloræ graciles involucello sub4-phylo; semina 5-jugata 4-sulcata; folia in aliis 3-pinnata aut multifida, in aliis ternata aut sæpius pinnata, pinnulis S. verticillati in rachi verticillatis.*

SIUM, T. L. \* SISARUM, T. \* AMMI, T. \* Berle, Chervi. Calix integer. Petala inflexo-cordata. Fructus subovatus striatus. Involucra & involucella polyphylla; folia sæpè pinnata. Radices Sisfari T. tuberosæ fasciculatæ. Umbella S. nodiflori axillaris, sæpè non involucrata. Herbæ plurimæ aquaticæ.

ANGELICA, T. L. \* IMPERATORIA, T. \* Angélique. Calix sub5-dentatus. Petala lanceolata incurva. Fructus subrotundus angulatus solidus, stylis reflexis. Umbella magna multiradiata patens, involucri 3-5-phylo, rariùs unifolio; umbellulæ globosæ, involucello 8-phylo; folia sæpè 2-pinnata magna. Semina dorso 3-jugata, margine alata alis non marginalibus, sed lateralibus secundariis ex Cuss.

LIGUSTICUM, T. L. \* CICUTARIA, T. Livèche. Calix vix 5-dentatus. Petala involuta integra. Fructus oblongus, seminibus 5-jugatis 4-sulcis. Umbellæ & umbellulæ multiradiatæ; involucra sæpè 7-phylla & involucella sub4-phylla, utraque interdum numero varia; folia sæpè pluriès pinnata aut decomposita. L. alterum Lob. à L. Austriaco secernit Cussonius generico Phytospermi nomine, ex ipso distinctum præcipuè tunicâ seminis geminâ extus plicatâ & sub plicis ab invicem disjunctâ interstitio cavo. L. Peloponensis semen alterum dorso 3-jugatum, alterum 2-jugatum.

LASERPITIUM, T. L. \* ANGELICA, T. \* LIGUSTICUM, T. \* CACHRYS, T. \* Laser. Calix vix 5-dentatus. Petala inflexo-emarginata patentia. Fructus oblongus angulis 8 membranaceis. Umbellæ & umbellulæ multiradiatæ, involucris & involucellis polyphyllis. Seminis juga 4 secundaria alata Laserpitium designant ex Cuss., & quasdam Linnæanas species aliò depellunt. An generi rectè adjecit Linnæus fil. Suppl. Acyphyllam Forst. t. 68 distinctam calice 5-dentato persistente; seminibus dorso sub3-gonis; umbellulis quibusdam brevioribus, quibusdam masculis, involucris & involucellis 3-5-phyllis dimidiatis, foliis mucronatis? An cum Crantzio genere distinguendum L. Siler L. cui semen sulcatum non alatum?

HERACLEUM, L. \* SPHONDYLIIUM, T. \* Berce. Calix subinteger. Petala inflexo-emarginata, in disco æqualia, in radio inæqualia exterioribus 2-fidis. Fructus ellipticus compressus apice emarginatus, margine membranaceus, 4-striatus. Umbellæ & umbellulæ multiradiatæ; involucra polyphylla caduca, rariùs nulla; involucella 3-7-phylla extrorsum longiora; stilosculi centrales interdum abortivi, radiales in H. angustifolio non difformes. Juga seminis 2 marginalia primaria alata ex Cuss.

FERULA, T. L. \* Ferule. Calix integer. Petala oblonga subæqualia. Fructus ovalis compressus, seminibus dorso 3-lineatis. Umbellæ & umbellulæ globosæ multiradiatæ, involucri caduco,



*involucello polyphylllo brevi; plures umbellæ laterales ex unius terminalis pedunculo enatæ; folia pluriès pinnatæ; caulis quarundam altissimus.*

**PEUCEDANUM**, T. L. \* **ANGELICA**, T. \* **OREOSELINUM**, T. \*  
Calix minimus 5-dentatus. Petala oblonga incurva æqualia. Fructus ovalis subcompressus, alâ cinctus, utrinque striatus. Involucra polyphylla, rariùs 1-5-phylla; involucella polyphylla breviora; flores lutescentes. Juga seminis 2 marginalia alata, & inde congeneres *Athamantha cervaria* & *A. Oreoselinum* L. ex Cuss.

**CACHRYS**, T. L. \* *Armarinte*. Calix integer. Petala lanceolata æqualia. Fructus magnus subovatus angulatus suberoso-corticatus. Flores lutei; umbellæ & umbellulæ multiradiatæ, involucris & involucellis polyphyllis, interdum ramosis; seminum cortex fungosus, lavis vix lineatus aut sæpiùs asper 5-costatus & 4-sulcus.

**CRITHMUM**, T. L. \* *Bacille*. Calix integer. Petala ovata inflexa subæqualia. Fructus ovalis compressus striatus. Umbellæ & umbellulæ multiradiatæ hemisphericæ, involucris & involucellis polyphyllis; seminis cortex fungosus ex Cuss.; folia 3-ternata aut pinnata. *C. pyrenaicum* L. *Athamant hæ affiniùs*.

**ATHAMANTHA**, L. \* **CHÆROPHYLLUM**, T. \* **OREOSELINUM**, T. \* *Athamante*. Calix integer. Petala inflexo-emarginata subinæqualia. Fructus ovato oblongus striatus. Umbellæ multiradiatæ involucro polyphylllo aut rariùs sub3-phylllo; involucella polyphylla. Semen in aliis oblongum 5-jugatum, in aliis 5-lineatum villosum, planum margine alatum in aliis (*Oreoselinum* T.) quas Cussonius *Peucedano*, Crantzius & Lamark *Selino* adjiciunt, 5-alatum alis primariis in *A. Chinensi* quæ *Cnidium* Cuss.

**SELINUM**, L. \* **THYSSELINUM**, T. \* **CARVIFOLIA**, CB. V. \*  
Calix integer. Petala cordata æqualia. Fructus ovalis oblongus, compresso-planus, utrinque medio striatus. Involucra & involucella polyphylla; alæ seminis 2 marginales primariæ in *Thyssefino* T. præterea lactescente, 2 laterales secundariæ in *Carvifoliâ* involucro destitutâ, 5 primariæ in *S. Monnieri* ad *Cnidium* Cuss. relatæ.

**CICUTA**, T. Hall. Lamark. \* **CONIUM**, L. \* *Ciguë*. Calix integer. Petala inflexo-cordata inæqualia. Fructus subglobosus feminibus 5-costatis, costis crenulato-crispis. Involucra 3-5-phylla, involucella 3-phylla dimidiata; folia pluriès pinnata. *C. africanæ* semen longius & plures flosculi steriles. *C. rigentis* semina muricata. *C. Royeni* *Caucalidis* congener ex D. Lamark.

**BUNIUM**, L. \* **BULBOCASTANUM**, T. \* *Suron, Terrenoix*. Calix integer. Petala inflexo-cordata æqualia. Fructus ovatus. Umbellæ multiradiatæ; umbellulæ breviores, floribus confertis. Ex Gouan *Illustr.* involucrum B. minoris polyphyllum, B. majoris 1-phyllum aut 0, involucella utriusque 3-4-phylla dimidiata, & radix tuberosa subsphæricea.



**AMMI**, T. L. \* *Ammi*. Calix integer. Petala inflexo-cordata, in disco æqualia, in radio inæqualia. Fructus subrotundus parvus lævis striatus. *Involucrum polyphyllum pinnatifidum; involucella polyphylla simplicia. Hujus congenes ex Lamark Dict. Daucus visnaga L. & D. Meoides HRP. quibus fructus lævis, & interea Dauci congener A. copticum L. fructu muricato.*

**DAUCUS**, T. L. \* **CAUCALIS**, T. \* *Carotte*. Calix integer. Petala inflexo-cordata, exteriora majora. Fructus ovatus, undique pilis hispida aut aculeis muricatus. *Umbella multiradiata, florens plana, fructifera concavo-connivens; involucella & præsertim involucria polyphylla pinnatifida. Abortiunt in quibusdam flores marginales, in quibusdam umbellula centralis. Seminis juga 5 primaria lævia parum prominula, 4 secundaria hispida aut muricata ex Cuss.; fructus igitur glabri (D. Visnaga) hinc eliminandi.*

**CAUCALIS**, T. L. \* *Caucalide, Girouille*. Calix 5-dentatus. Petala inflexo-cordata, disci æqualia, radii inæqualia extimo majore 2-fido. Fructus Dauci. *Umbella pauciradiata inæqualis; umbellula contracta, flosculis exterioribus masculis longius pedunculatis; involucria & involucella polyphylla indivisa, foliolis numero radiorum marginalium. A Dauco distincta involucriis non pinnatifidis; semen similiter constructum ex Cuss. Hinc revocanda duo Tordylia L.*

**TORDYLIUM**, T. L. \* Calix 5-dentatus. Petala inflexo-cordata, disci æqualia, radii inæqualia extimo majore. Fructus orbiculatus compressus, seminibus planis margine tumidis, crenulatis aut granulatis aut ciliatis. *Umbella inæqualis, involucrio polyphylo simplici; umbellula inæquales brevissimæ, involucrio dimidiato sub 3-phylo longo; folia plerumque pinnata. T. Anthriscus & T. nodosum L. ad Caucalidem depellenda.*

**RIASSELQUISTIA**, L. \* Calix 5-dentatus. Petala incurvato-bifida, disci æqualia & radii inæqualia extimis omnino aut partim majoribus tum in umbellâ, tum in umbellulis. Semina umbellæ exteriora, ut in Tordyllo orbiculata crenulata; interiora hemisphærica, calathiformia ut in Omphalode, hinc concava margine introflexo, inde convexa. *Umbella inæqualis involucrio 5-phylo minimo; umbellula centralis abortiva, ambientes in disco proprio steriles, in radio fertiles, involucello dimidiato 3-phylo; folia pinnata aut simplicia. A Tordyllo discrepat floribus abortivis & seminibus calathiformibus fortè vitio fructus deformatis.*

**ARTEDIA**, L. \* **THAPSIA**, T. \* Calix ... Petala Tordylia. Fructus orbiculatus compressus, seminibus planis extus 5-lineatis, margine lato membranaceis scariosis, profundè & eleganter sinuato-crenatis. *Umbella fructifera connivens, involucrio polyphylo, foliolis basi marginatis, apice 1-2-ternatis; umbellula contracta, flosculis disci masculis, involucrio 2-3-phylo dimidiato pinnatifido; folia multifida linearia.*

**BUPLEVRUM**, T. L. \* **BUPLEVRUM**. *Bupleyre*. Calix integer. Petala



Petala integra brevia involuta. Fructus subrotundus compressus striatus. Flores laci; umbellæ & umbellulæ paucifloræ aut rariâs multifloræ; involucria polyphylla brevia, rariâs 3-5-phylla; involucelli majora 5-phylla, intereum colorata, intereum basi coadunata; folia plerumque simplicia integra; species quædam frutescentes, quarum una spinescens.

**HERMAS, L. \*** Monoïca. Calix integer aut sub5-dentatus. Petala integra erecta. Fructus orbiculatus compressus. Umbellæ & umbellulæ multiradiatæ confertæ, involucrio polyphylo, involucello 1-3-phylo minore; in umbellâ terminali flores umbellularum radiâs abortivi pedunculis truncatis, flosculus centralis frugifer fœmineus antheris sterilibus; in umbellis 2-3 lateralibus flores umbellularum pauci masculi gemine abortivo, cæteri evanidi pedunculis setiformibus; caulis ramosus aut scapiformis 3-4-umbellifer; folia simplicia, radicalia aut caulina; umbellæ quarundam capituliformes.

**ASTRANTIA, T. L. \*** *Asrance*. Calix 5-dentatus. Petala inflexo-bifida. Fructus ovatus striatus rugoso-crispus, coronatus calice. Umbellæ 3-4-radiata, involucrio 4-6-phylo, aut ramosa lœvis & quasi nulla, ramis basi 1-bracteatis; umbellulæ multifloræ, flosculis aliis hermaphroditis, aliis pluribus masculis longius pedunculatis; involucello majore polyphylo (10-20) æquali colorato corollæformi. Folia sæpè palmata. Seminis coarctæ à rugosis tunicarum disjunctarum plicis intus vacuis productæ ex Cuss.

**SANICULA, T. L. \*** *Sanicle*. Calix subinteger. Petala inflexa. Fructus ovatus, scaber aut muricatus. Umbellæ 3-4-radiata involucrio dimidiato, aut quasi ramosa ramis 1-bracteatis; umbellulæ conferto-capitata, flosculis subsepalibus, centralibus masculis; involucello brevi polyphylo; folia palmata aut digitata.

#### I V. Umbelliferæ anomalæ.

**ARCTOPUS, L. \*** Umbellæ simplex flosculis in involucello monophyllo 4-partito spinoso magno sessilibus, pluribus in disco masculis, 4 in radio fœmineis. Singulis calix 5-dentatus; petala integra oblonga. Fructus 4, in involucello persistente & connivente reconditi, 2-spermi. Flores in distinctâ plantâ masculi omnes, umbellæ in umbellulas divisâ, involucrio & involucellis 5-phyllis. Folia conferta, sinuata ciliata, juxta sinus stellatim supra spinosa; flores inter folia terminales. Habitus *Eryngii*.

**ECHINOPHORA, T. L. \*** Umbellæ involucro 3-4-phylo; umbellulæ involucello turbinato monophyllo 6-fido inæquali. Harum flosculi marginales pedicellati masculi, calice 5-dentato, petalis patulis inæqualibus, pistillo abortivo; flosculus centralis 1 fœmineus sessilis, calice & staminibus carens, involucello immersus; huic petala emarginata, styli 2; semen 1 (altero forsân abortivo) testum involucello indurato, cum pedicella



masculis persistente, spinoso. Folia 1-2-pinnata subulato-spinosa aut inermia. Flos fœmineus interdum staminifer ex D. Turra.

**ERYNGIUM**, T. L. \* *Panicaut.* Flores plurimi sessiles paleis distincti, densè aggregati in umbellulâ capitatâ suprâ receptaculum conicum involucro polyphylo rigido cinctum. Singulis calix 5-partitus; petala inflexa; fructus ovatus. Umbellulæ nunc in umbellam involucrentem sæpè irregularem & ramosam dispositæ, nunc sparsæ; folia simplicia aut composita, sæpè spinosa ut & involucra; habitus Cardui.

**BOLAX**, Commerf. \* Calix... Petala 5 bipartita. Stamina 5. Styli & stigmata 2. Fructus didymus orbiculatus compressus glaber, feminibus dorso sulcatis. Umbellula simplex terminalis non prominens, obscurè 2-3-phylla & 2-3-flora; herba densè cespitosa aut glebosa, erecta; folia minima 3-loba crassiuscula, vaginis longioribus imbricatis caulem obtegentia; semina abundè gummoso-resinosa. Frequens in Magellaniâ & ins. Maclovianis dicta Gommier des Malouines, in Pernetty it. Maclov. 2. p. 7. memorata. Character ex Commerf. βόλος, gleba.

**HYDROCOTYLE**, T. L. \* Calix integer. Petala integra patentia. Fructus orbiculatus compressus. Umbella simplex involucro 4-phylo terminalis aut axillaris, interdum è centro prolifera, seu ramos emittens simplices aut ramosos, semel aut pluriès umbelliferos præcipuè in divisuris; herbæ plerumque repentes; folia simplicia, integra nonnunquam peltata, aut rariùs lobata. Huc retulit Linnæus fil. Suppl. omissis causis; 1<sup>o</sup>. Solandram L. herbam caulescentem tomentosam, ex Linnæo patre polygamam in umbellulâ 4-phyllâ 5-floram, flosculis 4 marginalibus pedunculatis masculis 5-petalis 5-andris, quinto centrali hermaphrodito sessili 6-petalo 6-andro 2-stylo cui fructus 2-coccus 2-spermus; 2<sup>o</sup>. Centellam L. ex eodem herbaceam volubilem alternifoliam foliis stipulaceis, floribus axillaribus monoïcis aut dioïcis, in umbellulâ masculâ 4-phyllâ 5-floram flosculis sessilibus 4-petalis 4-andris, in fœmineâ 2-phyllâ 1-floram flosculo sessili 4-petalo 2-stylo & fructu 2-loculari... An rectè congregata genera, an ex ulteriori observatione 5-andra? An cæteræ etiam species verè congeneres, licèt habitu interdum dissimiles? Confer in vivis.

**AZORELLA**, Lamark. \* *Azorelle.* Calix sub 5-dentatus. Petala 5 ovata integra. Stamina 5. Styli & stigmata 2. Fructus minimus subrotundus compressus 1-spermus, forsàn femine altero abortivo. Umbellula simplex axillaris aut terminalis, involucro 3-5-phylo foliolis basi ciliatis, 4-8-flora flosculis plurimis abortivis. Herba Magellanica ex Commerf. herb. innominata, humilis multicaulis densè cespitosa, Empetri facie; folia parva oblonga, margine inflexo suprâ concava & intus passim pilosa, vaginâ amplexicauli ciliis albis longis marginatâ; umbellæ numerosæ non exsertæ. Bolaci & Hydrocotyle affinis. Character ex secco.



LAGOECIA, L. \* CUMINOIDES, T. \* Calix 5-fidus, laciniis capillaceo-multifidis. Petala breviora 2-cornia. Stylus & stigma 1. Semen 1 laciniis calicinis coronatum. *Umbella simplex, involucri 8-phyllo foliolis pennato-dentatis; singulo flosculo involucri 4-phyllo capillaceo-pennatum; folia radicalia & caulina pinnata. Genus stylo & semine unico ab Umbelliferis discrepans, ceterum affine.*

Oss. Umbelliferarum distributio ac designatio, qualis hic exhibetur, integræ earum notitiæ impar extat seriemque minüs naturalem exhibet. Ex involucriis enim signa quædam solida, sed plura erronea ac facillè varia deducuntur, cum species congeneres nonnunquam aliæ sint involucriatæ, aliæ nudæ. Præcipuos in flore & fructu Vegetantium omnium ideòque Umbelliferarum characteres indigitat observatio. Horum primarii in omnibus Umbelliferis iidem, ordini designando prævalent, jam tales supra memorati. Secundarios genericis definitionibus addicendos exhibent diversæ partes ab Autoribus ad arbitrium selectæ, nempe calix, corolla, involucrum &c., sed eos in fructu potissimum quærendos suadet natura docentque Moriönus, Tournefortius, Rivinus, Hallerus & inter recentiores accuratior Crantzius Umbelliferarum monographus, Cussoniusque cuius posthuma de iisdem dissertatio in Act. Soc. Med. Par. 1782 prodiit excerpta, magni nuncia operis inediti, ex quâ sequens delibatur fructûs descriptio.

Duplex in Umbelliferarum semine superficies: altera interior conjugato semini obversa *commissura* dicta, latior omninò clausa aut angustior lateribus hiulca, gibbosa aut complanata aut concava variè excavata; altera superficies exterior dorsalis quinquelineata, aut lineis elevatis quinquejugata seu quincostata, striis aut sulcis quatuor interpositis exaratur, interdum quatuor aliis jugis aut costis secundariis in singulo sulco prominulis instructa. Costæ primariæ, sunt duæ marginales, duæ laterales, una dorsalis; secundariæ sunt duæ laterales marginalibus primariis proximæ, duæ dorsales dorsali priori viciniores; utraq; nunc nudæ, nunc seorsim aut simul in alas aut pilos aculeosve productæ. Eadem seminis superficies vel omninò dorsalis & variè prominens ideòque plana aut convexa aut gibba aut hemisphærica, vel juxtà costas primarias laterales angulata sit medio dorsalis, utrinque lateralis, lateribus pro mutuo commissuræ & dorsi diametro parallelis aut conniventibus aut divaricatis.

His signis aliisque in Autoris dissertatione attentius inquirendis superiores elucescent Umbelliferarum characteres, & species qualibet propriis generibus submittentur. Iteranda igitur in vivis specierum collatio, sepositis generum hodiernorum definitionibus, non tamen neglectis præcessorum observationibus. Quædam tum propriæ, tum frequentius ex Cussonianâ dissertatione Autorumque libris elicite adjiciuntur Linnæanis placitis, perficiendo ordini profuturæ, quibus addant ceteri operosa & minüs gratâ disquisitione non deterri.





## CLASSIS XIII.

### PLANTÆ DICOTYLEDONES POLYPETALÆ.

#### STAMINA HYPOGYNA.

**C**ALIX mono aut polyphyllus, rarissimè nullus. Petala hypogyna seu inserta sub pistillo, definita aut rarissimè indefinita, plerumque distincta aut interdum in corollam pseudo-monopetalam basi coalita, aut raro nulla. Stamina hypogyna, definita aut indefinita, filamentis sæpè distinctis aut quandoque in unum tubulosum coalitis, aut rariùs in plura fasciculatim collectis; antheræ distinctæ (in Violâ & Balsaminâ connatæ). Germen superum, in plurimis unicum, in nonnullis multiplex; stylus unicus aut multiplex aut nullus; stigma unum aut multiplex. Fructus superus, nunc simplex uni aut multilocularis, nunc rariùs multiplex singulo pericarpio uniloculari.

*Obs.* Staminum hypogynia exigit germen superum; admittit idem simplex aut multiplex, calicem monophyllum aut polyphyllum aut raro nullum, corollam polypetalam aut quandoque nullam, stamina definita aut indefinita, coalita aut distincta. Corolla utpotè polypetala & hypogyna staminibus hypogynis germinique supero semper adjungitur cæterosque permittit memoratos caractères; eadem interdum pseudo-monopetala calicem tunc reposcit monophyllum, pariter staminibus monadelphis jure adstantem. Germini unico stylus aut stigma simplex aut multiplex; germinibus junctis styli aut stigmata totidem simplicia.

Si qua difficilis extat Vegetantium series instituenda, ea est



certè quæ numerosas in eadem classe complectitur plantas uno conformes primario caractere, plurimisque secundariis discrepantes. Non tantum enim conficiendi ordines verè naturales certòque designati, sed & iidem mutuò disponendi ita ut facilis ab uno ad alterum habeatur progressio, nec ulla inter extremos utriusque fines detur absoluta distinctio, inversâ Systematicorum doctrinâ. Ordines autem alii faciles jam universè accepti, alii operosius exstruendi, quos tamen si quis feliciter ex integro aut partim tantum delineaverit, is de re botanicâ promeruit, licet in eorum distributione anceps hæreat. Stamina intrâ corollam polypetalam hypogyna primarium exhibent in classe caracterem quo velut communi nexu colligantur ordines plus quàm viceni, additis etiam plurimis generibus nulli alteri verè consociandis & novorum ordinum posthâc conficiendorum indiciis. Diverfos inter caracteres in classe secundarios nullus prævalet, ordinum distributioni jure præfuturus. Stamina numero & proportionem & filamentorum aut antherarum coalitione in ordinibus sæpè sibi non constant. Fructus Monopetalis ordinandis (p. 94) aptissimus, in Polypetalis minoris est momenti, nec in texturâ propriâ, in styli & loculorum numero, in seminum & dissepimentorum situ generaliora sufficit signa. Parum etiam proficeret insignior germinis simplicis & multiplicis distinctio, quæ Magnolias, Anonas Malvaceasque plures Ranunculaceis admovent & à cæteris affinioribus segregans, seriem naturalem non profert, quin potius invertit. Utilior ex situ corculi in semine, ex perispermii existentia aut defectu, ex ejusdem naturâ caracter educitur, in veris ordinibus plerumque conformis ac fortè nunquàm varius & indè stabiliore eorum collocationi potissimum impendendus, quasi unus è primariis aut inter secundarios longè prior. Perispermum inest corneum Ranunculaceis, farinaceum Caryophylleis, carnosum Tiliaceis, Berberidibus, Cistis, Rutaceis &c., nullum plerisque cæteris. Corculi forma, in diversis ordinibus varia, in singulo conformis, exhibet nunc radiculam juxta lobos incurvam in Capparidibus, Sapindis, Aceribus, Cistis, Caryophylleis, nunc lobos partim reflexos in Malpighiis, Geraniis, nunc eosdem corrugatos in Malvaceis, nunc plerumque rectos in plurimis aliis. Indè sæpius ex



eius intuitu generis indeterminati locus naturalis concluditur aut confirmatur : *Gordonia* Malvaceis accedit lobis corculi corrugatis; *Hermannia* habitu Malvacea, perispermio carnosio Tiliacea rectius judicatur. Sed in aliis notissima feminis structura, in aliis omnino aut partim ignoratur præ organi tenuitate aut observationum defectu, danturque præterea tum plantæ tum ordines aspectu affines, dissimiles corculi situ; sic in *Meliis* genera alia perispermio instructa, alia eodem orbata; sic *Tiliaceæ* à *Malvaceis* recedunt aut à *Vitibus* quædam *Meliæ*.

Interea in difficili negotio præponuntur *Ranunculaceæ* quibus ut & *Umbelliferis* præcessis corculum in supernâ perispermi solidi cavitare minimum delitescit. Subsequitur ordinum perispermio destitutorum series numerosa parum interrupta & in singulo eorum confinio sæpius spontè connexa. Ponè subeunt pauciores perispermio carnosio instructi. Classẽ absolvunt *Caryophylleæ* perispermio farinaceo affines prioribus decimæquartæ classis ordinibus. Ea tamen series nonnullis deturpatur nodis aut aliquandò intermittitur. Ordines quidam non absoluti; quidam generibus minus affinibus ad calcem repositis gravati; quidam à proximis caractere dissidentes, sed aliis in eadem classe non similiores; oppositifolii alternifolii passim intermixti; stipulacei ab invicem quandoque distantes. Ambigua insuper in nonnullis staminum insertio, una quidem in singulis, sed quasi ad libitum hypogyna aut perigyna, dum scilicet stamina non immediatè sub germine sed depressius inseruntur, tum ei puncto quo pistilli fulcrum & calicina basis coeunt in floris pedunculum, tum glanduloso disco ibidem prominulo. Talem exhibent præcipuè *Aurantia*, *Meliæ*, *Acera*, in staminum perigynorum classe antea recensita, sed *Sapindis*, *Malpighiis* & *Vitibus* affinia ideòque iis inter hypogyna nunc adjecta. An iterato insertionum examine memorati ordines perigynis restituendi, aliquæ plures eodem conjunctim migrandi; an potius insertiones ambiguæ novam designant classẽ inter hypogynas & perigynas mediam & utrasque consequentem?

Alter insertionum modus in classe notandus sedulo, insignis nunc in *Malvaceis*, inde in *Caryophylleis*. Priorum stamina sæpè indefinitis filamentis coalescunt in tubulum cui petala basi



extus adnascuntur, ita ut corollam mentiantur monopetalam, flaminiferam aut flaminum tubo infixam. In Caryophylleis stamina definita, sed sæpè petalorum dupla, alterna sub pistillo, alterna petalorum unguibus inferuntur, geminam in eodem flore insertionem colligentia: undè naturale exurgit principium jam p. 71 & in operis proœmio edictum, quo epipetala flaminum insertio singulis aliis seorsim facilè conciliatur, modò iisdem congruat propria corollæ ipsiusmet flaminiferæ insertio. Cùm prætereà lex altera corollas flaminiferas jubeat esse frequentius monopetalas, Caryophyllearum petala nonnunquàm basi coalescunt ut in Malvaceis, & exemplo Saponariæ Anglicæ fortè non unico, in corollam verè monopetalam quandoque concresecunt. Quò plures autem leges infringit exceptio, eò rarior: indè prædicta corollæ conversio calicem monophyllum (p. 93. 154.) & stamina definita præcipiens, in ordinibus calice polyphylo instructis minùs aut nullè admittitur, & in staminibus indefinitis non valet nisi priùs (p. 157.) horum coaluerint filamenta. Corollæ defectus in paucis Caryophylleis & paucioribus Malvaceis & vix in aliis observatur, rarior in flaminum hypogynorum (p. 87.) quàm in perigynorum (p. 74.) classibus. Cur sic variæ discrepant insertiones? Cur diversæ in iisdem ordinibus exceptiones cumulantur?

## O R D O I.

### RANUNCULACEÆ, *LES RENONCULACÉES.*

**CALIX** polyphyllus, interdum nullus. Petala definita, sæpius quinque. Stamina indefinita (in *Myosuro* definita); antheræ filamentis adnatæ. Germina plura, indefinita aut definita (rariùs unicum), receptaculo communi imposita; unicuique stylus unicus aut rarò nullus; stigma simplex. Capsulæ totidem, aut rariùs baccæ, in aliis monospermæ non dehiscentes, in aliis polyspermæ intùs semibivalves, marginibus seminiferæ. Corculum minimum in supernâ cavitate perispermii cornei magni. Caulis plerumque herbaceus.



Folia alterna, aut rarius (in Clematite & Atragene) opposita, quædam semivaginantia; alia composita, pinnata aut digitata; alia sæpius simplicia & hæc plerumque palmata aut lobata, sinibus basi frequenter pallidis.

I. Capsulæ monospermæ non dehiscentes. *Baccæ in Hydrasti,*

**CLEMATIS**, L. \* **CLEMATITIS**, T. \* *Clématite, Viorne.* Calix 0. Petala 4, rarius 5. Capsulæ plurimæ aristatæ, aristâ sæpè plumosâ. Caulis sæpè frutescens, sarmentosus aut erectus; folia opposita, simplicia aut ternata aut pinnata; flores axillares aut sæpius terminales, solitarii aut sæpius corymbosi, in quibusdam dioici, in paucis instructi caliculo tubinato 2-fido à petalis paululum remoto.

**ATRAGENE**, L. \* **CLEMATITIS**, T. \* Calix 4-phyllus. Petala 12, aut rarius plura. Capsulæ plures aristatæ, aristâ pilosâ. Frutices sarmentosi aut herbe repentes; folia opposita, conjugata cirrhusa aut 1-2-ternata; flores in fruticum ramulis aut in herbarum scapo Anemonoide involucrato terminales.

**THALICTRUM**, T. L. \* *Pigamon.* Calix 0. Petala 4, rarius 5. Capsulæ plures sulcatæ muticæ. Folia 1-2-pinnata aut 2-3-ternata, divisuris T. Aquilegifolii membranulâ involucratis; flores terminales spicati aut sæpius paniculati, rarissimè dioici.

**HYDRASTIS**, L. \* Calix 0. Petala 3. Baccæ numerosæ minimæ. Caulis alternè 2-phyllus, foliis palmatis; flos solitarius terminalis; fructus & habitus Rabi herbacei. Affinis Podophyllo, sed polygyna. An semini perispermum corneum?

**ANEMONE**, T. L. \* **PULSATILLA**, T. \* *Anemone, Pulsatille.* Calix 0; hujus loco involucri caulinum à flore distans, 2-3-phyllum. Petala 5 aut plura. Capsulæ in *Anemone* T. muticæ, in *Pulsatilla* T. lanatæ aristatæ aristâ plumosâ. Folia radicalia, 1-2-pinnata aut digitata aut simplicia lobata; scapi 1-flori, foliolis involucri simplicibus aut partitis. A. Hepaticæ petala 6 & involucri flori proximum caliciforme 3-phyllum simplex. Scapi quædam intra involucri umbellatim ramosi, ramis simplicibus aut iterum partitis & involucratis, apice 1-floris.

**HAMADRYAS**, Commerf. \* Dioica. Calix 5-6-phyllus. Petala 10-12 linearia longa. MASC. Stamina numerosa brevia. FEM. Germina numerosa in capitulum conglobata; frigmata totidem, stylis nullis. Capsulæ 1-spermæ...? Herbe nemorales Asiaticæ; folia radicalia palmata; scapi 2-4-flori; habitus Adonidis. Character ex Commerf. Ἀμὰ simul, σποὺν νέμει.

**ADONIS**, L. \* **RANUNCULUS**, T. \* *Adoniæ.* Calix 5-phyllus.



Petala 5 aut plura, ungue nudo. Capsulæ plurimæ muticæ. *Folia multifida aut 2-3-ternata ; flores terminales.*

**RANUNCULUS**, T. L. \* *Renoncule*. Calix 5-phyllus. Petala 5 ; horum unguis foveolâ intus excavatus nudâ aut membranaceo-marginatâ, aut operculo squamuloso testâ. Capsulæ numerosæ muticæ. *Folia indivisa aut lobata ; flores axillares & sæpius terminales , lutei aut rariùs albi.*

**FICARIA**, Dill. Hall. \* **RANUNCULUS**, L. \* Calix 3-phyllus. Petala 8-9, ungue intus squamuloso. Capsulæ numerosæ muticæ. *Folia radicalia cordata ; scapi 1-flori ; flores lutei. Hinc advocandus Ranunculus Ficaria L. , cui affinis Anemone Hepatica L.*

**MYOSURUS**, JB. V. L. \* **RANUNCULUS**, T. \* Calix 5-phyllus coloratus, foliolis infra insertionem caudatis. Petala 5 minima, ungue filiformi tubuloso. Stamina 5 aut rariùs 4-7. Capsulæ numerosæ acuminatæ, receptaculo longissimo styliformi impositæ. *Herbula foliis indivisis angustis, scapis 1-floris ; flores minimi lutei.*

II. Capsulæ polyspermæ intus dehiscentes. Petala irregularia. Calix sæpè coloratus, à Linnæo corollâ dictus, petalis ab eodem in nectaria conversis.

**TROLLIUS**, L. \* **HELLEBORUS**, T. \* Calix circiter 14-phyllus. Petala circiter 9, calice multò minora, tubulosa 1-labiata. Capsulæ numerosæ sub1-spermæ. *Folia digitata ; caulis apice sub1-florus, flore luteo ; habitus Ranunculi.*

**HELLEBORUS**, T. L. \* *Hellebore*. Calix 5-phyllus magnus, sæpè persistens. Petala 5 aut plura, calice multò minora, tubulosa ore 2-labiato. Capsulæ 3-6 compressæ, quædam interdum abortivæ. *Folia pedata aut digitata aut palmata ; flores plures in caule terminales pedicellis 1-bractæatis, aut in scapo solitarii, nudî vel folio involucrati.*

**ISOPYRUM**, L. \* **HELLEBORUS**, T. \* Calix 5-phyllus. Petala 5 tubulosa breviora, ore 3-lobo. Capsulæ plurimæ recurvæ. *Folia 1-2-ternata ; flores terminales. Quibusdam habitus Fumariæ.*

**NIGELLA**, T. L. \* *Nigelle*. Calix 5-phyllus magnus. Petala 8 minora & angustiora, bilabiata, ungue coarctato, labio inferiore excavato & ultrâ 2-fido, superiore integro breviora cavæam inferiorem obtegente. Capsulæ 5-10 oblongæ, mucronatæ aut aristatæ, distinctæ aut in unam multilocularem coalitæ. *Folia 1-2-pinnata linearia ; flores terminales, in quibusdam involucri 5-phylllo caliciformi multifido cincti.*

**GARIDELLA**, T. L. \* Calix 5-phyllus parvus. Petala 5 majora, Nigellæ petalis conformia. Stamina 10. Capsulæ 3 acu-



minatæ. *Folia pinnata laciniata linearia ; flores subsolitarii terminales.*

**AQUILEGIA**, T. L. \* *Ancolie*. Calix 5-phyllus. Petala 5 corniculata seu cuculliformia, ungue laterali. Germina 5, paleis 10 cincta. Capsulæ erectæ. *Folia 1-2-ternata ; flores terminales, rosei aut violacei.*

**DELPHINIUM**, T. L. \* Calix submonophyllus 5-partitus coloratus, laciniâ superiore infrâ calcaratâ. Petala 2 (in quibusdam 1), pariter basi calcarata, calcare calicino recta. Capsulæ 3 (rarius 1) erectæ. *Folia inferiora digitata aut palmata, superiora nonnunquam indivisa ; flores laxè spicati aut paniculati terminales, colore varii, nunquam lutei.*

**ACONITUM**, T. L. \* *Aconit*. Calix 5-phyllus, foliolo superiore concavo galeato. Petala plura ; horum 2 superiora calcarata, ungue longissimo canaliculato angusto incurvo, calcare brevi obtuso, sub galeâ calicis latentia ; cætera inferiora minima linearia squamiformia. Capsulæ 3-5 erectæ. *Folia digitata aut palmata ; flores paniculati aut laxè spicati terminales, violacei aut lutescentes.*

III. Capsulæ polyspermæ, intus dehiscentes. Petala regularia.

**CALTHA**, L. \* **POPULAGO**, T. \* *Populage*. Calix 0. Petala 5 aut plura. Capsulæ 5-10, breves acuminatæ patentes. *Folia reniformia ; flores subcorymbose terminales lutei ; habitus Ranunculi.*

**PÆONIA**, T. L. \* *Pivoine*. Calix 5-phyllus aut 5-partitus. Petala 5. Germina 2-5 ; styli 0 ; stigmata 2-5 capitata. Capsulæ tomentosæ ; semina ovalia, succo rubro colorata. *Folia sæpè magna, 1-2-pinnata aut 1-2-ternata, foliolis lobatis ; flores subsolitarii terminales magni, variè purpurei aut rarius albid.*

**ZANTHORRIZA**, L'Hérit. \* Calix 5-phyllus aut 5-partitus patens. Petala 5 minima, glandulæformia aut circinata, quasi didyma. Stamina circiter 8. Germina plura tenuissima ; styli & stigmata totidem. Capsulæ totidem compressæ oblongæ membranaceæ, apice semibivalves & 1-spermæ ex D. L'Hérit. *Suffrutex radice luteâ ; folia 1-2-pinnata basi semivaginantia ; flores minimi paniculati terminales, singuli bracteolati. Huc relata licèt 1-sperma, quia Cimicifugæ affinis.*

**CIMICIFUGA**, L. \* *Cimicaire*. Calix 4-phyllus. Petala 4 urceolata cartilaginea. Stamina 20. Germina 4-7 ; styli & stigmata 4-7. Capsulæ 4-7 oblongæ, futurâ laterali dehiscentes polyspermæ ; semina squamis cincta. *Folia 1-2-pinnata ; flores subpaniculati terminales ; habitus Actææ. Numerus partium sæpè varius & flores nonnunquam abortu dioici.*



IV. Germen unicum. Bacca unilocularis polysperma, receptaculo seminifero laterali unico.

ACTÆA, L. \* CHRISTOPHORIANA, T. \* Calix 4-phyllus caducus. Petala 4. Stylus 0; stigma capitatum. *Folia 2-pinnata; flores longè spicati terminales albi.*

PODOPHYLLUM, L. \* ANAPODOPHYLLUM, T. \* Calix 3-phyllus. Petala 9. Stylus 0; stigma capitatum. *Caulis 2-phyllus foliis palmatis, in dichotomiâ 1-florus flore albo.*

Oss. Apta generum signis numerosis affinium conjunctio ac dispositio jam in Act. Acad. Paris. 1773 statuta. Partes à Linnæo Nectaria dictæ, vera sunt petala docente Bern. Jussæo, confirmante Adansonio, & collatis iisdem organis in Nigellâ & Ranunculo similiter foventis & squamulosis, in Trollio & Myosuro pariter tubulosis. Numerus quarundam partium in Ranunculaceis indefinitus, ut adaugetur in infinitum, ita & minuitur ad unitatem usque: sic Myosurus sæpè pentander, Garidella decandra: sic germen quintuplex in Nigellâ, triplex in Aconito, simplex in nonnullis Delphiniis & in Acteâ ac Podophyllo rectè ordini adjunctis, quibus unica in fructu seminum lateralis series ut in Calthâ, Pæoniâ &c. Hinc autem mediantibus generibus hisce monogynis datur progressio ad Papaveraceas corollâ & staminibus & styli defectâ & germine simplici ac uniloculari conformes, sed distinctas præcipuè multiplici seminum serie totidem placentis lateralibus affixâ. Illinc Ranunculaceæ retròeunt ad Umbelliferas pariter instructas perispermio solido & alternifolias fronde compositâ aut lobatâ, infra vaginante; umbellulas capitato-multifloras Eryngii & Saniculæ æmulatur receptaculum Anemones polygynum similiter vallatum involucro. Aliqua igitur inter prædictos ordines extat analogia nec omninò repugnat horum approximatio. Ranunculaceis extus assimilantur quædam Juncoidæ sect. 3, p. 46, discrepantes calice apetalo, staminibus perigynis & præcipuè semine unilebo. An ordini affines Sarracenia, Monotropa & cum Nelumbio Nymphæa jam Hydrocharidibus p. 68 adjecta.

## ORDO II.

### PAPAVERACEÆ, LES PAPAVERACÉES.

CALIX plerumque diphyllus & caducus. Petala sæpius quatuor. Stamina definita aut indefinita. Germen unicum; stylus sæpè nullus; stigma divisum. Fructus capsularis aut siliquosus, plerumque unilo-



cularis, sæpiùs polyspermus. Semina receptaculis lateralibus affixa, singula involucro membranaceo semitecta. Caulis herbaceus aut rarissimè frutescens. Folia alterna. Succus quarundam coloratus.

I. Stamina indefinita; antheræ filamentis adnatæ.

**SANGUINARIA**, L. \* **BELHARNOSIA**, T. \* Petala 8. Stigma capitatum, bifidum persistens. Capsula ovata oblonga, apice attenuato, bivalvis valvis repleto biscalpo utrinque seminifero persistenti appositis caducis. *Folium unicum radicale; scapus 1-florus; succus hæmatodes.*

**ARGEMONE**, T. L. \* *Argemone*. Calix interdum 3-phyllus. Petala interdum 5 aut 6. Stigma capitatum divisum persistens. Capsula ovata 3-5-angula, inter angulos persistentes & seminiferos apice semivalvis. *Flores solitarii terminales; succus flavescens.*

**PAPAVER**, T. L. \* *Pavot, Coquelicot*. Stigma radiatum persistens. Capsula ovata aut oblonga pluribus instructa receptaculis, (totidem quot radii stigmatis) seminiferis, ad parietes intus prominulis, delinens ad apicem sub singulo radio totidem foraminulis infra univalvibus. *Flores solitarii terminales; succus lacteus.*

**GLAUCIUM**, T. \* **CHELIDONIUM**, L. \* *Glauciene*. Stigma capitatum, bifidum, lateribus protensum. Siliqua longa subcylindrica 2-fulca, 2-ocularis, dissepimento (an verum dissepimentum?) tumido medullari obturante repleta seminiferum biscalpum. *Flores solitarii terminales; stamina numerosa; succus non coloratus. G. violacei stigma 3-fidum & siliqua 1-ocularis 3-valvis instructa 3 receptaculis pariter tumentibus.*

**CHELIDONIUM**, T. L. \* *Chélidoine, Éclaire*. Stigma parvum bifidum. Siliqua longa tenuis 2-valvis 1-ocularis dissepimento nullo. *Pedunculi umbellatim multiflori axillares & terminales; flores lutei, circiter 12-andri; succus flavescens.*

**BOCCONIA**, T. L. \* *Boccione*. Petala nulla ex Linn. Stamina 8-12 aut plura. Stylus brevissimus; stigmata 2 revoluta, intus plumosa. Capsula ovata compressa 2-valvis 1-sperma, valvis liberis, repleto ovali biscalpo persistente. *Frutex; folia magna; flores paniculati terminales (8-andros vidi), divisuris panicula 1-bracteatis; succus flavescens.*

II. Stamina definita.

**HYPECOUM**, T. L. \* **MNEMOSILLA**, Forsk. \* Calix minimus. Petala 3-loba, 2 exteriora majora, 2 interiora conniventia. Stamina 4. Styli 2 brevissimi; stigmata 2. Siliqua longa sub-



articulata articulis 1-spermis. *Folia multifida, pinnata aut pinnatifida; flores umbellato-corymbosi terminales lutei.*

**FUMARIA, T. L. \* CAPNOIDES, T. \* CYSTI-CAPNOS, Boerh. \***  
*Fumeterr.* Calix minimus. Petala inæqualia & irregularia, quorum 1 (rarius 2) basi calcaratum. Filamenta 2, basi inferiora & approximata, singula 3-antherifera, antheræ mediâ 2-loculari, lateralibus forsân 1-locularibus. Stylus brevissimus; stigma orbiculatum 2-sulcum. Siliqua 1-sperma brevis non dehiscens, aut polysperma longior 2-valvis in *Capno de T.*, aut in *Cysti-capno B.* capsularis globosa inflata polysperma 3-valvis. *Folia multipartita, interdum 2-pinnata aut 2-ternata, rachis apice nonnunquàm cirrhoso; flores spicati terminales.*

**Obs.** Ordo præcedenti affinis ex suprâdictis p. 235, Cruciferas aliundè contingit mediantibus Chelidonio & Hypecco pariter tetrapetalis & siliquosis & perispermo destitutis, ab iis discrepans calice diphylo & floribus non hexandris. An huic affinis Balsamina calice & corollâ ferè compar, fructu longè dissimilis?

## ORDO III.

### CRUCIFERÆ, LES CRUCIFÉRES.

**CALIX** tetraphyllus, plerumque deciduus. Petala quatuor in crucem disposita (undè nomen ordinis), foliolis calicinis alterna, sæpiùs unguiculata, disco hypogyno inserta. Stamina sex ibidem inserta, tetradynama, nempe quatuor majora geminatim & duo minora solitariè aduersantia, calicinis foliolis opposita. Germen simplex, impositum disco staminifero nonnunquàm inter stamina majora & intrâ minora tumente ac ideò tunc quadriglanduloso; stylus unicus aut nullus; stigma sæpiùs simplex. Fructus siliquosus longus, aut siliculosus brevis, plerumque bilocularis & polyspermus, bivalvis valvis liberis in longum dehiscens, apposis dissepimento membranaceo marginato; & ultrâ nonnunquàm rostri instar prominulo, ad margines oppositos hinc & inde seminifero. Corculum absque perispermo. Herbarum aut rarius frutices suffruticesve. Folia alterna (unico exemplo



opposita). Flores plerumque non axillares, vagi aut spicati terminales aut rariùs paniculati.

# I. Fructus filiquosus. Stylus nullus.

**RAPHANUS**, T. L. \* **RAPHANISTRUM**, T. \* *Raisfort, Radis.* Calix connivens. Discus germinis 4-glandulosus. Siliqua (1-locularis in *Raphanistro* T.) teres articulata, articulis ventricosis torosa. *Radix tuberosa, fusiformis aut sphæroïdea. Petala R. Raphanistri venosa.*

**SINAPIS**, L. \* **SINAPI**, T. \* *Sanve, Moutarde.* Calix patentissimus. Petala unguibus rectis. Discus germinis 4-glandulosus. Siliqua infernè torosa, dissepimento valvulis sæpè duplò longiore rostriformi. *Genus ex Crantzio idem cum Raphano.*

**BRASSICA**, T. L. \* **NAPUS**, T. \* **RAPA**, T. \* **ERUCA**, T. \* *Chou, Navet, Rave.* Calix connivens basi gibbus. Discus germinis 4-glandulosus. Siliqua teres compressa, dissepimento valvis paulò longiore. *Flores paniculati aut spicati; radix fusiformis in Napo T., sphæroïdea in Rapâ T.; utriusque calix corollæ concolor, Brassicæ T. virescens; stylus Erucæ T. ensiformis; folia B. oleracæ maxima crassiuscula, in rosam sæpè confertocapitata.*

**TURRITIS**, T. L. \* *Turrite.* Calix connivens. Siliqua longissima stricta angulata. *Caulis simplex erectus; spica florum longa terminalis.*

**ARABIS**, L. \* **LEUCOÏUM**, T. \* **TURRITIS**, T. \* Calix connivens, foliolis 2 majoribus basi gibbis. Discus germinis 4-glandulosus, glandulis squamiformibus oblongis reflexis. Stigma simplex. Siliqua longa compressa linearis. *Quibusdam habitus Turritidis.*

**HESPERIS**, T. L. \* **TURRITIS**, T. \* *Julienne.* Calix connivens & clausus, foliolis 2 basi gibbis. Petala obliquè flexa. Discus germinis intrà stamina minora 2-glandulosus. Stigma basi 2-furcum supernè connivens. Siliqua stricta compresso-plana.

**HELIOPHILA**, L. \* Calix patens, foliolis 2 basi vesiculosus obtegentibus 2 glandulas recurvatas, è disco enatas. Siliqua teres subtorulosa mucronata. *Hujus congener Chamira Thunb. eadem cum H. Circæoïde LS. ex D. Smith.*

**CHEIRANTHUS**, L. \* **LEUCOÏUM**, T. \* **HESPERIS**, T. *Giroflée.* Calix oblongus connivens clausus, foliolis 2 basi gibbis. Discus germinis 2-glandulosus. Stigma 2-fidum. Siliqua longa compressa sub4-gona apice 2-dentata; semina in *Leucoïo* T. marginata, aut in *Hesperide* T. nuda. *Ex Lamark Dict. species aliæ disco 2-glanduloso Hesperidi consociandæ, aliæ non glandulosæ Cheiran-*



*ihò attribuendæ cum adjectis Erysimis 4-6 Linn. syst. ed. 14., excluso disci glandulosi caractere Linnæano.*

**ERYSIMUM**, T. L. \* **SISYMBRIUM**, T. \* **HESPERIS**, T. \* **TURRITIS**, T. \* *Velar.* Calix connivens clausus. Discus germinis 2-glandulosus, intrâ stamina breviora. Stigma capitatum. Siliqua columnaris exactè tetraëdra. *Ex Lamark species una Hesperidi, altera Eruca ab ipso restituta, quædam Cheirantho affiniore & E. officinale L. unicum in genere persistit.*

**SISYMBRIUM**, T. L. \* **ERYSIMUM**, T. \* **ERUCA**, T. \* **HESPERIS**, T. \* Calix patens. Petala patentia, ungue brevi. Stigma 1. Siliqua longa teres, valvis rectis non elasticis, dissepimento iisdem paulò longiore. *Folia simplicia aut pinnatifida aut pinnata; flores spicati aut paniculati, aut rariùs solitarii axillares. Siliqua brevis ovata in S. amphibio & S. sylvestri quæ Radicula Dill. Hall. & Roripa Scop.; eadem longissima tenuis in S. Sophiâ 2-3-pinnatifoliâ. S. Nasturtium L. Cardamini affinius ex D. Lamark, fructu licet non elasticè dissiliente.*

**CARDAMINE**, T. L. \* **SISYMBRIUM**, T. L. \* *Cresson.* Calix parvus hiulcus. Petala patentia, unguibus longis erectis. Siliqua elasticè dissiliens, valvis à basi ad apicem revolutis, dissepimento æqualibus. *Folia simplicia aut ternata aut pinnata. Flores interdum abortu 4-andri in C. hirsutâ & apetalis in C. impatiens. Valvæ fructus non revolutæ in C. petreâ, nec in C. fontanâ Lamark quæ Sisymbrium Nasturtium L. cæteris Sisymbriis minùs affine.*

**DENTARIA**, T. L. \* *Dentaire.* Calix oblongus connivens. Petala plana unguiculata. Stigma emarginatum. Siliqua ut in Cardamine dissiliens, dissepimento valvis longiore. *Radix carnosa, tuberculis dentata; folia sæpiùs digitata aut pinnata. Discus germinis in quibusdam 4-glandulosus ex Scopolio.*

**RICOTIA**, L. \* **LUNARIA**, T. \* Calix connivens. Petala apice plana obcordata. Siliqua 1-locularis oblonga compressa valvis planis, circiter 4-sperma. *Folia pinnata, foliolis lobatis. Lunariæ fructus sed 1-locularis angustior.*

## I I. Fructus siliculosus. Stylus unicus.

**LUNARIA**, T. L. \* *Lunaire.* Calix connivens, foliolis 2 basi gibbis & faccatis. Silicula magna integra elliptica compresso-plana pedicellata, valvis planis dissepimento æqualibus & parallelis; semina pauca compressa. *Folia simplicia, inferiora sæpè opposita.*

**BISCUTELLA**. T. \* **THLASPIDIUM**, T. \* Calix Lunariæ, coloratus. Petala oblonga apice patentia. Silicula compresso-plana, bis orbiculata orbiculis 1-spermis, latere adnatis imo



stylo. *Folia simplicia; calicina quarundam foliola profundius saccata, intus glandulosa & mellifera.*

**CLYPEOLA**, L. \* **JONTHLASPI**, T. \* **ALYSSON**, T. \* **PELTARIA**, Jacq. L. \* Calix erectus. Petala oblonga integra. Siliculata orbiculata compresso-plana 1-locularis 1-perma. *Folia simplicia. Huc Peltariam L. revocant Arduinus & Lamarck, Tournefortioque assentientes C. maritimam & C. tomentosam L. utramque 2-locularem Alyssso restitunt.*

**ALYSSUM**, T. L. \* **ALYSSOÏDES**, T. \* **VESICARIA**, T. \* Calix connivens. Petala apice patentia. Stamina filamenta 2 in quibusdam introrsum basi dentata. Silicula 2-locularis, stylo acuminata, in *Alyssso* T. orbicularis compressa valvis conformibus, aut ventricosa valvis elliptico-hemisphaericis & feminibus in *Alyssoides* T. marginatis planis, in *Vesicaria* T. subrotundis nudis. *Folia simplicia, sæpè pilis stellatis oblecta; flores lutei, aut caerulei vel albi; luteorum filamenta 2 basi dentata, 4 longiora nonnunquam apice 2-furca; cæterorum omnia nuda. Calix A. calicini persistens. Species quædam suffrutescentes, quædam (5. 6. 11. Linn.) ex D. Lamarck Drabæ congeneres fructu breviori ovato, aliæ siliculis inflatis ex eodem Vesicariæ genus redintegraturæ.*

**SUBULARIA**, L. \* Calix modicè patens. Petala obovata. Stylus brevis. Silicula integra ovoïdea, valvis dissepimento parallelis. *Herbula aquatica foliis subulatis. Genus vix à sequenti distinctum.*

**DRABA**, L. \* **ALYSSON**, T. \* **LUNARIA**, T. \* *Drave*. Calix erectus. Petala oblonga, modicè patentia, ungue brevi, nunc integra, nunc emarginata aut 2-partita. Stylus vix ullus. Silicula ovalis oblonga subcompressa, stylo destituta, valvis planiusculis dissepimento parallelis. *Caulis foliosus, aut subnudus foliis radicalibus confertis. Huc à D. Lamarck revocantur Alyssum deltoideum & A. incanum L., necnon A. clypeatum L. cujus filamenta denticulata, fructus multò major, flores interdum axillares.*

**COCHLEARIA**, T. L. \* **LEPIDIUM**, T. \* **NASTURTIIUM**, T. \* *Cranfon*. Calix hiuleus foliolis concavis. Petala patentia. Stylus brevis. Silicula cordata turgida emarginata subscabra, stylo acuminata, valvulis gibbis obtusis. *Caulis plerumque erectus; folia in plurimis simplicia, pinnatifida in C. Coronopo cujus præterea caules diffusi, flores glomerati & siliculæ rugosæ cristatæ genus fortè distinctum indicant. Myagrum saxatile L. Cochleariæ congener ex D. Lamarck.*

**IBERIS**, L. \* **THLASPI**, T. \* **THLASPIDIUM**, \* T. Calix patens. Petala patentia; horum 2 exteriora majora. Silicula orbicularis subcompressa, margine acuto supra emarginato cincta, dissepimento contracto valvis navicularibus compressis opposito. *Folia simplicia aut pinnatifida; flores purpurascens aut albi, sæpè spicato-corymbosi. Species quædam suffrutescentes.*

THLASPI;



**THLASPI**, T. L. \* **BURSA PASTORIS**, T. \* *Thlaspi*. Calix parvulus. Petala æqualia. Silicula Iberidis obcordata & similiter acutè marginata. *Folia simplicia*. An genere distinguendum T. Bursa pastoris L. seu *Capsella Casalp.*, cui silicula triangularis non marginata?

**LEPIDIUM**, T. L. \* **NASTURTIIUM**, T. \* *Passerage*. Calix parvulus. Petala æqualia. Silicula Iberidis & Thlaspeos, sed cordata rotundior, in *Nasturtio* T. margine acutior & suprà emarginata, in *Lepidio* T. margine obtusior & non emarginata. *Folia Nasturtii simplicia*, *Lepidii pinnatifida aut pinnata*. Species quædam suffrutescentes, quædam abortu 4-andræ aut 2-diandræ, una apetala.

**ANASTATICA**, L. \* **THLASPI**, T. \* *Jerosè*, *Rose de Jéricho*. Calix erectus. Petala patentia. Stylus subulatus persistens. Silicula loculis 1-spermis brevissima, valvularum dissepimento longiorum apice obliquatim truncato, indè suprà retusa aut instar fissi pedis centro depressa. *Folia simplicia*; flores minimi glomerati. *Herbula ramosa*, ramis virentibus patulis, siccatione contractis. *Myagro* congener A. *fyriaca* L. cui silicula ovoïdea in mucronem articulatum desinens.

**VELLA**, L. \* Calix erectus cylindræus. Petala longius unguiculata, apice patentia. Silicula globosa, dissepimento valvis duplò longiore, suprà ovato & complanato. *Suffrutices integrifolii*, aut herba foliis pinnatifidis. *Staminum filamenta 4 majora in V. Pseudocytiso castrata*.

**MYAGRUM**, T. L. \* **CAMELINA**, Dod. \* **RAPISTRUM**, T. \* *Cameline*. Calix modicè patens. Petala unguiculata. Silicula stylo conico terminata, loculo subispermo. Hic à Linnæo congeneruntur 1°. *Myagrum* T. siliculâ turbinatâ compressâ 3-loculari non dehiscente, loculis 2 superioribus vacuis, 1 inferiore 1-spermo; 2°. *Camelina* Dodon. siliculâ pyriformi 2-loculari polyspermâ 2-valvi, cujus fortè congeneres *Alyssoides* T. & *Vesicaria* T. *Alyssum* nunc adjecit; 3°. *Rapistrum* T. siliculâ nunc oblongâ 2-articulatâ, nunc sphericâ acuminatâ 2-loculari, articulo aut loculo altero vacuo, altero 1-spermo vix dehiscente. Præterea his addit D. Lamark *Anastaticam fyriacam*, & plerasque *Bunias* species, fructu sphericeo aut 4-gono, & *Sisymbria* quædam siliquâ brevi (*Radicula* Hall.) 2-loculari polyspermâ, rejiciens M. saxatile L. ad *Cochleariam* (b fructum ovatum 2-locularem polyspermum. Specierum tali cumulatione agrè definiendum genus: an potius iisdem iterum collatis restituenda partim prisca genera?

**BUNIAS**, L. \* **ERUCAGO**, T. \* Calix patens. Petala longiora, unguibus erectis. Stylus subnullus. Silicula tetraëdra angulis inæqualibus acuminatis muricata. Genera hæc à Linnæo convectata sunt 1°. *Bunias* fructu sphericeo rugoso aut echinato, 1-2-loculari, 1-2-spermo non dehiscente; 2°. *Erucago* T. fructu 4-gono angulis scabroso-cristatis, suprà infrâque 2-loculari non dehiscente,



*loculis quatuor 1-spermis ; 3°. Cakile T. fructu lanceolato 2-articulato, articulo utroque 1-spermo. Buniam & Erucaginem Myagro adjicit D. Lamarck intacto Cakile : an potius triplex servandum genus ?*

CRAMBE, T. L. \* RAPISTRUM, T. \* Calix modicè patens. Petala unguiculata, apice patentia. Stamina 4 majorum filamenta apice 2-furca, hinc antherifera. Discus germinis inter eadem 2-glandulosus. Stylus subnullus. Silicula globosa subbaccata 1-sperma non dehiscens. *Folia Acanthi aut Brassicæ magna ; panicula ramosissima multiflora alba. C. fruticosa LS. filamentis non bifurcis & siliculis biarticulatis, Myagri congener ex Jacq.*

ISATIS, T. L. \* Pastel, Guède. Calix modicè patens. Petala unguiculata patentia. Stylus 0 ; stigma capitatum. Silicula (Fraxini) linguæformis ovato-oblonga compressa non dehiscens, mediotumens 1-lineata & 1-sperma. *Herbæ tinctoriæ altissimæ ; folia simplicia ; flores numerosi paniculati terminales lutei.*

*Oss.* Ordo verè naturalis omnium consensu, facile definiendus, complectens Cruciferas Tournefortii & Tetradynamiam Linnæi, paucis horum generibus rejectis. Primaria silicarum & silicularum divisio utilis. Generica signa ex Linnæo mutuata nunc naturalia, nunc interdum merè systematica ac varia, iterum ergo conferenda in integro simul ordine collatis omnibus speciebus, ut æquabiliori & absolutâ distributione arbitraria ac molesta nimis sistatur generum nominumque mutatio.

## ORDO IV.

### CAPPARIDES, LES CAPRIERS.

CALIX polyphyllus aut monophyllus partitus. Petala quatuor aut quinque, calici sæpius alterna. Stamina definita aut sæpius indefinita. Germen simplex, sæpè stipitatum, stipite interdum staminifero, ejusdem basi nonnunquam hinc glandulosâ ; stylus nullus aut rarò unicus ; stigma simplex. Fructus polyspermus, filiquosus aut baccatus unilocularis (rarò multilocularis ?) ; femina sæpè reniformia placentis parietinis affixa. Corculum absque perispermo, incurvum radiculâ in lobos pronâ. Caulis herbaceus aut frutescens arboreusve. Folia alterna, simplicia integra aut rariùs



ternata vel digitata, basi interdum bistipulacea aut bispinosa aut biglandulosa.

**CLEOME**, L. \* **SINAPISTRUM**, T. \* *Mozambé*. Calix 4-phyllus parvus patens deciduus. Petala 4 secunda ascendentia. Stamina in plurimis 6, in paucioribus 4 aut 10-24, nunc petalis proxima, nunc summo stipiti germinifero infixa, filamentis declinatis. Germen stipitatum stipite longo aut brevi, glandulis 3 cincto sub foliolis 3 calicinis superioribus; stylus 0; stigma capitatum. Siliqua stipitata aut subsessilis, oblonga, cylindracea aut subcompressa, 1-locularis polysperma, 2-valvis valvis liberis repleto 2-scapo utrinque seminifero appositis. *Frutices aut herbae, plerumque graveolentes; folia basi 2-glandulosa aut rarius 2-spinosa, simplicia aut ternata aut digitata; flores spicati terminales, pedicellis bracteatis. Hujus congenere Siliquaria Forsk & fortè Roridula ejusdem, licèt ex Autore 4-andra & 1-petala 4-partita.*

**CADABA**, Forsk. \* Calix 4-phyllus patens deciduus. Petala 4 unguiculata, interdum nulla. Stamina 5, summo germinis stipiti inserta, filamentis filiformibus, antheris erectis. Germen stipitatum, basi stipitis hinc appendiculatâ, appendice infra rubulosâ & ultra ligulatâ; stylus 0; stigma 1. Siliqua stipitata cylindracea 1-locularis 2-valvis valvis revolutis, polysperma seminibus triplici serie in pulpâ reconditis. *Arbores aut frutices; folia simplicia, basi sub 2-glandulosa; flores spicati terminales, in C. rotundifoliâ apetalâ. Caractèr ex Forsk. Cleomem fruticosam L. hinc refert D. Lamark, licèt 4-andram.*

**CAPPARIS**, T. L. \* **BREYNIA**, Pl. \* *Caprier*. Calix 4-phyllus aut 4-partitus, foliolis concavis, 2 inferioribus basi gibbis. Petala 4 magna. Stamina numerosa, filamentis longis. Germen insidens stipiti non staminifero, infra hinc glanduloso intra foliola calicina gibba; stylus 0; stigma capitatum. Fructus in *Capparide* T. baccatus ovatus sphaericusve, in *Breyniâ* Pl. siliquæformis interdum longissimus 1-locularis polyspermus, seminibus parieti affixis, in pulpâ nidulantibus. *Frutices; folia simplicia, in baccatis sæpè basi 2-spinosa, in siliquosis plerumque nuda aut sub 2-glandulosa; flores solitarii axillares aut subcorymbosi terminales.*

**SODADA**, Forsk. \* Calix 4-phyllus foliolo superiore majore gibbo. Petala 4 inæqualia: horum 2 superiora ovata breviora, sub foliolo calicino majore. Stamina 8 inæqualia, antheris lanceolatis recurvis. Germen stipitatum stipite longo, 4-fulcum; stylus 1; stigma 1. Fructus ruber, nuce Coryli major. *Frut. x ramis ad singulos ocellos 2-spinosis; folia nulla aut mox decidua; pedunculi inter spinas terni 1-flori. Caractèr ex Forsk. Hujus congener Hombak Lippi mss. cui stamina 2, bacca stipitata cerasiformis 8-9-sperma seminibus cochleatis, cetera similia.*



**CRATEVA**, L. \* **TAPIA**, Pl. \* Calix 4-fidus inæqualis deciduus. Petala 4 secunda. Stamina plurima, ad latus oppositum declinata, stipiti germinis inserta. Germen stipitatum; stylus 0; stigma capitatum. Bacca pomiformis aut ovata, longè stipitata, tenuiter corticata (2-locularis ex *Brown.*) polysperma seminibus in carne nidulantibus. *Arbores; folia ternata; flores paniculatiterminales.* *C. marmelos* L. *Aurantiis* affinium hinc eliminanda.

**MORISONIA**, Pl. L. \* *Mabouia d'Amérique.* Calix lacero-bifidus. Petala 4 patentia. Stamina numerosa, filamentis basi in tubum connatis. Germen ovatum pedicellatum; stylus 0; stigma latum umbilicatum. Bacca pomiformis, stipitata stipite crassiore, 1-locularis cortice duro, polysperma seminibus reniformibus in molli carne nidulantibus. *Arbor; folia simplicia; pedunculi alternè multiflori, axillares.*

**DURIO**, Rumph. L. \* *Durion.* Calix urceolatus 5-lobus deciduus. Petala 5 calice minora. Staminum filamenta 5 basi plana, apice 7-8-fida laciniis subulatis antheriferis; antheræ 35-40 contortæ. Germen stipitatum; stylus 1; stigma... Pomum maximum subrotundum undique muricatum mucronibus polyedris, 5-loculare, 5-fariam dehiscens, loculis 1-5-spermis; semina magna, mucosâ carne obvoluta in arillo membranaceo. *Arbores; folia stipulacea petiolo tumido; flores ex ramis & ramulis racemoso-fasciculati, pedunculo communi crasso, involucri fasciculi 2-3-phyllo caduco; fructus (Artocarpi) esculentus. Character ex Rumph. & Linn. Morisoniæ affinis. An verè 1-stylus? Rumphius 1. p. 100 describit stylum (stipes?) longum qui gerit capitulum (stigma?) luteum oblongo insidens pistillo (germen?) granuloso. An fructus verè multilocularis? An semina receptaculis lateralibus affixa?*

### Genera Capparidibus affinia.

**MARCGRAVIA**, Pl. L. \* Calix 6-partitus persistens, laciniis coriaceis subrotundis, 2 extimis minoribus. Petalum 1 conicum integrum coriaceum, staminibus & pistillo incumbens instar calyptræ, basi abscedens, caducum. Stamina numerosa post petali lapsum patentia, antheris oblongis erectis. Germen 1; stylus 0; stigma crassum persistens. Capsula coriacea subglobosa, multilocularis multivalvis polysperma, seminibus numerosis minutis in pulpâ nidulantibus. *Frutex parasiticus sarmentosus, arboribus Hederae instar adhærens, ramis floriferis sæpè pendulis; folia alterna disticha integra coriacea; flores umbellati terminales penduli, pedunculis 5 centralibus non floriferis, terminatis sacculo cucullato oblongo obtuso coriaceo, intus cavo, ad unguem aperto, petalum Aquilegiæ aut Aconiti æmulante; fructus sæpè 10-locularis ex Jacq. Amer. Genus ex Bern. Jussæo & Linn. ord. nat. 25 Capparidibus affine. An corculum seminis idem?*



**NORANTEA**, Aubl. \* Calix 5-7-partitus coriaceus patens. Petala 5 brevia, hypogyna, calicinis laciniis alterna. Semina 40-50 hypogyna, filamentis brevibus, antheris oblongis. Germen 1; stylus vix ullus; stigma capitatum. Fructus... 1-locularis polyspermus. *Arbor; folia alterna integra crassa; flores laxè spicati terminales, in spicâ alterni subsessiles 1-bracteati; bractea longa unguiculata, Marcgraviæ sacculo cucullato simillima. Character ex Aubl. Guyan. t. 220. Genus Marcgraviæ conterminum.*

**RESEDA**, T. L. \* **LUTEOLA**, T. \* **SESAMOÏDES**, T. \* *Reseda*, Gaude. Calix 4-6-partitus. Petala hypogyna, 4-6 aut plura, irregularia, nunc omnia 3-fida, nunc quædam indivisa, supremo ad basim glanduloso gibbo & mellifero. Stamina 11-15 hypogyna, filamentis brevibus, antheris erectis. Germen subsessile; styli 3-5 aut 0; stigmata 3-5. Capsula angulata 1-locularis polysperma, receptaculis seminiferis 3-5 angularibus; semina numerosa reniformia; corculum incurvum absque perispermio. *Herbæ; folia alterna basi 2-glandulosa, indivisa in Luteolâ T. & Sesamoïde T., partita in Resedâ T.; flores spicati terminales; capsula Resedæ oblonga prismatica apice retusa, Luteolæ brevior profundius divisa & quasi 3-rostris, Sesamoïdis 5-partita patens, quasi stellatim 5-capsularis. Numerus partium varius, constans hiatus capsulæ & glandula petali supremi. Genus à Capparidibus discrepans petalorum & stigmatum numero, cæterum affine præcipuè corculo.*

**DROSERA**, L. \* **ROSSOLIS**, T. \* *Rossolis*. Calix 5-fidus persistens. Petala 5 hypogyna, calici alterna. Stamina 5, hypogyna, petalis alterna; antheræ filamentis adnatæ. Germen superum; styli 5; stigmata 5 simplicia. Capsula calice cincta 1-locularis 3-5-valvis polysperma; semina minutissima, receptaculo infimo centrali libero ramoso annexa. *Herbæ; folia radicalia alterna ciliis glandulosis testâ, petiolo basi intus aucto appendice ciliatâ; flores in scapo spicati (solitarii in D. uniflorâ Commerf. Magell.); scapus junior ab apice ad basim in spiram involutus. In D. Lusitanicâ scapus cauliformis ramosus & flores 10-andri. In D. cistiflorâ folia in caule simplici 1-floro alterna, stigmata dichotomè pluriès partita. An species utraque verè congener? Genus Resedæ affinius quàm Capparidibus, hic repositum donec hujus innotescat ordo. An corculum absque perispermio?*

**PARNASSIA**, T. L. \* Calix 5-partitus persistens. Petala 5 hypogyna, calici alterna; squamæ 5 interiores, unguibus petalorum insertæ, ciliatæ ciliis apice globosis. Stamina 5 hypogyna, petalis alterna; antheræ incumbentes. Germen 1; stylus 0; stigmata 4 persistentia, inter quæ foramen. Capsula sub4-gona 1-locularis (4-locularis?) apice 4-valvis polysperma valvis medio semiseptiferis atque seminiferis. *Herba; folia radicalia cordata enervia; scapus medio 1-folius, apice 1-florus. In P. polynectariâ Forsk. Æg. 207. petala basi intus 2-squamosa,*



*stigma 2-labiatum, caulis ramosus, folia opposita, pedunculi terminales 1-flori: an species verè congener? Genus affine parumper Reseda, ad parietes seminiferum ut in Capparidibus, sed habitu diversissimum & rectius posthac ordinandum. An corculum absque perispermo?*

Oss. Corculum incurvum absque perispermo, fructus unilocularis ad parietes seminifer, germen sæpè stipitatum & stigma simplex præcipua sunt ordinis verè naturalis signa. Hinc Cruciferis accedit staminibus Cleomes frequentius senis & fructu ejusdem siliquoso non tamen biloculari & seminum situ; indè corculo incurvo & corollâ 4-petalâ & calice 4-phylllo ad Sapindos dirigitur, dissimiles staminibus semper definitis & loculis monospermis in fructu sæpè triloculari ac quasi tricapsulari. Viola & Passiflora Capparidibus antea adjectæ utpotè similiter ad parietes seminiferæ, aliis ordinibus rectius adjiciendæ quia perispermo carnosio instructæ.

## ORDO V.

### SAPINDI, LES SAVONNIERS.

**CALIX** polyphyllus, aut monophyllus sæpè partitus. Petala quatuor aut quinque, disco hypogyno inserta, nunc nuda, nunc intus medio villosa aut glandulosa, nunc petalo interiore aucta. Stamina sæpius octo, disco hypogyno inserta, filamentis distinctis. Germen simplex; stylus unicus aut triplex; stigma unicum aut duplex triplexve. Fructus drupaceus aut capsularis, uni, bi vel trilocularis, aut uni, bi vel tricoccus, loculis aut coccis monospermis. Semina angulo loculorum interiori affixa. Corculum absque perispermo, radiculâ incurvâ in lobos sæpè incurvos. Caulis arborescens aut frutescens aut rarius herbaceus; folia alterna.

I. Petala duplicata, seu petalo interiore ad unguem aucta.

**CARDIOSPERMUM, L. \* CORINDUM, T. \*** Calix 4-phyllus. Petala 4 duplicata. Stamina 8. Styli 3; stigmata 3. Capsula membranacea, vesicaria inflata 3-loba 3-locularis (quasi 3-capsularis), feminibus parvis rotundis cordatâ maculâ ad hylum



notatis. *Herba* ; folia biternata ; pedunculi solitarii axillares longi, sub apice bicirrhosi, ultra corymboso-multiflori.

**PAULLINIA**, L. \* **SERJANIA**, Pl. \* **CURURU**, Pl. \* Calix 4-phyllus. Petala 4 duplicata basi glandulosa. Stamina 8. Capsula pyriformis 3-gona in *Serjaniâ Pl.*, aut apice 3-cocca & subius membranacea 3-alata in *Cururu Pl.*, 3-locularis 3-valvis ; semina subovata. *Frutices scandentes sarmentosi, habitu Vitis ; folia 1-2-3-ternata aut impari-pinnata aut suprâdecomposita ; pedunculi solitarii axillares, medio 2-cirrhosi, ultra racemoso-multiflori.*

**SAPINDUS**, T. L. \* *Savonier*. Calix 4-phyllus coloratus, foliolis 2 exterioribus. Petala 4 duplicata & basi glandulosa. Stamina 8 ( filamentis internè hirsutis ex *Brown.* ). Styli 3 ; stigmata 3 ( stylus 1, stigma 1, ex *Brown.* ). Capsulæ 3 globosæ carnosæ connatæ, quarum 2 sæpè abortivæ ; semina sphærica. *Arbores ; folia abruptè aut subimpari-pinnata aut ternata ; flores paniculati terminales.*

**TALISIA**, Aubl. \* Calix 5-partitus. Petala 5, calici alterna ; ungue intus squamuloso. Stamina 8 brevia. Germen 4-loculare ; stylus 1 brevissimus ; stigma 1. Fructus ... *Arbuseula ; folia alternè & impari-pinnata ; flores pedunculati axillares & terminales, bracteolati. Character ex Aubl. Guyan. t. 136.*

**APORETICA**, Forst. \* Calix 4-phyllus, foliolis 2 exterioribus. Petala 4 ; squamulæ 4 interiores minimæ. Stamina 8, antheris subrotundis. Germen didymum ; styli 2 basi juncti ; stigmata 2 divaricata. Fructus ... geminus, uterque 1-spermus. *Folia ternata ; flores quidam masculi. Character ex Forst. Austr. t. 66. Confer cum Schmideliâ & Ornítrophe.*

## I I. Petala simplicia.

**SCHMIDELIA**, L. \* **USUBIS**, Burm. \* Calix 2-phyllus coloratus. Petala 4 minora. Stamina 8, antheris subrotundis. Germen didymum pedicellatum ; styli 2 ; stigmata 2. Fructus 2 ... monospermi. *Frutex ; folia ternata ; flores racemosi axillares. Character ex Burm. Ind. & Linn. Confer cum Aporeticâ & Ornítrophe.*

**ORNITROPHE**, Commerf. \* Calix 4-partitus. Petala 4, in medio disco barbata ac quasi cristata. Stamina 8. Germen didymum ; stylus 1 ; stigma 2-fidum. Drupa (germine uno abortivo, altero superstiti) pyriformis, parva, parum pulposa, foeta nuce 1-spermâ. *Arbuseula ; folia ternata ; flores racemosi axillares, in racemulis secundi, plures masculi. Fructus Merulis gratus, undè Bois de Merle Borboniensibus dicitur. Opus avis, τροφή cibus. Character ex sicco. Confer cum Schmideliâ & Aporeticâ. An congener aut affinis Voua-rana Aubl. Guyan. t. 374 ?*

**EUPHORIA**, Commerf. \* Calix 1-phyllus parvus 5-dentatus aut 5-fidus. Petala 5 parva, medio intus subvillosa, reflexa



Stamina 6 aut sæpius 8. Germen didymum; stylus 1; stigmata 2. Fructus geminatus, alter plerumque abortivus rudimento superflite, alter sphaericus nuciformis, crustaceus aut coriaceus, undique tuberculatus, 1-ocularis intus pulposus, nucleo solido sphaerico foetus. *Arbores; folia abruptè pinnata, flores parvi paniculati terminales bracteolati, plurimi steriles. Huc referuntur Lit-chi & Lon-gan Sinensium fructus exquisiti. Character ex Commerf. & ex Incarvill. epist. & ex sicco. Euphoros fertilis. An congener Pometia Forst. Austr. t. 55 distincta calice 6-fido, corollâ 6-petalâ 6-andrâ, floribus fortè monoïcis, fructu lavi, quæ Palorum arbor Rumph. 3. t. 65 ex Forstero.*

**MELICOCCA**, L. \* Calix 4-partitus patens persistens. Petala 4... inter lacinias calicinas reflexa. Stamina 8 brevia. Stylus 1 brevis; stigma latum, peltato-umbilicatum, lateribus oppositis productum. Drupa corticosa subrotunda, interdum 2-3-sperma, sæpè abortu 1-sperma, seminibus coriaceis pulpâ propriâ obvolutis. *Arbor; folia abruptè pinnata bijugata costâ planâ; flores racemosi terminales, ex Curassaviensibus incolis dioïci memorante Jacquinio. Character ex Jacq. & Linn.*

**TOULICIA**, Aubl. \* Calix 5-partitus. Petala 4 (glandulis 3-4 villosis apice marginata ex Aubl.). Stamina 8, alterna minora. Germen 3-gonum disco staminifero insidens; styli 3 breves; stigmata 3. Capsula 3 alata, 3-ocularis, alis 2-valvibus, loculis 1-spermis. *Arbor; folia abruptè pinnata; flores spicato-paniculati axillares & terminales, in spicis glomerati. Character ex Aubl. Guyan. t. 140.*

**TRIGONIS**, Jacq. \* Calix 5-phyllus. Petala 5 triangularia, basi acuminata, intus hirsuta, apice villosa. Stamina 8 longiora, filamentis basi hirsutis. Germen hirsutum; stylus 0; stigma 1. Fructus... *Arbusecula; folia abruptè pinnata, alternè 3-juga; flores racemosi axillares parvi. Character ex Jacq. Amer. Confer cum Molineâ.*

**MOLINÆA**, Commerf. \* Calix 5-partitus. Petala 5 parva, calici alterna, ungue subvillosa. Stamina 8, filamentis basi villosis. Germen disco impositum substipitatum; stylus 0; stigma 1. Capsula pedicellata coriacea 3-quetra, quasi 3-alata 3-ocularis 3-valvis 3-sperma, valvis medio septiferis. *Arbores aut arbuseculæ; folia abruptè pinnata 2-3-juga coriacea; flores racemosi axillares, in racemis alterri bracteolati numerosissimi, plures masculi. Character ex sicco & ex Commerf. qui nomen deduxit eum à Molinæo prisco Dalechampii operum editore, tum ab amicissimo D. Desmoulins autore methodi plantarum Cluniacensium in Florâ Burgundicâ nuper divulgata. An Molinæa congener Trigonis Jacq.*

**COSSIGNIA**, Commerf. \* Calix 5-partitus persistens. Petala 4, rariùs 5, basi unguiculata. Stamina 6. Germen sub3-gonum; stylus brevis; stigma 1. Capsula ovata subtomentosa 3-gona



3-locularis, apice dehiscens loculis 2-3-spermis, seminibus subrotundis receptaculo centrali affixis. *Fruites*; *folia ternata aut quinato-pinnata*; *flores paniculati axillares & terminales*. *Character ex Commerſ.* & *ex ſicco*. *Nomen à D. de Coſſigny, Hiſtoriæ naturalis Indiæ conſulto & muneribus botanicis Coromandelianis Commerſoniani laboris fautore.*

### III. Genera Sapindis affinia.

**MATAYBA**, Aubl. \* Calix 5-fidus. Petala 5, diſco calicino inſerta, ſingula ad unguem intùs 2-appendiculata ſeu 2-ſquamofa. Stamina 8 diſco inſerta, filamentis villoſis. Germen 1; ſtylus 0; ſtigma 1. Capſula oblonga, utrinque compreſſa concava 1-locularis, 2-valvis valvâ alterâ nudâ, alterâ intùs medio 2-ſpermâ feminibus arillatis reniformibus. *Arbor*; *folia alterna, abruptè pinnata, ſtipulacea*; *flores paniculati axillares & terminales, diviſuris paniculæ bracteatis*. *Character ex Aubl. Guyan. t. 128. An Leguminofis affinior? Fructus denuò introſpiciendus.*

**ENOUREA**, Aubl. \* Calix 4-partitus, laciniis 2 oppoſitis majoribus. Petala 4 (imo calici inſerta?), ungue intùs ſquamuloſo, ſquamulâ villoſâ. Horum 2 ampliora, baſi inſuper glanduloſa. Stamina 13 inæqualia, baſi connata, ſecunda, hinc diſco inſerta juxtâ petala minora. Germen 3-gonum; ſtylus 0; ſtigmata 3. Capſula ſphærica 3-valvis 1-locularis 1-ſperma; ſemen pulpâ farinaceâ ſub arillo obductum. *Frutex ſarmentofus lacteſcens*; *folia alterna, oppoſitè & impari-pinnata*; *cirrhî quidam ſpirales axillares*; *flores ſpicati axillares & terminales*. *Character ex Aubl. Guyan t. 235. A Sapindis differt ſtaminum numero & fructu 1-ſpermo, cæterùm ſimilis. An corculum idem?*

**CUPANIA**, Pl. L. \* Monoïca. Calix 3-phyllus perſiſtens. **MASC.** Petala 5. Stamina 5 filamentis coalitis, antheris ſubrotundis. **FÆM.** Petala 3. Germen 1; ſtylus minimus 3-fidus; ſtigmata 3. Capſula coriacea turbinata 3-locularis 3-valvis loculis 2-spermis; ſemina ſubrotunda, arillo campanulato crenato ſemicalyptrata. *Character ex Linnæo, ipſo docente in vivis reſormandus. Arbor Caſtanæ facie*; *folia alterna magna, 7-8 in ſingulis ramulis, indè quaſi alternè pinnata*; *flores in ramulis nudis paniculati, ex Plumerio hermaphroditi*; *fructus ex eodem coriacei ſericæi 3-ſpermi*. Sic extant in herbarii mei ſpecimine fragifero aphylo *Cupania dicto*, fortè tamen diſſimili, cui *Sapindorum habitus & corculum idem & calix 5-partitus.*

**PEKEA**, Aubl. \* *Pekea de Cayenne*. Calix 1-phyllus carnoſus 5-lobus. Petala 5 majora ovata, perigyna, calici alterna. Stamina numeroſa diſco inſerta; antheræ ſubrotundæ. Germina 4 diſco inſidentia in unum approximata; ſtyli 4 longiſſimi; ſtigmata 4. Drupæ 4 diſtinctæ compreſſæ ſubreniformes, hylo lineari oblongo ſuprà axim communem affixæ,



(quædam interdum abortivæ), foetæ nuce conformi 1-spermâ undique echinatâ fetis rigidis pungentibus, drupacæ carni subditis. Semen magnum, corculi radiculâ inferiore in lobos reflexâ, perispermo nullo. *Arbores ramis oppositis; folia opposita digitata, juniora stipulâ 2 involuta mox caducis; flores spicato-corymbosi terminales, pedunculis longis 1-floris medio subarticulatis. Drupæ nucleus edulis, similis nucleo Mangiferæ. Character ex Aubl. Guyan. t. 238-239 & ex fructu sicco. Genus Sapindis affine fructibus pluribus 1-spermis & formâ ac situ corculi, sed polyandrum 4-gynum & oppositifolium, affinius fortè Aceribus non tamen polyandris. Hujus congener videtur Saouari Aubl. t. 240, arbor foliis oppositis ternatis, cujus flores non observati, sed drupæ (sapius unicæ, tribus abortivis) formâ, dispositione & structurâ inferiore similes, quas tamen in Musæo meo asservatas Aubletius malè delineat.*

*Obs.* Ordo solidis definitus signis, complectens tamen fructus nunc tricapsulares nunc monocarpus triloculares, & stamina interdum sena octonis frequentioribus intermixta, & petala simplicia duplicatis adjecta, & folia indiscriminatum abruptè aut impari-pinnata. Huic ut & Capparidibus corculum incurvum & radícula in lobos prona; simile etiam in subsequenter Aceribus & præcipuè in Æsculo Sapindis termino. An stamina verè hypogyna; an discus staminifer à pistilli fulcro, an ab imo calice exortus? An affinis Rourea Aubl., ut & nonnulla Terebintacearum genera? An indè earumdem cum Sapindis analogia?

## ORDO VI.

### ACERA, LES ÉRABLES.

**C**ALIX monophyllus. Petala definita, rarissimè nulla, circa discum hypogynum inserta. Stamina eidem disco medio imposita, definita & peralis numero sæpè inæqualia. Germen simplex, disco impositum; stylus unicus aut rarò geminus; stigma unum aut duplex. Fructus multilocularis aut multicapsularis, loculis aut capsulis tribus aut geminis; femina in singulis solitaria, aut ad summum tria, angulo interiori affixa, quædam sæpè abortiva. Corculi perispermo destituti radícula in lobos prona. Caulis arborescens aut frutescens. Folia opposita, non stipulacea. Flores racemosi aut corymbosi, interdum abortu diclines.



## I. Fructus multilocularis.

ÆSCULUS, L. \* HIPPOCASTANUM, T. \* PAVIA, Boerh. \* *Maronier d'Inde*. Calix tubulosus 5-lobus. Petala 5, aut 4 (quinto deficiente in *Paviâ B.*), inæqualia; horum 2 superiora angustiora. Stamina 7 inæqualia; antheræ subincumbentes. Germen definens in stylum conicum; stigma 1. Capsula coriacea, muricata in *Hippocastano T.* aut inermis in *Paviâ B.*, subrotunda 3-locularis 3 valvis, loculis 2-spermis; semina magna, hylo lato, cortice coriaceo, quædam abortiva. *Arbores; folia digitata; flores racemosi terminales, pedicellis supra racemum articulatis, quidam steriles; semen ferè Castaneæ, unde nomen vernaculum.*

## I I. Fructus multicapsularis.

ACER, T. L. \* *Erable*. Calix sæpè 5-partitus, rariùs 4-9-partitus. Petala totidem (rariùs nulla) calici alterna & plerumque concolora. Stamina sæpè 8, rariùs 5-12; antheræ oblongæ. Germen didymum; stylus 1, interdùm 2-partitus; stigmata 2. Fructus 2-capsularis, capsulis compressis superiùs in alam membranaceam divergentem attenuatis, 1-locularibus, 1-2-spermis. *Arbores aut arbusculæ; folia sæpè palmata, rariùs impari-pinnata aut ternata, petiolo infra dilatato & semiamplexicauli; flores axillares & terminales, subcorymbosi aut racemosi (in A. rubro aggregati) pedicellis basi 1-bracteatis, interdùm sexibus infæcundis aut abortivis masculi aut fæminei hermaphroditis mixti aut distincti, interdùm etiam apetalâ corollâ deficiente, aut quasi apetalâ petalis calici conformibus & concoloribus; fructus nonnunquàm luxurie 3-capsulares ut in Banisteriâ.*

## I I I. Genera hinc Aceribus, indè Malpighiis affinia.

HIPPOCRATEA, L. \* COA. Pl. \* Calix minimus 5-partitus. Petala multò majora, basi lata, apice concavo cucullata. Stamina 3, filamentis basi latiore connatis; antheræ transversim supra hiantes instar tubæ. Germen simplex, disco seu filamentorum tubo semiimmersum; stylus 1; stigma 1. Capsulæ obovatæ compressæ magnæ, 2-valves valvis carinatis, 1-loculares 2-5-spermæ, seminibus compressis hinc alatis. *Arbor scandens sarmentosa; ramuli oppositi; folia opposita stipulacea stipulis minimis; flores minimi dichotomè & umbellatim corymbosi axillares. Affinis Malpighiis, sed 3-andra & in capsulis non 1-sperma.*

THRYALLIS, L. \* Calix 5-partitus persistens. Petala 5. Sta-



mina 10, antheris subrotundis. Germen simplex; stylus 1; stigma 1. Capsula 3-queria 3-locularis, 3-partibilis, localis 1-spermis exteriori angulo dehiscentibus; semina glaberrima, mucronato-incurva. *Fruticulus ramis articulatis; folia opposita stipulacea; flores bracteolati, in ramulorum dichotomiâ racemosi terminales. Character ex Linnæo. A Malpighiis discrepat stylo simplici. An corculum rectum aut incurvum?*

*Obs.* An Æsculo omnimodè conveniat Acer licèt in multis similis, nondùm patet? Æsculus Sapindis cerre congruus, ab iis præcipuè discrepat calice tubuloso oblongo, staminibus septenis & foliis oppositis. Acer Banisteriam & congeneres in Malpighiis æmulatur fructu multicapulari alato, calice partito, foliorum situ; differt staminum numero, stylo non triplici, corculi radicula reflexâ & lobis rectis. Ordo igitur inter Malpighias & Sapindos medius, in eos fortè disper-tiendus. An discus staminifer non hypogynus sed perigynus, & indè cum Terebintaceis affinitas?

## ORDO VII.

### MALPIGHIÆ, LES MALPIGHIES.

**CALIX** quinquepartitus persistens. Petala quinque, calici alterna, disco hypogyno inserta, unguiculata. Stamina decem, ibidem inserta, alterna petalis, alterna calici opposita, filamentis interdùm basi coalitis; antheræ subrotundæ. Germen simplex aut trilobum; styli tres; stigmata tria aut sex. Fructus tricapsularis aut monocarpus trilocularis, capsulis aut loculis monospermis. Corculi perispermo destituti radícula recta, lobi basi reflexi. Arbusculæ aut frutices. Folia opposita simplicia substipulacea. Pedunculi terminales aut sæpiùs axillares, uniflori plures, aut solitarii multiflori floribus subumbellatis aut spicatis paniculatisve, pedicellis medio plerumque articulatis & bisquamulosis.

I. Germen trilobum. Fructus tricapsularis.

**BANISTERIA**, Houst. L. \* **ACER**, Pl. \* Calix parvus, laciniis 3-4 subtùs 2-glandulosis. Petala ungue lineari. Stigmata 3. Capsulæ basi tumidæ, superiùs compressæ in alam simplicem excurrentes, 1-2 nonnunquàm abortivæ. *Frutices quandoque sarmentosi; foliorum petiolus interdùm apice aut basi 2-glandulosus.*



**TRIOPTERIS**, L. \* *Hiræa*, Jacq. \* Calix minimus. Petala unguibus longis. Stamina alterna breviora. Stigmata 3-6. Capsulæ dorso carinatae, singulæ 3-alatæ alâ geminâ superiore, unicâ inferiore. *Arbusculæ aut frutices sæpè sarmentosi: flores oppositi paniculati, axillares & terminales. Idem ex Linnæo apertè in Triopteri, mancâ quidem observatione in vivis iterandâ, chinæ certè 5-petali habeantur tum in Acere Pl. ic. 16 hujus synonymo Linnæano, tum in Hiræâ Jacq. aliundè simillima.*

### I I. Germen simplex. Fructus monocarpus.

**MALPIGHIA**, Pl. L. \* *Malpighie*. Calix laciniis quibusdam extus 2-glandulosis. Petala ungue lineari. Stamina filamentis basi coalitis. Stigmata 3. Bacca globosa, foeta nuce triplici ossèâ angulatâ. *Arbores aut frutices, quidam sarmentosi; folia quorundam subtus aut margine setosa, setis urentibus utroque sine liberis; petiolus in pluribus basi intus appendiculatus aut dilatatus; pedunculi axillares aut terminales, uni aut multiflori. An congener Caucanthus Forsk. frutex oppositifolius florum structurâ & dispositione similis, fructu ignoto? In M. Glabrâ calicis laciniæ 2 biglandulosæ, 2 uniglandulosæ, 1 nuda. M. nitida 1-styla ex Jacq.; an verè congener?*

### I I I. Genera Malpighiis affinia.

**TRIGONIA**, Aubl. \* Calix 5-partitus inæqualis. Petala 5 hypogyna inæqualia, 1 superius erectum basi intus excavatum foveâ simplici aut geminâ, 2 lateralia reflexa, 2 inferiora in carinæ modum connexa. Stamina sæpè 10, interdum 5-11, filamentis in vaginam basi coalitis, quibusdam nonnunquam sterilibus. Germen 1; stylus 1; stigma capitatum. Capsula ovata aut longior siliquæformis, extus tomentosa aut aspera, 3-gona 3-ocularis 3-valvis, valvis intus tomentosis, margine dehiscentibus, medio affixis centrali receptaculo 3-gono, inter angulos tomentoso & seminifero; semina lanuginosa. *Frutices sarmentosi volubiles nodosi; folia opposita stipulacea; flores spicati bracteati, spicis axillaribus aut paniculatim terminalibus. Character ex Aubl. Guyan t. 149-150, & ex fructu T. villosæ immaturo. Habitus Malpighiarum, sed germen 1-stylum & fructus dispar polyspermus. An Tribulis affinior? An corculum absque perispermo?*

**ERYTHROXYLUM**, Brown. L. \* Calix turbinatus 5-dentatus. Petala 5 (an verè hypogyna?) ungue lato, squamulâ intus instructo. Stamina 10, filamentis basi in urceolum coalitis; antheræ subrotundæ. Germen 1; styli 3; stigmata 3. Drupa oblonga cylindrico-angulata, foeta nuce conformi 1-spermâ; corculum lobis rectis absque perispermo. *Arbores aut frutices, ramis alternis, apice compressis; folia distichè alterna integra,*



*squamulâ axillari compressâ semiamplexicauli sæpè persistente ; pedunculi axillares 1-flori , solitarii aut plures squamulis intermixtis ; fructus Berberidiformis , 3-locularis in arbusculâ Mauritianâ Bois d'huile dictâ certè congeneri , fortè etiam in cæteris speciebus loculo unico superstite. Hujus congeneres frutex Bois de Rongle Mauritianorum & Coca Peruvianorum. Genus à Malpighiis discrepans foliis alternis , petalis basi latis & appendiculatis , fructu sæpè 1-loculari , lobis corculi rectis.*

Obs. A Sapindis discrepant Malpighiæ staminum numero , petalorum & corculi formâ , foliorum situ ; ab Aceribus stylosum & staminum numero , localis monospermis & foliis stipulaceis. Conformes Hypericis foliorum oppositione & stylo triplici fructuque triloculari , dissentiunt staminibus seminibusque definitis & corculo non recto. Illud tamen minus reflectitur in quibusdam Banisteriis. Stamina in iis distincta , in Malpighiâ monadelphæ : an inde quædam generum discordia ?

## ORDO VIII.

### HYPERICA , LES MILLEPERTUIS.

**C**ALIX quadri aut quinquepartitus. Petala quatuor aut quinque. Stamina numerosa polyadelphea seu filamentis in plures phalanges basi coalitis ; antheræ subrotundæ. Germen simplex ; styli plures ; stigmata totidem. Fructus plerumque capsularis , multilocularis loculis numero stylosum , multivalvis valvis totidem introflexis loculum constituentibus ; semina minutissima , affixa receptaculo intrâ fructum centrali nunc simplici , nunc partito in plura valvis numero æqualia. Corculum rectum absque perispermio ? Caulis herbaceus aut suffrutescens aut fruticosus. Folia opposita. Flores oppositè corymbosi , sæpè terminales.

**ASCYRUM** , L. \* **HYPERICOÏDES** , Pl. \* Calix 4-partitus , laciniis 2 interioribus majoribus. Petala 4. Stamina basi leviter 4-adelphea. Stylus vix ullus ; stigmata 2 ( 1 ex Linn. ). Capsula 2-locularis 2-valvis , calice tecta. Frutices. Habitus omnino Hyperici. Nomen Ascyri posthac restituendum Hypericis 5-stylis.

**BRATHYS** , Mut. LS. \* Calix 5-partitus. Petala 5. Stamina plura. Styli 5 ; stigmata 5. Capsula 5-torulosa 1-locularis polysperma. Frutex Ericæ aut Juniperi facie ; folia opposita con-



*fortissima linearia perennia; flores in ramulis plures terminales sessiles. Character ex L. Suppl. An genus verè distinctum ab Hypericis 5-stylis?*

**HYPERICUM, T. L. \* ANDROSÆMUM, T. \* ASCYRUM, T. \* Millepertuis.** Calix 5-partitus æqualis. Petala 5. Stamina variè polyadelphica. Styli 3 aut 5 aut rariùs 2; stigma totidem. Capsula (bacca in *Androsæmo* T.) loculis & valvis totidem. *Herbæ aut frutices suffruticesve; caules cylindracei aut ancipites aut 4-goni; folia sæpè punctato-pellucida; flores nonnunquam cymosi, plerumque corymbosi pedunculis sæpè trichotomis 3-floris terminalibus aut & axillaribus.* Genus subindè forsàn in plura dividendum, quæ sunt: 1°. *Ascyrum* T. 5-stylum 5-loculare, cui addendæ species *Aubletianæ Guyanenses* t. 311-312, succo resinoso luteo turgidæ, indè *Guttiferis* infra memoratis affines; 2°. *Hypericum* T. 3-stylum 3-loculare, filamentis vix basi polyadelphis; 3°. *Androsæmum* T. baccatum subuniloculare, succo sanguineo turgidum, præterè simillimum *Hyperico*; 4°. *Elodea* Adansf. 3-styla 3-locularis, filamentis ad medium usque 3-5-adelphis, disco germinis glanduloso, petalorum unguibus pariter glandulosi; 5°. *Knifa* Adansf. 2-styla 2-locularis. Species 1-styla nulla est, sed in *H. monogyno* L. seu *Komanâ* Adansf. styli 5 arctè juncti unicum mentiuntur.

**Obs.** Ordo *Guttiferis* conterminus, numero situque partium & succo sæpè resinoso compar; discrepat tamen fructu capsulari & seminibus minutissimis, quorum ideò structura corculi difficiliùs agnoscenda. Signis antèa memoratis p. 254 laxiùs *Malpighiis* annectitur.

## O R D O I X.

## GUTTIFERÆ, LES GUTTIERS.

**CALIX** definitè polyphyllus, aut monophyllus partitus, aut rarissimè nullus. Petala definita, sæpè quatuor. Stamina plerumque indefinita, rariùs definita, filamentis nunc distinctis, nunc rariùs monadelphis aut polyadelphis; antheræ filamentis adnatæ. Germen simplex; stylus unicus aut nullus; stigma simplex aut divisum. Fructus plerumque unilocularis, baccatus drupaceusve aut capsularis nunc integer nunc valvis dehiscens, intùs mono aut polyspermus. Semina nunc receptaculo centrali nunc parietibus affixa. Corculum rectum absque perispermo, lobis suberoso-callofis.



Arbores aut frutices, plures succo resinoso turgidi. Folia saepius opposita, plerumque coriacea integra glabra, nervo medio unico longitudinali, cæteris transversis. Flores axillares aut terminales, interdum abortu diclines.

### I. Stylus nullus.

**CAMBOGIA**, L. \* *Guttier.* Calix 4-phyllus. Petala 4. Stamina plurima, antheris subrotundis. Stylus 0; stigma 4-fidum persistens. Pomum subrotundum, 8-10 costulis extuberans, intus pulposum (8-loculare loculis 1-spermis ex *Linn.*), sub singula costulâ 1-spermum, femine intrâ pulpam nidulante compresso. *Arbor gummi Guttam fundens; flores in ramulis terminales. Character ex Rheed. Mal. 1. t. 24. & ex Linnæo.*

**CLUSIA**, Pl. L. \* Calix 4-6-phyllus, interdum 9-16-phyllus, foliolis oppositè imbricatis persistentibus. Petala 4-6. Stamina numerosa (definita 5-8 in *C. albâ*, ex *Jacq.*); antheræ longæ. Stylus 0; stigma sessile peltatum 4-12-radiatum persistens. Capsula sphaeroidæa magna 1-locularis polysperma, 4-12-sulcata, ab apice ad basim 4-12-valvis, valvis coriaceis arcuatis, singulis continuo & persistente stigmatis radio superatis. Semina numerosa parva pulpâ obtecta, affixa receptaculo centrali anguloso aut & valvis intus apice placentaribus. *Arbores succo glutinoso tenaci turgidæ; pedunculi axillares aut plerumque terminales, 1-2-3-flori pedicellis bracteolatis; flores interdum abortu masculi aut foeminei.*

**GARCINIA**, L. \* **MANGOSTANA**, Rumph. 1. t. 43. \* *Mangoustan.* Calix 4-partitus. Petala 4. Stamina 16, antheris subrotundis. Stylus 0; stigma sessile 5-8-radiatum persistens. Bacca cortice coriaceo globosa pomiformis stigmate coronata, 1-locularis 5-8-sperma, feminibus angulosis villosis carne obvolutis, quibusdam interdum abortivis. *Arbores succo flavescente turgidæ; folia petiolo brevi tumido; flores subsolitarii axillares aut terminales, interdum in distinctâ arbore masculi ex Rumphio. An congener Panitsjika-maram Rheed. Mal. 3. t. 41?*

**TOVOMITA**, Aubl. \* *Tovomite.* Calix 2-phyllus. Petala 4. Stamina numerosa, antheris ovatis. Stylus 0; stigma 4-lobum. Fructus... *Arbor resinosa; folia petiolo semiamplexicauli; flores trichotomè corymbosi terminales singulis divisuris 2-bracteatis. Character ex Aubl. Guyan. t. 363.*

**QUAPOYA**, Aubl. \* *Dioica.* Calix 5-phyllus foliolis concavis imbricatis, basi 2-bracteatus. Petala 5. **MASC.** Antheræ 5 insertæ peltæ centrali stipitato concavo & intus glutinoso. **FÆM.** Antheræ 5 longæ steriles hypogynæ. Stylus 0; stigmata 5 crassa persistentia.

Capsula



Capsula parva 1-locularis polysperma ab apice ad basim 5-fstriata & 5-valvis, valvis coriaceis suo stigmatate superatis; semina plurima parva pulpâ obtecta, receptaculo centrali 5-angulo affixa. *Frutices, ex cortice & ramis oppositis succum flavescentem glutinosum resinosum emittentes; folia carnosâ; flores oppositè paniculati terminales, divisuris 2-bracteolatis; his interdum sexta pars additur aut quinta supprimitur. Car. ex Aubl. Guyan. t. 343-344.*

**GRIAS, L. \*** Calix 4-fidus lacerus. Petala 4. Stamina numerosa, antheris subrotundis. Germen calici immersum; stylus 0; stigma 4-gonum. Drupa magna 1-sperma foeta nuce 8-sulcatâ, 1-spermâ. *Arbor Calophyllo affinis. Character ex Linnaeo.*

## II. Stylus unicûs.

**MORONOBIA, Aubl. \* Mani.** Calix 5-partitus. Petala 5, imbricatim latere convoluta & conniventia. Stamina plurima (15-20) germen spiraliter involventia, filamentis 5-fasciculatis, singulis fasciculis 3-4-fidis 3-4-antheriferis; antheræ longæ Germen spiraliter striatum; stylus 1; stigma 5-radiatum. Capsula subbaccata ovata 1-locularis 2-5-sperma feminibus magnis subtomentosis. *Arbor resinosa; ramuli nodosi sub-4-goni; folia ad nodos opposita; flores solitarii axillares aut sub-corymbose terminales, in arbore maritimâ parvi, in montanâ duplè majores. Character ex Aubl. Guyan. t. 313.*

**MACOUBIA, Aubl. \* Calix... Corolla... Stamina... Germen...** Fructus aurantiiformis subcompressus, cortice tenui punctato subscabro, 1-locularis polyspermus; semina oblonga subcurva hinc sulcata, arillata, parietibus fructus affixa. *Arbor lactescens, ramis oppositis; folia opposita, nervis secundariis transversis; fructus racemosi. Character ex Aubl. t. 378. An ex allatis rectè ordinata?*

**MAMMEA, L. \* MAMEI, Pl. \*** Calix 2-phyllus coloratus coriaceus. Petala 4. Stamina numerosa, antheris oblongis. Stylus 1; stigma capitatum. Bacca maxima extus coriacea, intus carnosâ, subrotunda 1-locularis 4-sperma feminibus magnis coriaceis. *Arbores; folia magna; flores solitarii aut gemini axillares, interdum in eâdem vel distinctâ arbore masculi monente D. Jacq.*

**MACANEA. \* MACAHANEA, Aubl. \* Calix... Petala... Stamina... Stylus... Stigma... Bacca magna pyriformis extus gibba inæqualis, cortice coriaceo, 1-locularis intus pulposa 4-6-sperma, feminibus ad receptacula lateralia affixis ovatis coriaceis in pulpâ nidulantibus. Frutex sarmentosus; flores solitarii axillares. Character ex fructu sicco & ex Aubl. Guyan. t. 371. Cætera desiderantur; sed affinitas cum Mammeâ & Singanâ cæteros propemodum ordinis characteres evocat.**

**SINGANA, Aubl. \* Singane.** Calix 3-5-partitus. Petala 3-5, unguiculata limbo ferrulato. Stamina numerosa. Stylus 1, apice



incurvus; stigma 1. Capsula longa (6-10-pollicaris) cylindrica fragilis 1-locularis polysperma seminibus magnis (Æsculi) sibi mutuò incumbenibus, pulpâ involutis, ad receptacula 3 lateralibus affixis. *Frutex sarmentosus nodosus; folia ad nodos bina subopposita magna; flores axillares aut sparsi. Character ex Aubl. Guyan. t. 230 & ex fructu sicco.*

MESUA, L. \* Calix 4-phyllus persistens. Petala 4. Stamina numerosa, filamentis basi in urceolum connatis. Stylus 1: stigma crassiusculum concavum. Nux 4-gona acuminata coriacea, scissurâ 4-valvis 1-4-sperma. *Arbor; folia avenia; flores axillares aut terminales subsolitarii, gratè odori; semen Castaneæ simile, esculentum; fructus immaturus succum tenacem glutinosum exsudat. Character ex Linnaeo & Rheedio & Rumphio.*

RHEEDIA, L. \* VANRHEEDIA, Pl. Calix 0. Petala 4. Stamina numerosa. Stylus 1; stigma infundibuliforme. Bacca ovata 1-locularis 3-sperma. *Arbor ramis articulatis, ad ramulorum nodos resinam exsudans; flores axillares pedunculis 3-floris. An verè calix nullus?*

CALOPHYLLUM, L. \* Calix 4-phyllus coloratus, foliolis 2 exterioribus brevioribus. Petala 4. Stamina numerosa, antheris oblongis. Stylus 1; stigma capitatum. Drupa globosa aut ovata, foeta nuce 1-spermâ. *Arbores; folia nervis transversis numerosis appressis; flores axillares & terminales, oppositè paniculati, pedicellis 3-floris. Ex Jacquinio calix 2-phyllus, stamina 10, stylus 0, flores quidam masculi. Vidi speciem polyadelpham. Confer in vivis.*

III. Genera alternifolia, hinc Guttiferis, indè Aurantiis affinia.

VATERIA, L. \* PÆNOE, Rheed. \* Calix profundè 5-fidus. Petala 5. Stamina numerosa antheris subsessilibus longis. Stylus 1; stigma 1. Capsula ex Rheed. ovata coriacea, 3-lineata 1-locularis 3-valvis 1-sperma, calici persistenti reflexo supera. *Arbor cortice resinoso; folia alterna crassa magna; flores corymbosi aut paniculati terminales. Character ex Rheed. Mal. 4. t. 15. Vidi in germine Vateriæ rudimenta 3 seminum, & 3-sperma etiam dicitur in emendato Linn. syst.; an indè à Pænoe dissimilis? Confer cum Elaocarpo & Vaticâ & Tino.*

ELÆOCARPUS, Burm. L. \* Calix 4-5-partitus coriaceus æqualis. Petala 4-5, unguiculata, limbo fimbriata. Stamina 16-20, filamentis brevibus, antheris longis apice 2-fidis. Germen disco impositum villoso inter stamina & petala prominulo; stylus 1; stigma 1. Drupa rotunda foeta nuce ossâ rugosâ (4-5-segmentosâ & foraminulis undique eleganter pertusâ ex Rumph.). *Arbores; folia alterna; flores spicati axillares. Character ex Linn. An species 3-petala 8-andra ab ipso observata verè congener? An*



*huic 1-sperma; an corculum absque perispermis? An caractere similis Dicera Forst. huc in Linn. Suppl. relata?*

**VATICA**, L. \* Calix 5-partitus. Petala 5. Stamina 15, antheris sessilibus 4-locularibus. Germen sub5-gonum; stylus 5-striatus. Stigma 1. Fructus... *Abuscula Citri facie, ramis angulatis: folia alterna; flores paniculati. Character ex Linnæo.*

**ALLOPHYLLUS**, L. \* Calix 4-partitus, laciniis orbiculatis, 2 oppositis minoribus. Petala 4 calice minora, unguibus latis. Stamina 8 filamentis filiformibus, antheris subrotundis. Germen didymum; stylus 1, apice 2-fidus; stigmata 4. Fructus... *Arbor Lauri Perseæ facie; folia alterna integra glabra; racemi axillares breves. Character ex Linnæo. Confer cum Tino.*

**Obs.** Guttiferarum ordo novus genera exhibet rectè consociatâ; habitu & flore polyandro & fructu plerumque baccato & solido feminis corculo parilia, plurima gummi Guttam aut resinam similem fundentia & indè Hypericis quibusdam affinia. A styli presentia aut defectu discrimen tenue: an majus à fructu polyspermo aut monospermo? An Calophyllum utpotè monospermum, indè cæteris minùs conveniens? Huic accedunt genera ad calcem reposita pariter monosperma, sed foliis alternis & fortè fructu in his recognoscendo discrepantia, quæ staminum præcipuè numero à monospermis Aurantiorum generibus distinguuntur.

## ORDO X.

### AURANTIA, LES ORANGERS.

**CALIX** monophyllus, sæpè partitus. Petala definita, basi lata, inserta circa discum hypogynum. Stamina eidem disco imposita, definita aut rariùs indefinita, filamentis distinctis aut monadelphis polyadelphisve. Germen unicum; stylus unicus; stigma simplex aut rariùs divisum. Fructus plerumque baccatus, interdum capsularis, uni aut multilocularis, loculis mono aut dispermis. Corculum rectum assurgens, absque perispermis. Caulis arborescens aut frutescens. Folia alterna, simplicia aut rariùs composita.

I. Fructus monospermus. *Folia non punctata. Aurantia spuria.*

**XIMENIA**, Pl. L. \* Calix 4-fidus minimus persistens. Petala 4, calici alterna, intus pilosa, basi conniventia, superne revoluta.



Stamina 8, filamentis brevibus, antheris longis erectis. Ger-  
men 1; stylus 1; stigma 1. Drupa ovata foeta nuce 1-spermâ.  
*Arbusculæ inermes aut sæpius spinosæ; folia alterna spinis hinc  
adjuncta; pedunculi axillares uni aut multiflori. Hujus congener Hey-  
massoli Aubl. Guyan t. 125 caractere conformis, interdum tamen  
3-petala 6-andra. An congener etiam Agihalid Alpini, arbuscula  
canescens, in Linn. spec. Ximenia Ægyptiaca dicta, dein in  
ejusd. syst. omissa? Huic folia alterna conjugata petiolo communi ultra  
prominulo & basi 2-stipulaceo, spinæ simplices axillares aut supra-  
axillares, flores plures (8-10) sub spinâ axillares; singulis ex  
Lippi mss. calix 5-partitus, petala 5, stamina 10, germen supe-  
rum, stylus 1, stigma 1, bacca foeta nuce 5-gonâ 1-spermâ. An  
potius genere & ordine distinguendum?*

**HEISTERIA**, Jacq. L. \* Calix minimus sub 5-lobus persistens.  
Petala 5. Stamina 10, filamentis planis, alternis brevioribus;  
antheræ subrotundæ. Stylus brevis; stigma sub 4-fidum. Drupa  
olivæformis 1-sperma, semicincta calice plurimum ampliato,  
campanulato colorato, ad limbum patente, obtusè 5-lobo.  
*Arbor Lauri facie; folia alterna integerrima; flores parvi solitarii  
axillares. Martinicensibus dicitur Bois Perdrix quia fructus Per-  
dicibus gratus. Caractèr ex Jacq. Amer.*

**FISSILIA**, Commerf. \* Calix urceolatus brevis integer. Corolla  
hypogyna multò longior, aspectu 1-petala tubulosa regularis,  
sed 3-partita seu fissilis in 3 petala conniventia erecta quorum  
2 semibifida, 1 indivisum. Staminum filamenta 8 inserta petalis,  
3 fertilia & 5 sterilia, nempe petalis bifidis 1 fertile inter 2  
sterilia, petalo indiviso 1 sterile & alterum fertile. Stylus 1;  
stigma truncatum aut 3-gonum. Nux 1-sperma glandiformis,  
calice elongato cupulæformi non patente arctè complexa &  
apice tantum nuda. *Arbor Laurifolia sempervirens; folia integerrima;  
racemuli axillares pauciflori, interdum sub 1-flori. Fructus  
Psittacis gratus; inde Borboniensis Bois de Perroquet dicitur.  
Caractèr ex Commerf. & ex sicco. Fissilia à corollâ fissili. Affinis  
hinc Lauro sed non apetala, inde Hopeæ sed non polyandra mo-  
nadelphæ; affinior Heisteriæ. Corculum seminis magnum rectum as-  
surgens.*

**II. Fructus polyspermus baccatus. Folia pellucido-  
punctata. Aurantia vera.**

**CHALCAS**, L. \* Calix 5-partitus persistens minimus. Petala 5-6  
unguiculata erecta. Stamina 10. Stigma capitato-verrucosum.  
Bacca oblonga 2-sperma. *Frutex; flores subpaniculati terminales.  
Caractèr ex Linnaeo. An Murrayæ congener; an hinc referenda Tri-  
chogamila Brown. distincta calice extus infra 2-squamoso?*

**BERGERA**, L. \* Calix 5-partitus minimus persistens. Petala 5



patentia. Stamina 10, alterna breviora. Stigma turbinatum, transversim sulcatum. Bacca subglobosa 2-sperma. *Arbor frondosa; folia alternè & impari-pinnata; flores corymboso-racemosi terminales, pedicellis bracteatis. Car. fer ex Linnæo. Genus in Linn. syst. ed. 14 omissum; an idem cum Murrayâ?*

**MURRAYA, L. \*** Calix 5-partitus minimus persistens. Petala 5 aut interdum 6, in campanam basi conniventia, apice patula. Stamina 10, rarius 11-12, filamentis inæqualibus, basi subpolyadelphis. Germen disco (nectarium Linn.) urceolari minimo infrâ cinctum; stigma capitatum angulatum. Bacca parva, corrice tenui punctato, subpulposa 1-2-sperma feminibus cartilagineis. *Frutex (Marfania Sonner. Ind. 2. t. 139.) dictus Buis de Chine, ramis alternis; folia alternè & impari-pinnata, punctato-pellucida; flores corymbosi terminales; corculum seminis rectum assurgens. Confer Chalcam & Bergeram. Congener Camunium Japonense Rumph. Amb. 5. t. 18. f. 2.*

**COOKIA, Sonner. \*** *Wampi de la Chine.* Calix minimus 5-partitus. Petala 5 patentia. Stamina 10 distincta; antheræ subrotundæ. Germen substipitatum hirsutum; stylus 1; stigma capitatum. Bacca parva punctata multilocularis, loculo sæpius gemino superstiti, utroque 1-spermo. *Arbor; folia alternè & impari-pinnata, pellucido-punctata; flores racemoso-paniculati terminales. Caract. ex Sonner. Ind. 2. t. 130. An corculum rectum absque perispermo?*

**CITRUS, T. L. \* AURANTIUM, T. \* LIMON, T. \* Oranger; Citronnier, Limon.** Calix 5-fidus parvus. Petala 5 patentia. Stamina circiter 20, filamentis in cylindrum dispositis, basi appressis & polyadelphis. Stigma globosum. Bacca cortice carnosulo vesiculis innumeris papuloso, multilocularis, loculis 9-18 membranâ propriâ distinctis, intus cellulosis pulpofis & 1-2-spermis; semina cartilaginea angulo interiori affixa. *Arbores aut frutices; folia punctato-pellucida petiolo sæpè marginato; spinæ in pluribus axillares solitariae; pedunculi axillares aut terminales, uni aut multiflori. Corculum seminis rectum assurgens, in C. Aurantii vulgaris semine triplex distinctam nullâ membranâ interpositâ. Bacca Aurantii T. sphericea cortice tenui cum folii petiolo cordato, Limonis T. oblonga apice mammoso & cortice tenui cum petiolo nudo, Citri T. oblonga cortice crasso cum petiolo nudo.*

**LIMONIA, L. \*** Calix 5-partitus minimus. Petala 5. Stamina 10. Stigma 1. Bacca 3-locularis 3-sperma. *Caract. ex Linnæo. Arbores aut frutices; folia punctato-pellucida, simplicia aut ternata aut pinnata; spinæ axillares, solitariae aut geminae. L. trifoliatam vidi 3-petalam 5-andram. Meliis & Turrae affinis L. monophylla L. 4-petala 8-andra monadelpha & simplicifolia.*



III. Fructus polyspermus capsularis. *Folia non punctata. Genera Aurantiis & Meliis affinia.*

**TERNSTROMIA**, Mut. LS. \* Calix 5-6-partitus coriaceus, extus 2-squamosus. Corolla 5-partita aut rarius 6-partita (petalis basi subcoalitis?). Stamina numerosa, duplici serie inæ corollæ inserta, filamentis brevibus, antheris oblongis. Stylus 1; stigma capitatum. Bacca exsucca 2-locularis sub8-sperma. *Arbor; folia alterna integerrima avenia coriacea; pedunculi axillares. Character ex Linn. Suppl. Genus idem cum sequenti ex D. L'Herit.*

**TONABEA**. \* **TAONABO**, Aubl. \* Calix 5-partitus coriaceus persistens basi 2-squamosus. Corolla hypogyna, 4-5-partita (petalis basi subcoalitis?). Stamina numerosa (20-60) hypogyna, germini imbricatim appressa, filamentis brevibus foliaceis medio latioribus; antheræ oblongæ filamentis intus adnatæ. Stylus 1; stigma capitatum. Capsula parva subsphærica acuminata, calici patulo persistenti insidens, 5-6-locularis 5-6-sperma, seminibus offeis. *Arbores; folia alterna, crassiuscula, serrulata; pedunculi solitarii 1-flori sæpius axillares. Character ex Aubl. Guyan. t. 227-228. Confer cum Ternstromiâ. Capsulas habeo innominatas, fortè Ternstromiæ, sed iconi Aubletianæ similes, tantum 2-loculares loculis 3-4-spermis, seminibus testâ fragili luteâ inclusis, & lobis corculi in radiculam longam reflexis absque perispermo.*

**THEA**, L. \* **THEE**, Kæmpf. \* *Thé*. Calix 5-6-partitus. Petala 6, interdum 9 quorum 3 exteriora minora. Stamina numerosa, distincta aut polyadelphe; antheræ subrotundæ. Stylus 1 (fortè triplex coalitus); stigmata 3. Capsula 3-cocca 3-locularis 3-6-sperma; seminum testa solida. *Frutices; folia alterna; flores axillares. Corculum seminis rectum absque perispermo.*

**CAMELLIA**, L. \* **TSUBAKKI**, Kæmpf. \* Calix 5-partitus coriaceus, squamis plurimis minoribus imbricatis infrâ cinctus. Petala 5 magna basi coalita. Stamina numerosa, filamentis infrâ coalitis in coronam, cui petala adnascuntur; antheræ subovatæ. Stylus 1; stigma 1. Capsula ex Kæmpf. lignea pyriiformis 3-sulca 3-cocca 3-sperma. *Frutex; folia alterna coriacea; gemmæ axillares, imbricatim squamosæ; flores axillares & terminales subsessiles, in hortis pleni.*

**Obs.** Ordo ex dictis p. 230 inter polypetalos staminibus perigynis antea recensitus, nunc hypogynis intermixtus, iterato examine forsân prioribus restituendus. Triplex hujus sectio distinctissima, triplicis futuri ordinis exordium. Prima utpotè non polyandra, indè ab ultimis Guttiferarum generibus discrepat, licet similiter monosperma. Postrema Theam & congenere complectens hîc dubiè reponitur antea Malvaceis adjecta, sed corculo seminis recto non corrugato affinium.



tum Aurantiis tum Meliis : an Magnoliis rectius admovenda ? Aurantia vera distinguuntur foliis punctato-pellucidis & fructu baccato similiter punctato, multiloculari aut saltem polyspermo. An inde his addenda quadam genera ex Terebintaceis deprompta, ut Vepiis & Amyrides nonnullæ & fortè Copaifera ? Conferantur etiam plantæ Rumphianæ 5. t. 13-14, & Cudranus ibid. t. 15-16, & Camunium Sinentse ibid. t. 18. f. 1. cujus fortè congener Vitex pinnata L., & Tobira Kämpf. p. 796 fig. quæ species Evonymi ex Thunbergio. Peculiaris in Aurantii vulgaris semine corculi triplicis concursus, in aliis seminibus nondum observatus.

## O R D O X I.

## M E L I Æ , L E S A Z E D A R A C H S.

**CALIX** monophyllus, partitus aut apice tantum divisus. Petala quatuor aut quinque, ungue lato, sæpius basi conniventia. Stamina definita, totidem aut sæpius dupla, filamentis connatis in tubum aut urceolum, apice dentatum dentibus antheriferis aut antheras eidem intus adnatas obtegentibus. Germen unicum; stylus unicus; stigma simplex aut rarius divisum. Fructus baccatus aut sæpius capsularis, multilocularis, loculis mono aut dispermis, valvis numero loculorum, medio septiferis. Caulis frutescens aut arborescens, ramis alternis. Folia alterna non stipulacea, simplicia aut composita.

## I. Folia simplicia.

**WINTERANIA**, L. \* **CANELLA**, Murr. \* Calix 3-partitus laciniis rotundatis. Petala 5 subrotunda. Stamina filamenta omnino coalita in urceolum conicum truncatum, intra cujus faucem antheræ 16 sessiles conniventes. Stigma triplex. Bacca parva subrotunda 3-locularis 3-sperma. *Character ex Linneo.* Arbor Canella alba officinis dicta; folia simplicia; pedunculi multiflori axillares & terminales. Ex Montinio antheræ 20 & stigma capitatum simplex : an potius antheræ tantum 8-10 didymæ ?

**SYMPHONIA**, LS. \* Calix 5-partitus laciniis rotundatis. Petala 5 subrotunda coriacea, in globum conniventia. Stamina 5, filamentis omnino coalitis in tubum cylindricum germi arcte circumpositum, apice 5-antheriferum. Stigmata 5 antheris

\* *Conferat vult manroba-*

R 4



alterna. Bacca globosa 5-locularis 5-sperma. Arbor; folia laurina simplicia, conferta; flores (Theæ) subumbellati terminales; fructus cortice coriaceo, intus mucosus. Character ex L. Suppl.

**TINUS**, L. \* **VOLKAMERIA**, \* Brown. \* Calix 5-fidus. Corolla 5-partita connivens (petalis basi latâ coalitis?); stamina 9, filamentis basi coalitis in urceolum concavum germini circumpositum, ore perforatum. Stigmata 3. Bacca subrotunda 3-locularis 3-sperma. Arbor; folia simplicia; spicæ florum ramosæ terminales. Character ex Brown. An genus verè 9-andrum; an quandoque 5-10-andrum? An ab ordine distinctum corollâ submonopetalâ & filamentis basi tantum coalitis? In specimine sicco semideflorato vidi eadem omninò distincta, corollæ adnata & simul quasi perigyna, & fructum fortè potius capsularem: inde Clethra p. 160 proximum adstat, ipsamet veriùs monopetalum & Ericis affinius. Hujus congener aut affinis frutex J. Jussæi Peruvianus, alternifolius nondum frugifer, cui flores spicati axillares, calix urceolatus 5-dentatus, corolla 5-partita connivens, stamina 10 tubo brevi & antheris longis conniventibus intus villosis, stylus 1, stigmata 3, germen fortè 3-loculare 6-spermum.

**GERUMA**, Forsk. \* Calix planus 5-dentatus parvus persistens. Petala 5 longiora truncata patentia. Stamina 5, filamentis brevibus basi interiore in anulum crassiusculum germini circumpositum coalita. Stigma triplex. Capsula ovata 4-5-locularis loculis 1-2-spermis; semina pulpæ trigonæ affixa. Folia alterna. Djerrum Arabum. Character ex Forsk. An Malvaceis affinior?

**AYTONIA**, LS. \* Calix 4-5-dentatus. Petala 4-5. Stamina 8-10, tubo ad apicem 8-10-fido, laciniis antheriferis. Stigma obtusum. Bacca membranacea (4-angularis 1-locularis seminibus columnæ affinis ex LS.). Frutex; folia simplicia; flores axillares; fructus physalodes. Character ex Linn. Suppl. & flore sicco.

**QUIVISIA**, Commerf. \* Quivi, Bois de Quivi. Calix urceolatus 4-5-dentatus. Petala 4-5 breviora. Stamina 8-10, tubo brevi suprâ 8-10-antherifero. Stigma capitatum. Capsula coriacea, 4-5-locularis, apice 4-5-valvis, valvis medio septiferis, loculis 2-spermis. Frutices; folia simplicia; pedunculi axillares 1-flori aut spicato-multiflori. Numerus quaternarius in flore frequentior. Quibusdam corculum perispermo carnosio cinctum.

**TURRÆA**, L. \* Calix 5-fidus. Petala 5 longissima ligulæformia. Stamina 10, tubo longo suprâ 10-fido, laciniis antheriferis. Stigma crassiusculum. Capsula 5-cocca coccis 2-spermis. Frutices; folia simplicia; flores axillares.

## II. Folia composita.

**TICOREA**, Aubl. \* Calix 5-dentatus. Petala 5 longa. Stamina 5, tubo ad apicem 5-dentato, dentibus antheriferis. Stigma 1



capsula 5-locularis... *Frutex*; *folia ternata*; *flores subcorymbosi*. *Discus germini subiectus*. *Caracter ex Aubl. Guyan. t. 277.*

**SANDORICUM**, Rumph. 1. t. 64. \* *Hantol des Philippines*. Calix brevis 5-dentatus. Petala 5 linearia. Stamina 10, tubo ad limbum 10-dentato, intrâ faucem 10-antherifero. Stigmata 5 bifida. Bacca pomiformis extûs subtomentosa, intûs pulpofa, fœta 5 feminibus, singulis arillo coriaceo compresso infrâ 2-valvi obvolutis. *Arbor*; *folia ternata*; *flores racemoso-paniculati axillares*; *fructus acidus*. *Hantol Camelli ic. 136. Caracter ex sicco & ex DD. Lamarck & Cavanilles.*

**PORTESIA**. \* Calix parvus 4-dentatus. Petala 4 conniventia. Stamina 8, tubo 8-fido, laciniis intûs antheriferis. Stigma capitatum. Capsula villosa coriacea 2-locularis 2-valvis 2-sperma loculo & femine 1 sæpè abortivo. *Frutex Domingensis (priscum inter benè-multa botanicum munus Medici Desportes Auctoris libri de morbis & plantis Domingensibus)*; *folia impari-pinnata bijuga*; *flores racemosi axillares*. *Caracter ex Cavan.*

**TRICHILIA**, L. \* Calix tubulosus brevis 5-dentatus. Petala 5. Stamina 10, tubo cylindrico 5-dentato, antheris ejusdem limbo intûs adnatis. Stigma 3-dentatum. Capsula subrotunda 3-locularis 3-valvis 3-sperma, feminibus arillatis. *Arbores*; *folia ternata aut impari-pinnata*; *flores racemosi aut paniculati*, sæpiùs *axillares*. *Loculi T. Spondioïdis interdum 2-spermi.*

**ELCAJA**, Forsk. \* Calix campanulatus 5-partitus laciniis rotundatis. Petala 5 longiora linearia, basi plana, villosa. Stamina 10, filamentis ad medium connatis in prismâ 4-gonum, suprà antheriferis & productis in squamam antheræ extûs appositam. Stigma capitatum. Capsula obovata tomentosa 3-locularis 3-valvis loculis 2-spermis, valvis medio sulcatis. *Arbor*; *folia impari-pinnata*, *foliolis 4-jugis*; *flores (Citri) corymbosi axillares & terminales*. *Caracter ex Forsk. Confer cum Trichiliâ.*

**GUAREA**, L. \* **GUIDONIA**, Pl. \* Calix minimus 4-dentatus. Petala 4. Stamina 8, tubo oblongo subcylindrico integro, intrâ faucem 8-antherifero. Stigma capitatum. Capsula subglobosa 4-fulca 4-locularis 4-valvis 4-sperma feminibus arillatis. *Arbor*; *folia impari-pinnata*; *flores racemoso-paniculati axillares*. *Bois rouge Domingensium. Corculum absque perispermio.*

**EKEBERGIA**, Sparm. \* Calix 4-fidus. Petala 4. Stamina 10, tubo brevissimo integro, antheris intrâ tubum subsefilibus. Stigma capitatum. Bacca globosa 5-sperma... *Arbor*; *folia abruptè aut impari-pinnata petiolo communi complanato*; *flores paniculati axillares*. *Caracter ex DD. Sparmann & Thunberg. An corolla verè 4-petala simul & 10-andræ? Confer cum Guareâ.*

**MELIA**, L. \* **AZEDARACH**, T. \* *Azédarach*. Calix minimus 5-fidus. Petala 5 oblonga. Stamina 10, tubo cylindrico 10-dentato, dentibus antheras intûs adnatas obtegentibus. Stigma



capitatum. Drupa globosa foeta nuce 5-loculari 5-spermâ. *Fru-  
rices ; folia impari-pinnata , aut bipinnata ; flores paniculati axil-  
lares. Corculum seminis intrâ perispermum carnosum tenue.*

**AQUILICIA**, L. \* Calix turbinatus 5-dentatus. Petala 5 ovata. Stamina 5, tubo urceolato 5-lobo inter lobos intrus antheri-fero, antheris stipitatis. Stigma obtusum. Capsula baccata sphaeroïdea 5-torulosa 5-locularis 5-sperma. *Frutices Sambuci facie ; folia bipinnata ; flores corymboso-umbellati. Bois de Source Mauritanorum. Hujus congener Nalugu Rheed. Mal. 2. t. 26, & ex Thunbergio Leea æquata L.*

### III. Genera Meliis affinia.

**SWIETENIA**, Jacq. L. \* Calix minimus 5-fidus deciduus. Petala 5. Stamina 10, filamentis in tubum coalitis apice 10-dentatum, intrâ faucem 10-antheriferum antheris oblongis. Stylus 1 ; stigma capitatum. Capsula oviformis densè lignosa, 5-locularis polysperma, à basi ad apicem 5-valvis ; valvæ margine appositæ ad angulos receptaculi centralis 5-goni numerosis tecti seminibus imbricatis, compressis apice alatis. *Arbor ; folia abruptè pinnata sub4-juga, foliolis falcatis ; flores parvi racemosi axillares. Acajou meuble Domingensium. Flos Meliarum, sed fructus omninò dispar, habitusque dissimilis ad Sapindos aut Terebintaceas accedens.*

**CEDRELA**, Brown. L. \* Calix minimus 5-dentatus. Petala 5 obtusa, basi latâ approximata. Stamina 5, filamentis brevibus distinctis, antheris oblongis. Germen stipitatum stipite incrassato suprâ staminifero, infrâ corollifero ; stylus 1 ; stigma capitatum. Capsula Swieteniae, multò minor, lignosa tenuior, ab apice ad basim 5-valvis, receptaculo confimili, seminibus numerosis compressis imbricatis infrâ alatis. *Arbores ; folia abruptè pinnata 7-8-juga, flores laxè paniculati. Acajou à planches Martinicensium. Fructus habitusque Swieteniae, sed stamina distincta stipiti imposita : an stipes ex filamentorum coalitione absolutâ?*

**Obs.** Ordo facilè designatus filamentis staminum definitorum coalitis, petalis basi latis, stylo simplici, fructu multiloculari & seminibus definitis. Indè discrepat à Citro polyadelphâ, à Camelliâ polyandrâ, à Vitibus non monadelphis, à Malvaceis polystigmatosis & sæpè polyandris præterea distinctis corculo corrugato. An tamen verè naturalis series quæ corculum nunc perispermio instructum, nunc eodem destitutum exhibet ? An à seminis structurâ Quivisia affinior Evonymo, Guarea Guttiferis ? insuper non certò constat hypogynia staminum quæ, ut in Aurantiis, inter pistilli fulcrum & calicis basim inferuntur. Habitu tamen similes Vitibus Aquilicia & Melia, agrè ab iis dimovendæ. In omnibus interea semen enucleandum & iterum definiendus partium situs.



## O R D O X I I.

## V I T E S , L E S V I G N E S.

**CALIX** monophyllus brevis subinteger. Petala definita, quatuor aut quinque aut sex, basi lata. Stamina totidem, petalis opposita, filamentis distinctis, inserta disco hypogyno. Germen simplex; stylus unicus aut nullus; stigma simplex. Bacca uni aut multilocularis, monosperma aut definitè polysperma; semina ossea, superficie inæqualia, imo loculo inserta. Corculum descendens, lobis rectis absque perispermo. Caulis frutescens aut rarò arboreus, sarmentosus nodosus; folia alterna stipulacea; cirrhi aut pedunculi floriferi foliis oppositi.

**CISSUS**, L. \* **VITIS** T. \* Calix minimus integer. Petala 4. Stamina 4. Germen semiimmersum disco staminifero ad ambitum producto; stylus 1; stigma acutum. Bacca rotunda 1-sperma. *Folia simplicia aut 1-2-ternata aut digitata; flores umbellati involucri polyphylli aut corymbosi. Hujus congenes Neriam-pulli Rheed. Mal. 7. t. 48, & Kareta-Valli ibid. t. 45, & Sælanthus quadrangus Forsk. idem cum C. quadrangulæ ac distinctus caule 4-gono. An proximus etiam Sælanthus glandulosus ejusd. cui ex Autore caulis teres, folia opposita, cirrhi extræaxillares, flores cymosi, pedicello & imo calice extus glanduloso, disco germinis 4-lobo ad insertiones filamentorum? An Cissus interdum 2-sperma?*

**VITIS**, T. L. \* *Vigne*. Calix minimus 5-dentatus. Petala 5, sæpius apice cohærentia, & instar calyptræ basi abscedentia simulque decidua. Stamina 5. Stylus 0; stigma capitatum. Bacca rotunda aut rariùs ovata, 2-locularis loculis sæpè 2-spermis. *Folia simplicia, aut ternata aut digitata aut bipinnata; flores racemosi, non rarò 6-petali 6-andri; racemus frugifer Uva dictus; cirrhi dichotomi, interdum floriferi, ideò pro pedunculis sterilibus habendi. Hujus congenes Hedera quinquefolia L., Valli Rheed. Mal. 7. t. 6-11, & fortè Nialel ibid. 4. t. 16., & Vites Romphianæ 5. t. 164-167. Diversa fortè V. trifolia Burm. Ind. t. 24.*

**Obs.** Vites Aquiliciam & Meliam extus æmulantur petalis basi latis, foliis quandoque conformibus & alternis non tamen nudis, floribus racemosis aut umbellatis sed præterea oppositifoliis. Harum discus germini circumpositus & staminifer assimilatur tubo Meliarum staminifero, sed in Meliis stamina sæpè intrà tubum, in Vitibus extus



discum inferuntur, indè forsàn pro perigynis habenda. Vites Linnæus in ord. nat. 46 adjicit *Hederæ* & *Araliæ*, distinctas tamen germine supero & staminibus non epigynis. *Rhamnis* fortè similiores petalorum & staminum oppositione mutuâ, discrepant depressiori organi utriusque situ non ut in iis apertè perigyno, & petalis non unguiculatis, & perispermo nullo. Eodem signo *Berberidibus* affines, differunt germinis disco, antherarum structurâ, perispermi stipularumque defectu. Compar oppositio supradicta in *Menispermis*, *Cissampelo* & consinibus quibus pariter caulis sarmentosus & folia alterna & flores sæpè racemosi; sed in iis styli plures, germen sæpè multiplex, corculum in perispermo incurvo, cirrhi nulli nec stipulæ, racemi axillares aut supraaxillares non oppositifolii. Rectiùs fortè *Vitibus* accedunt *Gerania* quædam fruticosa alternifolia stipulacea, pedunculis floralibus oppositifoliis & germine simplici instructa, faciliè tamen distinguenda calicis & petalorum formâ, staminum situ eorumque monadelphiciâ ad basim inchoatâ, stigmate quintuplici, fructu quinquecapulari & lobis corculi non rectis.

## ORDO XIII.

### GERANIA, LES GERAINES.

**CALIX** simplex pentaphyllus aut quinque partitus, persistens. Petala quinque. Stamina definita, filamentis basi coalitis, nunc omnia fertilia, nunc quædam sterilia. Germen simplex; stylus unicus; stigmata quinque oblonga. Fructus quinquelocularis aut quinquecapularis, loculis aut capsulis mono aut dispermis. Corculum absque perispermo. Caulis suffrutescens aut herbaceus; folia stipulacea, opposita aut alterna; flores foliis alternis oppositi, oppositis axillares.

**GERANIUM**, T. L. \* **PELARGONIUM**, Burm. \* *Geranion*, *Geraine*. Calix 5-phyllus aut 5-partitus. Petala 5 æqualia aut inæqualia. Staminum filamenta 10, basi in urceolum aut tubum coalita, nunc omnia antherifera, nunc quædam sterilia. Germen modò basi 5-glandulosum, modò pedicello insidens fistuloso intrâ florem hinc hianti. Fructus dehiscens in capsulas 5, ovatas aut basi acutas, 1-2-spermas, aristatas aristis stylo persistenti adnatis, à basi ad apicem dehiscens unâ cum capsulis; corculum lobis à medio reflexis. *Herbæ aut suffrutesces; folia alterna, aut opposita; pedunculi florum 1-2-flori aut multiflori. Corolla in Europæis speciebus regularis admittit calicem 5-phyllum aut 5-partitum, germen basi 5-glandulosum, glandulas pe-*



*alis alternas, caulem herbaceum, folia sæpius opposita & pedunculos axillares, in 1-2-floris stamina omnia fertila & capsulas ovatas aristis supra revolutis, in multifloris stamina 5 sterilia & capsulas basi acutas aristis tortilibus. Corolla in Africanis irregularis quasi papilionacea, petalis 2 superioribus erecto-reflexis, intra calicem 5-partitum non polyphyllum, profert germen non basi glandulosum, staminum filamenta 7 aut pauciora antherifera cæteraque sterilia, capsulas basi acutas aristis tortilibus barbatis, pedicellum floris hinc fistuloso-cavum intra petala & extra stamina apertum, caulem sæpè suffrutescentem, folia plerumque alterna, pedunculos sæpius multifloros & foliis oppositos. Numerosissimas D. Cavanilles in accuratâ Monographiâ nitidis expressas iconibus recensuit species generis in posterum dividendi, Africanis ad Pelargonium Burmanni rejectis. Ex ipso congener Grielum L. 5-stylum, præterea simillimum Europæis: an idem posthac restituendum?*

**MONSONIA**, L. \* Calix 5-partitus æqualis, laciniis acuminatis. Petala 5 æqualia, imo staminum tubo inserta. Staminum filamenta 5 plana, basi in urceolum brevissimum coalita, singula apice 3-partita & 3-antherifera. Germen 5-gonum. Capsula 5-gona 5-ocularis (loculis 1-spermis?). *Herbæ; folia fasciculata (radicalia alterna?); pedunculi (radicales?) 1-flori.*

Genera Geraniis affinia.

**TROPÆOLUM**, L. \* **CARDAMINDUM**, T. \* *Capucine*. Calix profundè 5-fidus coloratus, laciniâ superiore basi calcaratâ, calcare intra florem hinc hiantem extra stamina. Petala 5 calici inserta, ejusdem laciniis alterna, quorum 2 superiora sessilia remota, calcaris fauci infixa; 3 unguiculata germen ex opposito ambientia. Stamina 8, filamentis distinctis, germini arctè circumpositis & ejusdem disco (perigyno?) impositis; antheræ oblongæ erectæ 2-loculares (4-loculares ex Linnæo). Germen 3-gonum; stylus 1 cylindricus 3-striatus; stigmata 3 aucta. Pericarpia 3 reniformia fuberosa 1-sperma non dehiscencia, hinc sulcata, indè imo stylo persistenti affixa; semina conformia; corculum magnum absque perispermio, radicula intra lobos rectos supra latente non prominulâ. *Herbæ diffusæ aut volubiles; folia alterna non stipulacea, simplicia peltata, aut rariùs digitata; pedunculi 1-flori longi axillares. Flores T. pentaphylli Juss. Peruv. & Commerf. herb. Bonar. tantum 2-petali, petalis cæteris nullis aut citiùs caducis; iidem in summo caule vix calcarati serè regulares, inferioribus longè calcaratis multò minores. Genus affine Geranio staminum & petalorum situ, stylo unico, stigmate multiplici, pericarpis imo stylo affixis, perispermii defectu. Affinitas quædam calcaris Tropæoli & tubi Geraniorum Africanorum intra florem similiter hiantis, sed tubus pedicello arctè inhæret, non autem calcar. Præterea Tropæolum discrepat stipulis nullis, floribus non oppositifoliis, lobis corculi rectis.*



**BALSAMINA**, T. \* **IMPATIENS**, L. \* *Balsamine*. Calix 2-phyllus minimus. Petala 4 hypogyna, irregularia & inæqualia: superius latius fornicatum; inferius breve basi calcaratum; lateralia seu interiora 2 majora basi appendiculata aut interdum 2-partita, undè corolla tunc quasi 6-petala. Stamina 5 hypogyna, filamentis brevibus primò monadelphis, dein maturatone distinctis, antherarum persistente supernâ coalitione. Germen 1; stylus 0; stigma acutum. Capsula oblonga 5-locularis polysperma 5-valvis, elasticè diffiliens valvis in spiram intortis, dissepimentis membranaceis ex receptaculo columnari centrali seminifero enatis & valvularum margini appositis; corculum seminis rectum absque perispermo. *Herbæ; folia alterna aut rariùs opposita, non stipulacea; pedunculi axillares uni aut multiflori. Genus, antea Papaveraceis adjectum, simile calice 2-phyllò & corollâ 4-petalâ & stylo nullo, sed discrepans antheris definitis & connatis, fructu multiloculari & multivalvi, receptaculo centrali & foliis interdum oppositis. Extùs convenit Geraniis Africanis similiter calcaratis, sed huic ut & Tropæolo calcar liberum, non pedicello inhærens ut in Geraniis; diversa insuper staminum & fructus & seminis structura. Genus ergò sui ordinis nunc verè unicum. An pro calice habenda petala 2 exteriora, calicis munus jam obeuntia in flore nondum explicato?*

**OXALIS**, L. \* **Oxys**, T. \* *Surelle*. Calix 5-partitus persistens. Petala 5 hypogyna, latere leviter connexa. Stamina 10 hypogyna, filamentis basi coalitis, alternis brevioribus; antheræ subrotundæ. Germen simplex; styli 5; stigmata 5. Capsula brevis aut oblonga, 5-gona 5-locularis loculis mono aut polyspermis, 5-valvis valvis introflexis & receptaculo centrali affixis, singulis loculum constituentibus & extùs elasticè bipartitis; femina compressa transversim multifidariata arillata, receptaculo annexa. *Herbæ, quædam radice tuberosâ, caulescentes aut scaposæ; folia confertim alterna, ternata aut rariùs abruptè pinnata, petiolo basi dilatato (stipulaceo?), juniora Filicum more in spiram involuta; pedunculi in scapis terminales, in caulibus axillares aut & terminales, nunc 1-flori medio 2-squamulosi, nunc umbellatim multiflori umbellâ subinvolucratâ. Seminis minimi corculum videtur rectum absque perispermo. Genus à Geraniis distinctum stylis pluribus, capsulæ formâ & dehiscendi modo, corculo recto, perispermi defectu: an Tribulo aut Zygophyllo affinius?*

**Obs.** Gerania hinc Vitibus indè Malvaceis affinia. Habitu, staminum monadelphiâ & foliis stipulaceis Malvaceas referunt, dissimiles tamen corculi lobis non corrugatis, capsularum aristis stylo applicitis & à basi dehiscuntibus, foliis interdum oppositis. Pedunculus multiflorus folio alterno stipulaceo oppositus signum est Vitibus & Geraniis nonnullis commune, sed Vitium habitus paulò dispar, calix minimus, petala staminibus opposita, germen dissimile & fructus baccatus. An ex Tropæoli & Cissi cum Geraniis comparatione concludenda in his staminum perigynia?



## ORDO XIV.

## MALVACEÆ, LES MALVACÉES.

**CALIX** quinquefidus aut quinquepartitus, nunc simplex, nunc duplex caliculo cinctus mono aut polyphyllo. Petala quinque æqualia, modò distincta hypogyna, modò basi connata & imo staminum tubo adnata. Stamina hypogyna, definita aut indefinita; filamenta nunc maximâ suâ parte coalita in tubulum stylo appressum, ipsi subæqualem, basi corolliferum, apice & sæpè in summâ superficie externâ antheris onustum filamento proprio stipitatis aut rariùs sessilibus; nunc eadem infrâ connata in urceolum cuius divisuræ aut omnes antheriferæ, aut quædam steriles fertilibus intermixtæ. Germen unicum, in quibusdam stipitatum; stylus sæpè unicus, rarò multiplex; stigma multiplex, rarissimè simplex. Fructus modò multilocularis, multivalvis valvis medio septiferis, modò multicapsularis capsulis dehiscentibus aut rariùs non dehiscentibus, in fructum unicum compactis, aut circâ styli basim verticillatis, aut rarò suprâ receptaculum capitatis. Semina in loculis aut capsulis solitaria aut plura, angulo interiori inserta aut receptaculo fructûs centrali columnari loculos & capsulas connectenti. Corculum absque perispermo, lobis in radiculam incurvis ac corrugatis. Caulis arborescens aut frutescens aut herbaceus. Folia alterna stipulacea, sæpè simplicia, rarò digitata. Flores axillares aut terminales, rarissimè abortu diclines.

I. Stamina in tubum corolliferum connata, indefinita. Fructus multicapsularis; capsulæ capitatæ.

**PALAVA**, Cav. \* Calix 5-fidus simplex. Antheræ in apice tubi. Stigmata plura. Capsulæ plures 1-spermæ non dehiscentes. *Herbæ; flores solitarii axillares.*



**MALOPE**, L. \* **MALACOÏDES**, T. \* Calix 5-fidus caliculo 3-phylo cinctus. Antheræ in apice & superficie tubi. Stigmata plura. Capsulæ plures 1-spermæ non dehiscentes. *Herbæ ; flores axillares.*

II. Stamina in tubum corolliferum connata, indefinita. Fructus multicapsularis ; capsulæ verticillatæ, in orbem dispositæ aut in unam compactæ.

**MALVA**, T. L. \* **ALCEA** T. \* *Mauve, Alceë.* Calix 5-fidus ; caliculo cinctus 3 phyllo, rariùs 1-2-4-phylo. Antheræ in apice & superficie tubi. Stigmata 8 aut plura. Capsulæ totidem in orbem dispositæ, 1-spermæ non dehiscentes, rariùs 2-3-spermæ (in *M. Carolinianâ* & *M. prostratâ* 2-loculares 2-spermæ ex Cav.). *Frutices aut sæpiùs herbæ ; flores axillares aut terminales.*

**ALTHÆA**, T. L. Cav. \* **ALCEA**, T. L. \* **MALVA**, T. \* *Guimauve.* Calix 5-fidus, caliculo 6-9-fido cinctus. Capsulæ plures 1-spermæ. Cætera ut in Malvâ. *Herbæ, quædam lignosæ assurgentes ; flores axillares aut spicati terminales. Huc retulit meritò D. Cavanilles Alceam L. caliculo 6-fido designatam, interdum tamen 8-fido.*

**LAVATERA**, T. L. \* **ALTHÆA**, T. \* **MALVA**, T. \* Calix 5-fidus, caliculo 3-fido cinctus. Capsulæ plures 1-spermæ. Cætera ut in Malvâ. *Frutices aut herbæ ; flores axillares. Capsulæ in L. trimestri testæ peltâ orbiculari planâ quæ Lavateræ T. signum præcipuum.*

**MALACHRA**, L. \* **MALACOÏDES**, Pl. \* Involucrum 3-6-phyl-lum multiflorum. Singulo flori calix 5-fidus, caliculo 8-12-phylo cinctus. Antheræ in apice & superficie tubi. Stigmata 10. Capsulæ 5, in orbem dispositæ, 1-spermæ. *Herbæ ; flores axillares.*

**PAVONIA**, Cav. \* **HIBISCUS**, L. \* Calix 5-fidus, caliculo 5-20-phylo aut multipartito cinctus. Antheræ in apice & superficie tubi. Stigmata 8-10. Capsulæ 5 in orbem dispositæ, 2-valves 1-spermæ. *Frutices, rariùs herbæ ; flores axillares aut spicati terminales. Hibisco affinis sed multicapsularis. Capsulæ quarundam apice spinosæ.*

**URENA**, Dill. L. \* Calix 5-partitus, caliculo 5-fido cinctus. Antheræ in apice tubi. Stigmata 10. Capsulæ 5 conniventes 1-spermæ, extùs echinatae. *Herbæ aut suffrutices ; foliorum nervi 1-3 primarii subtùs glandulâ porosâ instructi ; flores axillares & terminales.*

**NAPÆA**,



**NAPÆA**, L. \* **Calix** campanulatus 5-fidus simplex. **Antheræ** in apice tubi. **Stigmata** 10. **Capsulæ** 10 in unam conniventes, 1-spermæ. *Herbæ altissimæ; pedunculi multiflori, axillares aut corymbosi terminales. Species una abortu dioica germine in masculis abortivo, antheris fœminarum effertis. Napæa Sida congener ex D. Cavanilles: petala tamen non obliqua nec pedicellus articulatus & calix præterea basi latior.*

**SIDA**, L. \* **ABUTILON**, T. \* **Calix** 5-fidus simplex. **Antheræ** in apice tubi. **Styli** plures (5-30) basi approximati (raro stylus verè unicus); **stigmata** totidem. **Capsulæ** totidem 1-loculares 1-3-spermæ 2-valves, in unam conniventes. *Frutices aut herbæ, raro arbores; flores axillares aut terminales, pedicellis sub calice quasi articulatis, in articulo solubilibus, observante D. Cavanilles. Ex eodem petala in speciebus 5-10-capsularibus 1-spermis sæpius hinc falcatim & obliquè productiora, in cæteris non item. Capsulæ in S. vesicariâ ejusd. 5-spermæ.*

III. **Stamina** in tubum corolliferum connata, indefinita. **Fructus** simplex multilocularis.

**ANODA**, Cav. \* **SIDA**, L. \* **Calix** 5-fidus simplex. **Antheræ** in apice tubi. **Stylus** 1; **stigmata** plura (10-25). **Capsula** loculis totidem 1-spermis, steliatim dispositis, apice rostratis & divaricatis. *Herbæ; flores solitarii axillares, pedunculis non articulatis. A Sida discrepat præcipuè fructu simplici.*

**LAGUNA**, Cav. \* **Calix** tubulosus 5-dentatus simplex, hinc fissus. **Antheræ** in apice & superficie tubi. **Stylus** 1; **stigma** peltatum. **Capsula** 5-locularis oblonga loculis polyspermis extus 2-valvibus. *Herbæ; folia 3-partita; flores axillares & terminales. Genus dubium & à sequenti vix distinctum.*

**SOLANDRA**, Murr. \* **Calix** 5-fidus simplex. **Antheræ** in apice & superficie tubi. **Stylus** 1; **stigmata** 5. **Capsula** oblonga 5-locularis polysperma, in 5 valvulas medio septiferas solubilis, superstitite receptaculo centrali filiformi. *Herbæ crecta; flores axillares & terminales. An servandum nomen, jam speciei Umbelliferæ & alteri Solanaceæ addictum?*

**HIBISCUS**, L. \* **KETMIA**, T. \* **Calix** 5-fidus aut 5-dentatus caliculo polyphylo (5-30, rarissimè 3) aut multipartito cinctus. **Antheræ** in apice & superficie tubi. **Stylus** 1; **stigmata** 5. **Capsula** formâ varia, 5-locularis 5-valvis, loculis polyspermis, raro 1-spermis. *Frutices aut herbæ; flores axillares & terminales. In H. esculento stigmata 5-10 & capsulæ totidem. Species quædam nervo foliorum præcipuo subtus glanduloso.*

**MALVAVISCUS**, Dill. Cav. \* **HIBISCUS**, L. \* **Calix** tubulosus 10-striatus 5-dentatus, caliculo 8-phylo cinctus. **Petala** con-



voluta, basi hinc auriculata. Antheræ in apice & superficie tubi contorti. Stylus 1; stigmata 10. Bacca 5-locularis 5-sperma. *Frutex; flores solitarii axillares.*

GOSSYPIUM, Bauh. L. \* XYLON, T. \* Coton. Calix cyathiformis punctatus sub 5-lobus, caliculo cinctus majore 3-fido laciniis dentato-cristatis. Antheræ in apice & superficie tubi. Stylus 1; stigmata 3-4. Capsula 5-locularis 5-valvis polysperma, seminibus lanâ involutis. *Arbustula, aut frutices quidam subherbacei; flores axillares. Folia quorundam nervo præcipuo subtus glanduloso.*

I V. Stamina in tubum corolliferum connata definita. Fructus multilocularis.

SENRA, Cav. \* Calix cyathiformis 5-fidus, caliculo cinctus majore 3-phylo. Antheræ circiter 10, stipitatae in apice & superficie tubi. Membrana 4-loba sub germine. Stylus 1; stigmata 5. Fructus (5-locularis?) 10-spermus. *Herba; flores solitarii axillares. Character ex D. Cavanilles.*

FUGOSIA. \* CIENFUEGOSIA, Cav. \* Calix 5-fidus, caliculo cinctus minimo circiter 12-phylo. Antheræ paucae, in mediâ superficie tubi quasi verticillatae. Stylus 1; stigma clavatum. Capsula globosa 3-locularis 3-sperma. *Herba; flores solitarii axillares & terminales.*

PLAGIANTHUS, Forst. \* Calix 5-fidus simplex. Petala à cæteris remota. Tubus apice 12 antheris circiter onustus. Stylus 1; stigma clavatum. Bacca ...? *Character ex Forst. t. 43.*

QUARARIBEA, Aubl. \* Calix coriaceus tubulosus 3-5-dentatus simplex, interdum latere fissus. Petala 5 longa angusta, ex imo calice orta, supra divaricata. Stamina filamenta connata in tubum gracilem longissimum integrum, apice 4-5-glandulosum, subtus 9-andrum antheris sessilibus verticillatis, infra multiglandulosum glandulis pariter verticillatis antherarum æmulis, basi nudum. Stylus longus, tubo staminum vaginatus; stigma 2-lobum exsertum. Capsula coriacea, calice infra cincta ovata 2-locularis 2-sperma, seminibus hinc planis, inde convexis. *Frutex; folia alterna stipulacea stipulis caducis; flores 1-5-axillares, pedunculis 1-floris squamulosis. Character ex Aubl. Guyan. t. 278. An affinium Meliis & Turrae cui similis habitu; an corculum corrugatum?*

V. Stamina basi in urceolum sessilem connata, omnia fertilia, definita aut indefinita.

MELOCHIA, Dill. L. \* Calix 5-fidus simplex. Stamina 5. Styli 5; stigmata 5. Fructus 5-capsularis calice angulato cinctus,



capsulis conniventibus apice 2-rostratis & 2-valvibus 1-spermis. *Frutices aut herbæ; flores axillares & terminales interdum glomerati.*

**RUIZIA**, Cav. \* **KOENIGIA**, Commerf. \* Calix 5-partitus, caliculo 3-phylo deciduo cinctus. Petala oblique falcata. Stamina numerosa. Styli 10 breves; stigmata 10. Fructus parvus globoso-umbilicatus, 10-torosus, 10-capsularis capsulis in unam conniventibus 1-locularibus 2-spermis. *Arbustula aut frutices; flores corymbofo-umbellati axillares & terminales. Character ex Commerfonio & Cavan.*

**MALACHODENDRUM**, Mitch. Cav. \* **STEWARTIA**, L. \* Calix 5-partitus 1-bracteatus. Petala interdum 6 limbo crenulato. Stamina numerosa. Germen 5-fulcatum; styli 5; stigmata 5 capitata. Capsulæ 5 monospermæ. *Frutex; folia alterna non stipulacea; flores magni solitarii axillares extus sericei. Character ex Mitchell apud Catesb. Car. 3. p. 13 & ex D. Cavanilles. Genus Stewartiæ 1-stylæ antea adj. nctum, Gordoniæ affinius. An tamen corculum corrugatum? Fructus in immaturo observatus, an verè 5-capsularis?*

**GORDONIA**, L. \* Calix 5-partitus simplex coriaceus laciniis rotundatis. Petala staminum urceolo infra inserta. Stamina numerosa. Stylus 1; stigmata 5. Capsula parva conica 5-locularis, 5-valvis valvis medio septiferis, loculis 2-spermis; semina foliacea compressa. *Frutices; flores solitarii axillares. Habitus à Malvaceis paulò diversus & stipulæ nullæ, sed corculum lobis corrugatis.*

**HUGONIA**, L. Cav. \* Calix 5-partitus simplex persistens, laciniis 2 exterioribus. Stamina 10. Styli 5; stigmata 5. Bacca globosa pisiformis, foeta nucibus 5 bivalvibus 1-spermis. *Frutices; flores subcorymbofi axillares & terminales. Ramuli H. Myrtacis sæpè gemino instructi cirrho lignoso recurvo corniformi.*

**BOMBAX**, L. \* **CEIBA**, Pl. \* *Fromager.* Calix coriaceus campanulatus 5-lobus simplex. Petala basi juncta & staminum urceolo inserta. Stamina 5 aut plura indefinita. Stylus; stigma capitatum aut 5-fidum. Capsula magna oblonga, cylindrica aut ovata aut turbinata, 5-locularis 5-valvis valvis lignosis, polysperma; semina numerosa densâ lanugine obvoluta, affixa receptaculo columnari centrali. *Arbores cortice trunci nunc inermi interdum suberoso, nunc aculeis maximis lignosis numerosis tecti; folia digitata; flores fasciculati axillares aut racemosi terminales.*

**ADANSONIA**, L. \* *Bacbab du Sénégal.* Calix cyathiformis 5-fidus coriaceus simplex. Petala basi staminum urceolo oblongo inserta. Stamina numerosa, ultra urceolum patentia. Stylus longus intortus; stigmata 10. Capsula maxima ovata lignosa non dehiscens, intus pulposa 10-locularis, dissepimentis membranaceis, loculis polyspermis; semina numerosa reniformia



subossæa pulpâ involuta. *Arbor trunco crassissimo transverse 20-50-pedali; folia digitata; flores solitarii axillares.*

V. Stamina basi in urceolum sessilem connata; sterilia fertilibus intermixta, definita aut rariùs indefinita.

**PENTAPETES, L. \*** Calix 5-fidus coriaceus oblongus simplex. Petala oblonga, calici æqualia. Stamina filamenta basi in tubulum connata, 15 fertilia 5 sterilibus longioribus interjectis quinquies ternata. Stylus 1; stigma crassiusculum. Capsula lignosa, clavato-ovata 5-locularis loculis 2-valvibus polyspermis; semina oblonga compressa, alâ membranaceâ aucta. *Caracter ex Linn. Aman. 1. p. 134. Arborea; folia simplicia stipulacea; flores axillares aut terminales; fructus serè Theobromæ. An corculum corrugatum? Hinc eliminat D. Cavanilles P. phæniceam L. cæteris speciebus nuperiùs adjunctum & Dombeyæ veriùs congenerem calice caliculato, fructu globoso parvo, seminibus non alatis.*

**THEOBROMA, L. \* CACAO, Pl. Aubl. \* Cacaoyer, Cacao.** Calix 5-partitus. Petala imo staminum urceolo inserta, basi concavâ faccata, ultrâ producta in ligulam integram recurvam apice dilatatam. Stamina filamenta 10, basi in urceolum connata, 5 longiora lanceolata sterilia, 5 alterna breviora reflexa fertilia (singula 5-antherifera ex Linn.) antheris in petalorum cavitate reconditis. Stylus 1; stigmata 5. Capsula magna, coriaceo-lignea ovata, 5-angulata & sæpè salebrosa, 5-locularis loculis polyspermis; semina amygdaliformia numerosa in pulpâ nidulantia, receptaculo columnari affixa. *Arbustulæ; folia magna; flores parvi, suprâ ramos fasciculatim sparsi, pedunculis 1-floris. Caracter ex Aubl. Guyan. t. 275-276.*

**ABROMA, Jacq. Murr. \* AMBROMA LS. \* THEOBROMA, L. \*** Calix 5-partitus persistens. Petala basi fornicata (nectarium exterius LS.) & introrsum concava, suprâ ovata magna. Stamina filamenta connata in urceolum (nectarium interius LS.) apice 10-fidum, laciniis 5 brevibus 3-fidis 3-antheriferis, 5 alternis sterilibus erectis linearibus apice recurvato fornicatis. Styli 5 approximati; stigmata 5. Capsula oblonga truncata mucronata, 5-alata 5-locularis suprâ dehiscens polysperma; semina numerosa reniformia receptaculis barbatis utrinque adhærentia. *Frutex; flores (Theobromæ) axillares; fructus Hibisci. Caracter ex Linn. Suppl.*

**GUAZUMA, Pl. \* THEOBROMA, L. \*** Calix 5-partitus. Petala basi concavâ faccata, ultrâ producta in ligulam apice bifurcam. Stamina filamenta 10 in urceolum basi connata, 5 longiora lanceolata sterilia, 5 alterna breviora fertilia 3-anthe-



risera. Stylus 1; stigma 5. Fructus parvus globosus scaber, cortice verrucoso cribriformi lignoso, 5-locularis polyspermus. *Arbor Ulmi facie, inde Orme d'Amérique vernaculè dicta; flores racemosi & axillares & terminales.*

MELHANIA, Forsk. \* Calix 5-partitus caliculo cinctus 3-phyllis. Petala cuneata retusa. Stamina filamenta 10 in urceolum basi connata, 5 longiora sterilia, 5 alterna 1-antherifera. Stylus 1; stigma 5. Capsula globosa 5-locularis 5-valvis, loculis 4-spermis. *Frutex; pedunculi solitarii axillares umbellatim multiflori. Character ex Forsk. An congener Dombeya decanthera Cav. distincta tamen filamentis fertilibus 2-antheriferis; an potius Melhania Dombeyæ addenda?*

DOMBEYA, Cav. \* STEWARTIA, Commerf. \* Calix 5-partitus caliculo cinctus 3-phyllis, lato aut angusto, deciduo. Stamina filamenta 20, basi in urceolum corolliferum connata, 5 longiora sterilia, 15 fertilia 1-antherifera sterilibus ternatim alternantia. Stylus 1; stigma 5. Fructus globosus aut turbinate, torosus, 5-capsularis capsulis in unam conniventibus, 1-locularibus 2-valvibus, mono aut polyspermis. *Arbustulae aut frutices; flores corymboso-umbellati axillares & terminales; petala quorundam hinc oblique falcata, plurimorum marcescentia. Character ex Commerf. herb. Borb., & ex D. Cavanilles qui Pentapetem phæniceam L. caractere similem hinc retulit. D. punctata fortè abortu dioica. D. decanthera filamentis tantum 10 instruitur, 5 sterilibus, 5 brevioribus 2-antheriferis, inde Melhaniae proxima.*

ASSONIA, Cav. \* KOENIGIA, Commerf. \* Calix 5-partitus, cinctus foliolo laterali 3-lobis. Petala oblique falcata. Stamina Dombeyæ, sterilia fertilibus breviora. Styli 5; stigma 5. Fructus globosus umbilicatus 5-capsularis capsulis conniventibus 1-locularibus 2-spermis. *Arbustula Borboniensibus dicta Bois de senteur bleu; flores corymbosi axillares & terminales; petalorum basis marcescens. Character ex Commerf., & ex D. Cavanilles qui plerasque descripsit delineavitque Malvaceas in sextuplici de generibus monadelphis dissertatione.*

BYTTNERIA, L. \* Calix simplex 5-fidus patens. Petala basi arcuato-inflexa concava, supra 3-loba lobo intermedio in ligulam filiformem integram longam producta. Stamina urceolus brevis margine 10-dentatus, dentibus 5 nudis, 5 biantheriferis petalorum basi concavâ tectis. Germen sessile urceolo cinctum; stylus 1; stigma 5-gonum. Fructus globosus echinatus, 5-capsularis capsulis arcuè conniventibus, intus dehiscentibus & 1-spermis. *Frutices aculeati, ramis sæpè angulatis, interdum samentosis; nervus foliorum medius in quibusdam subtus basi glandulosus aut tumidus; flores axillares.*



VI. Stamina basi in urceolum germini arctè circumpositum & cum ipso stipitatum connata, plerumque definita & fertilia.

**AYENIA**, L. \* Calix 5-partitus simplex. Petala imo stipiti inserta, ungue filiformi longo arcuatim incurva, superius latiora & in planam conniventia stellulam quam superant 5 glandulæ minimæ pedicellatæ, singulæ in summo petalo mediæ. Staminum urceolus stellulâ petalinâ obiectus, margine 10-dentatus, dentibus alternis obtusis, alternis filiformibus monandris. Germen stipitatum; stylus 1; stigma sub5-lobum. Fructus globosus parvus muricatus 5-capsularis capsulis conniventibus 2-valvibus 1-spermis. *Suffrutices minimi; flores minimi axillares, pedunculis 1-floris. Corculum corrugatum.*

**KLEINHOVIA**, L. Cav. \* Calix 5-partitus simplex. Petala imo stipiti inserta, lanceolata, supremo latiore fornicato. Staminum urceolus minimus 5-fidus (10-fidus 10-ander ex Linn.), singulis laciniis 3-antheriferis. Germen stipiti longo insidens; stylus 1; stigma crenulatum. Capsula (Cardiospermi) membranacea vesicaria turbinata 5-gona 5-locularis 5-valvis, loculis 1-spermis; semina globosa. *Arbuseula; flores paniculati axillares & terminales minimi. Character ex Linn. & Cavan. Corculum corrugatum. An Kleinhovia aut Helicteri affinis Glatta.*

**HELICTERES**, L. \* **ISORA**, Pl. \* Calix simplex tubulosus coriaceus, extus tomentosus, 5-fidus inæqualis. Petala imo stipiti inserta, plerumque longa & ligulata, basi attenuata in unguem filiformem calici subæqualem, suprâ 2-dentatum aut rarius fimbriatum. Staminum urceolus nunc oblongus suprâ multifidus laciniis numerosis antheriferis, nunc 10-15-partitus, laciniis 5 sterilibus squamiformibus germini appressis, filamentis 5-10 monantheris solitariè aut geminatim interjectis. Germen stipiti longissimo insidens, 5-fulcatum; stylus 1 subulatus; stigma sub5-fidum. Fructus ovatus aut oblongus 5-capsularis, capsulis arctè conniventibus, in spiram mutuò complexis aut rarius rectis, 1-locularibus polyspermis, intus dehiscentibus. *Arbuseulæ tomentosæ; pedunculi axillares pauciflori; corculum certè corrugatum. H. Iforam Aubletius dicit 6-andræam 5-stylam.*

**STERCULIA**, L. \* **IVIRA**, Aubl. \* Calix coriaceus 5-partitus. Petala 0. Staminum urceolus patens, villosus aut lævis, 5-dentatus dentibus 2-3-antheriferis. Germen 5-striatum stipiti longo insidens; stylus 1 subulatus; stigma sæpè sub5-lobum. Fructus rudimento urceoli fimbriato infrâ cinctus, dehiscens in capsulas 5 (aut pauciores quibusdam abortivis) divaricatas aut & reflexas, coriaceas reniformes aut leguminiformes, singulas pedicellatas 1-loculares polyspermas, futurâ interiore dehiscentes marginibus seminiferis, intus sæpè villoso-prurientes. *Ca-*



*radler ex Aubl. Guyan. t. 279 & ex D. Cavanilles. Arbores; folia simplicia aut digitata, stipulis caducis; flores paniculati terminales divisuris bracteatis. Monoicam dixit Linnaeus, quia stipes diu solis terminatur antheris in globum compactis, germine tardius prodeunte aut quandoque abortivo Helicteri affinis sed apetalâ: hujus ergo congener Helicteres apetalâ Jacq., ut & Culhamia Forsk. eadem ex D. Vahl cum S. platanifoliâ LS. Capsulâ S. Balanphas gelatinâ per rimam exsudante tumentes. An corculum corrugatum?*

## VII. Genus Malvaceis affine.

**PACHIRA**, Aubl. \* **CAROLINEA**, LS. \* Calix tubulosus, limbo truncato sub 5-dentato. Petala 5 longissima, imo calici inserta, in tubum basi conniventia, supra patentia. Stamina filamenta numerosa, basi connata in tubum longum apice 15-partitum, laciniis 10-11 partitis, lacinulis 2-partitis, divisuris omnibus filiformibus longis, ultimis monandris; antheræ (300-320) oblongæ erectæ. Germen (inferum ex LS.) simplex superum; stylus 1 longissimus; stigmata 5. Capsula magna (Theobromæ) ovata sulcata 1-locularis (2-locularis ex Linn.) multivalvis valvis coriaceis, polysperma feminibus angulatis rufescentibus. *Arbor; folia alterna digitata stipulacea; flores solitarii axillares maximi; semina (cotyledonibus plicatis ex LS.) esculenta. Character ex Aubl. Guyan. t. 291-292. An Carolina LS. Pachira verè congener?*

**Obs.** Malvaceæ inter ordines verè naturales & facilè definiendos annumerandæ. Affines Geraniis habitu & staminum monadelphîâ & petalorum numero ac situ, discrepant corculo corrugato, staminibus sæpè numerosis, capsulis aliter stylo annexis, foliis semper alternis & pedunculis non oppositifoliis. Flos à Tournefortio dictus in plurimis monopetalus, ab aliis rectius polypetalus habetur, quia petala basi juncta inhærent potius (p. 230) staminum tubo quàm sibi invicem; insuper in congeneribus omninò distincta sunt, nec dantur in his pseudo-monopetalis omnes cæteri characteres corollæ monopetalæ comites. An autem stamina verè sub pistillo, an potius imo calici inhæreant, inter Autores ambigitur. Hæc tamen potius hypogyna videntur tum ex observatis tum analogiâ confirmante: talia enim certè extant in generibus urceolo stipitato instructis, quæ licet à cæteris paululum dissimilia, ab his tamen dimoveri nequeunt, utpotè pariter stipulacea & in urceolo ac corculo conformia. Cuticula stipitis exterior fortè habenda pro staminum tubo supra in urceolum dilatato & stipitem vaginante, sed cum ipso concreta nec acu divellenda. Simili stipite & urceolo 5-partito 5-andro instruitur Passiflora indè Malvaceis affinis, sed dispar stylo triplici & fructu simplici uniloculari & corollâ multipartitâ & præcipuè corculo intrâ perispermum carnosum recto. Hæc corculi structura Tiliaceas etiam ab iisdem repellit, licèt habitu & quibusdam signis similes.



## ORDO XV.

## MAGNOLIÆ, LES MAGNOLIERS.

**CALIX** definitè polyphyllus, interdum bracteatus. Petala plerumque definita, verè hypogyna. Stamina numerosa distincta, ibidem inserta; antheræ filamentis adnatæ. Germina plura definita, aut indefinita, receptaculo communi imposita; styli totidem aut nulli; stigmata totidem. Capsulæ aut baccæ totidem uniloculares mono aut polyspermæ, quandoque in fructum unicum coalitæ. Corculum seminis rectum absque perispermo. Caulis frutescens aut arborescens. Folia alterna, plerumque integra, juniora stipulis cincta ramulos vaginantibus, Ficuum more convolutis in cornu gemmam terminalem fovens, mox tamen caducis superstitite earundem vestigio circulari. Flores terminales aut axillares,

**EURYANDRA**, Forst. \* Calix 5-phyllus. Petala 3. Stamina antheræ didymæ, adnatæ filamentis apice dilatatis. Germina 3; styli 3; stigmata 6. Folliculi 3 divaricati, intus dehiscentes polyspermis. *Planta scandens. Character ex Forst. t. 41.*

**DRYMIS**, Forst. \* Calix 3-lobus deciduus. Petala 6-12 majora. Antheræ didymæ, filamentis apice incrassatis adnatæ. Germina 4-8; styli 0; stigmata 4-8. Baccæ 4-8 subsessiles, 2-4-spermæ. *Arbores Lauri facie, cortice aromatico; flores 1-3 axillares. Character ex Forst. t. 42 & L. Suppl.*

**ILLICIUM**, L. \* *Badiane*. Calix 6-phyllus, foliolis 3 intimis angustioribus alternis & petaloideis. Petala 27, triplici ordine, interiora breviora. Antheræ 30 oblongæ. Germina circiter 20; styli 20; stigmata 20, in summis stylis lateralibus. Capsulæ totidem in stellam dispositæ, 2-valves 1-spermæ, seminibus nitidis. *Character ex Linnæo. Arbores Lauri facie, cortice aromatico; flores axillares. Ex Kämpferi descriptione calix I. anisati concluditur 4-phyllus, corolla 8-petala 8-andra, germina 20, capsulæ 8 superstites cæteris abortivis.*

**MICHELIA**, L. Lamark. \* *Champac de l'Inde*. Calix Magnoliæ. Petala 15, exteriora majora. Antheræ numerosæ longæ, filamentis intus adnatæ. Germina numerosa axi centrali oblongo



imposita, quasi spicata; stigmata totidem, stylis nullis. Capsulæ totidem axi elongato quasi racemosæ, subbaccatæ globosæ, extus punctatæ, semibivalves 1-loculares 3-7-spermæ. *Arbuseula; folia magna; flores solitarii axillares, magni odori. Character ex D. Lamark.*

**MAGNOLIA**, L. \* *Magnolier*. Calix 3-phyllus corollæformis deciduus, bractea cinctus membranaceâ hinc fissâ & fugaciore. Petala 9. Antheræ numerosæ longæ, filamentis utrinque adnatæ. Germina numerosa axi centrali clavato imposita; totidem styli brevissimi & stigmata villosa. Capsulæ totidem in strobilum dense compactæ persistentes compressæ acutæ 2-valves 1-loculares 1-spermæ; semina ossea, baccata seu arillata, ex dehiscente capsulâ filo pendentia. *Arbores; folia magna; flores axillares maximi odori.*

**TALAUMA**. \* **MAGNOLIA**, Pl. \* Calix, petala, stamina & fortè germina Magnoliæ. Fructus strobiliformis magnus ovatus, extus squamosus squamis crassis granulatis suberosis persistentibus, intus ligneus durus plurimis in ambitu loculis 1-spermis excavatus fortè non dehiscentibus, quibusdam abortivis. *Arbor; folia magna coriacea; flores solitarii terminales maximi odoratissimi. Character floris ex Plum. mss. vol. 6 & icone 90 à Burmanno non editâ, fructus ex eodem & ex sicco. In herbario Suriani nunc meo Talauma dicitur.*

**LIRIODENDRUM**, L. \* *Tulipier*. Calix 3-phyllus corollæformis deciduus, bractea 2-phyllâ deciduâ cinctus. Petala 6 in campanam conniventia. Antheræ numerosæ longæ, filamentis utrinque adnatæ. Germina numerosa, in conum digesta; stigmata totidem globosa, stylis nullis. Capsulæ totidem, basi tumidæ 1-2-spermæ non dehiscentes, apice in squamam planam lanceolatam attenuatæ, supra axim subulatum dense imbricatæ, deciduæ. *Arbores; folia magna, in L. Tulipiferâ 3-loba lobo medio truncato; stipulæ latiores, tardius deciduæ; flores solitarii terminales, tulipæformes.*

**MAYNA**, Aubl. \* Calix 3-partitus. Petala 8. Stamina circiter 30, antheris oblongis 4-gonis apice crassioribus. Germina nulla... *Frutex; folia magna stipulacea, stipulis deciduis; flores parvi, plurimi axillares, odori. Genus fortè dioicum, semina nondum detectâ. Character ex Aubl. Guyan. t. 352.*

### Genera Magnoliis affinia.

**DILLENIA**, L. \* Calix 5-phyllus persistens foliolis subrotundis coriaceis. Petala 5 subrotunda magna. Stamina numerosa; antheræ longæ, filamentis adnatæ. Germina circiter 20, intransum connexa; stigmata totidem stylis nullis, in stellam simul patentia. Capsulæ totidem oblongæ, applicitæ recepta-



culo centrali magno pulposo, & intus foventes aut obtegentes femina numerosa minima in pulpæ superficie nidulantia. *Arbores*; *folia coriacea magna*; *flores axillares aut terminales*, interdum *maximi*; *fructus ferè Clusæ*. *An Magnoliis minùs affinis & Guttiferis propior licèt alternifolia?*

**CURATELLA**, Loëfl. L. Aubl. \* Calix 4-5 partitus persistens, laciniis rotundatis quarum 1 interior petaliformis. Petala 4-5 calici similia. Stamina numerosa (hypogyna ut & petala ex Aubl.); antheræ subrotundæ. Germina 2 hirsuta; styli 2; stigmata 2. Capsulæ 2 basi junctæ, minimæ sphaericæ hirsutæ, 1-loculares 2-spermæ, tardius 2-valves. *Arbustula*; *folia alterna magna asperima (stipulacea?)*; *flores racemosi*, ex foliorum jam antè deciduorum axillis orti, *divisuris racemi 2-bractæatis*. *Caracter ex Loëfl. & Aubl. Guyan. t. 232. Habitus à Magnoliis diversus*; *calix perennior ut & stamina*, *antheræ non similes*, *stamina non certò hypogyna*, *stipulæ fortè nullæ*, *ignota corculi structura*. *An affinior Tetracæ & Rosaceis, an potiùs Ranunculaceis?* *Nodum solvet staminum & corculi situs determinatus.*

**OCHNA**, L. \* **JABOTAPITA**, Pl. \* Calix 5-partitus persistens. Petala 5 unguiculata patentia. Stamina numerosa conniventia; antheræ subrotundæ. Germen desinens in stylum subulatum; stigma 1. Receptaculum carnosum subsphaericum tectum baccis 2-5 distinctis subrotundis semiimmerfis 1-spermis. *Caracter ex Linnæo. Arbustula*; *folia alterna stipulacea*; *flores spicati aut paniculati terminales*. *Speciem geminam Madagascariensem Sophistesques nomine memorat Commerçonius*, *alteram polyandram filamentis longis persistentibus antherisque brevibus 10-carpam corculo seminum recto*, *alteram 10-andram antheris longis erectis subsessilibus caducis 5-carpam*, *utramque præterè 1-stylum & Ochne similem*. *Genus ergò aliter definiendum collatis aliis speciebus*, *stylo simplici diversum à Magnolis & Anonis*, *habitu fortè similis Hirtellæ & Rosaceis*. *An stamina verè hypogyna?*

**QUASSIA**, L. \* **SIMAROUBA**, Aubl. \* *Quassi*, *Simarouba*. *Monœica*. Calix parvus 5-partitus. Petala 5 lanceolata, multò majora, sub disco hypogyno inserta. *MASC.* Stamina 10 eidem disco imposita, filamentis longis basi intus squamulâ instructis; antheræ oblongæ incumbentes. Germen sterile. *FÆM.* Germen 5-lobum disco impositum & squamulis 10 cinctum; stylus unicus; stigma sub5-fidum. Capsulæ 5 olivæformes laterales distantes subcarnosæ 1-spermæ. *Caracter Simaroubæ ex Aubl. Guyan. t. 332*, *cui convenit Quassia certè 10-squamulosa & non hermaphrodita*. *Arbores amaræ cortice lactescente*; *folia alterna, non stipulacta, abruptè pinnata, foliolis in Quassiâ oppositè 3-4-jugis rachi marginatâ, in Simaroubâ alternè 2-9 jugis rachi nudâ*; *flores paniculati axillares & terminales divisuris bractæatis*, *in Quassiâ dioici ex Murrayo*. *Genus Ochne affine stylo simplici & fructu multiplici*, *affinior fortè Guayaco & Rutaceis.*



*Obs.* Ordinis caracter facilis & habitus proprius, idem tamen in Ficu & Artocarpo & congeneribus quibus similis foliorum & stipularum dispositio. Sed in his receptaculum commune floribus monogynis apetalis obtegitur, in illo germinibus numerosis intra florem unicum polypetalum. Magnoliæ utpotè polygynæ & alternifoliæ hinc Malvaceis pariter stipulaceis, inde Anonis accedunt, ab utrisque tamen corculo discrepantes.

---

## O R D O X V I.

## A N O N Æ , L E S A N O N E S.

**CALIX** brevis trilobus persistens. Petala sex, quorum tria exteriora calicem interiorem æmulantia. Stamina numerosa, antheris subsessilibus receptaculum hemispharicum obtegentibus, subtetragonis, apice latioribus. Germina numerosa, receptaculo medio imposita, confertissima, vix ab antheris distincta & iisdem quasi obtecta; styli totidem breves aut subnulli; stigmata totidem. Baccæ aut capsulæ totidem mono aut polyspermæ, nunc distinctæ sessiles aut stipitatae & receptaculo communi impositæ, nunc coadunatae in fructum unicum pulposum, numerosis sub cortice excavatum loculis monospermis. Membrana seminum exterior coriacea, interior membranacea transversim pluriès intus plicata, plicis innumeros distinguuntibus lobulos transversos seminis seu perispermii magni solidi, in cujus hylo corculum minimum. Caulis arborescens aut frutescens; rami & ramuli alterni cortice sæpiùs reticulato. Folia alterna simplicia integra non stipulacea. Flores axillares.

**ANONA**, L. \* **GUANABANUS**, Pl. \* *Anone*, *Corossol*, *Cachiment*.

Petala 3 interiora minora. Germina concreta in unum stigmatibus numerosis tectum. Bacca unica ex pluribus concreta, cortice muricato aut squamoso aut reticulato aut rariùs lævi, intus pulposa, ad ambitum multilocularis loculis 1-spermis.

**UNONA**, LS. \* Petala basi intus excavata & in urceolum conniventia. Germina distincta; styli circiter 10. Baccæ distinctæ ovatae, umbellatim divergentes, 2-spermæ semine uno suprà alterum, *Character ex Linn. Suppl.*



**UVARIA**, L. \* Petala parentia. Germina numerosa. Baccæ totidem distinctæ globosæ pedunculatæ polyspermæ. *Character ex Linneo. Baccæ U. Zeylanicæ Aubl. t. 243 & Funis Musarii Rumph. 5. t. 42 siliq æformes cylindricæ 2-3-4-torsæ, in singulo torulo 1-spermæ, quas Unona LS. sibi potius vindicat quàm Uvaria. Baccæ U Japonicæ sessiles 2-spermæ ex Kämpfero : indè genus aliter posthac definiendum.*

**CANANGA**, Aubl. \* Petala parva. Germina numerosa. Capsulæ aut baccæ totidem ovatæ stipitatæ 1-spermæ. *Character ex Aubl. Guyan t. 244. Congener fortè Uvaria longifolia Sonner. Ind. 2. p. 233. t. 131, ut & Aberemoa Aubl. t. 245 cujus baccæ majores brevius stipitatæ.*

**XILOPIA**, L. Aubl. \* Petala parva, exteriora latiora. Germina 2-15. Capsulæ totidem subsessiles compressæ coriaceæ 2-valves 1-loculares 1-2-spermæ. *Character ex Aubl. Guyan. t. 242.*

*Oss.* Anonæ Magnoliis simillimæ flore polyandro fructuque polygyno & antea iisdem coordinatæ, dissentiunt stipularum defectu, calice trilobo, petalis semper senis, antheris sessilibus & præcipuè structurâ seminis. Organum amygdaliforme non tamen bipartitendum & transversim pluriès sulcatum, pro vero habetur semine à plurimis, sed Adansonio teste diversum est à corculo superius posito. Corculum autem in vivo recognoscendum evanescit in sicco, indè mihi prætervisum. Accedunt Anonis Menisperma sequentia pariter polygyna & perispermio instructa, sed eodem non sulcato & staminibus definitis distincta. An duplex tantum in ordine genus admittendum, alterum monocarpum, alterum polycarpum?

## ORDO XVII.

### MENISPERMA, LES MENISPERMES.

**CALIX** definitè polyphyllus. Petala definita calicî opposita; squamulæ in quibusdam totidem interiores petalis oppositæ. Stamina definita, petalis numero æqualia & iisdem opposita. Germina plura definita, styli & stigmata totidem. Fructus totidem baccati aut capsulares reniformes monospermi, semine conformi, plures sæpè abortivi, unico superstite. Corculum plenum parvum lobis tenuibus, in apice perispermi carnosius multò majoris incurvi. Caulis frutescens, plerumque sarmentosus; folia alterna simplicia non



stipulacea ; flores axillares aut terminales , sæpè fasciculatim spicati aut racemosi fasciculis unibracteatis , sæpiùs abortu declines.

**CISSAMPELOS** , L. \* **CAAPEBA** , Pl. \* Dioïca. Calix o. Petala 4 patentia. MASC. Stamina 4 , antheris brevibus , filamentis in unicum coalitis , è medio floris disco membranaceo rotato exsertum breve. FÆM. Germen minimum , margine laterali membranaceo extrorsum dilatato ; styli 3 breves ; stigmata 3. Bacca 1-sperma semine rugoso compresso. *Caracter ex Linnæo. Flores axillares minimi , præ tenuitate difficillimè observandi ; masculi racemosi , pedunculis in racemo corymbiferis tenuibus , pluribus basi simul 1-bracteolatis ; fæminei ( apetalii ex Linn. ) spicati , spicâ crassiore è fasciculis 1-bracteatis compositâ ; fructus Menispermii & habitus idem. An indè genera conformia & similiores cæteri utriusque caracteres ; an calix idem , sed vix conspicuus ; an germen triplex stylo triplici prænuntiatum , unico persistente suprâ pedunculum obliquè infixum ?*

**MENISPERMUM** , T. L. \* *Menisperme*. Calix 6-phyllus extus 2-bracteatus , interdum numero varius. Petala 6 apice crassiuscula. Stamina 6. Germina 3-6 ; styli & stigmata 3-6. Baccæ totidem compressæ reniformes , unicâ sæpè superstitæ. *Flores spicati aut racemosi , suprâaxillares aut terminales , singuli bracteati. Caracter fructûs ex siccis , floris ex M. Virginico in hortis botanicis vegeto , sed antheris aut germinibus effætis non frugifero. Indè genus dioïcum ex Linnæo qui in M. Canadensi describit calicem 2-phyllum , petala 4 exteriora & 8 interiora , stamina maris 16 fertilia & fæminæ 8 sterilia , germina 2 & baccas totidem. M. Virginici omninò congener Cebatha Forsk. caractere simillima omittit tamen bracteis , & verè dioïca 3-gyna , nullo in masculis floribus germine , in fæmineis stamine. Congener etiam Calumbra Commers. distincta fructu olivæformi hurto , flore pariter non bracteato & forsàn hermaphrodito. Caracter corculi in M. cocculo præcipuè observatus , analogiâ prænuntiatum in cæteris.*

**LEÆBA** , Forsk. \* Dioïca. MASC. Calix 5-phyllus patens , foliolis 2 exterioribus minimis. Petala 3 calice majora. Squamæ 6 interiores. Stamina 6 , squamis opposita & iisdem convolutis basi cincta. FÆM. . . . *Caracter ex Forskalio qui flores fæmineos non vidit. An mutato partium nomine idem cum Menispermum caracter ?*

**EPIBATERIUM** , Forsk. \* Monoïcum. Calix duplex uterque deciduus , exterior 6-phyllus minimus , interior 3-phyllus multò major. Petala 6 , calice interiore minora. MASC. Stamina 6 ( petalis opposita in icone Forst. ) ; antheræ subrotundæ. FÆM. Germina 3 ; styli & stigmata 3. Drupæ 3 subglobosæ , stylo mucronatæ , foetæ nuce reniformi compressa 1-sperma. *Planta scandens. Caracter ex Forst. Austr. t. 54.*



ABUTA, Aubl. \* Calix .... Petala .... Stamina .... Germina ....  
 Baccæ 3 magnæ, ovatæ exsuccæ subcompressæ, foetæ testâ  
 fragili 1-spermæ. *Frutices scandentes alterrifolii; fructus racemosi*  
*axillares; cætera non observata. Character ex Aubl. Guyan. t. 250-251.*  
*Paireiræ species ex eodem. Affinis certè præcedentibus & caractere non*  
*plurimum dissimilis, fortè dioica 6-andra & plus quàm 3-gyna.*

Oss. Ordo naturalis sed in caractere & partium nomine refo-  
 mandus, postquam eæ in vivis certius innotuerint. An admittendæ  
 squamulæ interiores, an potius squamulis in petala conversis calix  
 duplicatus? Intereâ staminum definitorum cum petalis aut squamulis  
 oppositio, ab Anonis polyandris discernit omninò Menispermata, indè  
 proxima Berberidibus eadem oppositione designatis. Sed Menispermis  
 germen multiplex, fructus monospermi, perispermum incurvum, cor-  
 culum superum parvum; Berberidibus autem germen simplex, fructus  
 polyspermus, perispermum rectum corculo longiori circumpositum,  
 & antherarum structura diversa.

## ORDO XVIII.

### BERBERIDES, LES VINETTIERS.

CALIX definitè polyphyllus aut partitus. Petala de-  
 finita, calicinis foliolis numero æqualia & iisdem sæpè  
 opposita, nunc simplicia, nunc basi aucta petalo in-  
 teriore. Stamina definitiva, totidem quot petala, iisdem  
 opposita; antheræ filamentis adnatæ, à basi ad apicem  
 valvulâ dehiscentes. Germen simplex; stylus unicus  
 aut nullus; stigma sæpè simplex. Bacca aut capsula  
 unilocularis, sæpè polysperma, seminibus imo lo-  
 culo affixis. Corculum descendens planum, peri-  
 spermo carnosio cinctum. Caulis frutescens aut her-  
 baceus. Folia plerumque alterna, stipulacea aut sæpius  
 nuda, simplicia aut composita.

BERBERIS, T. L. \* *Vinettier, Epine-Vinette.* Calix 6-phyllus  
 extus 3-bracteatus. Petala 6, ungue intus 2-glanduloso, ca-  
 licinis foliolis opposita. Stamina 6. Stylus 0; stigma latum orbi-  
 culatum. Bacca parva, ovata aut rarius subsphærica, 1-locularis  
 2-3-sperma. *Frutices; folia alterna, sæpè alternatim fasciculata,*  
*fasciculo squamis imbricatis basi cincto & subtus spinâ simplici aut*  
*partitâ plerumque stipato; flores è medio fasciculo spicati, aut ra-*  
*rius subcorymbosi solitarii ut in Magellanica Commerc., pedicellis*



*basi 1-bracteolatis. Stamina filamenta glandulis petalorum implicita elasticè solvuntur.*

**LEONTICE**, L. \* **LEONTOPETALON**, T. \* Calix 6-phyllus caducus. Petala 6 calici opposita; squamulæ 6 interiores, petalorum unguibus insertæ. Stamina 6. Stylus brevis, obliquè germini insertus; stigma 1. Capsula vesicaria subbaccata globoso-acuminata, 1-locularis 3-4-sperma seminibus globosis. *Herbæ; folia alterna, pinnata aut 1-2-3-ternata, petiolo communè infra dilatato semivaginate; flores laxissimè paniculati terminales, divisuris 1-bracteatis. An congener L. Leontopetaloides ex Linneo monopetala?*

**EPIMEDIUM**, T. L. \* Calix 4-phyllus patens caducus, foliolis 2 basi 1-bracteolatis. Petala 4 patentia calici conformia & eidem opposita, singula petalo interiore calceiformi discolorè aucta. Stamina 4. Stylus 1, è summo germine lateralis; stigma 1. Silicula oblonga 1-locularis 2-valvis polysperma. *Herba caule simplici, propè radicem squamis cincto, supernè trichotomo foliato, subius ad nodum florifero; folia ex trichotomiâ 2-3-ternata divisuris villosis; florum panicula lateralis laxa, basi nuda, divisuris 1-bracteolatis.*

**RINOREA**, Aubl. \* Calix 5-partitus. Petala 5 longiora, ad unguem aucta petalo interiore minore. Stamina 5, petalorum unguibus inserta. Stylus 1; stigma 1. Fructus... *Arbusecula ramis alternis; folia alterna, stipulacea stipulis caducis; flores racemosi axillares & terminales, pedicellis 1-floris basi 2-squamosis. Character ex Aubl. Guyan. t. 93.*

**CONORIA**. \* **CONOHORIA**, Aubl. \* Calix 5-partitus. Petala 5 basi conniventia & aucta petalo interiore minore, apice patentia. Stamina 5, petalorum interiorum unguibus inserta; antheræ subsessiles (an à basi ad apicem dehiscentes?). Stylus 1; stigma 1. Fructus... *Frutex apice ramosus ramis nodosis; folia opposita (stipulacea?); flores spicati, spicæ basi squamulosæ, pedicellis 1-floris infra 1-bracteatis & medio 2-squamulosis. Character ex Aubl. Guyan. t. 95.*

### Genera Berberidibus affinia.

**RIANA**, Aubl. \* Calix 5-partitus. Petala 5, basi conniventia; limbo revoluta; squamulæ 5 hypogynæ, petalis interiores & alternæ, minores. Stamina 5, squamularum unguibus inserta; antheræ subsessiles. Germen 5-striatum; stylus incrassatus; stigma clavatum. Capsula oblonga 1-locularis 3-valvis valvis compressis medio 3-spermis. *Frutex ramosus; folia opposita stipulacea; flores spicati terminales, in spicâ alterni, pedicellis 1-floris basi 4-bracteolatis. Character floris ex Aubl. Guyan. t. 94, fructus ex sicco. An congener Passloura Aubl. t. 380, fructu*



*simillima & pariter oppositifolia ; an squamulae verè petalis alternæ ?*

**CORYNOCARPUS**, Forst. LS. \* Calix 5-phyllus. Petala 5... ; squamulae 5, petalis alternæ, minores petaliformes, basi intus glandulosæ. Stamina 5, unguibus petalorum inserta ; antheræ oblongæ. Stylus 1 ; stigma 1. Nux turbinato-clavata 1-sperma. *Frutex ? ... ; folia alterna ; flores paniculati terminales. Character ex Forst. t. 16, & ex Linn. Suppl.*

**PORAQUILIBA**, Aubl. \* Calix minimus 5-dentatus. Corolla hypogyna 5-partita, laciniis oblongis apice & basi concavis, foveâ superna geminâ, infernâ ternatâ. Stamina 5 hypogyna, laciniis opposita & in eorundem foveis recepta, filamentis latis emarginatis, antheris articulatis longis 4-gonis quasi 4-alatis. Stylus 1 ; stigmata 3. Fructus... *Arbor ; folia alterna ; flores spicati axillares parvi. Character ex Aubl. Guyan. t. 47, in vivo recognoscendus. An corolla verè 1-petala, & genus Mæse Ericisque affine ?*

**HAMAMELIS**, L. \* Calix 4-fidus extus 2-squamosus. Petala 4 longa ligulæformia (hypogyna ?), laciniis calicinis alterna, ungue intus 1-squamuloso. Stamina 4, petalis alterna ; antheræ 2-loculares subrotundæ filamento brevi adnatæ, utrinque 1-valves valvâ operculæformi penès liberâ. Germen desinens in stylos 2 breves ; stigmata 2. Capsula coriacea, calicis basi persistente semicincta & quasi semiinfera, 2-ocularis apice 2-valvis valvis 2-fidis, foeta arillis 2 coriaceis 1-spermis oppositè & elasticè suprâ 2-valvibus ; semina oblonga nitida, hylo superiore ; corculi plani perispermo carnofo cincti radícula descendens, hylo adversa. *Arbusculæ habitu Alni ; folia alterna stipulacea ; involucri quædam glomerata axillaria sessilia, singula 3-phylla & 3-flora. Petalorum squamulae staminibus sterilibus sæpe similes. Ex Linn. Mant. petala interdum 0, & flores abortu monoici aut dioici. Antherarum dehiscendi modus cum Lauris & Berberidibus constituit ex Bern. Jussæo affinitatem diverso staminum situ infirmatam.*

**OTHERA**, Thunb. \* Calix 4-partitus persistens. Petala 4... Stamina 4, imis petalis inserta, breviora. Stylus 0 ; stigma sessile. Capsula... *Frutex ; folia alterna integra coriacea ; flores aggregati axillares pedunculati. Character ex Thunb. Jap. Huc relata ob stamina petalis opposita.*

**RAPANEA**, Aubl. \* Calix parvus 5-6-fidus. Corolla hypogyna 5-6-partita. Stamina 5-6, imis corollæ laciniis opposita ; antheræ 4-gonæ. Stylus brevissimus ; stigma 1. Bacca pisiformis 5-6-sperma, semine 1 sæpius superstiti. *Frutex apice ramosus ; folia alterna coriacea integerrima ; flores in ramis & ramulis conferti subsessiles. Character ex Aubl. Guyan. t. 46. Confer cum Otherâ. An affiniior Rhamnis aut Sapotis ; an corolla verè 1-petala ?*

OBS.



OBS. Mutua staminum & petalorum oppositio, antheræ à basi ad apicem dehiscentes, germen simplex, corolla polypetala definiunt ordinem inde distinctum à cæteris. Discedunt Menispermata gemine multiplici & antherarum structurâ dissimili. Lauri antherarum structurâ conformes (p. 80) dissentiunt corollæ defectu. Genera hæc adjecta, quibusdam signis affinia, quibusdam etiam extranea.

## ORDO XIX.

## TILIACEÆ, LES TILIACÉES.

**CALIX** polyphyllus aut multipartitus. Petala definita distincta (in Sloaneâ nulla), laciniis aut foliolis calicinis alterna & plerumque numero æqualia. Stamina sæpius indefinita & distincta. Germen simplex; stylus sæpè unicus, rarò multiplex aut nullus; stigma simplex aut divisum. Fructus baccatus aut capsularis, plerumque multilocularis loculis mono aut polyspermis, valvis capsularum medio septiferis. Corculum feminis planum perispermo carnosio cinctum. Caulis arborescens frutescensve aut rarò herbaceus. Folia alterna simplicia stipulacea.

I. Stamina basi aut omninò monadelphica, definita.  
*Tiliaceæ dubiæ.*

**WALTHERIA**, L. \* Calix turbinatus 5-fidus, caliculo 3-phyllis semicinctus. Petala 5. Stamina 5, filamentis omninò coalitis in tubum basi corolliferum, apice 5-dentatum dentibus antheriferis. Stylus 1; stigmata plura. Capsula membranacea 1-locularis 1-sperma. *Frutices; folia alterna simplicia stipulacea, tomentosa; flores glomerati sessiles, sæpius axillares, lutei. Corculum planum perispermo carnosio tectum; inde genus Tiliaceis affine licet monadelphum & definitè staminiferum. Duplici hoc signo Malvaceis pariter monadelphis accedit, ab iis tamen distinctum corculo non corrugato, fructu 1-spermo & tubo staminum non columnari ut in Malvâ, nec urceolari ut in Melochiâ; inde nulli horum sectioni potissimè tribuendum. W. ovatæ Cav. stamina basi tantum monadelphia.*

**HERMANNIA**, T. L. \* Calix campanulatus 5-fidus. Petala unguibus utroque margine in tubum convolutis, basi conniventia. Stamina 5, filamentis latioribus utrinque marginatis, basi in annulum brevem coalitis; antheræ sagittatæ conniventes. Styli 1.



in unum approximati; stigmata 5 pariter juncta. Fructus parvus 5-gonus 5-locularis 5-valvis, valvis medio septiferis, loculis polyspermis; corculum planum in perispermo carnosum. *Frutices; folia alterna simplicia stipulacea; flores axillares & terminales, sæpè geminati, lutei. Malvacearum habitus & quarundam annulus staminifer, sed corculum ut in Tiliaceis.*

**MAHERNIA**, L. \* Petalorum ungues non convoluti. Staminum filamenta infra plana angusta, supra dilatata obcordata, apice protinùs contracto filiformia. Stylus & stigma 1, fortè potius quintuplex arctissimè cohærens. *Cætera ut in Hermannia.*

II. Stamina distincta, plerumque indefinita. Fructus multilocularis. *Tiliaceæ veræ.*

**ANTICHORUS**, L. \* Calix 4-phyllus patens deciduus. Petala 4. Stamina 8, antheris subrotundis. Stylus 1; stigma 1. Capsula (Corchori) oblonga filiquæformis 4-locularis 4-valvis polysperma. *Herbula procumbens Corchori facie, eadem cum Jussiaëæ eduli Forsk.; folia alterna stipulacea; flores minimi axillares lutei.*

**CORCHORUS**, T. L. \* **GUAZUMA**, Pl. \* *Corète*. Calix 5-phyllus caducus. Petala 5. Stamina numerosa, antheris subrotundis. Stylus 1 brevis aut 0; stigmata 1-3. Capsula filiquæformis aut rariùs sphaericea, 2-5-locularis 2-5-valvis polysperma. *Herbæ aut rariùs frutices; flores axillares lutei. Infimi foliorum dentes in quibusdam subulato-aristati. An genere distinguendi C. capsularis fructu sphaericeo, & C. hirsutus seu Guazuma Pl. frutescens Helicteris facie, fructu similiter lanuginoso?*

**HELIOCARPOS**, L. \* Calix 4-phyllus coloratus deciduus. Petala 4. Stamina 16, antheris didymis. Styli 2 (an stylus 1 brevis?); stigmata 2. Capsula stipitata ovata parva subcompressa, 2-locularis, 2-valvis 2-sperma, valvis ovatis margine eleganter ciliatis, ciliis longis radiantibus plumosis. *Frutex; folia (Tiliæ) ferrata, dentibus infimis glanduloso-concavis; flores paniculati terminales. Habitus Triumfettæ.*

**TRIUMFETTA**, Pl. L. \* Calix 5-phyllus deciduus. Petala 5 linearia, sub apice acuminata. Stamina 16. Stylus 1; stigmata 2. Capsula globosa parva, undique echinata aculeis uncinatis, 4-locularis loculis 2-spermis. *Frutices; pedunculi axillares, umbellatim 1-5-flori. Infimi foliorum dentes in quibusdam glanduloso-concavi.*

**SPARMANNIA**, LS. \* Calix 4-phyllus. Petala 4 longiora. Stamina numerosa; filamenta exteriora cæteris breviora sterilia, basi torulosa. Germen 5-gonum hispidum; stylus 1; stigma truncatum papillosum. Capsula 5-angularis, setis rigidis undique & præsertim ad angulos echinata, 5-locularis loculis 2-spermis. *Frutex habitu Triumfettæ; pedunculi ut in Geranio op-*



*oppositifolii & umbellatim multiflori, involucri umbellæ polyphyllæ brevissimo. Character ex L. Suppl.*

**SLOANEA**, Pl. Aubl. \* Calix 5-10-partitus. Petala 0. Stamina numerosa; antheræ longæ filamentis brevibus adnatæ, apice foliaceæ. Germen villotum; stylus 1; stigma 1 (4-5-fidum ex Aubl.). Capsula coriaceo-ligna subrotunda, echinata setis lignosis acutis variè inflexis, 5-locularis 5-valvis, loculis (1-2 sæpè abortivis) 1-3-spermis, seminibus oblongis arillo carnofo involutis. *Arbores ligno parùm compacto; folia magna; flores spicati axillares & terminales, singuli 1-bracteolati. Character ex Plum. & Aubl. & ex flore sicco. An corolla verè nulla; an omninò congener & verè apetalæ S. Sinemariensis Aubl. t. 212 cui lignum durum, capsulæ longior setis minùs rigidis, valvis laxius connexis, loculis 1-2-spermis, perispermio carnofo corculum involvente? An in cæteris perispermum idem? Sloanea L. diversa & Apeibæ adjicienda.*

**APEIBA**, Marcg. Aubl. \* **SLOANEA**, L. \* Calix 5-partitus magnus. Petala 5, calici æqualia aut minora. Stamina numerosa, filamentis brevibus, antheris longis apice foliaceo acuminatis. Germen hirtum; stylus 1 sensim crassescens; stigma perforatum infundibuliforme, margine dentatum. Capsula magna coriacea sphæroïdea depressa, pilis rigidis densis echinata aut limæ instar rugosa, multilocularis (8-24), polysperma seminibus numerosis minutis receptaculo centrali carnofo affixis. *Arbores aut arbusculæ ligno levi; folia magna; pedunculi solitarii oppositifolii ut in Geranio, di aut trichotomè multiflori in divisuris 2-4-bracteati, basi 2-stipulacei. Fructus rarò dehiscens semina emitit per scissuram superiorem aut per foramen inferius dimisso pedunculo succedaneum. A. aspera interdum 4-petala calice 4-partito. Character ex Aubl. Guyan. t. 213-216, & ex fructibus siccis immaturis. Semina quorundam pauciora majora. Huc referenda Sloanea Linn. & Lœfl., non autem Plumerii.*

**MUNTINGIA**, Pl. L. \* Calix 5-partitus deciduus. Petala 5. Stamina plurima, antheris subrotundis. Germen globosum; stylus 0; stigma capitatum radiatum persistens. Bacca globosa cerasiformis, stigmate coronata, 5-locularis polysperma, seminibus minimis in pulpâ nidulantibus. *Arbuscula; folia Apeibæ, minora, basi hinc productiora; flores solitarii (2 ex Jacq.) axillares, longè pedunculati. An corculum perispermio instructum?*

**FLACURTIA**, Commerf. L'Herit. \* *Ramontchi*. Dioïca. Calix 5-7-partitus laciniis subrotundis parvis. Petala 0. MASC. Stamina numerosa (50-100) suprà receptaculum hemisphæricum dense congesta; antheræ subrotundæ. FÆM. Germen subrotundum; stylus subnullus; stigma latum 5-9-radiatum persistens, radiis 1-sulcatis. Bacca (Prunastri) globosa multilocularis loculis 2-spermis, seminibus offeicis. *Frutices; folia alterna; spinæ solit.*



*tariæ passim axillares; flores in ramulis terminales, masculi racemulosi, fœminei sæpè solitarii; bacca pruniformis, maturior siccata 5-gona. Caractèr ex Poivre & Commerf. mss. & ex D. l'Heritier. Alamotou Madagascariensium ex Flacourt qui anno 1661 in Madagascariâ præfectus ejusdem historiam adumbravit non omissis plantis indigenis. Genus Muniingia & Oncobæ accedens sed apetalum & dioicum: an indè Euphorbiis & Maprouneæ affinius?*

**ONCOBA**, Forsk. \* Calix 4-partitus persistens. Petala 11-12, alterna interiora & minora. Stamina numerosa, antheris oblongis erectis. Germen globosum; stylus crassus; stigma orbiculatum, suprâ concavum, margine 7-12-lobatum. Bacca globosa citriformis, epidermide carnosâ tenui, fœta nuce magnâ conformi lignosâ non dehiscente, extûs 6-12-lineatâ, intûs 6-12-loculari polyspermâ, feminibus numerosis in pulpâ nidulantibus. *Arbores ramis ad axillas aut in apice spinosis; axillæ foliorum 1-2-spinosæ aut inermes (stipulaceæ?); flores solitarii terminales magni. Corculum planum perispermo carnosò cinctum. Caractèr ex sicco & ex Forsk. & ex Adans. herb. Seneg. ubi Dimb aut Rimbot dicitur.*

**STEWARTIA**, Catesb. L. \* Calix 5-partitus. Petala 5. Stamina numerosa. Stylus 1; stigma capitatum sub5-lobum. Capsula lignosa conica, calici reflexo persistenti insidens, 5-locularis 5-valvis, valvis crassis ligneis medio septiferis, loculis 1-2-spermis; semina ovata, corculo intrâ perispermum carnosum plano. *Frutex Oncobæ facie; folia alterna (stipulacea?); flores solitarii (axillares?) magni. Caractèr ex Catesb. & ex fructu sicco. Huic adjunxerat Linnæus Malachodendrum distinctum ex Cavan. staminibus monadelphis, fructu multicapsulari & nunc adjunctum Malvaceis p. 275.*

**GREWIA**, L. \* Calix 5-phyllus coriaceus, extûs tomentosus, intûs coloratus deciduus. Petala 5, calici conformia, basi intûs 1-squamulosa. Stamina numerosa, antheris subrotundis germini appressis. Germen stipitatum, stipite brevi crassiore infrâ corollifero, suprâ staminifero, inter petala & stamina mellifluo; stylus 1; stigma 4-fidum. Drupa parva 4-loba, fœta 4 nucibus osseis 2-locularibus 2-spermis. *Arbores aut frutices; pedunculi axillares aut terminales 1-3-flori, rariùs paniculatim multiflori. Corculum in G. occidentali planum perispermo carnosò tectum: an & in cæteris? Ex Sonner. Ind. 2. t. 138 petalâ G. Asiaticæ non squamulosa & bacca pisiformis tantùm 2-sperma, aliis forsàn abortivis: an indè Microci genus restituendum? In Linn. Suppl. Grewiæ adjicitur Mallococca Forst. t. 39, distincta petalis non squamulosis, germine sessili & nucibus non 2-locularibus, in vivo tamen aut in sicco recognoscendis. Congener etiam Chadara Forsk. ex D. Vahl.*

**TILIA**, T. L. \* Tilleul. Calix 5-partitus deciduus. Petala 5, basi squamulosa in *T. Americanâ*, nuda in *T. Europæâ*. Stamina indefinita, antheris subrotundis. Stylus 1; stigma sub5-lobum.



Capsula ovata parva coriacea 5-lineata 5-locularis 5-valvis 5-sperma, loculo & semine 1 sæpius superstite. Corculum lobis sinuatis in perispermo carnosio. *Arbores; folia cordata; pedunculi solitarii axillares longi, tri aut multiflori, supra nudi, infra adnati nervo medio alæ floralis utrinque marginantis & ultra seorsim in ligulam productæ.*

### III. Stamina distincta indefinita. Fructus unilocularis. *Genera Tiliaceis affinia.*

**BIXA**, L. \* **MITELLA**, T. \* *Rocou.* Calix 5-partitus magnus (petala exteriora L.) laciniis rotundis coloratis, extus 5 glandulosus (calix L.) aut 5-tuberculatus. Petala 5, calici alterna & æqualia. Stamina numerosissima, filamentis longis, antheris subrotundis. Germen hirtum; stylus 1; stigma 2-fidum. Capsula conica acuminata, fetulis rigidis undique echinata, 2-valvis 1-locularis polysperma, valvis intus omnino vestitis membranâ cui mediæ receptaculum seminiferum adnascitur lineare non prominulum; semina numerosa succo miniato obducta, singula turbinata & cupulæ pedicellatæ infixæ; corculum parvum in perispermo carnosio. *Arbuscula; folia (Tiliæ) alterna (stipulacea stipulis caducis?); flores paniculati terminales. Character ex sicco. A Tiliaceis discrepat receptaculo in mediis valvis non prominulo & fructu idè 1-loculari, indè affinis Helianthemo.*

**LAETIA**, Loëfl. Jacq. L. \* Calix 5-partitus coloratus marcescens. Petala 5 aut 0. Stamina numerosa, antheris subrotundis. Germen 1; stylus 1; stigma 1. Fructus 1-locularis polyspermus, capsularis 3-valvis aut subbaccatus extus 3-lineatus, valvis aut parietibus membranâ cartilagineâ intus vestitis; semina plurima, membranæ affixa ex *Brown.*, arillata arillo pulposo. *Arbusculæ; folia alterna (stipulacea?); pedunculi axillares tri aut multiflori. Character ex Jacq.*

**BANARA**, Aubl. \* Calix 6-partitus. Petala 6, disco hypogyno inserta. Stamina numerosa ibidem infixæ, antheris subrotundis. Germen disco insidens; stylus 1; stigma capitatum. Bacca parva globosa, stylo acuminata 1-locularis polysperma. *Arbuscula ramis vimineis; folia alterna stipulacea; flores racemosi axillares & terminales, pedicellis 1-bracteatis. Character ex Aubl. Guayan. t. 217. Confer cum Laëtiâ completâ,*

**Obs.** Tiliaceas veras definiunt stamina numerosa sæpius distincta & fructus multilocularis & corculi recti perispermum carnosum & folia alterna stipulacea. Indè dissident ab iisdem Berberides definite staminiferæ ac uniloculares. Discrepant etiam Cisti corculo incurvo, perispermo tenui, fructu sæpè uniloculari, foliis plerumque oppositis & sæpè nudis. An rectè ordini præposita genera habitu & staminibus monadelphis Malvacea, sed perispermo Tiliaceis accedentia? Statuendus



anteà in organorum & characterum serie verus perispermi gradus, quem indicabunt dijudicati ordines quorum fabricæ aut distributioni præfuerit. Genera unilocularia à multilocularibus dissentiunt receptaculo in singulis valvis non prominulo, indè sequenti ordini affinia. An Tiliaceis in posterum addenda genera polypetala polyandra quæ nunc minus nota indeterminatis extrà ordines adjiciuntur, nempe Soramia, Calinea, Cleyera, Vallea, Dicera, Caraipa, Mahurea, Houmiria, Vantanea, Trilix &c.? An ab iisdem removendæ Sloanea, Flacurtia, Laëtia utpotè apetalæ, cæterum tamen ordini proximæ.

## ORDO XX.

### CISTI, LES CISTES.

**CALIX** quinquepartitus. Petala quinque. Stamina numerosa. Germen simplex; stylus unicus; stigma unicum. Capsula polysperma feminibus parvis, unilocularis trivalvis aut multilocularis multivalvis, valvis medio seminiferis, receptaculo nunc septiformi loculos distinguente, nunc lineari non prominulo; femina numerosa, parva. Corculi radícula in lobos incurva, intrà perispermum tenue. Caulis frutescens aut suffrutescens aut herbaceus. Folia plerumque opposita, stipulacea aut nuda. Flores spicati aut umbellatim corymbosi.

**CISTUS**, T. L. \* *Ciste*. Calix æqualis. Capsula sæpè 5-locularis, nonnunquam 10-locularis, valvis totidem medio septiferis, septo intrà utrinque ad marginem seminifero, receptaculo centrali nullo; femina arillata. *Frutices aut suffrutices; folia opposita nuda; flores umbellati terminales, purpurei aut albi.*

**HELIANTHEMUM**, T. \* **CISTUS**, L. \* *Hélianthème*. Calix nunc æqualis, nunc sæpiùs inæqualis laciniis 2 extimis minoribus. Capsula 1-locularis 3-valvis; membrana valvas intùs vestiens, medio exarata lineâ seminiferâ. *Herbæ aut suffrutices; folia opposita aut rariùs alterna, stipulacea aut nuda; flores plerumque spicati terminales (excepto H. umbellato), plures lutei, pauciores purpurascens aut albi.*

Genera Cistis affinia fructu trivalvi valvis seminiferis, sed definitè staminifera.

**VIOLA**, T. L. \* *Violette*. Calix 1-phyllus hinc sub petalo supremo fissus, 5-partitus laciniis basi productis. Petala 5 inæqualia;



supremum impar majus, basi corniculatum. Stamina 5, antheris coalitis apice membranaceis, filamentis distinctis (aut monadelphis?) quorum 2 basi appendiculatâ in superioris petali corniculum irrepentia. Stylus 1; stigma acutum aut urceolatum. Capsula 3-gona 1-locularis polysperma, 3-valvis valvis medio seminiferis; corculum rectum tenue subcylindricum in perispermio carnosio centrale. *Herbæ aut rarò frutices; folia alterna stipulacea; pedunculi axillares 1-flori, flore sæpè inverso.*

**PIRIQUETA**, Aubl. \* Calix 5-phyllus deciduus. Petala 5 æqualia, calici alterna. Stamina 5 hypogyna, antheris ovatis. Styli 5-6; stigmata 5-6 dilatata 5-ftriata. Capsula 1-locularis 3-4-valvis, valvis receptaculo medio lineari prominulo 7-8-spermo intùs auctis. *Herba villosa; folia alterna (stipulacea?); pedunculi axillares solitarii 1-flori, sub apice articulati. Character ex Aubl. Guyan. t. 117. Confer cum Turnerâ cistoïde.*

**PIPAREA**, Aubl. \* Calix ... Petala ... Stamina ... Germen ... Capsula supera 3-gona 1-locularis 3-valvis valvis lineâ longitudinali mediâ prominulâ 1-3-spermâ intùs auctis; femina tomentosa, singula placentæ fimbriatæ imposita. *Frutex; folia alterna stipulacea; fructus solitarii axillares; flores nondum observati. Character ex Aubl. Guyan. t. 386. An rectè ordinata & 5-andra; an potius polyandra & Lætiæ Tiliaceisq̃ue affinior?*

**TACHIBOTA**, Aubl. \* Calix 5-partitus persistens. Petala 5 hypogyna, calici alterna. Stamina 5 hypogyna, antheris subrotundis. Stylus 0; stigmata 3. Capsula calice cincta, 3-gona 3-locularis polysperma 3-valvis, valvis medio septiferis & seminiferis. *Frutex ramis sparsis; folia alterna stipulacea; flores spicati axillares & terminales pedicellis 1-bracteatis. Character ex Aubl. Guyan. t. 112.*

**Obs.** Fructus in Cisto & Tiliaceis multilocularibus idem, idem in Helianthemo & Tiliaceis unilocularibus, receptaculo seminum in his lineari non prominulo, in illis prominente & septiformi. Difficilis ideò ordinis utriusque polyandri & monostyli distinctio; sed in Tiliaceis corculum rectum, perispermum magnum, folia semper alterna & stipulacea; in Cistis corculum incurvum, perispermum tenue ac fortè subnullum, folia plerumque opposita & persæpè nuda. An tamen duplex in unum colligendus ordo? Cistis accedunt genera quædam, primitivæ novi ordinis, Helianthemi fructu insignia sed definitè staminifera & indè primis affinia Rutaceis. An his addendæ Sauvagesia, Roridula, Aldrovanda, Dionæa, &c.





## ORDO XXI.

## RUTACEÆ, LES RUTACÉES.

**C**ALIX monophyllus, sæpè quinquepartitus. Petala sæpiùs quinque, laciniis calicinis alterna. Stamina definita distincta, sæpiùs decem, alterna petalis & alterna calici opposita. Germen simplex; stylus unicus; stigma simplex aut rariùs divisum. Fructus multilocularis aut multicapsularis, loculis aut capsulis sæpè quinis, mono aut polyspermis; semina angulo interiori affixa. Corculum planum in perispermo carnosum. Caulis herbaceus aut frutescens aut rariùs arborescens. Folia in aliis alterna nuda, in aliis stipulacea sæpiùs opposita. Flores axillares aut terminales.

## I. Folia stipulacea sæpiùs opposita.

**TRIBULUS**, T. L. \* *Herse*. Calix 5-partitus. Petala 5. Stamina 10. Stigma sub5-fidum. Fructus sæpiùs 5-capsularis, capsulis extrinsecus latioribus 3-4-spinosis, introrsum contractis ac coalitis, singulis transversè 2-3-locularibus 2-3-spermis. *Herbæ sæpè diffuse; folia abruptè pinnata, altero sæpè minore aut interdum abortivo; flores solitarii alterni, folio minori axillares, lutei. Fructus T. maximi 10-capsularis non spinosus. Species una 5-andra ex Forskallio.*

**FAGONIA**, T. L. \* Calix 5-partitus deciduus. Petala 5 unguiculata. Stamina 10. Stigma 1. Capsula subrotunda acuminata 5-torosa 5-locularis, loculis 2-valvibus 1-spermis. *Herbæ basi lignosæ; folia simplicia aut ternata; stipulæ quarundam spinescentes; flores solitarii axillares.*

**ZYGOPHYLLUM**, L. \* **FABAGO**, T. \* Calix 5-partitus. Petala 5 unguiculata. Stamina 10, filamentis basi intus 1-squamulosis, squamulis circa germen conniventibus. Stigma 1. Capsula oblonga 5-gona 5-locularis 5-valvis, valvis medio septiferis, loculis polyspermis. *Frutices aut suffrutices; folia conjugata aut rariùs simplicia; flores solitarii axillares. Guaiaco affine Z. arboreum cui caulis arborescens ligno duro, folia abruptè pinnata, pedunculi multiflori, stamina Zygomphylli.*

**GUAIAACUM**, Pl. L. \* *Gayac*. Calix 5-partitus inæqualis. Petala 5. Stamina 10, filamentis nudis. Stigma 1. Fructus sub-



pedicellatus, angulatus angulis compressis, 2-5-locularis loculis 1-spermis semine corneo. *Arbores ligno duro; folia abruptè pinnata; pedunculi axillares 1-flori; fructus* G. officinalis 2-locularis compressus obcordatus, G. sancti 4-5-locularis quasi 4-5-alatus.

## II. Folia alterna nuda.

**ruta**, T. L. \* *Ruë*. Calix 5-partitus parvus persistens. Petala 5 unguiculata concava. Stamina 10, filamentis basi latioribus. Stigma 1. Capsula 5-loba 5-locularis inter apices quinquefariam dehiscens, loculis polyspermis; semina reniformia. *Herbæ aut suffrutices graveolentes; folia simplicia aut sapiùs 1-2-pinnata; flores terminales corymbosi aut cymosi, in R. graveolente omnes summo excepto 4-petali 8-andri 4-loculares.*

**PEGANUM**, L. \* **HARMALA**, T. \* Calix 5-partitus persistens, laciniis longis angustis, quibusdam dentatis. Petala 5. Stamina 15, filamentis basi dilatatis. Stigma triquetrum. Capsula substipitata subsphærica 3-locularis apice 3-valvis polysperma. *Herba; folia simplicia aut multifida; flores extrâaxillares solitarii. Stamina interdum pauciora, additis simul in fructu loculis.*

**DICTAMNUS**, L. \* **FRAXINELLA**, T. \* *Fraxinelle*. Calix 5-partitus minimus deciduus. Petala 5 lanceolata inæqualia unguiculata patula. Stamina 10, filamentis declinatis inæqualibus punctato-glandulosis. Germen substipitatum; stylus declinatus; stigma 1. Capsulæ 5, introrsum coalitæ compressæ, apice acuminato divaricatæ, 2-valves, foetæ arillo cartilagineo 2-valvi 2-spermo. *Herba undique punctato-glandulosa; folia impari-pinnata; flores spicati terminales,*

## III. Genera Rutaceis affinia.

**MELIANTHUS**, T. L. \* *Méliante*. Calix magnus profundè 5-fidus coloratus persistens, laciniis inæqualibus, infimâ remotâ cæteris minore, deorsum gibbâ & cucullatâ, intus cavâ & fovente glandulam mellifluam (ex disco hypogyno hinc enatam?) membranâ propriâ conduplicatâ cinctam. Petala 5 ligulæformia; 4 inferiora declinata, glandulæ inserta extrâ membranam, basi & apice distincta, medio agglutinata; quintum nunc cæteris proximum, nunc procul inter lacinias 2 calicinas superiores enatum. Stamina 4, germi circumposita; horum filamenta 2 superiora distincta, 2 inferiora breviora basi connata inter germen & glandulam media; antheræ incumbentes. Germen 4-fidum; stylus 1; stigma sub4-fidum. Capsula membranacea vesicularia 4-loba 4-locularis, quasi 4-capsularis; loculi medio 1-spermi, compressi alæformes, suprâ distincti & angulo interiore dehiscences, infrâ margine connati in dissepimenta angusta, introrsum apice incisa pro seminum recep-



taculo centrali; femina subrotunda nitida; corculum lobis parvis, radicula longiore intrà perispermum carnosum. *Frutex*; *folia alterna, impari-pinnata petiolo alato, stipulacea stipulis distinctis aut in unam petiolo intus adnatam connatis*; flores spicati axillares aut terminales, singuli bracteati. Genus *Tropaeolo* affine calicis cucullo, petalorum & staminum situ, *Dictamnino* similis habitu & fructu & seminis perispermum, plurimum tamen ab utroque discrepans.

**DIOSMA**, L. \* Calix profundè 5-fidus persistens, basi intus vestitus disco (hypogyno?) ad limbum 5-crenato aut in 5 squamulas productio. Petala 5 sessilia, sæpè marcescentia, sub disco inserta & ejusdem crenis aut squamulis opposita. Stamina 5 ibidem inserta, petalis alterna. Germen disco infrà cinctum; stylus 1; stigma capitatum. Fructus 3-5-capsularis, capsulis compressis conniventibus oblongis, intus dehiscentibus, foetis arillo conformi cartilagineo similiter dehiscente, mono aut polyspermo; femina nitida. *Frutices Ericoidei*; *folia opposita aut sparsa, sæpè conferta & linearia, interdum subius margine punctata*; flores corymbose aut capitati terminales. Genus à Bern. Jussæo *Rutaceis* adjectum & *Dictamnino* affine præcipuè fructu multicapsulari & seminis arillo, sed distinctum habitu & staminibus quinis & floris disco fortè perigyno. An affinius *Rhododendris* & *Ledo*? An corculum perispermum instructum? Calices quorundam punctato-glandulosi.

**EMPLEVRUM**, Soland. Lamark. \* **DIOSMA**, LS. \* Calix turbinatus punctato-glandulosus 4-lobus. Petala 0. Stamina 4 exserta; antheræ magnæ apice glandulosæ, utrinque dehiscentes, filamentis adnatæ. Germen apice hinc in alam definens, inde stylum emittens lateralem; stigma 1. Capsula oblonga compressa, gladiata aut leguminiformis, suprà alata, 1-locularis hinc dehiscens, 1-sperma femine nitido intrà arillum coriaceum elasticè 2-valvem contento. *Frutex salicifolius*; *folia alterna, margine dentata & punctata*; flores parvi axillares, plures masculi. Habitu & seminis arillo simile *Diosmæ*, sed apetalum & 1-capsulare.

**ARUBA**, Aubl. \* Calix 5-6-partitus. Petala 5-6, disco hypogyno inserta. Stamina sæpius 5, rariùs 6-8, ibidem inserta, filamentis basi intus squamam villosam instructis, antheris 4-gonis. Germen 3-6-striatum; styli 3-6 in unum approximati; stigmata 3-6. Fructus 3-6-capsularis capsulis 1-spermis. *Frutex ramosus*; *folia alterna, simplicia aut sæpiùs ternata*; flores subcorymbose axillares & terminales, pedicellis medio 2-squamosis. *Caractèr ex Aubl. Guyan. t. 115. Confer cum Zygophyllo & Quassia similiter intrà filamenta squamulosi.*

**Obs.** Rutacearum sectio stipulacea Geraniis affinis, sed distincta perispermum carnosum & corculo recto. Habitu similior *Cassia* & congeneribus inter Leguminosas pariter stipulaceis abruptè pinnatis & decandris monostylis, sed diversa foliis oppositis & fructu multiloculari & præcipuè staminibus hypogynis. An huic affines *Quassia*, *Thrya*.



III. Trigonis, &c. ? An utraque sectio rectè confociata, licèt habitu dissimilis; an potius duplex distinguendus ordo, & in fructu definiendus? Interea Rutaceas distinguunt stamina definita à Tiliaceis & Cistis, eadem corollæ alterna à Berberidibus.

## ORDO XXII.

## CARYOPHYLLÆ, LES CARYOPHYLLÉES.

**CALIX** monophyllus plerumque persistens, tubulosus aut partitus. Petala definita (rarò nulla), laciniis calicinis alterna & numero æqualia, sæpiùs unguiculata. Stamina definita, interdum petalis pauciora, sæpiùs iisdem numero æqualia & alterna, aut dupla alternis hypogynis, alternis epipetalis. Germen simplex; styli plures (rarò unicus) & stigmata totidem. Fructus capsularis plerumque polyspermus, uni aut multilocularis, seminibus receptaculo centrali affixis. Corculum incurvum, typo farinaceo circumpositum. Caulis plerumque herbaceus. Folia opposita basi connata aut rariùs verticillata, in paucis stipulacea, in plurimis nuda. Flores axillares aut sæpiùs terminales.

I. Calix partitus. Stamina tria. Stylus unicus aut sæpiùs triplex.

**ORTEGIA**, Loëfl. L. \* Calix 5-partitus. Petala 6. Stylus 1; stigma capitatum. Capsula 1-locularis polysperma, apice 3-valvis. *Folia opposita stipulacea stipulis minimis; pedunculi sæpè multiflori, axillares aut terminales. Stigma O. dichotomæ triplex.*

**LOEFLINGIA**, L. \* Calix 5-partitus, laciniis basi 2-dentatis. Petala 5 minima conniventia. Stylus 1; stigma 1. Capsula 1-locularis 3-valvis. *Folia opposita stipulacea stipulis appendiciformibus; flores solitarii axillares sessiles.*

**HOLOSTEUM**, L. \* **ALSINE**, T. \* Calix 5-partitus. Petala 5 bipartita. Styli 3. Capsula 1-locularis apice dehiscens. *Folia opposita, in H. cordato stipulacea; flores dichotomè corymbosi, axillares & terminales, in H. umbellato umbellati & interdum 4-5-andri 4-styli.*

**POLYCARPON**, L. \* Calix 5-partitus. Petala 5 brevissima emarginata persistentia. Styli 3. Capsula 1-locularis 3-valvis. *Folia 4 verticillata stipulacea; flores dichotomè corymbosi terminales.*



**DONATIA**, Forst. \* **POLYCARPON**, L. \* Calix 3-partitus. Petala 9, interdum pauciora, integra. Styli 3. Fructus... *Planta digitalis simplex foliis imbricatis. Character ex Forst. t. 5 & ex Linn. Suppl. Habitu & corollâ 9-petalâ dispar à Polycarpo. An rectè ordinata; an germen verè superum?*

**MOLLUGO**, L. \* Calix 5-partitus, intus coloratus. Petala 0. Styli 3. Capsula 3-locularis 3-valvis. *Folia opposita aut sæpius verticillata; flores axillares aut terminales.*

**MINUARTIA**, Loëfl. L. \* Calix 5-partitus. Petala 0. Styli 3. Capsula minima 1-locularis 3-valvis. *Character ex Linnæo. Folia opposita conferta; flores conferti, fortè petalodes, petalis 5-3 ex Linnæo & Loëfl. glandulæformibus minimis.*

**QUERIA**, Loëfl. L. \* Calix 5-partitus. Petala 0. Styli 3. Capsula 1-locularis 3-valvis 1-sperma. *Habitu similis Minuartiæ, sed fragilior & præcipuè 1-sperma. Discrepat Q. canadensis caule dichotomo, in dichotomiis 1-floro, foliis stipulaceis, habitu Lini cathartici.*

I I. Calix partitus. Stamina quatuor. Styli duo aut quatuor.

**BUFONIA**, L. \* Calix 4-partitus. Petala 4. Styli 2. Capsula 1-locularis 2-valvis 2-sperma. *Herba graminifolia; flores contractè paniculati terminales, interdum 2-3-andri ex D. Gerard.*

**SAGINA**, L. \* **ALSINE**, T. \* Calix 4-partitus. Petala 4, rariùs 0. Styli 4. Capsula 4-locularis 4-valvis. *Herbulæ; flores subsolitarii, terminales & axillares longè pedunculati, petalis sæpè caducis: an S. apetala L. verè iisdem destituta?*

III. Calix partitus. Stamina quinque aut octo. Styli duo aut tres aut quatuor.

**ALSINE**, T. L. \* *Morgeline*. Calix 5-partitus. Petala 5. Stamina 5. Styli 3. Capsula 1-locularis 3-valvis. *Flores axillares & terminales. A. mediæ petalâ 2-fida & numerus staminum varius.*

**PHARNACEUM**, L. \* Calix 5-partitus intus coloratus. Petala 0. Stamina 5. Styli 3. Capsula 3-locularis 3-valvis. *Folia sæpè verticillata; flores axillares aut terminales. Habitus Molluginis. Capsula P. distichi 1-locularis. Species quædam stipulacæ.*

**MOERHINGIA**, L. \* **ALSINE**, T. \* Calix 4-partitus. Petala 4. Stamina 8. Styli 2. Capsula 1-locularis 4-valvis. *Flores subsolitarii axillares aut terminales, longè pedunculati.*

**ELATINE**, L. \* **ALSINASTRUM**, V. \* Calix 4-partitus. Petala 4 sessilia. Stamina 8. Germen orbiculatum depressum; styli 4.



Capsula 4-locularis 4-valvis. *Herbæ aquaticæ diffusæ humillimæ ; folia verticillata aut opposita ; flores axillares minimi , in E. Hydropipere interdum 3-petali 6-andri , in E. Alfinastro nonnunquam 4-andri.*

IV. Calix partitus. Stamina decem. Styli tres aut quinque.

BERGIA, L. \* Calix 5-partitus patens. Petala 5. Styli 5 breves approximati ; stigmata persistentia. Capsula 5-torulosa 5-locularis 5-valvis valvis patentibus. *Caulis simplex ; folia opposita ; flores conferti axillares subsessiles ; statura Ammania. Character ex Linnæo. An stamina hypogyna. An Ficoïdeis affinior ?*

SPERGULA, L. \* ALSINE, T. \* Spargoute. Calix 5-partitus. Petala 5 integra. Styli 5. Capsula 1-locularis 5-valvis ; semina marginata. *Folia verticillata stipulacea aut opposita nuda ; flores axillares & terminales , interdum 5-andri.*

CERASTIUM, L. \* MYOSOTIS, T. \* Céraïste. Calix 5-partitus. Petala 5 bifida. Styli 5. Capsula globosa calici æqualis , aut subcylindrica eodem longior , 1-locularis apice dehiscens. *Flores terminales. Species quædam 5-10-andræ 3-5-stylæ , Alfinæ fortè congeneres.*

CHERLERIA, Hall. L. \* Calix 5-partitus. Petala 5 minima emarginata. Styli 3. Capsula 3-locularis 3-valvis loculis 2-spermis. *Herba muscoïdes cæspitosa ; folia minima densè congesta , apice patentia in rosulas medio 1-floras.*

ARENARIA, L. \* ALSINE, T. \* Sabline. Calix 5-partitus. Petala 5 integra. Styli 3. Capsula 1-locularis apice 5-valvis. *Flores axillares aut terminales. Folia stipulacea & flores interdum 5-8-andri 5-styli & semina margine membranacea in A. rubrâ & A. mediâ fortè non congeneribus & Spergulæ affinioribus. Minuartiæ affinis A. tetraquetra cui flores capitati & capsula omninò 5-valvis.*

STELLARIA, L. \* ALSINE, T. \* Stellaire. Calix 5-partitus. Petala 5 bipartita. Styli 3. Capsula 1-locularis 6-valvis. *Flores axillares & sæpiùs terminales. Petala 5. radiantis 5-fida.*

V. Calix tubulosus. Stamina decem ( alterna hypogyna , alterna sæpiùs epipetala ). Styli duo aut tres aut quinque.

GYPSOPHILA, L. \* LYCHNIS, T. \* Calix campanulatus , profundè 5-fidus. Petala 5 , parum unguiculata. Styli 2. Capsula 1-locularis 5-valvis. *Flores 2-3-chotomè paniculati numerosissimi parvi , in G. paniculatâ dioïci , sub calice 4-squamulosi in*



*G. Saxifragâ indè Diantho proximâ. G. Struthium Lasi suffrutescens.*

**SAPONARIA**, L. \* **LYCHNYS**, T. \* *Saponaire, Savoniere.* Calix tubulosus 5-dentatus, basi nudus. Petala 5, unguiculata. Styli 2. capsula 1-locularis. *Flores axillares aut sæpius corymbosi terminales, calice quorundam angulato. S. officinalis varietas monopetala.*

**DIANTHUS**, L. \* **CARYOPHYLLUS**, T. \* *Æillet.* Calix tubulosus 5-dentatus, basi squamis 4 aut pluribus cruciatim imbricatis cinctus. Petala 5 unguiculata, limbo sæpè dentato. Styli 2, sæpè recurvi. Capsula cylindrica 1-locularis apice dehiscens. *Flores terminales, aggregati aut solitarii pluresve distincti. Species quædam suffrutescentes. Varietas D. Caryophylli sub calice multifquamosa squamis in spicam 4-gonam imbricatis.*

**SILENE**, L. \* **LYCHNIS**, T. \* Calix tubuloso-ventricosus 5-dentatus. Petala 5 unguiculata, ad faucem 2-dentata, suprâ sæpè 2-fida. Styli 3. Capsula 3-locularis apice 5-fariâ dehiscens. *Pedunculi uni aut multiflori, axillares aut terminales aut ex dichotomiâ caulis. Species quædam basi suffrutescentes, una muscoides caespitosa.*

**CUCUBALUS**, T. L. \* **LYCHNIS**, T. \* *Carnillet.* Calix tubulosus ventricosus 5-dentatus. Petala 5 unguiculata, ad faucem nuda, apice plerumque 2-fida. Styli 3. Capsula 3-locularis apice 5-fariâ dehiscens. *Flores axillares aut sæpius terminales spicato-paniculati. C. Bacciferi capsula subbaccata, petalorum fauce 2-dentata & caulis quasi scandens: an Silene affinior? C. Orites abortu dioicus.*

**LYCHNIS**, T. L. \* Calix tubulosus 5-dentatus. Petala 5 unguiculata, limbo sæpè fissa. Styli 5. Capsula 3-locularis 5-valvis. *Flores sæpè corymbosi terminales, rariùs spicato-paniculati, in L. alpinâ & L. quadridentatâ interdum 4-styli, in L. dioicâ abortu dioici. Fructus in L. viscariâ 5-locularis, in L. flore cuculi 1-locularis.*

**AGROSTEMMA**, L. \* **LYCHNIS**, T. \* Calix tubulosus apice 5-fidus. Petala 5 unguiculata, fauce nuda aut appendiculata. Styli 5. Capsula 1-locularis, apice 5-valvis. *Flores solitarii aut plures terminales. Petala A. Githaginis integra fauce nuda & calicinis laciniis breviora, cæterorum longiora apice emarginata & fauce appendiculata.*

V I. Calix tubulosus. Stamina pauciora quàm decem.  
Styli duo aut tres.

**VELEZIA**, L. \* Calix tubulosus filiformis 5-dentatus. Petala 5 parva unguiculata. Stamina 5 aut 6. Styli 2. Capsula cy-



lindrica 1-locularis. *Herba rigida dichotoma; flores 1-2 axillares subsessiles.*

**DRYPIS**, Ger. Mich. L. \* Calix tubulosus 5-dentatus. Petala 5 unguiculata, fauce 2-dentata, suprâ 2-partita. Stamina 5. Styli 3. Capsula 1-locularis circumscissa 1-sperma semine reniformi. *Folia caulina & floralia dentata dentibus subulatis; ramea integra linearia mucronata pungentia; flores glomerati terminales.*

**SAROTHRA**, L. \* Calix profundè 5-fidus connivens. Petala 5 linearia. Stamina 5. Styli 3. Capsula oblonga acuta 1-locularis 3-valvis. *Herba gentianelloïdes, subtrichotoma; folia minima linearia; flores axillares solitarii sessiles. Affinis Gentianis sed polypetala.*

## VII. Genera Caryophylleis affinia.

**ROOTALA**, L. \* Calix tubulosus 3-dentatus. Petala 0. Stamina 3. Stylus 1; stigmata 3. Capsula minima calice inclusa, 3-locularis 3-valvis polysperma. *Herba ramis articulatis, inferioribus oppositis, superioribus alternis; folia 4 verticillata; flores 4 verticillati, axillares sessiles minimi. An affinis Isnardiæ?*

**FRANKENIA**, L. \* Calix subcylindricus 5-dentatus. Petala 5, ungue intus canaliculato. Stamina 6. Stylus 1; stigmata 3. Capsula 1-locularis 3-valvis polysperma. *Character ex Linnæo. Herbæ minimæ; folia opposita minuta; flores parvi, glomerati terminales, aut axillares sessiles interdum secundi, ex Adansonio 5-10-andri fructu 3-loculari. An stylus verè unicus?*

**LINUM**, T. L. \* Lin. Calix 5-partitus persistens. Petala 5 unguiculata, staminum annulo inserta. Staminum filamenta 10, basi in anulum connata, alterna fertilia antheris sagittatis, alterna breviora sterilia. Styli 5; stigmata 5. Capsula globosa acuminata 10-locularis 10-valvis valvis geminatis, singulis margine utroque introflexo loculum constituentibus 1-sperma; receptaculum centrale nullum; semina ovata compressa nitida; corculum rectum planum absque perispermo. *Herbæ aut suffrutices; folia plurimorum alterna, pauciorum opposita; flores solitarii axillares aut rarius oppositifolii, apice corymbosi aut spicati aut sparsi, in L. radiolâ 4-andri 4-styli. Genus à Caryophylleis distinctum staminibus basi monadelphis, nullo nec receptaculo fructus centrali nec seminis perispermo, foliis sæpè alternis.*

**LECHEA**, Kalm. L. \* Calix 3-partitus persistens. Petala 3. Stamina 3, interdum 4-5. Stylus 0; stigmata 3 plumosa. Capsula 3-locularis 3-valvis 3-sperma, valvis totidem aliis interioribus versus exteriores conniventibus. *Character ex Linnæo. Herbæ aut suffrutices habitu Lini; folia alterna aut opposita; pedunculi multiflori, axillares aut paniculati terminales.*



Oss. Caryophylleæ à cæteris Polypetalis hypogynis discrepantes perispermæ (p. 230) farinaceæ, indè Amaranthos apetalos collimant ex dictis p. 89, & insuper accedunt subsequenter Sempervivis polypetalis similique instructis perispermæ sed staminum perigyniâ & germine multiplici diversis. Triplicem ordinem in diversis classibus hic repositum penès conjunxerat in Horto Trianonensi Bern. Jussæus de corollæ existentiâ aut defectu minùs sollicitus, staminum insertioni libentiùs obtemperans, non tamen habitâ ratione insertionis mediatae aut immediatae, quæ multiplicandis classibus utilis (p. 71) tanquàm primarius caracter, in instituendâ verâ serie naturali quandoque minùs est proficua & præmissis tantùm exceptionibus admit-tenda. Utraque enim interdum in eodem ordine & in eâdem plantâ concurrat insertio, præcipuè in plurimis Caryophylleis decandris quarum stamina alterna hypogyna & alterna epipetala, dum in iisdem pentandris duntaxat hypogyna habentur. Indè corolla in decandris essentialis utpotè staminifera, in pentandris faciliùs evanescit, persistente tamen generum analogiâ & ideò infirmatâ Apetalarum & Polypetalarum distinctione.





# CLASSIS XIV.

## PLANTÆ DICOTYLEDONES POLYPETALÆ.

### STAMINA PERIGYNÆ.

**C**ALIX monophyllus, superus aut inferus, apice divisus aut profundè partitus. Corolla perigyna seu imo aut summo calici inserta, polypetala aut quandoque nulla aut rariùs monopetala petalis in unum coalitis. Stamina perigyna, definita aut indefinita, sæpè distincta aut interdùm filamentis coalita. Germen superum simplex multiplexve, aut rariùs inferum simplex; singulo germi styli unus aut multiplex aut nullus, stigma integrum aut divisum. Fructus nunc simplex superus aut inferus, uni aut multilocularis, nunc rariùs multiplex superus singulo pericarpio uniloculari. Sexus interdùm abortu distincti.

*Obs.* Numerosi Polypetalorum ordines in triplici classe collecti, jam prodire paucissimi p. 217. staminum epigyniâ insignes & multò plures p. 230. hypogyniâ designati, nunc tredecim circiter sistendi supersunt communi perigyniæ nexu conjuncti. Quos in Apetalis socios habuit characteres staminum perigynia, eosdem ferè in Polypetalis sibi vindicat adæquatos, nempe calicem semper monophyllum, stamina definita aut indefinita, germen superum aut inferum, simplex aut multiplex, & præterea corollam plerumque exstantem, sæpius polypetalam & non staminiferam, semper perigynam.

Hæc autem corolla, licet inter præcipuos characteres enumerata, minùs essentialis utpotè non staminifera, passim aboletur recidivâ exceptione, generibus apetalis inter polypetalos nonnun-



quàm immixtis, pluribus quidem in perigyniâ quàm in hypogyniâ, ex jam dictis p. 74. 87. 231, & ex observandis in præsentī classe cujus ordines vix quidam habentur omninò polypetalī, dūm in præcedenti numerosiore paucissimi generibus apetalis implicantur. Rarior corollæ polypetalæ perigynæ in monopetalam conversio, parcè referata in Sempervivis, Portulaceis, Leguminosis & Rhamnis, non in generibus polyandris habita, sed in definitè staminiferis quorum stamina tunc, generaliori legi obtemperantia, mutato situ ex perigynis fiunt sæpius epipetala. Cuilibet prætereà scrutanti varios insertionum modos manifestus fiet uniformis in singulo ordine staminum situs, in quibusdam tamen ægrè definiendus habitâ ratione pistilli, inter hypogyniam & perigyniam anceps indeterminatâ (p. 154. 230) disci staminiferi origine, & analogiâ conjiciendus.

Ut in Hypogynis præcedentibus p. 229, sic & in Perigynis nunc scrutandis facilis classica designatio ex essentialibus & primariis caracteribus deprompta, difficilior ordinum distributio defectu caracterum inter secundarios generaliorum. Nulla enim in eâ partitione utilitas percipienda ex organorum sexualium situ aut numero, dūm in iisdem ordinibus & præcipuè in Rosaceis concurrunt stamina definita cum indefinitis, germen superum cum infero, cum simplici multiplex. Certius in intimo semine latet divisionis primordium jam antea in hypogynis insigne & in perigynis non posthabendum: sic ordiendo à feminibus corculo incurvo & perispermo aut typo farinaceo instructis datur connexio cum Caryophylleis in præcedenti classe ultimis & comparent suo ordine Sempervivæ, Saxifragæ, Cacti, Portulacæ, Ficoideæ. Proximè instant semina perispermo destituta in Onagris, Myrtis, Melastomis, Salicariis, Rosaceis, Leguminosis & Terebintaceis. Postremi prodeunt Rhamni perispermo carnosio à præcedentibus diversi & Euphorbiis in sequenti classe primis subsimiles.





## ORDO I.

## SEMPERVIVÆ, LES JOUBARBES.

**CALIX** inferus, definitè partitus. Petala imo calici inserta, definita, calicinis divisuris numero æqualia & iisdem alterna, aut rariùs corolla monopetala, tubulosa vel partita. Stamina totidem alterna petalis, aut dupla quorum alterna petalorum ungui inserta, alterna imo calici; antheræ subrotundæ. Germina plura, petalis numero æqualia, basi interiori juncta, exteriori glandulosa glandulis interdum squamiformibus; styli & stigmata totidem. Capsulæ totidem uniloculares, polyspermæ, intus bivalves, marginibus valvarum feminiferis. Corculum feminis incurvum, farinaceo typo circumpositum. Caulis herbaceus aut suffrutescens. Folia opposita aut alterna, succulenta.

**TILLÆA**, Mich. L. \* **SEDUM**, V. \* *Tillée*. Calix 3-4-partitus. Petala 3-4. Stamina 3-4. Germina 3-4. Capsulæ 3-4. *Herbæ minimæ; folia opposita; flores minimi axillares.*

**CRASSULA**, Dill. L. \* *Crassule*. Calix 5-partitus. Corolla 5-partita. Stamina 5. Germina 5. Capsulæ 5. *Herbæ aut suffrutices; folia alterna aut opposita, interdum connata, rariùs pinnata; flores terminales fasciculati aut corymbosi aut spicati. Species tubulosæ ad Cotyledonem repellendæ.*

**COTYLEDON**, T. L. \* *Cotylet*. Calix 5-partitus. Corolla monopetala, tubulosa, 5-fida. Stamina 10, rariùs 5, corollæ inserta. Germina 5. Capsulæ 5. *Herbæ aut suffrutices; folia opposita aut alterna, interdum pinnata; flores terminales, corymbosi aut spicati.*

**RHODIOLA**, L. \* **ANACAMPSEROS**, T. \* *Dioïca*. Calix 4-partitus. Petala 4. **MASC.** Stamina 8. Germina 4 abortiva. **FÆM.** Germina 4. Capsulæ 4. *Herbæ; folia alterna plana; flores densè corymbosi terminales.*

**SEDUM**, T. L. \* **ANACAMPSEROS**, T. \* *Trique*, Orpin. Calix 5-partitus. Petala 5. Stamina 10. Germina 5. Capsulæ 5. *Herbæ; folia alterna, plana aut teretia; flores corymbosi, axillares & sæpiùs terminales.*

**SEMPERVIVUM**, L. \* **SEDUM**, T. \* *Joubarbe*. Calix 6-12-partitus.



titus. Petala 6-12. Stamina 6-12. Germina 6-12. Capsulæ 6-12. *Herbæ aut suffrutices; folia alterna, plana, in rosam terminalem congesta; flores corymboso-cymosi terminales, in S. arboreo 20-andri.*

SEPTAS, L. \* Calix 7-partitus. Petala 7. Stamina 7. Germina 7. Capsulæ 7, parallelæ. *Herbula; folia radicalia; scapus apice umbellatim multiflorus.*

Genus Sempervivis affine.

PENTHORUM, Gron. L. \* Calix 5-10-fidus. Petala 5 (rariùs 0) calici alterna, minima. Stamina 10, antheris subrotundis. Germen 5-cuspidatum; styli 0; stigmata 5. Capsula 5-locularis, loculis apice distinctis & divaricatis, singulis 1-locularibus circumscissis polyspermis; semina minutissima. *Herba; folia alterna non succulenta; flores spicati aut spicato-paniculati terminales. A Sempervivis discrepat habitu & fructûs dehiscentiâ.*

Obs. Sempervivæ utpotè perispermo feminis farinaceo instructæ, accedunt tum Caryophylleis præcedentibus sub pistillo staminiferis, tum subsequenter staminum perigyniâ insignibus Saxifragis, Cactis, Portulacis, Ficoideis; utpotè polygynæ, à prædictis omnibus monogynis discrepant; utpotè definite staminiferæ, à Rosaceis dissentiunt polyandris & præterea perispermo destitutis.

## ORDO II.

### SAXIFRAGÆ, LES SAXIFRAGES.

CALIX superus aut sæpiùs inferus, quadri aut quinquefidus. Petala quatuor aut quinque (rariùs nulla), summo calici inserta, ejusdem laciniis alterna. Stamina totidem aut sæpiùs dupla, ibidem inserta. Germen simplex, superum aut rariùs inferum; styli & stigmata duo. Fructus sæpè capsularis, polyspermus, apice bivalvis, unilocularis aut bilocularis valvis introflexione dissepimentum constituentibus. Corculum incurvum, typo farinaceo aut subcarnoso circumpositum. Caulis plerumque herbaceus. Folia alterna aut rariùs opposita, interdum crassiuscula.

I. Fructus superus capsularis, apice birostris.

HEUCHERA, L. \* Calix 5-fidus. Petala 5 parva. Stamina 5. Capsula 2-locularis. *Folia H. Americanæ radicalia & flores in*



*scapo paniculati terminales. H. dichotomæ caulis dichotomus & pedunculi 2-flori foliis oppositis axillares.*

**SAXIFRAGA**, T. L. \* **GEUM**, T. \* *Saxifrage*. Calix 5-fidus persistens. Petala 5. Stamina 10. Capsula 1-locularis inter apices dehiscens, in *Saxifragâ* T. semiinfera seu infrâ cincta calice, in *Geo* T. supera. *Folia alterna aut rariùs opposita, indivisa aut partita, interdum omnia radicalia; flores sæpè plures, variè dispositi.*

**TIARELLA**, L. \* **MITELLA**, T. \* Calix 5-fidus persistens. Petala 5 integra. Stamina 10. Capsula 1-locularis 2-valvis valvâ alterâ majore. *Folia pleraque radicalia, simplicia aut ternata; flores in scapo nudo aut alternè 2-phyllo laxè spicati terminales.*

**MITELLA**, T. L. \* Petala laciniata aut pinnatifida. Capsula 2-valvis valvis æqualibus. Cætera ut in *Tiarellâ*. *Folia simplicia, pleraque radicalia; flores in scapo nudo aut oppositè 2-phyllo laxè spicati terminales.*

## I I. Fructus inferus, capsularis aut baccatus.

**CHRYSOSPLENIUM**, T. L. \* *Dorine, Saxifrage dorée*. Calix superus 4-5-fidus, inæqualis persistens, intus coloratus. Petala 0. Stamina 8-10 breviter. Germen inferum, definens in stylos 2; stigmata 2. Capsula 2-rostris 1-locularis 2-valvis polysperma. *Herbæ; folia crassiuscula simplicia, opposita aut alterna; flores parvi sessiles, plurimi terminales foliis floralibus cincti, 4-fidi & 8-andri omnes excepto primario interdum 5-fido 10-andro.*

**ADOXA**, L. \* **MOSCHATELLINA**, T. \* *Moscatelle*. Calix superus (corolla L.) 4-5-fidus, basi extus 2-squamosus (calix L.) squamis persistentibus. Petala 0. Stamina 8-10, antheris subrotundis. Germen inferum; styli 4-5 persistentes; stigmata 4-5. Bacca globosa umbilicata 4-5-locularis loculis 1-spermis. *Herbæ; folia biternata radicalia; scapus medio oppositè 2-phyllus, apice sæpiùs 5-florus floribus capitatis, lateralibus 5-fidis 10-andris 5-stylis 5-spermis, supremo 4-fido 8-andro 4-stylo 4-spermo. Habitus Panacis trifolii.*

## I I I. Genera Saxifragis affinia.

**WEINMANNIA**, L. \* *Tan-rouge*. Calix 4-partitus. Petala 4 majora. Stamina 8 breviter. Germen superum, disco 8-glanduloso infrâ cinctum; styli 2; stigmata 2. Capsula ovata 2-acuminata 2-locularis 6-8-sperma, apice 2-valvis, valvis introflexione dissepimentum constituentibus. *Arbores aut frutices; folia opposita, oppositè & impari-pinnata petiolo communi alato & articulato, aut rariùs ternata simpliciave; in plurimis stipula utrinque simplex foliis intermedia maxima, mox decidua; flores longè racemosi axillares & terminales, in racemo passim fasciculati*



*pedunculis 1-floris; fructus ferè Iteæ: an ideò genus Rhododendris quodammodò affine?*

**CUNONIA**, L. \* Calix 5-partitus. Petala 5. Stamina 10. Germen superum; styli 2; stigmata 2. Capsula ovata acuminata 2-locularis polysperma. *Arbores; folia opposita, oppositè & imparipinnata, petiolis articulatis; flores racemosi axillares, pedicellis passim fasciculatis 1-floris; stipula foliis & racemis superioribus interjecta magna plana petiolata. Genus Weinmanniæ proximum. Congener Oosterdykia...Burm. Afr. t. 95, cui racemi densiores alopecuroidei.*

**HYDRANGÆA**, Gron. L. \* Calix superus 5-dentatus. Petala 5 majora. Stamina 10, alterna longiora; antheræ subrotundæ. Germen inferum; styli 2; stigmata 2 persistentia. Capsula didyma 2-rostris, apice 2-valvis aut circumscissa, calice coronata, bilocularis polysperma seminibus minutis. *Frutex; folia opposita; flores parvi oppositè & densè corymbosi terminales. Saxifragis adjecta à Bern. Jussæo & à Linn. ord. nat. 13 & ab Adansonio; an affinium Corno, an Philadelpho aut Myrtoideis inter Onagras?*

*Obs.* Germen simplex superum distylum & fructus bivalvis valvis introflexis veras designant Saxifragas, quibus indè cognatæ Weinmannia & Cunonia arboreo tamen habitu foliisque oppositis absimiles. Pro Saxifragis spurii habeantur Chrysosplenium & Adoxa, utrumque germine infero & corollæ defectu & flore supremo aliter stamineo distinctum, sed alteri non affinius ordini.

## ORDO III.

### CACTI, LES CACTES.

**CALIX** superus, apice divisus. Petala definita aut indefinita, summo calici inserta. Stamina definita aut indefinita, ibidem inserta. Germen inferum simplex; stylus unicus; stigma partitum. Bacca infera unilocularis polysperma, ad parietes seminifera. Caulis frutescens aut arborescens; folia alterna aut sæpè nulla.

#### I. Petala & stamina definita.

**RIBES**, L. \* **GROSSULARIA**, T. \* *Groselier, Cassis.* Calix ventricosus 5-fidus coloratus. Petala 5, calici alterna. Stamina 5, eidem opposita; antheræ compressæ incumbentes. Stylus 2-fidus; stigmata 2. Bacca globosa umbilicata, receptaculis 2 oppositis seminiferis. *Frutices, alii inermes, alii spinosi spinis simplicibus aut partitis, quibus axillares gemmæ ramulorum squa-*



mosæ ; folia alterna , in spinescentibus pariter axillaria , petiolo basi dilatato semiamplexicauli in inermibus ciliato aut interdum ciliis rigidis spinuloso ; pedunculi axillares aut è gemmis erumpentes , spinescentium 1-3-flori , inermium racemoso-multiflori ; flores 1-bracteati , in R. alpino dioici ; baccæ esculentæ. Perispermum R. rubri Ranunculaceo more corneum videtur , non farinaceum ; an idem in cæteris ? An restituendum aptius *Grossulariæ* nomen ?

## I I. Petala & stamina indefinita.

CACTUS, L. \* ECHINO-MELOCACTUS, Herm. \* MELOCACTUS, T. \* CEREUS, J. \* OPUNTIA, T. \* EPIPHYLLUM, Herm. \* PERESKIA, Pl. \* *Cacte*, *Cierge*, *Nopal*. Calix urceolatus aut longior tubulosus , squamis numerosis appendiciformibus sæpè imbricatis tectus , suprà germen deciduus. Petala numerosa multiplici serie , basi subcoalita , interiora majora. Stamina numerosa , pariter infrà coalita , antheris oblongis. Stylus longus ; stigma multifidum. Bacca umbilicata squamularum vestigiis exasperata , polysperma feminibus in pulpâ nidulantibus. Arbores aut frutices , pingues formâ variâ , sæpiùs aphylli & articulati , plerumque obducti spinis fasciculatis & pilis in singulo fasciculo intermixtis. Spinarum fasciculi nunc summis tuberculis impositi in Echino-melocacto undique tuberculato & inter tubercula florifero ; nunc unâ serie jugis costarum insidentes , tum in Melocacto ovato vix sesquipedali 14-15-costato suprà desinente in capitulum amplum hemispharicum ex floribus & spinis pilisque compactum densè commixtis , tum in Cereo altiùs assurgente articulatim ramoso sæpè subcylindrico 5-10-costato , rariùs 3-4-gono , & in fasciculorum axillis florifero ; nunc suprà ramos complanatos soleæformes articulatos passim sparsi in Opuntiâ ad extremorum ramulorum margines floriferâ ; nunc subnulli in Epiphyлло pariter articulato & complanato , sed tenuiori & dentato dentibus 1-floris ; nunc demùm foliis alternis planis crassiusculis axillares in Pereskia caule tereti ramoso folioso , ad axillas sertim florifero. Flores in Pereskia & Opuntiâ urceolati , in cæteris subcylindrici longiores , in Epiphyлло longissimi. Fructus quorundam parvus ribesioides , plurimorum major ficiformis , undè *Ficus Indica* nomen. C. cylindrici superficies non costata nec plana , sed areolis rhombeis regularibus apice spiniferis tessellata. Pereskia ex Plumerio monoïca ; ejusdem petala exteriora numerosa criniformia , interiora ovata , in sicco specimine Peruviano observata. Opuntia stamina titillatione irritabilia. Iterato examine sistenda germinatio Melocacti ex Linnæo monocotyledonis , ut & existentia ac natura perispermii in omnibus Cactis.

Obs. Ribes & Cactus communi germinis inferi monostyli & fructus unilocularis ad parietes seminiferi junguntur nexu , indè discrepantes tum à præmissis Saxifragis distylis , tum à sequentibus Portulaceis , utrisque germine supero veriùs notatis. An autem Ribes pentapetala



& pentandra verè Cacto polypetalo & polyandro affinis, suadente conformi fructuum & spinorum fasciculorum structurâ hinc in Ribesiis spinosis, indè in quibusdam Cactis, præcipuè in Cacto parasitico similiter frugifero & in Cacto Pereskia quem Americani vernaculè Groslulariam nuncupant? An generis utriusque semen intus idem?

## ORDO IV.

### PORTULACEÆ, LES PORTULACÉES.

**CALIX** inferus, apice divisus. Corolla definitè polypetala, rarò monopetala aut nulla, imò aut medio calici inserta, eidem sæpiùs alterna dùm numero partium æqualis. Stamina ibidem inserta, definita aut rarò indefinita. Germen superum simplex; stylus unicus aut duplex triplexve aut rarò nullus; stigma sæpè multiplex. Capsula supera, uni aut multilocularis, loculis mono aut polyspermis. Corculum incurvum, typo farinaceo aut subcarnoso circumpositum. Herbæ aut frutices pingues, rariùs arbusculæ. Folia opposita aut alterna, sæpè succulenta.

#### I. Fructus unilocularis.

**PORTULACA**, T. L. \* *Pourpier*. Calix apice 2-valvis & compressus, persistens. Petala 5 majora. Stamina 6-12 aut plura, brevia. Stylus 1 brevis; stigmata 4-5. Capsula circumscissa polysperma receptaculo libero. *Herbæ succulentæ; folia crassiuscula, opposita aut alterna, in axillis nuda aut pilorum fasciculo instructa; flores in ramulis terminales, solitarii aut plures, cincti involucri polyphyllo exteriori uni aut multistoro & interdum pilis numerosis interioribus.* P. quadrifidæ corolla 4-partita 8-andra & germen inferum ex Linneo. Ad *Talinum* depellendæ species Linneanæ 3-valves.

**TALINUM**, Adans. \* **PORTULACA**, L. \* Calix 2-partitus. Petala 5. Stamina plura. Stylus 1; stigmata 3. Capsula 3-valvis polysperma. *Frutices aut suffrutices; folia alterna crassiuscula, interdum in axillis pilosa; flores terminales, paniculati aut racemosi. Hinc referendæ Portulacæ Linneanæ non circumscissæ, & Orygia Portulacifolia Forsk. T. patens 3-stylum, & calix T. fruticosi 5-partitus ex Linn. An congener Cosmia Domb. Peruv., distincta caule herbaceo, floribus solitariis axillaribus 5-andris, habitu Samoli?*



**TURNERA**, Pl. L. \* Calix tubulosus infundibuliformis, limbo 5-partito. Petala 5, perigyna unguiculata. Stamina 5 perigyna, antheris erectis. Styli 3; stigmata multifida. Capsula 3-valvis polysperma, valvis medio seminiferis. *Suffrutices aut herbæ; folia alterna non succulenta, petiolo quorundam 2-glanduloso; flores axillares aut folii petiolo insidentes, solitarii. A Portulacæis habitu dispar & fortè removenda. Confer T. cistoidem cum Piriquetâ.*

**BACOPA**, Aubl. \* Calix 5-partitus inæqualis, laciniâ superiore majore. Corolla monopetala perigyna, tubo brevi, limbo 5-fido. Stamina 5, fauci corollæ inserta; antheræ cuspidatæ erectæ. Germen semiinferum seu basi adnatum calici; stylus 1; stigma capitatum. Capsula polysperma, seminibus minutis. *Herba; folia opposita, basi connata; pedunculi solitarii axillares, medio 2-bracteati. Character ex Aubl. Guyan. t. 49.*

**MONTIA**, Mich. L. \* **ALSINOÏDES**, V. \* Calix 2-valvis persistens. Corolla monopetala 3-partita, laciniis 3 minoribus staminiferis. Stamina 3. Styli 3; stigmata 3. Capsula turbinata, calice tecta, 3-valvis 3-sperma. *Herbula; folia opposita; flores solitarii axillares aut terminales, interdum 5-andri calice 3-valvi. Corolla ex Vaill. 5-petala 5-andra & fructus elasticè 3-partibilis valvis 1-spermis. Affinis Claytoniæ.*

**ROKEJEKA**, Forsk. \* Calix 5-fidus persistens laciniis margine membranaceis. Petala 5 majora marcescentia. Stamina 10. Germen suprà excavatum; styli 2 divaricati; stigmata 2. Capsula compressa 3-sperma calice & petalis persistentibus cincta. *Herba basi lignosa, caulibus diffusis articulatis dichotomis; folia ad articulos opposita vaginantia; flores in caulium dichotomiâ solitarii, aut gemini terminales. Character ex Forsk. An Trianthemæ affinis?*

**TAMARIX**, L. \* **TAMARISCUS**, T. \* *Tamaris*. Calix 5-partitus persistens. Petala 5 majora. Stamina 5-10, antheris subrotundis. Stylus 0; stigmata 3 oblonga plumosa. Capsula oblonga 3-quetra 3-valvis polysperma, seminibus papposis. *Frutices aut arbusculæ Cupressi aut Sabinæ facie; folia alterna, minima squamiformia, aut in T. orientali Forsk. conformia vaginulæ hinc acuminata; flores in ramulis terminales, spicati aut spicato-paniculati, singuli bracteolati. Species quædam galliferæ.*

**TELEPHIUM**, T. L. \* Calix 5-partitus persistens. Petala 5, calici æqualia. Stamina 5; antheræ incumbentes. Stylus 0; stigmata 3. Capsula 3-quetra 3-valvis polysperma, receptaculo seminifero centrali libero. *Herbæ procumbentes; folia alterna stipulacea; flores corymbosi terminales. Species una oppositifolia ex Linn.*

**CORRIGIOLA**, L. \* **POLYGONIFOLIA**, V. \* Semen unicum 3-quetrum, calice connivente tectum. Cætera omninò ut in Telephio. *An congener C. repens Forsk. cui ex Autore caules*



*articulati, folia verticillata subtilius stipulacea, flores capitati terminales, calix 5-phyllus, petala 5 minora, stamina 5, stylus 1, stigmata 3, semen ignotum?*

**SCLERANTHUS**, L. \* **ALCHIMILLA**, T. \* *Gnavelle*. Calix tubulosus, collo coarctatus, suprâ 5-fidus. Petala 0. Stamina 10 minima, calici infidentia; antheræ subrotundæ. Styli 2; stigmata 2. Capsula tenuissima 2-sperma, tecta calice suprâ coarctato. *Caracter ex Linnaeo. Herbulæ; folia opposita linearia; flores axillares & subcorymbose terminales. Habitus Arenariæ & Caryophyllearum, sed stamina perigyna. An fructus potius 1-spermus perispermo seminis nullo, & indè genus Thymelæis aut Thesio affinius?*

**GYMNOCARPUS**, Forsk. \* Calix 5-partitus persistens laciniis intus coloratis, margine pellucidis. Petala 0. Staminum filamenta 10, alterna fertilia, alterna breviora sterilia. Stylus 1; stigma 1. Semen 1, calice indurato tectum. *Suffrutex diffusus, caulibus geniculatis; folia opposita, stipulâ mediâ utrinque juncta, sæpè fasciculum minorum foliorum foventia; pedunculi capitato-multiflori terminales, rariùs axillares; calix intus violaceus. Caracter ex Forsk. Trianthemæ species fruticosa ex D. Vahl: an affinior Paronychiæ & Amaranthis?*

## II. Fructus multilocularis.

**TRIANTHEMA**, Sauv. L. \* Calix 5-fidus persistens, laciniis intus coloratis & sub apice mucronatis. Petala 0. Stamina 5, rariùs 10-12; antheræ subrotundæ. Germen retusum; styli 1-2; stigmata 1-2. Capsula oblonga, imo calice infrâ cincta, apice truncata circumscissa, 2-locularis loculis 2-spermis, semine uno suprâ alterum. *Herbæ; folia opposita; flores axillares capitati sessiles. T. monogyna eadem cum Papulariâ Forsk. 5-andra 1-styla. T. pentandra seu Rocama Forsk. 5-andra 2-styla. An genere distinguenda T. decandra seu Zaleya Burm. Ind. 10-andra 2-styla, Rokejekæ affinis sed apetala & 2-locularis?*

**LIMEUM**, L. \* Calix 5-partitus persistens, laciniis margine membranaceis, 2 exterioribus. Petala 5 breviora. Stamina 7, filamentis basi coalitis aut margini germen ambienti insertis. Stylus 2-partitus; stigmata 2. Capsula 2-locularis polysperma. *Herba prostrata; folia alterna; flores corymbose terminales; habitus Telephii. Caracter ex Linnaeo.*

**CLAYTONIA**, Gron. L. \* Calix 2-valvis. Petala 5 subunguiculata. Stamina 5, unguibus petalorum inserta; antheræ incumbentes. Stylus 1; stigmata 3. Capsula 3-locularis elasticè 3-valvis 3-sperma. *Herbæ; folia radicalia; scapus oppositè 2-phyllus, apice racemoso-multiflorus. An Talino affinior C. portulacaria L. frutex cui habitus Crassulæ, calix 2-valvis, pe-*



*cala 5 persistens, stamina 5, stylus 0, stigmata 3, fructus 3-gonus nondum observatus? C. virginica germinans Monocotyledonum instar unicum protrudit foliolum ex Claytonio.*

**GISEKIA**, L. \* Calix 5-partitus. Petala 0. Stamina 5, filamentis basi dilatatis. Germen 5-partitum; styli 5; stigmata 5. Fructus 5-locularis aut fortè 5-capsularis capsulis minimis approximatis, 1-spermis non dehiscentibus, calice cinctis. *Herba diffusa decumbens, ramis inferioribus trichotomis, cæteris flexuosè & alternatim dichotomis; folia in trichotomiis opposita, cætera alterna, omnia integra pinguia granulata; flores plurimi axillares pedunculis 1-floris; calicis lacinia pilis sparsis intus instructa; capsulae seu semina nigra. An Sempervivis affinior?*

*Obs.* Portulacearum sectio prima Cactos contingit, distincta fructu supero, sed similis eodem uniloculari & habitu Portulacæ pilosæ in foliorum axillis pariter piliferæ. Sectio secunda definitè staminifera & multilocularis priores spectat Ficoïdeas multiloculares sed polyandras. Genera ordinis quædam recognoscenda & fortè à cæteris procul ableganda, jubente hinc staminum & petalorum insertionem mutuâ, inde situ seminum nunc receptaculo centrali nunc mediis valvis innascentium. An præterea genera apetala & monosperma ordinibus apetalis consocianda? An Samolus p. 97 huc revocandus?

## ORDO V.

### FICOIDEÆ, LES FICOIDES.

**CALIX** monophyllus inferus aut superus, definitè partitus. Petala indefinita aut rariùs definita summo calici inserta, aut quandoque nulla calice tunc intus colorato. Stamina plura quàm duodecim, sæpè numerosa, ibidem inserta; antheræ oblongæ incumbentes. Germen simplex, superum aut inferum; styli plures; stigmata totidem. Capsula aut bacca, supera aut infera, multilocularis loculis numero stylium, polyspermis; semina angulo loculorum interiori affixa. Corculum incurvum farinaceo typo circumpositum. Caulis herbaceus aut suffrutescens. Folia opposita aut alterna, plerumque succulenta, formâ plurimùm varia.



## I. Germen superum.

REAUMURIA, Hasselq. L. \* Calix profundè 5-fidus persistens; foliis numerosis linearibus imbricatis infrà cinctus. Petala 5, calici subæqualia, basi intus 2-appendiculata appendicibus ciliatis. Stamina numerosa, antheris subrotundis. Styli 5 approximati. Capsula 5-locularis (1-locularis ex Forsk.) 5-valvis polysperma feminibus lanatis. *Caracter ex Linnæo. Suffrutex Salsolæ facie; folia minima conferta; flores solitarii terminales sessiles.*

NITRARIA, Schob. Pall. L. \* Calix 5-fidus minimus persistens. Petala 5. Stamina 15, antheris subrotundis. Germen oblongum definens in stylum 1; stigma 1 (divisum in icon. Pall.). Drupa ovata acuminata, foeta nuce conformi 3-loculari. *Caracter ex Linnæo. Frutices: folia alterna crassiuscula, interdum fasciculata; flores terminales paniculati aut cymosi. Hujus congener Frutex flore roseo 5-petalo foliis triangulis Lippi mss. n. 237, & Guirzim Maurorum cujus tamen ex D. Adans. nux in 7 crustas coriaceas solubilis.*

SESUVIUM, L. \* PORTULACA, Pl. T. \* Calix campanulatus 5-fidus, intus coloratus, marcescens. Petala 0. Stamina plurima calice breviora, antheræ subrotundæ. Styli 3. Capsula 3-locularis circumscissa. *Folia opposita semiamplexicaulia; flores solitarii axillares, interdum ex Jacq. 4-styli cum fructu 4-loculari.*

AIZOON, L. \* FICOIDEA, Niss. \* Calix 5-partitus persistens. Petala 0. Stamina plura, circiter 15; per phalanges ternatim disposita in calicis sinubus. Styli 5. Capsula 5-gona 5-locularis 5-valvis. *Folia alterna, solitaria aut ex eodem puncto gemina inæqualia; flores solitarii axillares. Species dichotoma foliis suboppositis, in dichotomiis 1-flora.*

GLINUS, L. \* ALSINE, T. \* Glinole. Calix 5-partitus connivens; intus coloratus, persistens. Petala 5 breviora, ligulæformia, apice 2-3-fida. Stamina circiter 15. Styli 5. Capsula calice recta, 5-locularis 5-valvis; semina minuta hinc tuberculata, funiculo umbilicali longiore redimita. *Herbæ repentes, sæpè tomentosæ, ramis alternis; folia alterna, ex eodem puncto gemina inæqualia; flores plurimi axillares; habitus Αἰζοῖ, cujus congener G. crystallinus Forsk. similiter apetalus 8-15-ander staminibus fasciculatis. G. fetifolius Forsk. polypetalus petalis numerosis apice 3-4-setosis, inde Mesembryanthemo propior, sed dispar foliis verticillatis, staminibus definitis, fructu 1-loculari. Genus Caryophylleum ex Bern. Jussæo, & ex Linn. ord. nat. 22, & ex Adans. cui Rolosa dicitur 5-10-petala 1-styla 5-stigmatosa: an rectius Αἰζοο adjectum; an stamina perigyna?*



**ORYGIA**, Forsk. \* Calix 5-partitus. Petala plurima lanceolata. Stamina numerosa. Styli 5. Capsula calice cineta 5-locularis 5-valvis. *Caulis fruticosus decumbens; folia subfarinosa. Character O. decumbentis ex Forskal. O. portulacifolia ejusdem Talini congener.*

## II. Germen inferum.

**MESEMBRYANTHEMUM**, L. \* **FICOIDES**, T. \* *Ficoïde*. Calix superus 5-fidus persistens. Petala numerosa serie multiplici, linearia basi leviter connata. Stamina numerosa. Styli 5, rarius 4 aut 10. Capsula carnosâ umbilicata umbilico radiis notato, multilocularis loculis numero styliorum. *Suffrutices aut herbæ; folia opposita aut rarius alterna, incrassata, formâ plurimum varia; flores solitarii, axillares aut extrâaxillares aut sæpius terminales; fructus interdum ficiformis.*

**TETRAGONIA**, L. \* Calix superus 4-fidus, intus coloratus, persistens. Petala 0. Stamina circiter 20, calice breviora. Styli 4. Drupa coriacea, 4-gona aut 4-alata, foeta nuce 4-loculari. *Herbæ aut suffrutices; folia alterna, solitaria aut rarius ex eodem puncto gemina; flores axillares pedunculis 1-floris, aut racemosi terminales, supremo sæpè 5-fido 5-stylo 5-loculari. Corculum incurvum absque perispermio ex Adans. An inde genus Onagris affinius? T. expansæ fructus sub laciniis calicinis extrâ 4-cornutus.*

**OBS.** Maxima Aizoi & Orygiæ & Mesembryanthemorum alternifoliorum affinitas, non obstante diverso germinis situ: utraque igitur Ficoïdearum sectio rectè consociata. Prior germine supero Portulacis proxima, discrepat numero staminum indefinito aut suprâduodenario. Posterior germine infero Onagris accedens, stylo multiplici & typo corculi incurvi farinaceo & succulento habitu ab iisdem discernitur. An huic affinis Nevada?

## ORDO VI.

### ONAGRÆ, LES ONAGRES.

**CALIX** monophyllus tubulosus superus, limbo diviso, persistente aut deciduo. Petala definita, summo calici inserta, ejusdem laciniis alterna. Stamina definita, ibidem inserta, petalis numero æqualia aut dupla, rarius plura. Germen simplex inferum; stylus plerumque unicus; stigma partitum aut simplex.



Fructus capsularis aut baccatus, inferus aut rarius semiinferus, plerumque multilocularis & polyspermus, raro unilocularis, nunc calicis limbo coronatus, nunc eodem deciduo supra denudatus. Corculum absque perispermio. Caulis herbaceus aut frutescens. Folia alterna aut opposita.

I. Stylus multiplex. Genera inter Ficoideas & Onagras media.

**MOCANERA.** \* **VISNEA**, LS. \* Calix semisuperus 5-fidus. Petala 5. Stamina 12, antheris 4-angulis apice aristatis. Germen semiinferum hirtum; styli 3; stigmata 3. Nux semiinfera, supra calicinis laciniis conniventibus tecta, 2-3-locularis loculis 2-spermis. *Frutex Canariensibus Mocanera dictus; folia alterna; pedunculi axillares solitarii 1-flori, primò nutantes, dein fructu maturescente erecti. Character ex Linn. Suppl., immutatus tamen ratione nucis semiinferæ.*

**VAHLIA**, Thunb. \* Calix 5-fidus. Petala 5. Stamina 5, peralis alterna. Germen inferum; styli 2. Stigmata 2. Capsula calicinis laciniis coronata 1-locularis 2-valvis polysperma. *Herba Aizoï aut Silenes facie; folia opposita; flores axillares. Character ex Thunb. Jap.; ex eodem Ruffelia LS. congener.*

**CERCODEA**, Soland. Lamark. \* **TETRAGONIA**, LS. \* Calix urceolatus 4-gonus, limbo 4-fido brevi persistente. Petala 4 linearia. Stamina 8; antheræ longæ subfessiles 4-gonæ, petalis binatim oppositæ. Germen inferum; styli 4; stigmata 4. Capsula drupacea sub4-gona, calicino limbo connivente coronata, 4-locularis 4-sperma. *Suffrutex caule 4-gono; folia opposita; flores axillares parvi. Congener Haloragis Forst. t. 31. distincta caule herbaceo, habitu Ammaniae.*

II. Stylus unicus. Fructus capsularis. Stamina petalis numero æqualia.

**MONTINIA**, Thunb. LS. \* Dioïca. Calix 4-dentatus. Petala 4; calicinis dentibus alterna. MASC. Stamina 4. FÆM. Filamenta 4 sterilia. Germen inferum; stylus 2-fidus; stigmata 2. Capsula oblonga 2-locularis, longitudinaliter dehiscens polysperma, feminibus depresso margine alatis imbricatis. *Frutices ramis alternis; folia alterna; flores terminales, interdum 5-petali 5-andri. Character ex Thunb. & L. Suppl.*

**SERPICULA**, L. \* Monoïca. Calix 4-fidus persistens. MASC. Petala 4. Stamina 4 brevia. FÆM. Petala... Germen inferum



fulcatum; stylus...; stigma... Nux cylindrica 8-torulosa cartilaginea 1-sperma decidua. *Herba repens, facie Veronicæ serpillifoliæ; folia alterna; flores axillares, masculi pedunculati, feminei sessiles. Character ex Linnæo. Huc referenda ex Thumbergio Laurembergia Berg. Cap. 1. §. f. 10, descriptione non omnino conformis.*

**CIRCÆA**, T. L. *Circée*. \* Calix brevis limbo 2-partito. Petala 2. Stamina 2. Stigma emarginatum. Capsula ovata hispida 2-locularis 2-valvis 2-sperma. *Herbæ; folia opposita; flores spicati terminales, in spicis alterni.*

**LUDWIGIA**, L. \* Calix urceolatus limbo 4-partito longo persistente. Petala 4. Stamina 4, antheris oblongis erectis. Stigma 4-gonum. Capsula 4-gona, calice non coarctato coronata, inter ejusdem lacinias prominula & apice dehiscens foraminulo integro, 4-locularis polysperma. *Suffrutices aut herbæ; folia alterna aut opposita, simplicia; flores solitarii axillares. An verè congener L. erigata L. cui folia opposita, flores terminales?*

III. Stylus unicus. Fructus capsularis. Stamina petalorum dupla.

**JUSSIÆA**, L. \* **ONAGRA**, Pl. T. \* Calix longus cylindricus limbo 4-5-partito persistente. Petala 4-5. Stamina 8-10; antheræ ovatæ aut oblongæ versatiles. Stigma capitatum 4-5-striatum. Capsula oblonga, cylindrica aut angulata, calice coronata, 4-5-locularis 4-5-valvis polysperma, valvis medio septiferis, receptaculo centrali seminifero. *Frutices aut sæpiùs herbæ; folia alterna; flores solitarii axillares. Genus ab Ænotherâ discrepans limbo calicinis persistente.*

**ÆNOTHERA**, L. \* **ONAGRA**, T. \* *Onagre*. Calix longus cylindricus apice deciduus cum limbo 4-partito. Petala 4. Stamina 8; antheræ oblongæ incumbentes. Stigma 4-fidum. Capsula longa cylindrica sub 4-gona 4-locularis 4-valvis polysperma, valvis medio septiferis, seminibus nudis numerosis angulatis receptaculo centrali affixis. *Herbæ, quædam lignosæ; folia alterna; flores solitarii axillares.*

**EPILOBIUM**, L. \* **CHAMÆNERION**, T. \* *Neriette, Epilobe*. Calix longus cylindricus, limbo 4-fido deciduo. Petala 4. Stamina 8, laterna breviora; antheræ ovatæ. Stigma 4-fidum. Capsula longa cylindrica 4-locularis 4-valvis polysperma; semina papposa numerosa, receptaculo longo centrali affixa; valvæ medio longitudinaliter septiferæ. *Frutices aut sæpiùs herbæ; folia opposita aut alterna; flores solitarii axillares aut spicati terminales, in spicis alterni 1-bracteati. Stamina in aliis recta, in aliis declinata.*

**GAURA**, L. \* Calix longus cylindricus, apice deciduus cum limbo 4-partito. Petala 4. Stamina 8; antheræ oblongæ ver-



fatiles. Stigma 5-lobum. Capsula ovata 4-gona striata 1-locularis polysperma, semine unico superflite, cæteris abortivis. *Herbæ; folia alterna; flores spicato-paniculati terminales, in spicis alterni. Glandulas 8 in G. bienni memorat Linnæus summo calici adnatas sub filamentis.*

**CACOUCIA**, Aubl. \* Calix campanulatus, limbo dilatato 5-fido deciduo. Petala 5. Stamina 10, plurimum exserta, antheris ovatis. Stigma 1. Capsula subbaccata 5-angula fusiformis intus pulposa 1-locularis 1-sperma. *Frutex sarmentosus scandens; folia alterna, flores in spicâ terminali longâ alterni, basi bracteati. Character ex Aubl. Guyan. t. 179. Huc fortè referendus Fructus 5-angulus Petiv. Gaz. t. 37. f. 8.*

**COMBRETUM**, Loëfl. L. \* Calix campanulatus, limbo 4-5-dentato deciduo. Petala 4-5 parva. Stamina 8-10 plurimum exserta, antheris oblongis. Stigma 1. Capsula oblonga, 4-5-angularis angulis alatis membranaceis 1-locularis 1-sperma. *Frutices sarmentosi; folia opposita; flores spicati aut spicato-paniculati, terminales & axillares, spicis oppositis. Congener Cristaria Sonner. Ind. 2. t. 140, seu Pevræa Commerf., gallicè Aigrette de Madagascar.*

**GUIERA**. \* *Guier du Sénégal.* Calix oblongus gracilis subcylindricus 4-dentatus. Petala 5 parva. Stamina 10 exserta, alternâ longiora; antheræ globosæ. Stigma 1. Capsula oblonga angusta, cylindræco 5-gona, villosissima villis longis, dentibus calicinis coronata, 1-locularis sæpius 5-sperma seminibus minimis filo pendulis. *Frutex; folia opposita punctata; flores in ramulis terminales, capitati sessiles numerosi suprâ axim involucro communi 4-phyllo cinctum. Character ex D. Adans. & ex sicco. An Myrtoideis affinium?*

IV. Stylus unicus. Fructus baccatus. Genera Myrtoïdea, sed definite staminifera.

**FUCHSIA**, Plum. \* **SKINNERA**, Forst. \* **DORVALLIA**, Commerf. \* Calix infundibuliformis coloratus, limbo 4-fido deciduo. Petala 4, calici concolora. Stamina 8, non exserta (more Rhizophoræ, geminatim petalis opposita?); antheræ subrotundæ. Stigma capitatum. Bacca 4-locularis polysperma. *Carlus Fuchsiæ herbaceus simplex, foliis 3 verticillatis, floribus spicatis terminalibus. Flores 1-2 axillares longè pedunculati penduli, tum in Skinnerâ arboreâ alternifoliâ, tum in Dorvalliâ fruticosâ oppositifoliâ cui simillimum Thilco Feuil. Chil. t. 47, sed 5-petalum 10-andrum.*

**MOURIRIA**, Aubl. \* Calix urceolatus 5-dentatus basi 2-squamosus. Petala 5 basi lata. Stamina 10 inæqualia; antheræ oblongæ. Stigma 1. Bacca calicis suprâ coarctati dentibus coronata, globosa



globosa 1-locularis 4-sperma. *Arbor ramis nodosis; folia ad nodos opposita; corymbi pauciflori axillares, pedunculis bracteolatis. Character ex Aubl. Guyan. t. 180.*

**OPHIRA**, Burm. L. \* Calix... Petala 4 conniventia. Stamina 8, antheris ovatis. Stigma emarginatum. Bacca 1-locularis 2-sperma. *Frutex nodosus; folia ad nodos opposita; flores laterales sessilis involucrati, involucro 2-valvi 3-floro persistente. Character ex Linn. Affinis hinc Corno p. 214, inde Grubbiæ ad Empetrum p. 162 relatæ.*

**BÆCKEA**, Osb. L. \* Calix turbinatus 5-dentatus. Petala 5. Stamina 8, quorum 6 paria & 2 solitaria brevissima; antheræ ovatæ. Stigma 1. Capsula globosa coronata, inter calicinos dentes 3-4-valvis, 3-4-locularis polysperma valvis medio septiferis, seminibus minutis paucis. *Frutex habitu Abrotani, ramulis oppositis; folia opposita linearia; flores solitarii axillares oppositi minimi. Character ex Osbeck & Linn. Genus recognoscendum.*

**MEMECYLON**, L. \* Calix turbinatus, margine integro, fundo striato. Petala 4. Stamina 8, filamentorum apice dilatato truncato, antheris lateri adnatis. Stigma 1. Bacca coronata calice... *Arbuseula; folia opposita integerrima; flores capitati axillares, capitulis solitariis pedunculatis oppositis. Car. ex L. Confer cum Melaleucâ.*

**JAMBOLIFERA**, L. \* Calix 4-dentatus. Petala 4 basi conniventia. Stamina 8, filamentis planis, antheris ovatis. Stigma 1. Fructus... *Arbor Myrto affinis; folia opposita integra; pedunculi multiflori axillares oppositi trichotomi, sæpè fructibus caducis superstites in ramis infra folia. Character ex Linnaeo. An genus potius polyandrum & ad Myrtos depellendum?*

**ESCALLONIA**, LS. \* Calix 5-dentatus persistens. Petala 5 linguata. Stamina 5. Germen inferum; stylus 1; stigma capitatum. Bacca subrotunda calice coronata, 2-locularis polysperma feminibus numerosis. *Frutex glaberrimus, in ramulis dense foliosus & 1-florus; folia alterna linguæformia; flos terminalis. Planta siccatione nigrescens. Character ex L. Suppl.*

**SIRIUM**, L. \* Calix urceolatus 4-fidus. Petala 4 minima (nec raria L.) squamiformia. Stamina 4, antheris oblongis. Stigma 3-fidum. Bacca coronata 3-locularis... *Arbor Myrti facie; folia opposita integra; flores thyrsoides axillares & terminales.*

**SANTALUM**, L. *Santal.* Calix urceolatus margine 4-dentato. Petala 4; glandulæ 4, iisdem alternæ. Stamina 4. Stigma 1. Bacca 1-sperma. *Arbor aromatica; folia opposita; flores... Character ex Linnaeo.*

V. Genera Onagris affinia, polyandra.

**MENTZELIA**, Pl. L. \* Calix superus cylindricus asper, limbo 5-fido deciduo. Petala 5 majora, summo calici inserta. Stamina



circiter 30 ibidem inserta, quorum 10 exteriora filamentis latioribus, cætera interiora subulata; antheræ subrotundæ. Germen inferum; stylus 1; stigma 1. Capsula infera, cylindrica oblonga aspera 1-locularis sub6-sperma, apice 3-valvis. *Herba aspera; folia alterna; flores in ramulis 2-3 terminales.*

LOASA, Adans. Jacq. L. \* ORTIGA, Fewill. \* Calix superus pilosus, limbo 5-fido persistente. Petala 5 majora patentia, unguiculata, apice concavo cucullata; squamulæ 5 interiores, petalis alternæ & minores, sub3-lobæ lobo medio intimo longiore, in conum conniventes & basi intus filamentis 2 sterilibus instructæ. Stamina numerosa 5-fasciculata, calici inserta; fasciculi 15-17-andri squamulis alternantes & petalis oppositi; antheræ erectæ subrotundæ. Germen semiinferum; stylus 1; stigma 1. Capsula infera aut semiinfera, oblonga hirta, 1-locularis, apice 3-valvis & calicinis laciniis cincta, polysperma; receptacula 3 seminifera, capsulæ parietibus affixa. *Herbæ, pleræque piloso-prurientes more Urticæ; folia alterna aut rarius opposita, simplicia interdum pinnatifida; flores in summis ramulis axillares & terminales. Genus Mentzelia proximum, habitu & germinis seminumque situ quodammodo accedens Cucurbitaceis, sed polypetalum.*

Obs. Inter Ficoideas polyandras polystylas & Myrtos polyandros monostylos mediæ procedunt Onagræ, utrisque conformes germine infero sed definite staminiferæ & monostylæ, habitu similes Campanulaceis sed non monopetalæ nec lactescentes, similes etiam Cucurbitaceis sed non apetalæ nec declines nec cirrhosæ ac prærepentes. An Mentzelia & Loasa rectè ordini consociatæ licèt polyandræ; an his adjungenda Turnera licèt pentandra & tristyla? An Montinia & Serpicula declines hinc non dimovendæ? An Trapa huc revocanda? Onagris adjiciuntur baccata quædam genera plurimis characteribus proxima, habitu veriùs Myrtoidea non tamen polyandra, alterutri ordini ad libitum addenda aut in novum posthac erigenda, quibus fortè affines Cornus aut Rhizophora ratione numeri & sitûs staminum.

## ORDO VII.

### MYRTI, LES MYRTES.

CALIX monophyllus, urceolatus aut tubulosus, superus aut rarò semisuperus, nudus aut basi bisquamosus. Petala definita, summo calici inserta, ejusdem laciniis numero æqualia & alterna. Stamina indefinita, ibidem sub petalis inserta; antheræ parvæ subrotundæ



arcuata, apicem filamentorum dilatatum marginantes. Germen simplex inferum aut rarò semiinferum; stylus unicus; stigma simplex aut rariùs divisum. Fructus baccatus drupaceusve aut quandoque capsularis, inferus aut rarò semiinferus, uni aut multilocularis loculis mono aut polyspermis. Corculum absque perispermio, rectum aut incurvum. Caulis arboreescens aut frutescens, ramis saepiùs oppositis. Folia saepiùs opposita & simplicia, rarò alterna, in plurimis punctata.

I. Flores in foliorum axillis aut in pedunculis multifloris oppositi. *Folia plerumque opposita & punctata.*

**ALANGIUM**, Lamark. \* *Angolan.* Calix 6-10-dentatus. Petala 6-10 linearia. Stamina 10-12. Bacca calicinis dentibus coronata, sphæricea carnosâ subcoriacea, 1-locularis 1-3-sperma feminibus pulpâ involutis. *Arbores fastigiata ramulis alternis & interdum apice spinuloso pungentibus; folia alterna non punctata; flores 1-3 axillares. Character ex D. Lamark Dict. An genus rectè dispositum; an Myrtoideis præcedentibus affine?*

**DODECAS**, LS. \* Calix turbinatus 4-fidus, basi 2-bracteatus. Petala 4. Stamina 12 brevia. Capsula semiinfera 1-locularis polysperma, inter persistentes calicis lacinias ultrâ producta apice denudato 4-valvi; semina numerosa minuta. *Frutex; folia opposita; flores solitarii axillares. Habitus Lycii, aut Jusfiæ. Character ex L. Suppl. An Salicariis affinior?*

**MELALEUCA**, L. \* Calix turbinatus, limbo 5-fido deciduo. Petala 5 parva. Stamina 30-35, filamentis basi connatis in 5 fasciculos senarios aut septenarios; antheræ oblongæ incumbentes. Capsula semiinfera, calice baccato urceolato semi-vestita, 3-locularis apice 3-valvis loculis polyspermis. *Arbor; folia alterna integerrima subavenia; pedunculi breves multiflori, ramulis insidentes infra folia. Character ex Linnæo.*

**LEPTOSPERMUM**, Forst. \* Calix & petala Melaleucæ. Stamina numerosa distincta; antheræ ovatæ incumbentes. Capsula turbinata semiinfera, calicis margine umbilicata, 3-locularis supra 3-valvis, polysperma feminibus minutis. *Arbores aut frutices; folia opposita aut alterna, nunc subavenia nunc tri aut multinervia; pedunculi uni aut multiflori, terminales aut axillares aut infra folia. Character ex Forst. & ex Linn. Suppl. Genus ex utroque congener Melaleucæ sed non polyadelphum: an uniendo duo genera, posthabitâ polyadelphiam?*



**GUAPURIUM.** \* *Guapuru du Pérou.* Calix 4-fidus. Petala 4. Stamina numerosa, antheris subrotundis. Bacca sphaericea, calicis limbo umbilicata, intus pulposa & 2-4-sperma. *Arbustula; folia ramorum decidua, ramulorum opposita simplicia punctato-pellucida, 3-6-juga & inde quasi abruptè-pinnata; flores ex rimoso ramorum nudorum coriice fasciculatim erumpentes. Character ex sicco & ex Jos. Jussao. Habitus Pliniae, sed germen non superum.*

**PSIDIUM, L.** \* **GUAIAVA, T.** \* *Goyavier.* Calix 4-5-fidus, extus basi 2-squamulosus. Petala 4-5. Stamina numerosa. Bacca ovalis calicino limbo coarctato coronata, 4-5-locularis polysperma, seminibus numerosis pulpâ involutis. *Arbores ramulis 4-gonis; flores solitarii axillares pedunculati; fructus esculentus. An verè congener species foliis 3-nerviis quæ Arbor Sinensis... Pluk. t. 272 f. 1? Huc retulit Linneus fil. Supl. Decaspermum Forst. t. 37, distinctum tamen fructu 10-loculari 10-spermo.*

**MYRTUS, T. L.** \* *Myrte.* Calix 5-fidus. Petala 5. Stamina numerosa. Bacca calice umbilicata 2-3-locularis, loculis 1-5-spermis. *Arbustulae aut frutices; flores nunc solitarii basi 2-squamosi axillares, nunc oppositè corymbosi aut paniculati axillares terminalesve, quidam 4-petali calice 4-fido, quidam calice indiviso. Folia in paucissimis interdum quædam alterna. An genus dividendum ratione loculorum baccae & situs florum? Bacca M. communis in axillis florifera polysperma 3-locularis, 2-locularis 2-sperma in M. caryophyllatâ & M. Pimentâ utraq. ad ramulorum apices oppositè multiflorâ: prætereâ calix M. Pimentæ basi 4-squamulosus.*

**EUGENIA, Mich. L.** \* Calix 4-fidus. Petala 4. Stamina numerosa. Bacca pyriformis aut sphaericea, calicinis laciniis patentibus coronata, 1-locularis 1-sperma, rariùs 2-3-sperma. *Arbores aut frutices; pedunculi axillares aut terminales, 1-flori aut trichotomè multiflori. Congeneres arbusculæ & frutices Commersoniani Bois de Neffe & Bois Jacot Borboniensibus dicti quibus flores solitarii axillares sub calice 2-squamosi & drupa 1-2-sperma mespiliformis, undè nomen. Congener etiam Eugeniæ aut Myrti Adelia Brown. Jam. t. 36. f. 3. E. acutangula & E. racemosa L., utraq. alternifolia & racemoso-multiflora, ad Butonicam & Stravadium infra relatæ.*

**CARYOPHYLLUS, Clus. T. L.** \* *Giroflier.* Calix oblongus infundibuliformis, limbo 4-fido. Petala 4. Stamina numerosa. Drupa sicca ovata, calicinis laciniis conniventibus coronata, 1-sperma. *Arbustulae; flores trichotomè & alternatim corymbosi terminales, articulis & pedicellis basi 2-squamulosi. Calix antè florescentiam excerptus, inter condimenta aromatica insignis. Species quædam aut varietates spiculis trichotomè corymbosis ex Rumphio.*

**DECUMARIA, Willich. L.** \* Calix 8-10-fidus laciniis coloratis reflexis. Petala 8-10. Stamina 16-25. Stigma 10-lobum. Fructus...



10-locularis 10-spermus. *Arbor ; panicula corymbosa terminalis ; flores tiliacei. Character ex Linnaeo.*

**PUNICA**, T. L. \* *Grenadier*. Calix turbinatus coriaceus 5-6-fidus coloratus. Petala 5-6. Stamina numerosa. Pomum magnum sphaericeum, limbo calicino coronatum, cortice coriaceo, 9-loculare, loculis 5 superioribus & 4 inferioribus septo transverso ab invicem distinctis polyspermis ; femina numerosa angulata, arillo pulposo involuta. *Arbusculæ aut frutices ramulis axillaribus sub 4-gonis apice spinoso pungentibus ; interdum spinæ simplices axillares ; folia opposita, rarius verticillata aut alterna ; flores 2-5, in ramulis conferti terminales subsessiles.*

**PHILADELPHUS**, L. \* **SYRINGA**, T. \* *Syringa*. Calix turbinatus 4-fidus. Petala 4. Stamina circiter 20. Stigma 4-fidum. Capsula ovata semiinfera 4-locularis 4-valvis polysperma feminibus minutis. *Frutices aut arbusculæ ; folia opposita non punctata ; flores terminales corymbosi aut oppositè subspicati, singuli bracteolati, interdum 5-petali cum fructu 5-loculari. P. coronarii stylus maturescente fructu 4-partitus. Melaleuca congener ex L. Suppl. frutex dictus Philadelphus aromaticus HRP. alternifolius 5-petalus stigmate unico.*

**SONNERATIA**, LS. Lamark. \* *Pagapate*. Calix coriaceus urceolatus 6-fidus persistens. Petala 6 patentia. Stamina numerosa. Germen semiinferum. Bacca semiinfera magna globosa, calici persistenti & patulo insidens quasi supera, Aurantii instar multilocularis (24-26) loculis intus utriculosis succo acido turgidis polyspermis ; femina pauca, cartilaginea. *Arbuscula ramis 4-gonis ; flores in ramulis subsolitarii terminales magni. Huc referantur Mangium caseolare Rumph. 3. t. 74 & Pagapate Sonner. Guin. t. 10-11. & Blatti Rheed. Mal. 3. t. 40. Lamark Dict. 1. p. 429 & Bagatpat Camell. ic. 33. Rai. hist. 3. Luz. p. 83.*

**FÆTIDIA**, Commerf. Lamark. \* Calix turbinatus 4-fidus. Petala. Stamina numerosa, antheris minimis. Stylus 1 ; stigma 4-fidum. Capsula lignosa, apice truncata 4-angularis plana, laciniis calicinis marginata coriaceis revolutis, intus 4-locularis loculis 1-2-spermis. *Arbuscula Myrtoïdea, licet forsàn apetala ; folia conferta terminalia, subnervia, centrali juniore in cornu convoluta ; flores inter folia solitarii axillares pedunculati. Bois puant Bourbonnensium. Character ex sicco & ex Commerfic. An affinis Pirigaræ ?*

**CATINGA**, Aubl. \* Calix 4-fidus. Petala... Stamina numerosa. Stigma... Drupa Aurantii aut Citri æmula, calicino limbo minimo coronata, cortice crasso vesiculis oleiferis obtecto, intus fibrosa, foeta testâ fragili 1-spermâ ; semen magnum. *Arbores ; folia opposita aut interdum alterna ; fructus plurimi axillares ; flores nondum observati. Character ex Aubl. Guyan. t. 203.*



I I. Flores in racemis alterni. *Folia sæpiùs alterna & non punctata.*

**BUTONICA**, Rumph. 3. t. 114. Lamarck. \* **BARRINGTONIA**, Forst. LS. \* **MAMMEA**, L. \* **COMMERSONA**, Sonner. Guin. t. 8-9. *Butonic.* Calix maximus 4-gonus pyramidatus, limbo coriaceo 2-partito persistente. Petala 4 magna coriacea. Stamina numerosa, filamentis basi in cylindrum coalitis. Stylus è medio cylindro longissimus persillens. Drupa sicca magna, 4-angularis pyramidata, intus ligneo-carnosa, foeta nuce fibrosa 4-gonâ 1-spermâ, loculis & seminibus 3 abortivis. *Arbor maritima; folia confertim opposita, summa verticillata coriacea integerrima; flores sæpè in thyrsium terminalem ternatim dispositi, pedicellis 1-bracteatis. Hujus congener ex D. Lamarck Samstravadi Rheed. Mal. 4. t. 6, ad Eugeniâ racemosam L. relatum, cui calix pariter 2-fidus & stamina basi monadelphæ & fructus 4-gonus 1-spermus & folia conferta, & præterea flores racemosi terminales in racemo alterni.*

**STRAVADIUM**. \* **EUGENIA**, L. \* Calix apice 4-fidus. Petala 4. Stamina numerosa. Fructus drupaceus oblongus sub4-gonus, calicino limbo parvo coronatus, intus 1-spermus. *Arbores; folia conferta terminalia; flores racemosi terminales, in racemo alterni. Huc referantur Butonica alba Rumph. 3. t. 116 Eugeniæ racemosæ L. adjecta, & Eugenia acutangula L. seu Tsjeria-Samstravadi Rheed. 4. t. 7, & Balingasan Camell. ic. 38. Rai. hist. 3. Luz. p. 61.*

**PIRIGARA**, Aubl. \* **GUSTAVIA**, LS. \* Calix turbinatus, limbo 4-6-lobo, basi extus 2-squamosus. Petala 4-6. Stamina numerosa filamentis brevibus, basi in campanam à stylo distantem coalitis ex LS. Stylus brevis; stigma 4-lobum. Capsula coriacea pomiformis, suprâ calicino vestigio latius umbilicata, 4-locularis, aut 6-locularis ex LS., loculis 6-7-spermis; semina fabæformia receptaculo centrali annexa ope funiculi appendiciformis incrassati. *Arbores ligno foetido, Bois puant Guyanensium; folia alterna magna; pedunculi multiflori terminales, floribus alternis magnis Lilium spirantibus. Caractèr ex Aubl. Guyan. t. 192-193 & ex L. Suppl.*

**COUROUPITA**, Aubl. \* Calix, corolla, urceolus, stamina, germen, stylus & stigma ut in Lecythi subsequente. Capsula maxima globosa, lignosa tenuis, semiinfera, calicino vestigio circulari cincta, non dehiscens nec operculata, includens alteram capsulam seu nucem conformem magnam pulpâ involutam 6-locularem, septis membranaceis (fructu maturecente evanidis) loculos distinguentibus intus pulposos & polyspermos; semina numerosa, in pulpâ nidulantia. *Arbor; folia*



*in ramulis alterna magna ; flores in trunco & ramis nudis spicati , in spicis alterni magni , suave odori , pedicellis basi 1-bracteolatis & sub calice 2-squamosis ; fructus magnus , Boulet de Canon à formâ dictus. Hujus emissio per foramina arte facta succo pulposo inter utramque capsulam contento , interior libera volvitur in exteriore. Character ex Aubl. Guyan. t. 282.*

**LECYTHIS**, Loëfl. L. Aubl. \* *Quatelé*. Calix semisuperus, apice 6-lobus æqualis lobis deciduis. Petala 6, calici inserta sub divisuris & urceolo adnata, coriacea concava. Urceolus in flore centralis (nectarium L.), sub petalis calici insertus, medio perforatus pro trajiciente germinis stylo, corollæformis coriaceus margine integer, intus vestitus staminibus numerosis subsessilibus, hinc productus in ligulam lateralem membranaceam bilamellatam, longam & latam, numerosis in apice incrassato papillis aut lamellis imbricatis onustam, à basi inflexam & in urceolum pronam papillis & antheris tunc promiscuis. Germen semiinferum, desinens in stylum conicum; stigma obtusum. Capsula lignosa, 4-locularis aut rarius 2-6-locularis, formâ & mole & densitate varia, semiinfera exstantibus ad ambitum calicis vestigiis, ollæ instar apice circumscissâ & operculata, operculo infra producto in receptaculum centrale angulosum & capsulæ dissepimentis adjectum; semina in quolibet loculo solitaria aut pauca, receptaculo inserta, angulata, arillo membranaceo tecta. *Arbores aut frutices ; folia alterna ; flores spicati terminales & ramulis axillares , in spicis alterni , pedicellis basi 1-bracteatis & sub calice sæpè 2-squamosis. Character ex Linn. & ex Aubl. Guyan. t. 283-289 & ex floribus fructibusque siccis. Peculiaris in Lecythi urceolus non limbo staminifer ut in Pirigarâ & Butonicâ , sed antheris intus obtectus & latere ligulatus : an indè genus à præcedentibus diversissimum ? An huic adjicienda Couratari Aubl. t. 290 , cui ex Aubletio capsula longior subcylindrica 3-gona minùs crassa , receptaculum operculo continuum crassum longum 3-gonum , semina 3 oblonga alâ foliaceâ cincta , caulis arborescens , folia alterna , flores nondum observati ? An potiùs Couratari eadem cum Penar-valli Rheed. 8. t. 47-49 & Zanonîâ L. , ideòque Cucurbitaceis affinior ?*

**Obs.** Germen Onagris & Melastomis definitè staminiferis simplex inferum & monostylum, idem omninò in Myrtis indè similibus sed indefinito staminum numero diversis. An tamen genera inter Onagras Myrtoïdea à veris Myrtis certò dimovenda utpotè vix decandra ; an potiùs iisdem consocianda, evanido tunc polyandriæ caractere generali cui subrogetur alter ex habitu & corculi formâ & stigmate simplici aut diviso desumptus Onagras secernens à Myrtis. Utcumque se res habeat, Onagræ Myrtos attingunt mediantibus Myrtoïdeis alterutri adjunctis ordini aut seorsim ordinandis. Rectè etiam Myrtis accedunt genera alternifolia foliis non punctatis, præterea similia nec aptiùs alibi reponenda, quæ stylo simplici non laterali & majore



staminum copiâ & stipularum defectu discrepant à Rosaceis nonnullis infra memorandis, pariter polyandris & intrâ calicem germiniferis & alternifoliis.

## ORDO VIII.

### MELASTOMÆ, LES MÉLASTOMES.

**C**ALIX monophyllus tubulosus, superus aut inferus, unicus aut squamis cinctus. Petala plura definita, summo calici inserta, ejusdem laciniis numero æqualia & alterna. Stamina ibidem inserta, definita, petalorum dupla; filamentorum apex sub antheris sæpius bisetosus aut biauriculatus; antheræ longæ apice rostratæ, basi summis infixæ filamentis, primò iisdem intròflexis nutantes, dein erectis assurgentes. Germen nunc superum calice tectum, nunc inferum; stylus unicus; stigma simplex. Fructus baccatus aut capsularis, modò superus calice suprâ coarctato tectus, modò inferus eidem calici adnato succrescens, multilocularis loculis polyspermis. Corculum absque perispermo? Caulis subarborescens aut frutescens aut rarius herbaceus. Folia opposita simplicia, tri aut multinervia nervis longitudinalibus. Flores oppositi, axillares aut terminales, pedunculis uni aut multifloris.

#### I. Germen inferum.

**BLAKEA**, Brown. L. Calix limbo integro 6-angulari, basi cinctus 6 squamis trino ordine oppositis. Petala 6 æqualia. Stamina 12, filamentis erectis, antheris magnis in annulum concatenatis. Germen margine calicino coronatum. Capsula 6-locularis. *Arbusculæ aut frutices; flores axillares subsolitarii. Character ex Brown. & Linn. Huic affinis & minùs congener Blakea Aubl. Guyan. t. 2. 10, cui calicis limbus 5-lobus caducus, petala 8-9 unguiculata & hinc basi appendiculata, stamina 16-18, filamenta breviter apice dilatata, antheræ ovatæ filamentis intùs adnatæ in annulum conniventes, stigma peltatum striatum, bacca turbinata truncata calice integro suprâ marginata, 8-9-locularis intùs pulposa, cætera similia. Utriusque examinanda in vivis stamina, & posthàc genus unicum aut duplex ad Myrtos fortè repellendum.*



MELASTOMA, Burm. L. \* GROSSULARIA, Pl. T. \* *Mélastome*.

Calix 5-fidus aut 5-dentatus, aut subinteger. Petala 5. Stamina 10. Bacca 5-locularis. *Arbusculæ aut frutices; flores oppositè corymbosi aut paniculati aut spicati, axillares & terminales, interdum 4-petali 8-andri cum fructu 4-loculari. Calix in plurimis supra fructum coarctatus & ultra prominens, in paucioribus fructui truncato æqualis non coarctatus. Petala quibusdam hinc appendiculata. Germen ex Linnæo obvolutum calice, ex Jacquinio subinferum, ex Aubletio nunc inferum nunc superum. Aubletius insuper species memorat alias fructu 3-loculari, alias 2-loculari, quasdam fructu capsulari in valvas scissili, quasdam calice extus 2-bracteato, quasdam caule herbaceo Rhexiæ magis affines, unam staminibus 5 sterilibus, unam calice 10-dentato. Genus ergò in vivis denudè examinandum, & in plura fortè distribuendum, aucto specierum numero. Huc interea referatur Fothergilla Aubl. Guyan. t. 175, cui calix subinteger vix 5-dentatus, extus 2-bracteatus, antheræ basi glandulosæ, germen inferum, stigma peltatum, bacca exsucca pisiformis coronata 3-locularis, cætera similia.*

TRISTEMMA. \* Calix limbo 5-fidus, extus propè limbum duplici coronâ membranaceo-ciliatâ auctus. Petala 5 unguiculata. Stamina 10. Germen semiinferum. Bacca ovata compressa subangulata, apice tantum libera sed tecta & coronata, 5-locularis intus pulposa. *Herba Mauritanica (Melastoma virulana Commerf.) caulibus 4-gonis; flores capitati, foliis superioribus axillares; capitula imbricatim bracteata bracteis singulis 1-floris, exterioribus majoribus; bacca à vicinarum contactu compressæ, edules, antisphiliticæ. Character ex Commerf. & ex sicco. Nomen à triplici fructus coronâ persistente.*

## II. Germen superum.

TOPOBEA, Aubl. \* Calix basi ventricosus & squamis 4 cruciatim imbricatis cinctus, medio coarctatus, limbo campanulatus subinteger vix 6-dentatus. Petala 6 inæqualia. Stamina 12, filamentis & antheris erectis in cylindrum subcoalitis. Germen imo calice cinctum; stylus staminum cylindro longior & ultra incurvus; stigma 6-gonum. Bacca imo calice carnosio obvoluta 6-locularis. *Frutex arborum parasiticus, sarmentosus sarmentis 4-gonis; flores plures pedunculati axillares. Character ex Aubl. Guyan. t. 189.*

TIBOUCHINA, Aubl. \* Calix superficie squamulosâ, limbo 5-fidus, basi cinctus squamis 4-6 imbricatis & cruciatim oppositis. Petala 5. Stamina 10; antheræ basi 2-cornes. Capsula 5-locularis 5-valvis calice obvoluta. *Frutex caulibus 4-gonis; flores solitarii axillares aut corymbosi terminales pedunculis 1-3-floris. Character ex Aubl. Guyan. t. 177.*



**MAYETA**, Aubl. \* Calix hirsutus limbo 5-fidus, extùs 5-squamulosus. Petala 5 subrotunda. Stamina 10; antheræ basi 2-cornes, apice membranaceæ. Stylus brevis. Bacca calice carnosio obvoluta coronata 5-locularis. *Frutex caulibus 4-gonis nodosis; folia ad nodos opposita, inæqualia uno majore; flores axillares subsessiles solitarii. Character ex Aubl. Guyan. t. 176.*

**TOCOCA**, Aubl. \* Calix limbo 5-fido ad margines piloso. Petala 5 subrotunda. Stamina 10. Stylus brevis; stigma latius peltatum. Bacca calice carnosio suprâ coarctato obvoluta, quasi infera, coronata 3-locularis. *Frutex caulibus 4-gonis; folia petiolo utrinque vesiculoso; flores verticillato-spicati terminales, pedunculis oppositis brevibus sub 3-floris, quidam 6-petali 12-andri. Character ex Aubl. Guyan. t. 175.*

**OSBECKIA**, L. \* Calix limbo 4-partito, squamulis ciliatis interjectis. Petala 4. Stamina 8; antheræ rostro filiformi longo. Germen infrâ calici adnatum, suprâ terminatum squamis ciliatis. Capsula vestita calicis tubo truncato, 4-locularis. *Herba?... caule 4-gono; flores aliquot terminales sessiles, cincti 4 foliis flore longioribus. Character ex Linnæo.*

**RHEXIA**, Gron. L. \* Calix 4-fidus, Petala 4. Stamina 8, antheris declinatis. Capsula calice infrâ ventricoso tecta 4-locularis 4-valvis. *Herbæ caule 4-gono, quædam sublignosæ; flores terminales & axillares pedunculati. R. Acisanthera L. infrâ Salicariis adjicitur, restituto Acisantheræ generico nomine Brownæano.*

**Obs.** Melastomæ inter Myrtos & Salicarias mediæ & utrisque affines calice tubuloso ad limbum-staminifero & corollifero, obtegente germen in aliis inferum more Myrtoideo, in aliis superum tectum ut in Salicariis. Ab utroque discrepant ordine filamentis staminum bisetosis & antheris longis apice rostratis, numero earundem definito Salicariis propius accedentes & à Myrtis distantiores.

## ORDO IX.

### SALICARIÆ, LES SALICAIRÉS.

**CALIX** tubulosus aut urceolatus. Petala definita, summo calici inserta & ejusdem divisuris alterna, interdum nulla. Stamina definita (indefinita in Lagerstromiâ & Munchausiâ), petalis numero æqualia aut dupla, medio calici inserta; antheræ parvæ. Germen simplex superum; stylus unicus; stigma sæpè capitatum. Capsula calice cincta, uni aut multilocularis,



polysperma seminibus receptaculo centrali affixis. Corculum absque perispermo. Caulis frutescens aut herbaceus. Folia opposita aut alterna. Flores axillares aut terminales.

### I. Flores polypetali.

**LAGERSTROMIA**, L. \* Calix campanulatus 6-fidus. Petala 6 undulata, ungue filiformi. Stamina plurima, quorum 6 exteriora longiora; antheræ orbiculatæ. Fructus... *Caracter ex Linnæo. Frutex ramis 4-gonis; folia (Punicæ) inferiora opposita, superiora alterna quibus axillares pedunculi multiflori in paniculam terminalem disposui. An Munchausiæ congener?*

**MUNCHAUSIA**, L. Murr. \* Calix turbinatus 6-fidus persistens, extus torulosus. Petala 6 undulata, ungue filiformi. Stamina plurima, in sex fasciculos 4-5-andros collecta aut connata; antheræ reniformes. Capsula ovata, stylo acuminata, infra calice cincta, 6-locularis 6-valvis valvis medio septiferis, polysperma seminibus planis alatis receptaculo centrali affixis. *Arbusculæ; folia alterna magna; flores racemoso-paniculati terminales. Caracter ex Linnæo & ex fructu secco. Hinc referendæ Adamboë Rheed. Mal. 4. t. 20-22, & Banava Camell. ic. 42. Rai hist. 3. Luz. p. 80.*

**PEMPHIS**, Forst. t. 34. \* **LYTHRUM**, LS. \* Calix turbinatus sulcatus, limbo 12-dentato, dentibus alternis minoribus. Petala 6. Stamina 12, alterna paulò breviora; antheræ incumbentes. Capsula subsphærica, stylo acuminata, 1-locularis basi circumscissa, polysperma seminibus angulatis receptaculo centrali dentato & parum prominulo insertis. *Frutex canus; folia opposita; flores solitarii axillares pedicellis basi 2-bracteatis.*

**GINORIA**, Jacq. L. \* Calix urceolatus 6-fidus coloratus. Petala 6 longiora unguiculata. Stamina 12; antheræ reniformes. Capsula sphæroïdea stylo acuminata 4-fulca 1-locularis 4-valvis polysperma, receptaculo seminifero magno subrotundo. *Frutex elegans; folia opposita; pedunculi 1-flori axillares & terminales. Caracter ex Jacq. Amer.*

**GRISLEA**, Loëfl. L. \* Calix tubuloso-campanulatus 4-dentatus coloratus persistens. Petala 4 minutissima. Stamina 8 longissima ascendentia; antheræ subrotundæ. Capsula globosa substipitata, calice brevior 1-locularis polysperma receptaculo magno. *Frutex ramis parallelis vimineis; folia disticha; flores in corymbis axillaribus confertis oppositis secundi, sursum flexi. Caracter ex Loëfl.*

**LAUSONIA**, L. \* Calix 4-fidus. Petala 4. Stamina 8, geminatim petalis opposita ex Linn. Capsula calici patulo persistenti insidens, globosa stylo acuminata, 4-locularis polysperma



feminibus angulatis receptaculo centrali annexis. *Frutices aut arbusculæ Ligustri facie, ramulorum apice spinoso aut inermi; folia opposita; flores paniculati supraaxillares & terminales. Hinc eliminanda Poutaletsje Rheed. Mal. 4. t. 57 monopetala 4-andra germine infero, affinium Petesæ. An generi rectè adjecit Linnæus fil. Suppl. Acronychiam Forst. t. 27 distinctam calice minimo 4-partito, petalis apice inflexis (fortè hypogynis?), disco germinis tumido 8-sulcato, stigmate subbilobo, loculis 1-spermis?*

**CRENEA**, Aubl. \* Calix urceolatus 4-fidus. Petala 4. Stamina 14. Capsula parva, calice infrà obvoluta, acuminata 5-locularis polysperma feminibus minutis. *Herba multicaulis; caules 4-goni alati; folia opposita; pedunculi 1-2 axillares, 2-3-flori floribus minimis, pedicellis basi 1-bracteolatis & medio 2-squamosis. Caractèr ex Aubl. Guyan. t. 209.*

**LYTHRUM**, L. \* **SALICARIA**, T. \* *Salicaire*. Calix cylindricus striatus 12-dentatus, denticulis alternis minoribus aut interdum nullis. Petala 6. Stamina 12 filiformia duplici ordine, superiora breviora; antheræ assurgentes. Capsula oblonga tecta 2-locularis polysperma. *Herbæ, excepto L. fruticoso fortè dissimili; folia alterna aut sæpius opposita aut subverticillata; flores sæpè verticillato-spicati terminales aut verticillati axillares, interdum axillares subsolitarii 6-andri, aut in L. Thymifoliâ seu Pentaglossa Forsk. 2-andri 4-petali calice 4-dentato. An verè congener L. triflorum LS. (Nesæa Commerf.) herbaceum foliis oppositis, pedunculis oppositis axillaribus 3-floris, 4-5-petalum 8-10-andrum, calice ventricoso 8-10-dentato, fructu 2-loculari? Species quædam aliæ Linnæanæ infrà generibus propriis restituntur.*

**ACISANTHERA**, Brown. \* **RHEXIA**, L. \* Calix ventricosus 5-fidus. Petala 5. Stamina 10, antheris sagittatis versatilibus. Capsula calice tecta & coronata, subrotunda 2-locularis 2-placentaris polysperma. *Herbæ; folia opposita; flores alternè axillares solitarii. A Rhexiâ discrepat numero partium & loculorum, antheris non conformibus, foliis non similiter nervosis, florum situ.*

**PARSONSIA**, Brown. \* **LYTHRUM**, L. \* Calix subventricosus striatus 6-denticulatus. Petala 6. Stamina 6 breviora non exserta. Capsula parva membranacea calice tecta, unilocularis 2-6-sperma receptaculo centrali. *Herbæ; folia opposita; flores alternè axillares solitarii. Huc referatur Lythrum Parsonsia L. An congener etiam Melanium Brown. seu Lythrum Melanium L. 8-9-andrum & præterea simillimum?*

**CUPHEA**, Brown. Jacq. \* **LYTHRUM**, LS. \* Calix tubulosus 12-striatus 6-dentatus dente superiore latiore. Petala 6 inæqualia, 2 superiora majora. Stamina 12 insertionem inæqualia, nempe hinc 8 coordinata & conformia, inde 4 minora gemino ordine disposita quorum 2 superiora villosa; antheræ subrotundæ. Capsula oblonga 1-locularis calice tecta, cum



ipſo ſimul hinc fiſſa & tunc cymbiformis; receptaculum centrale è mediâ per rimam erumpens flexum, circiter 5-ſpermum ſeminibus lentiformibus quaſi ſpicato-ſecundis. *Herba undique viſcoſiſſima; folia oppoſita, axillis inferioribus ſæpiùs alternè ramiferis, ſuperioribus ſub-1floris.*

## II. Flores ſæpè àpetali.

**ISNARDIA**, L. \* Calix campanulatus 4-fidus. Petala 0. Stamina 4. Capſula imo calice cinctâ, 4-gona 4-locularis polyſperma. *Herba paluſoſa repens; folia oppoſita; flores miniſi axillares oppoſiti ſeſſiles. Habitus Peplidis.*

**AMMANNIA**, Houſt. L. \* Calix campanulatus ſtriatus 8-dentatus. Petala 4, interdum 0. Stamina 4, antheris didymis. Capſula calice rectâ 4-locularis polyſperma. *Herbæ aquaticæ; folia oppoſita; flores plures axillares ſeſſiles miniſi, oppoſiti & quaſi verticillati. Calix A. bacciferæ, ſeu Cornelix Ard. 4-dentatus capſulâ brevior.*

**GLAUX**, T. L. \* Calix campanulatus coloratus 5-lobus lobis revolutis. Petala 0. Stamina 5, antheris ſubrotundis. Capſula calice cinctâ, globosa 1-locularis 5-valvis 5-ſperma, receptaculo globoſo ſeminibus excavato. *Herba maritima repens; folia oppoſita; flores miniſi axillares ſubſolitarii ſeſſiles. An congener Brami Rheed. Mal. 10. t. 14, licèt 5-petala?*

**PEPLIS**, L. \* **GLAUX**, T. \* Calix campanulatus 12-fidus laciniis alternis reflexis. Petala 6, interdum abortiva. Stamina 6 brevia; antheræ ſubrotundæ. Capſula calice rectâ 2-locularis polyſperma diſſepimento utrinque ſeminifero. *Herba paluſtris repens; folia oppoſita; flores miniſi axillares ſolitarii oppoſiti. P. tetrandra Jacq. L. 1-petala 4-andra germine infero, ſtigmatè duplici, capſulâ 2-loculari polyſpermâ 2-valvi, ſtipulâ foliis intermediâ: affinioregå Rubiaceis & proxima Oldenlandix aut Gomoziæ, diſtinguenda tamen calice 8-dentato.*

**Obs.** Salicariæ ordinibus conterminis affines calice tubuloſo uaut receptaculoſo, ſuprà corollifero & ſubtus ſtaminifero. Illas germen ſuperum ſecernit ab Onagris, à Myrtis prætereâ polyandris & à Pomaceis ſubſequentibus inſuper polystylis. Similes Melastomis nonnullis fructu recto non infero, diverſam antherarum ſtructuram exhibent. An rectè diſpoſitæ inter Melastomas & Pomaceas? An propiùs adjiciendæ Onagris dum polypetalæ, aut Portulacis dum apetalæ? An genera apetala polypetalis verè affinia utpotè in eodem puncto ſtaminifera & monoſtyla & pariter receptaculo centrali inſtructa? An indè potiùs addenda Portulacis?





## ORDO X.

## ROSACEÆ, LES ROSACÉES.

**C**ALIX superus tubulosus, aut inferus urceolaris rotatusve, limbo sæpiùs diviso, plerumque persistens. Petala definita, sæpiùs quinque, summo calici inserta & eidem alterna, aut quandoque nulla. Stamina indefinita aut rariùs definita, ibidem inserta sub petalis; antheræ sæpè subrotundæ. Germen nunc simplex inferum stylo & stigmate sæpiùs multiplici, nunc superum simplex monostylum aut multiplex polystylum; styli semper laterales seu ex germinum latere erumpentes. Structura fructus varia: in aliis pomum inferum multiloculare, aut urceolus pseudo-inferus polyspermus suprà femina coarctatus; in aliis femina aut pericarpia unilocularia & plerumque monosperma, indefinita aut definita, supera & receptaculo communi imposita; in aliis capsula supera unica unilocularis, aut nux pariter supera mono vel disperma, nuda vel drupaceo tegmine vestita. Seminum hylus sub apice lateralis cui funiculus inferitur ex imo pericarpio enatus. Corculum rectum absque perispermo. Caulis herbaceus aut frutescens arboreusve. Folia alterna, stipulacea, simplicia aut composita.

I. Germen simplex inferum, polystylum. Pomum calicino limbo umbilicatum, multiloculare. *Arbores aut frutices. POMACEÆ.*

**MALUS**, T. \* **PYRUS**, L. \* *Pommier*. Calix 5-fidus. Petala 5. Stamina circiter 20. Styli 5 basi connati & villosi; stigmata 5 distincta. Pomum sphæroïdeum glabrum, basi circà pedunculum concavâ umbilicatâ, medio 5-loculare loculis cartilagineis 2-spermis; femina cartilaginea. *Folia simplicia indivisa subtùs tomentosa; flores sæpiùs fasciculati axillares aut in gemmis foliaceis terminales. M. sylvestris spinosa.*



**PYRUS**, T. L. \* *Poirier*. Calix, petala & stamina Mali. Styli 5 omninò distincti, basi villosi; stigmata 5. Pomum glabrum turbinatum, basi in pedunculum productâ, intus 5-loculare loculis cartilagineis 2-spermis; femina cartilaginea. *Folia simplicia indivisa sæpiùs glabra; flores in summis ramis conferti subspicati, Malo longiùs pedunculati. P. sylvestris spinosa.*

**CYDONIA**, T. \* **PYRUS**, L. \* *Coignassier*. Calix, petala, stamina & styli ut in Pyro. Pomum tomentosum turbinatum aut ovatum, pyriforme intus 5-loculare, loculis 2-spermis; femina callosa. *Folia simplicia indivisa, subtus tomentosa; flores solitarii terminales subsessiles; calicis laciniae magnæ ferrulatæ persistentes.*

**MESPILUS**, T. L. \* **CRATÆGUS**, L. \* *Néflier, Azérolier, Akbepin*. Calix 5-fidus. Petala 5. Stamina 20. Styli & stigmata 2-5. Pomum sphæriceum 2-5-spermum feminibus ossibus. *Folia simplicia, indivisa aut lobata; pedunculi sæpiùs multiflori, corymbosi terminales & interdum solitarii axillares. Flos M. Germanicæ terminalis solitarius sessilis ut in Cydoniâ.*

**CRATÆGUS**, T. L. \* **MESPILUS**, L. \* *Alisier*. Calix, corolla, stamina & styli Mespili. Pomum sphæriceum 2-5-spermum feminibus cartilagineis. *Folia simplicia, indivisa aut lobata; pedunculi in pluribus multiflori corymbosi terminales & solitarii axillares, in paucis 1-flori axillares & spicati terminales.*

**SORBUS**, T. L. \* *Sorbier, Cormier, Cochesne*. Calix, corolla & stamina Mespili. Styli & stigmata 3. Pomum globosum aut turbinatum molle 3-spermum feminibus cartilagineis. *Folia pinnata aut rariùs semipinnata; flores corymbosi terminales. Genus à præcedentibus vix distinctum, ex Hallero 5-stylum & 5-spermum feminibus quibusdam abortivis, & idè Cratægo affinius. Linnæus Cratægum dicit 2-spermam, Sorbum 3-spermam, Mespilum 5-spermam, admissò tamen in omnibus numero vario. An rectiùs semina cartilaginea ab ossibus & poma 5-locularia à 5-spermis distinguenda?*

**II.** Germina plura indefinita, calice urceolari suprâ coarctato tecta, quasi infera, singula monostyla. Semina totidem. *Frutices. ROSÆ.*

**ROSA**, T. L. \* *Rosier, Eglantier*. Calix urceolaris collo coarctatus, suprâ 5-fidus laciniis oblongis, 2 nudis, 2 utrinque appendiculatis, 1 hinc tantum appendiculatâ. Petala 5. Stamina plurima brevissima. Singulo stylo stigma simplex. Calix bacatus, sphæriceus aut ovoideus, limbo persistente coronatus, fovens semina numerosa hispida oblonga. *Frutices, plerique aculeati aculeis sparsis; folia impari-pinnata, stipulis alæformibus imò petiolo communi adnatis; flores solitarii aut subcorymbosi terminales, sæpè magni, in hortis pleni.*



III. Germina plura definita (rariùs unicum), calice urceolari suprà coarctato tecta, quasi infera, singula monostyla. Semina totidem. *Herbæ pleræque, plures apetalæ, plures definitè staminiferæ, quædam diclines. SANGUISORBÆ.*

POTERIUM, L. \* PIMPINELLA, T. \* *Pimprenelle*. Dioicum. Calix 4-fidus, basi 3-squamosus. Petala 0. MASC. Stamina 30. FÆM. Germina 2; styli 2; stigmata 2 penicilliformia. Semina 2 intrà calicem capsularem. *Herbæ; folia impari-pinnata stipulis imo petiolo adnatis; flores capitati terminales. Discrepat P. spinosum caule frutescente ramosissimo, ramulorum apice spinoso, calicibus spicatis distinctis baccatis, habitu similis Rosæ.*

SANGUISORBA, L. \* PIMPINELLA, T. \* *Sanguisorbe*. Calix 4-fidus, basi 2-squamosus. Petala 0. Stamina 4. Germina 2; styli 2; stigmata 2 simplicia. Semina 2 intrà calicem capsularem. *Herbæ; folia & flores ut in Poterio. An analogiâ ex Ancistro d sumpti, lacinia calicina in Poterio & Sanguisorbâ pro petalis limbo calicino subintegro adnatis habendæ? Indè major cum Rosaceis affinitas. An contrâ, Linnæo duce, squamæ inferiores mutantur in calicem & calix in corollam?*

ANCISTRUM, Forst. LS. \* Calix basi 2-squamosus, apice 4-aristatus, aristarum apicibus 4-hamosis. Petala 4. Stamina 2. Germen 1; stylus 1; stigma penicilliforme. Semen 1 intrà calicem capsularem. *Herbæ; folia & flores ut in Poterio.*

ACÆNA, Mutis. L. \* Calix 4-fidus, basi 2-squamosus. Petala 0. Stamina 4. Germen 1; stylus 1; stigma multifidum. Semen 1 intrà calicem subbaccatum echinatum spinis retrorsis. *Planta lignosa ramosissima ramis fruticosis; folia pinnata, vaginantia; flores spicati axillares, in spicis alterni. Character ex D. Mutis.*

AGRIMONIA, T. L. \* AGRIMONOÏDES, T. \* *Aigremoine*. Calix oblongus 5-fidus, extus medio multifetosus fetis apice uncinatis, caliculo minimo 2-partito infrà cinctus. Petala 5. Stamina 12-20. Germina 2; styli 2; stigmata 2. Semina 2 intrà calicem capsularem 2-locularem ventricosum fetis persistentibus supernè tectum. *Herbæ; folia impari-pinnata foliolis alternatim inæqualibus; flores spicati terminales, singuli 3-bracteati. Discrepat Agrimonoïdes T. foliis caulinis ternatis, corymbo 3-4-floro terminali, floribus 7-8-andris 1-gynis 1-stylis, caliculo majore campanulato multifido, capsulâ 1-sperma gabra non setosâ: an genus distinguendum?*

NEVRADA, L. \* Calix parvus hemisphæricus 5-fidus (multifidus imbricatus ex Forsk.) Petala 5 majora, limbo calicino inserta.



inserta. Stamina 10, ibidem inserta. Germen inferum; styli 10; stigmata 10. Capsula hemisphærica, subtus convexa, supra plana & calicinis laciniis rigidis acuminatis erectis echinata, 10-locularis 10-sperma. *Caracter ex Linnæo. Herba tomentosa basi lignosa caulibus diffusis; folia alterna simplicia (non stipulacea?) ex eodem puncto gemina inæqualia; flores solitarii axillares pedunculati. Semen germinans (unicum superstes cæteris forsitan abortivis aut obrutis?) capsulam supra & infra perforat, annuli instar diutius circumpositam radicis collo, etiam in plantâ vegetiore. Genus idem cum Tribulastro Lippi mss. n. 211, ex Bern. Jussæo & Adansonio Rosaceum Agrimonie affine, rectius fortè Mesembryanthemo & Ficoideis adjiciendum duce Linnæo ord. nat. 13.*

**CLIFFORTIA**, L. \* Dioïca. Calix 3-fidus. Petala 0. Masc. Stamina circiter 30; antheræ didymæ. Fœm. Germina 2; styli 2 (laterales?); stigmata 2. Semina 2 intrâ calicem capsularem 2-locularem. *Frutices; folia simplicia aut ternata, basi vaginantia; flores axillares subsessiles. An rectè Sanguisorbis adjecta? An huic affine Empetrum pinnatum Lamark? An verè congener C. strobilifera L. habitu diversa, gallis strobiliformibus insignita?*

**APHANES**, L. \* **ALCHIMILLA**, T. \* *Percepier*. Calix 8-fidus, laciniis alternis minimis. Petala 0. Stamina 4 minima. Germina 2; styli 2; stigmata 2. Semina 2 calice connivente tecta. *Herbula; folia minima simplicia basi vaginantia; flores axillares glomerati sessiles, ex D. Leers 1-gyni & 1-spermi & ideo Alchimillæ subditi.*

**ALCHIMILLA**, T. L. \* *Alchimille, Pied-de-Lion*. Calix tubulosus, limbo patens 8-fidus, laciniis alternis minoribus. Petala 0. Stamina 4 minima. Germen 1; stylus 1 lateralis è basi germinis; stigma 1. Semen 1 tectum calice ad collum connivente. *Herbæ; folia palmata aut subdigitata; flores corymbosi axillares & terminales.*

**SIBBALDIA**, L. \* **FRAGARIA**, T. \* Calix limbo patens 10-fidus, laciniis alternis angustioribus. Petala 5. Stamina 5 brevia. Germina 5; styli & stigmata 5. Semina 5 calice connivente tecta. *Herbæ; folia ternata, foliolis simplicibus partitis; flores axillares & terminales, interdum 10-gyni.*

I V. Germina plura indefinita, verè supera, receptaculo communi imposita, singula monostyla. Semina totidem nuda aut rariùs baccata. *Herbæ aut rariùs frutices. POTENTILLÆ.*

**TORMENTILLA**, T. L. \* *Tormentille*. Calix 8-fidus, laciniis alternis minoribus. Petala 4. Stamina indefinita. Receptaculum



feminiferum parvum exsuccum. *Herbæ ; folia digitata ; flores axillares & terminales subsolitarii. Numero partium discrepat à Potentillâ.*

**POTENTILLA**, L. \* **QUINQUEFOLIUM**, T. \* **PENTAPHYLLOIDES**, T. \* **FRAGARIA**, T. \* *Potentille, Quintefeuille.* Calix patens 10-fidus laciniis alternis minoribus. Petala 5. Stamina indefinita. Receptaculum feminiferum exsuccum minimum. *Herbæ aut rarò frutices ; folia impari-pinnata in Pentaphylloide, digitata in Quinquefolio, ternata in Fragariâ ; stipulæ alæformes imo petiolo adnatæ ; flores sæpè corymbosi terminales.*

**FRAGARIA**, T. L. \* *Fraisier.* Calix, petala & stamina Potentillæ. Receptaculum feminiferum magnum pulposum, baccatum coloratum, sæpè deciduum. *Herbæ repentes, passim sæpè radicales ; folia ternata, rarissimè digitata vel simplicia ; stipulæ petiolo adnatæ ; flores sæpiùs corymbosi terminales, quidam dioici ; receptaculum esculentum.*

**COMARUM**, L. \* **PENTAPHYLLOIDES**, T. \* *Comaret.* Calix, petala & stamina Potentillæ. Receptaculum feminiferum magnum ovatum spongiosum persistens, non baccatum. *Herbæ palustris ; folia impari-pinnata, stipulis petiolo adnatis, caulem vaginantibus ; pedunculi pauciflori axillares & terminales ; petala calice minora. Potentillæ congener ex Scopoli.*

**GEUM**, L. \* **CARYOPHYLLATA**, T. \* *Benoite.* Calix, petala & stamina Potentillæ. Semina in aristas longas geniculatas apice uncinatas desinentia, receptaculo oblongo hirsuto imposita. *Herbæ ; folia digitata aut sæpiùs impari-pinnata foliolo terminali plerumque majore ; stipulæ petiolo adnatæ ; pedunculi terminales aut & axillares pauciflori.*

**DRYAS**, L. \* **CARYOPHYLLATA**, T. \* Calix 5-8-fidus patens, laciniis æqualibus. Petala 5-8 majora. Stamina numerosa. Semina in aristas longas plumosas desinentia. *Herbæ ; folia simplicia aut impari-pinnata ; stipulæ petiolo adnatæ ; flores subsolitarii terminales, longè pedunculati.*

**RUBUS**, T. L. \* *Ronce, Framboisier.* Calix patens 5-fidus. Petala 5. Stamina numerosa brevia. Semina numerosa baccata, suprâ receptaculum commune densè collecta in baccam compositam. *Frutices aculeati vel quandoque inermes, rariùs herbæ semper inermes ; folia simplicia aut ternata aut digitata, aut pinnata in Rubis quibusdam Commersonianis habitu similibus Rosæ ; flores terminales aut & rariùs axillares, racemoso-paniculati aut rariùs solitarii, in R. odorato corymbosi & abortu dioici. R. Chamaemorus sub terrâ monoïca & extûs dioïca, radicibus maris & seminæ junctis, caulibus distinctis, observante post Solandrum Linnæo.*





V. Germina plura definita, supera, monostyla. Capsulæ totidem mono aut polyspermæ. *Frutices aut rariùs herbæ. SPIRÆÆ.*

SPIRÆA, T. L. \* ULMARIA, T. \* FILIPENDULA, T. \* BARBA CAPRÆ, T. \* Calix patens 5-fidus. Petala 5. Stamina plurima. Germina 3-12. Capsulæ 3-12, intus 2-valves, 1-3-spermæ. *Frutices aut herbæ; folia simplicia aut ternata aut impari-pinnata; stipulæ petiolo adnatæ, interitum minimæ aut nullæ; flores axillares & sæpiùs terminales, corymbosi aut paniculati aut rariùs fasciculati, in Barba Capræ T. bipinnatifolia dioici 3-gyni. Capsulæ in Spiræa T. frutescente pauciores rectæ, in Filipendula T. herbaceæ plurimæ rectæ, in Ulmaria T. herbaceæ plurimæ contortæ.*

SURIANA, Pl. L. \* Calix profundè 5-fidus. Petala 5. Stamina 10, quædam interdum abortiva. Germina 5. Capsulæ 5 mono-spermæ non dehiscentes. *Frutex; folia simplicia spatulata non stipulacea, ramorum caduca, ramulorum conferta terminalia; pedunculi multiflori axillares & terminales; flores bracteati lutei. Semper vivis consociatur in Linn. ord. nat. 13: an rectiùs? Styli certè laterales.*

TETRACERA, L. \* Calix 6-partitus persistens, laciniis subrotundis, alternis extimis minoribus. Petala... Stamina numerosa; antheræ simplices. Germina 4 divaricata. Capsulæ 4 reflexæ, suprâ intus dehiscentes, sub 1-spermæ. *Caractèr ex Linnaeo. Frutices sæpè sarmentosi; folia stipulacea, sæpiùs scabra; flores racemoso-paniculati axillares & terminales. Tigareæ proximæ & idèò polypetala. Congener Arbor Brasiliæna... Breyn. Icon. 6.*

V I. Germen unicum superum monostylum. Fructus unilocularis mono aut polyspermus. *Arbores aut frutices, interdum petalis carentes. PROCKIÆ.*

TIGAREA, Aubl. \* Dioica. Calix 4-5-fidus. Petala 4-5 calici alterna. MASC. Stamina plurima, antheris subrotundis. Germen flaccidum. FÆM. Filamenta staminum plurima sterilia. Germen 1; stylus 1; stigma 1. Capsula pisiformis 2-valvis 1-sperma. *Frutices sarmentosi; folia stipulacea, aspera aut villosa; flores racemosi axillares. Caractèr ex Aubl. Guyan. t. 350-351. Genus recognoscendum, fortè abortu 1-gynum dioicumque & idem cum Tetracera. An utrique affinis Curatella?*

DELIMA, L. \* Calix 5-partitus. Petala 0. Stamina numerosa. Germen 1; stylus 1; stigma 1. Bacca sicca acuminata 2-valvis 2-sperma. *Arbor; folia Fagi similia scabra; flores pedunculati,*



*laxè paniculati axillares & terminales. Caractèr ex Linnæo. An affinis Banara?*

**PROCKIA**, Brown. L. \* Calix 3-5-partitus, sæpè 1-3 squamis basi cinctus. Petala 0. Stamina numerosa. Germen 1; stylus 1 brevis aut 0; stigma capitatum. Bacca parva 1-locularis polysperma, seminibus uni receptaculo laterali affixis. *Frutices; folia stipulacea stipulis caducis; pedunculi 1-5 axillares 1-flori, medio 1-2-squamulosi. Caractèr ex Brown. Linn. & ex siccis Commersonianis. An affinis Laëtia?*

**HIRTELLA**, L. \* Calix 5-partitus laciniis reflexis. Petala 5. Stamina 3-5-6, eidem calicis lateri omnia inserta, filamentis longis intortis. Germen 1 villosum; stylus 1 longus, è basi & latere germinis; stigma 1. Bacca sicca ovalis compressa, suprâ latior sub3-gona 1-sperma semine magno, stylo infrâ persistente stipata. *Caractèr ex Linnæo & ex siccis. Arbusculæ aut frutices; folia stipulacea; flores spicati aut racemosi terminales, singuli 1-bracteolati. Nux 2-locularis ex Aubl. Guyan. t. 98.*

VII. Germen unicum superum monostylum. Nux mono aut disperma, nuda aut sæpiùs drupacea. *Arbores aut frutices. AMYGDALÆ.*

**LICANIA**, Aubl. \* Calix turbinatus (corolla Aubl.) limbo 5-fidus, basi 2-bracteatus (calix Aubl.). Petala 0. Stamina 5, cingulo calicinæ faucis inserta, ejusdem laciniis opposita. Germen 1; stylus 1 incurvus (lateralis?); stigma 1. Drupa olivæformis carnosâ, foeta nuce 1-spermâ. *Arbuscula; folia stipulacea; flores parvi spicati terminales; drupa edulis. Caractèr ex Aubl. Guyan. t. 45.*

**GRANGERIA**, Commerf. \* Calix 5-fidus. Petala 5. Stamina 15. Germen lanuginosum; stylus 1; stigma 1. Drupa olivæformis sub3-quetra, foeta nuce 3-quetrâ ossicâ 1-spermâ. *Arbor, Borboniensibus Arbre de buis; folia stipulacea integra; flores spicati axillares & terminales. Caractèr ex Commerf. Petala (fortè caduca) in sicco non vidi. Nomen ab indefesso peregrinatore Granger qui plurimis ex Judæâ & Ægypto missis seminibus Parisiensem annis 1733-36 ditavit hortum.*

**CHRYSOBALANUS**, L. \* **ICACO**, Pl. \* *Icaque*. Calix campanulatus 5-fidus. Petala 5. Stamina plurima in orbem posita. Germen 1; stylus 1 è latere & basi germinis; stigma 1. Drupa pruniformis foeta nuce 5-fulcatâ rugosâ 5-valvi 1-spermâ. *Arbusculæ; folia integra stipulacea; flores racemosi axillares & terminales; drupa esculenta.*

**CERASUS**, T. \* **PADUS**, JB. \* **LAUROCERASUS**, T. \* **PRUNUS** L. \* *Cérifier, Pûtier, Laurier-Cérise. Calix campanulatus 5-lobus deci-*



duus. Petala 5. Stamina 20-30. Stylus 1; stigma 1. Drupa carnosa subrotunda glabra, hinc leviter 1-fulcata, foeta nuce lævi subrotundâ 1-2-spermâ hinc subangulatâ. *Arbustulæ*; *folia stipulacea*, in quibusdam basi glandulosa, in Lauroceraso T. *sempervirentia*, *juniora* in omnibus conduplicata; *flores* in Ceraso T. *foliis præciores* & è gemmis erumpentes fasciculati pedunculis longis 1-floris, in Lauroceraso & Pado spicati aut racemosi axillares & terminales; *drupa* Cerasi esculenta, cæterorum ingrata, sæpè rubra & acida, rariùs nigrescens aut virens. C. sativæ varietas datur polygyna.

**PRUNUS**, T. L. \* *Prunier*. Calix, petala, stamina & germen Cerasi. Drupa major glabra, ovata aut subrotunda, hinc leviter 1-fulcata, foeta nuce 1-2-spermâ ovatâ subcompressâ, suprâ acutâ, extùs inæquali & propè margines angulatos fulcatâ. *Arbustulæ*; *folia stipulacea*, sæpiùs serrata serraturis imis glanduloso-concavis, *juniora* convoluta; *flores foliis præciores*, è gemmis fasciculati pedunculis brevibus 1-floris; *drupa* esculenta non acida, lutea aut viridis aut violacea. P. sylvestris spinosa fructu minore acerbo. *Armeniacam* & *Cerasum* Pruno consociavit Linnaeus, congeneres quidem sed vulgò & antiquitus distinctos signis conspicuis idèò admittendis.

**ARMENIACA**, T. \* **PRUNUS**, L. \* *Abricotier*. Calix, petala, stamina & germen Cerasi aut Pruni. Drupa subrotunda Pruno similis aut major, flava, superficie tomentosa, hinc 1-fulcata, foeta nuce 1-2-spermâ subrotundâ subcompressâ margine altero obtuso, altero acuto & utrinque fulcato. *Arbustulæ*; *folia cordata*, *juniora* convoluta; *flores foliis præciores*, è gemmis solitarii aut pauci sessiles; *drupa* suavis esculenta.

**AMYGDALUS**, T. L. \* **PERSICA**, T. \* *Amandier*, *Pêcher*. Calix, petala, stamina & germen Cerasi. Drupa tomentosa, hinc 1-fulcata, foeta nuce 1-2-spermâ suprâ acuminatâ & extùs numerosis punctis aut foveolis irregularibus excavatâ. *Arbustulæ* aut *frutices*; *folia stipulacea*, sæpiùs lanceolata & serrata, *juniora* conduplicata; *flores foliis præciores*, 1-2 è gemmis erumpentes subsessiles. Drupa in Amygdalo T. *exsucca* coriacea ovata nuce punctatâ, in Persicâ T. *succosa* major esculenta sphaericea nuce foveatâ. An genera distinguenda? Species tamen datur aut varietas (Amygdalo-Persica Duham. frug. 1. p. 127. t. 4.) utriusque caracteris particeps. Ex Amygdali semine eduli oleum exprimitur.

**MOQUILEA**, Aubl. \* Calix turbinatus 5-dentatus. Petala 5. Stamina numerosa. Germen villosum; stylus 1 è basi germinis; stigma 1. Fructus... *Arbustula*; *folia* (stipulacea?); *flores* racemosi axillares & terminales. *Caracter* ex Aubl. Guyan. t. 208. An fructus 1-spermus?

**COUEPIA**, Aubl. \* *Couepi de Cayenne*. Calix tubulosus, apice 5-lobus. Petala 5? Stamina numerosa. Germen substipitatum; stylus 1; stigma 1. Drupa oviformis sicca cortice crasso co-



riaceo fibroso ; semen 1 magnum , testâ fragili inclusum. *Arbor ; folia (stipulacea?) ; flores terminales. Character ex Aubl. Guyan. t. 207.*

**ACIOA**, Aubl. \* *Coupi de Cayenne*. Calix turbinatus 5-lobus inæqualis. Petala 5 subæqualia. Stamina 11-12, filamentis in carnosam coalitis membranam, calici intrâ 2 petala minora insertam. Germen costæ è fundo calicis intus prominenti adnatum & imo membranæ staminiferæ lateri compositum ; stylus 1 ; stigma 1. Drupa Couepiæ, sed major, maturatione undique rimola ; lumen simile. *Arbor ; folia stipulacea, stipulis caducis ; flores corymbosi terminales. Character ex Aubl. Guyan. t. 280. Habitu & fructu simillima Couepiæ ; an congener?*

**PARINARIUM**. \* **PARINARI**, Aubl. \* *Parinari de Cayenne*. Calix urceolatus 5-fidus. Petala 5, calicinis laciniis alterna. Stamina 14, quorum 7 in unâ phalange sterilia, 7 opposita fertilia. Germen 1 villosum ; stylus 1 ; stigma 1. Drupa ovata, magnitudine varia, crassa fibrosa, foeta nuce durissimâ extus sinuoso-scubrosâ, 2-loculari 2-spermâ, seminibus rufâ lanugine obductis. *Arbores ramulis villosis ; folia stipulacea ; flores racemosi axillares & terminales ; semina edulia. Character ex Aubl. Guyan. t. 204-206. Hujus congeneres Mampata & Neou Senegalensium in siccis Adansonianis observatæ, quibus tamen nux ovata minus anfructuosa & stamina fortè 15 ternatim calicinis laciniis opposita & germen latere adnatum calici. Genus à præcedentibus distinctum præcipuè nuce 2-loculari. An inde affinis Ferolia Aubl. t. 372?*

### VIII. Genera Rosaceis affinia.

**PLINIA**, Pl. L. \* Calix 4-5-fidus patens. Petala 4-5. Stamina numerosa, antheris parvis. Germen superum ; stylus 1 ; stigma 1. Drupa magna globosa sulcata, 1-sperma semine magno. *Arbores ; folia opposita simplicia, in P. croceæ ramulis pinnaformibus circiter 6-juga & inde quasi abruptè pinnata ; flores per ramos seniores nudos fasciculatim sparsi subsessiles ; drupa edulis. Character ex Plum. & Linn. An Rosaceis Amygdaleis addenda? Nucleus P. croceæ, docente Plumerio, carnosus fossulis excavatur resinâ flavescere turgidis : an inde quædam cum Guttiferis analogia? An potius germen inferum & genus idem cum Guapurio Myrtis adjuncto? Ibipitanga Marcg. P. rubræ ex Linnæo similis, affinior Eugeniæ unifloræ.*

**CALYCANTHUS**, L. \* Calix urceolatus multifidus, laciniis plurimo ordine numerosis coloratis deciduis, interioribus (fortè petala) sensim majoribus petala mentientibus. Stamina numerosa, calicis fauci inserta ; antheræ oblongæ filamentis adnatæ. Germina plurima calice cincta desinentia in stylos totidem ; stigmata glandulosa. Semina totidem caudata, intrâ



calicem incrassatum subbaccatum & laciniarum vestigiis salebrosum recondita. *Frutices*; folia opposita non stipulacea; flores in ramulis solitarii terminales. Fructu affinis Rosæ, sed oppositifolius & quasi apetalus. Habitu similis Philadelpho & Myrtis sed polygynus. An verè congener *C. præcox* L. seu *Obai* Kampsf. amon. 1. 879, 5-6-spermus seminibus non caudatis, 1-stylus stylo quasi 5-stigmatoso aut 5-andro?

**LUDIA**, Commerf. \* Calix 5-7-lobus. Petala... Stamina numerosa perigyna, filamentis persistentibus, antheris subrotundis. Germen 1 superum; stylus 1 apice 3-4-fidus; stigmata 3-4 didyma. Bacca sicca globosa, stylo acuminata, calici persistenti deformato & reflexo insidens, 1-ocularis polysperma seminibus 25-30 subangulatis. *Arbuseula Mauritiiana*; folia alterna venosa (stipulacea?) formâ plurimum varia, in arbuseulâ juniore minima dentato-spinosa, in increcente myrtina seu buxæ integerrima, in vetustiore ovata integra multò majora cassinoidea; flores axillares solitarii subsessiles, basi pedicelli quasi caliculatâ caliculo 3-fido. *Caracter ex Commerf. & ex sicco. Ludia à foliaturâ lusu. An affinis Prockia inter Rosaceas? An utrique proxima Dalea Brown. Jam. p. 239., discrepans calice truncato & bacca 1-nucleâ. Confer Ludiam cum Blakwelliâ subsequente.*

**BLAKWELLIA**, Commerf. \* Calix basi turbinatus semisuperus, limbo patente 16-20-30-partito sæpè æquali persistente, laciniis oblongis villoso-ciliatis. Stamina 8-10-15, calicinis laciniis dimidio pauciora, iisdem alternis basi insidentia; antheræ didymæ. Glandulæ totidem staminibus alternæ, alternarum calicis laciniarum basi appositæ. Germen villosum semiinferum; styli 4-6; stigmata 4-6. Capsula semiinfera 1-ocularis 4-6-valvis polysperma; semina pauca parietibus affixa. *Arbores aut frutices*; folia alterna (stipulacea stipulis caducis?); flores racemosi aut spicati axillares, pedicellis basi articulatis & 1-bracteolatis. *Caracter ex Commerf. & ex siccis. Glandulas mihi præ tenuitate prætervisas describit in specie 10-andrâ quam Vermonetæ decadeniæ nomine inscribit & in alterâ 10-12-andrâ quam Linschottiam appellat. Genus Homalio plurimum affine, distinctum præcipuè staminibus in laciniarum calicinarum ungue non pluribus congenitis, sed solitariis. Utriusque semina antè maturitatem antheriformia. An cum Jacq. & Aubl. laciniæ calicis alternæ in utroque persistentes pro petalis habendæ?*

**HOMALIUM**, Jacq. \* **RACUBEA**, Aubl. \* *Acomat.* Calix basi turbinatus semisuperus, limbo patens 12-14-partitus, laciniis persistentibus, alternis (petala Jacq.) majoribus. Glandulæ 6-7 (nectaria Jacq.) unguibus laciniarum calicis minorum insidentes. Stamina plurima (18-24) perigyna, 3 aut 4 congenita ex basi cujusque laciniæ calicinæ majoris; antheræ subrotundæ. Germen semiinferum apice desinens in stylos 3-4; stigmata 3-4 simplicia. Capsula semiinfera calicis limbo pa-



rente coriaceo cincta, 1-locularis apice 3-4-valvis aut non dehiscens, intus polysperma; semina pauca, parietibus affixa. *Arbores aut frutices; folia alterna stipulacea; flores spicato-paniculati axillares, divisuris paniculae bracteolatis, pedicellis medio articulatis. Character ex Jacq. & Aubl. t. 236 & ex siccis. An Rhamnis affinius; an corculum absque perispermio?*

**NAPIMOGA**, Aubl. \* Calix limbo 6-partitus. Petala 6 villosa, disco inserta ut & stamina 18 quorum antherae subrotundae. Germen inferum, disco coronatum; styli 3; stigmata 3. Fructus.. *Arbor; folia alterna stipulacea; flores spicati axillares & terminales, in spica terui interrupta alterni. Character ex Aubl. Guyan. t. 237. Habitus Homalii.*

**Obs.** Rosacearum nomine designantur à Tournefortio plantae omnes Polypetalae regulares quae nec Umbelliferae sunt aut Cruciferae, nec Dianthi aut Lili florem aemulantur. In serie naturali, circumscripta definitione & affinitatis ratione habitae, eae tantum dicuntur Rosaceae quae praecipuos Rosae characteres induunt, nempe petala aequalia & definita summo inserta calici monophyllo sub iisdem staminifero, germina stylo instructa laterali, semina perispermio destituta, corculum rectum, folia alternantia ac stipulacea. Illis plerumque germina plura supera, stamina numerosa, corolla existens; sed interdum flores apetalii, stamina definita, germina calice tecta ac infera, & etiam contracto numero germen unicum. Inde variae ordinis sectiones, singulae naturales, ab invicem non distrahendae & ad libitum in distinctis ordinibus approximandae aut in unum colligendae. Germina in Rosae urceolari calice delitescencia nunc eodem omnino teguntur infera in Pomaceis baccatis & Sanguisorbis capsularibus, nunc patentem super eminent numerosa in Potentillis, pauca in Spiraeis, in Amygdaleis & Prockiiis solitaria. Sanguisorbae apetalae, antea in remoto ordine dispositae, sed certo proximae Rosaceis & Ancistri retrapetalii ferè congeneres, Polypetalarum & Apetalarum analogiam jam pluries p. 305 edictam denuò confirmant. Idem ferè dicendum de Prockia apetalâ, sed fortè minus affini utpotè polyspermâ intra fructum simplicem. Genera herbacea arboreis & frutescentibus rectè consociata in diversis ordinibus & praecipuè in Rosaceis, caducam arborum & herbarum distinctionem in perpetuum subvertunt. Amygdalae monogynae regularibus accedunt Leguminosis plurimo caractere similibus, sed definitè staminiferis & aliter frugescentibus. Accedunt Pomaceae praemissis ordinibus infero fructu instructis & praecipuè Myrtis alternifoliis, distinctis tamen stylo simplici & stipularum defectu & corculo fortè non conformi. An inde invertenda ordinum series, & Melastomae ac Salicariae Myrtis ac Rosaceis non interjiciendae? An ordini verè conveniunt genera ad calcem adjecta, novorum ordinum fortè primordia? An affines etiam Ochna, Krameria, Anavinga, Samyda, Anrideisma?





## ORDO XI.

## LEGUMINOSÆ, LES LÉGUMINEUSES.

**C**ALIX monophyllus, variè divisus. Corolla polypetala, rarissimè nulla aut monopetala, summo calici inserta infrà ejusdem divisuras. Petala nunc quinque aut interdùm pauciora, regularia subæqualia, nunc sæpiùs quatuor irregularia, papilionem simul æmulantia (undè flos *papilionaceus*), nempe *vexillum* superius & exterum cætera semiamplectens & iisdem plerumque majus, *alæ* duæ laterales, *carina* inferior & intima simplex aut bipartita. Stamina decem, rarò pauciora aut plura, calici sub petalis inserta, filamentis modò distinctis aut basi tantùm subcoalitis, modò sæpiùs diadelphis seu novem connatis in tubum sub vexillo fissum & decimo solitario fissuræ applicito, aut interdùm monadelphis tubo indiviso decandro; antheræ distinctæ, sæpiùs subrotundæ parvæ, interdùm oblongæ incumbentes. Germen simplex superum; stylus unicus; stigma simplex. Fructus in paucis capsularis unilocularis submonospermus bivalvis aut non dehiscens; in plurimis leguminosus (undè nomen ordinis) longior bivalvis (trivalvis in *Moringâ*, quadri-valvis in *Mimosæ* specie unicâ) seminibus uni futuræ laterali affixis, nunc unilocularis mono aut polyspermus, nunc multilocularis dissepimentis transversis & loculis monospermis interdùm pulposis. In polypetalis irregularibus radícula corculi in lobos inclinans absque perispermo; in regularibus eadem recta, perispermo seu membranâ crassiusculâ corculum involvente; lobi in folia seminalia plerumque mutabiles generaliori Dicotyledonum more, interdùm sub iisdem foliis persistentes distincti. Caulis herbaceus aut frutescens arboreusve, sæpiùs alternè ramosus. Folia stipulacea alterna (in paucissimis subopposita), nunc



simplicia nunc sæpiùs ternata aut digitata aut semel vel pluriès pinnata. Flores variè dispositi.

I. Corolla regularis. Legumen multiloculare, sæpiùs bivalve, dissepimentis transversis, loculis monospermis. Stamina distincta. *Arbores aut frutices; folia abruptè pinnata.*

MIMOSA, T. L. \* ACACIA, T. \* *Acacie, Sensitive.* Calix tubulosus 3-5-dentatus. Corolla infundibuliformis 5-fida aut 5-petala aut nulla. Stamina definita 4-10 aut indefinita, distincta aut rariùs monadelphæ, interdum sterilia. Legumen longum, carnosum aut membranaceum aut lignosum, formâ varium, interdum alatum aut articulatum (in *M. quadrivalvi* 4-valve), læve aut rariùs echinatum. *Arbores aut frutices suffruticesve, inermes aut ad basim petiolorum passimve aculeatæ; folia 1-2-pinnata petiolo interdum glanduloso; flores capitati aut spicati axillares terminalesve, quidam abortu masculi aut fœminei; legumen Mimosæ T. articulatum, Acaciæ T. non articulatum. Genus posthæc dividendum ratione numeri flaminum & structuræ leguminis. Species quædam gummifera, quædam tenaci turgidæ succo ex leguminibus expresso. Folia omnium vesperè contracta manè expanduntur, quarundam sensibilia nimis ad tactum comprimuntur & nutant.*

GLEDITSIA, L. \* *Févier.* Polygama dioïca. MASC. Calix 3-fidus. Petala 3. Stamina 6. Germen 0. HERM. Calix 3-fidus. Petala 4. Stamina 6. Germen 1. Legumen maximum compressissimum latum, loculis pulposis. FÆM. Calix 5-fidus. Petala 5. Filamenta 2 minima sterilia. Germen & legumen ut in hermaphroditis. *Arbores inermes aut spinosæ spinis axillaribus; folia subalternè 2-pinnata; flores spicati axillares & terminales, nunc dioïci, nunc hermaphroditi masculis aut masculi fœmineis mixti. Character ex Linnæo.*

GYMNOCLADUS, Lamark. \* GUILANDINA, L. \* *Chicot.* Calix infundibuliformis 5-fidus. Petala 5 breviora. Stamina 10 non exserta, quædam interdum sterilia. Legumen læve oblongum latum subcompressum intus pulposum, sæpiùs multiloculare loculis 1-spermis, rariùs 1-loculare 1-spermum; femina (Guilandinæ) ossæa subglobosa. *Arbusculæ inermes; folia 2-pinnata foliolis alteris; flores spicato-paniculati terminales, dioïci in G. Canadensi quæ Guilandina dioïca L. foliis hyeme deciduis illepidè denudata quasi emortua, indè Canadensibus dicta Chicot. Κλαδος γυμνος, ramus nudus. Congener ex D. Lamark Hyperanthera Forsk. hermaphrodita, 5-petala petalo supremo majore, 9-andra filamentis basi villosis, 5 fertilibus inæqualibus, 4 brevior-*



*ribus sterilibus alternantibus, stigmate 3-dentato, legumine tereti 6-carinato articulatim incrassato, foliis impari-bipinnatis & Cassia instar glandulosis.*

**OUTEA**, Aubl. \* Calix turbinatus 5-dentatus, basi 2-bracteatus bracteis magnis. Petala 5, superius magnum, cætera minora æqualia. Stamina filamenta 4, nempe 1 sterile villosum breve sub petalo superiore, 3 opposita longissima fertilia; antheræ versatiles. Germen stipitatum. Legumen... Arbor; folia pinnata 2-juga; flores spicati axillares. *Character ex Aubl. Guyan. t. 9.*

**CERATONIA**, L. \* **SILQUA**, T. \* *Caroubier*. Calix minimus 5-fidus. Petala 0. Stamina 5, rarius 6-7, filamentis calice multò longioribus distinctis, antheris magnis. Germen disco carnosio 5-lobo extus staminifero cinctum. Legumen longum magnum compressum subcoriaceum, loculis pulposis; semina dura nitida. Arbor; folia pinnata, suboppositè 2-5-juga; flores spicati axillares, nunc hermaphroditi, nunc sexuum abortu dioici; fructus edulis.

**TAMARINDUS**, T. L. \* *Tamarinier*. Calix basi turbinatus, limbo 4-partito reflexo deciduo. Petala 3 ascendentia subæqualia (carinâ deficiente). Stamina filamenta basi tantum coalita, 3 longa fertilia, 4 minima sterilia fertilibus interposita, 2 testiformia (nectarium Linn.) sterilia priorum vaginæ extus apposita. Germen oblongum pedicellatum. Legumen oblongum compressum subtorulosum, duplici vestitum cortice, exteriori sicco fragili, interiori membranaceo, in utriusque interstitio pulposum, 1-3-loculare 1-3-spermum; semina compressa nitida. Arbor; folia pinnata, oppositè multijuga; flores in ramulis racemosi terminales, singuli 2-bracteati bracteis deciduis, plures abortivi. *Character ex D. Jacq. Americ.*

**PARKINSONIA**, Pl. L. \* *Sigaline, Parkinset*. Calix urceolatus limbo 5-partito deciduo. Petala 5 unguiculata subæqualia, infimo latiore. Stamina 10. Legumen longum teres acuminatum (1-loculare?) polyspermum, 2-tunicatum tunicâ utrâque 2-valvi, moniliforme seu ad singula semina ovata torulosum. Arbuscula spinosa; folia 2-5 ex ejusdem spinæ simplicis aut 3-partitæ axillâ, alternè pinnata, petiolo communi plano compresso ad apicem attenuato, foliolis minimis; flores laxè spicati axillares & terminales; legumen quandoque breve 1-spermum.

**SCHOTIA**, Jacq. \* **GUAÏACUM**, L. \* Calix turbinatus petalis concolor, limbo 5-lobo deciduo. Petala 5 longiora æqualia, in tubum ventricosum conniventia. Stamina 10; antheræ incumbentes. Germen stipitatum. Legumen... stipitatum. Arbuscula ligno duro & ramis rigidis, idem cum Guaïaco Afro L.; folia (Lentisci) pinnata, petiolo communi marginato; stipula subulata; flores in ramis nudis spicati aut fasciculati, rubri.



CASSIA, T. L. \* SENNA, T. \* *Cassé, Séné*. Calix 5-partitus coloratus deciduus. Petala 5, quorum inferiora majora. Staminum filamenta 10 distincta, 3 inferiora longiora antheris longis arcuatis, 4 lateralibus antheris brevibus, 3 superiora breviter antheris effœctis. Germen pedunculatum. Legumen oblongum 2-valve dissepimentis transversis multiloculare loculis 1-spermis, nunc planum membranaceum ficcum, latius & breve, aut longum & angustius, nunc subcylindricum lignosum intus sæpè pulposum vix dehiscens. *Arbusculæ aut suffrutices; folia pinnata, oppositè 1-12-juga aut rariùs multijuga, petiolo communi ad basim aut & inter foliola sæpè glanduloso; flores axillares spicati aut rariùs subsolitarii. An ratione fructûs dividendum genus in Sennam legumine membranaceo & Cassiam legumine pulposo?*

## II. Corolla regularis. Legumen uniloculare bivalve.

Stamina decem distincta. *Arbores aut frutices; folia abruptè pinnata. (Moringæ folia impari-pinnata & legumen 3-valve).*

MORINGA, JB. Burm. \* GUILANDINA, L. \* *Ben, Noix de Ben*. Calix profundè 5-fidus deciduus. Petala 5 fœssilia, quorum 4 inferiora, 1 superius arrectum. Stamina 10 breviter inæqualia (quædam sterilia aut antheris minoribus instructa?). Legumen longum 3-gonum, omninò 3-valve valvis intus interruptè & alternatim excavatis pro totidem feminibus 3-gonis 3-alatis. *Arbores inermes; folia oppositè & impari-tripinnata; flores paniculati axillares & terminales; semen oleiferum insigni ordinis exceptione. Genus aliundè leguminis & foliorum structurâ discrepans à plerisque Leguminosis.*

PROSOPIS, L. \* Calix hemisphæricus 4-5-dentatus. Petala 5 fœssilia æqualia. Stamina 10, distincta, æqualia. Legumen longum inflatum 1-loculare polyspermum. *Arbor; folia oppositè pinnata; flores spicati parvi, terminales & axillares. Caractèr ex Linn. & Burm. Ind. An affinis Cadia Forsk. 5-petala 10-andra, aut rariùs 6-7-petala 12-14-andra, legumine lineari longo compresso membranaceo compresso, cujus nec caulem nec folia nec inflorescentiam memorat Forskalius?*

HÆMATOXYLUM, L. \* *Campêche, Bois de Campêche*. Calix turbinatus 5-fidus. Petala 5 æqualia, calice vix majora. Stamina 10, filamentis distinctis basi intus barbatis. Stigma emarginatum. Legumen capsulare lanceolatum compressissimum, medio 2-valve valvis navicularibus, 1-loculare 2-3-spermum; semina oblonga compressa. *Arbor tinctoria; folia pinnata, oppositè 3-4-juga foliolis obcordatis; flores spicati axillares.*



**EPERUA**, Aubl. \* Calix urceolatus limbo magno 4-partito. Petalum 1, calicis fauci insertum, basi convolutum. Stamina 10, filamentis exsertis longissimis basi villosis, 9 infra subcoalitis, 1 simplici. Germen substipitatum; stylus longus. Legumen longum compressum, apice acuminato falcatum, elasticè 2-valve 3-4-spermum seminibus magnis coriaceis, hinc interdum emarginatis. *Arbor cacumine ramosissimo; folia pinnata, oppositè 3-juga; panicula axillares & terminales, longæ pendulæ, basi nudæ, apice floriferæ. Character ex Aubl. Guyan. t. 142, cui fructus Eperu & Pois Sabre dicitur. An calicis laciniæ pro petalis potiùs habendæ & corolla idè 5-petala genusque sequenti addendum?*

**TACHIGALIA**, Aubl. \* *Tachigali de Cayenne*. Calix turbinatus 5-lobus inæqualis persistens. Petala 5 inæqualia. Stamina 10, filamentis distinctis villosis exsertis quorum 3 breviora. Germen substipitatum; stylus longus. Legumen coriaceum longum compressum villosum 6-7-spermum, tumidum supra semina magna ovata. *Arbores cacumine ramosissimo; ramuli 3-gori; folia pinnata, oppositè aut alternè 4-6-juga; flores spicato-paniculati terminales, pedicellis basi bracteolatis. Character ex Aubl. Guyan. t. 143. An Eperuæ congener aut & Cæsalpinarum inermium?*

**ADENANTHERA**, L. \* *Condori*. Calix minimus 5-dentatus. Petala 5 æqualia. Stamina 10 distincta; antheræ incumbentes, apice extus glandulosæ. Legumen longum compressum membranaceum, polyspermum seminibus remotis. *Arbores inermes; folia bipinnata; flores laxè spicati axillares aut terminales.*

**POINCIANA**, T. L. \* *Poincillade*. Calix turbinatus coloratus profundè 5-fidus, laciniis caducis, inferiore majore. Petala 5 unguiculata, calice majora, 4 subæqualia, quintum difforme majus aut minus. Stamina 10, filamentis distinctis longis declinatis basi hirsutis, supremo pedicellato. Germen oblongum compressum; stylus longus. Legumen oblongum compresso-planum 2-valve polyspermum. *Arbusculæ aut frutices, inermes aut in caule & foliorum petiolis aculeati; folia oppositè bipinnata; flores laxè spicati terminales & axillares, longè pedicellati. P. elatæ L. caulis inermis, flos multò minor, petala non unguiculata, legumen incurvum spongiosum: an verè congener?*

**CÆSALPINA**, Pl. L. Lamark. \* *Brésillet, Sapan*. Calix urceolatus 5-fidus, laciniâ infimâ longiore. Petala, 5 infimo pulchriore. Stamina 10, filamentis distinctis corollâ vix longioribus, basi lanuginosis. Germen oblongum. Legumen oblongum compressum 2-valve polyspermum, quandoque apice dilatato truncatum & hinc acuminatum. *Arbores aut arbusculæ tinctoriæ, inermes aut sæpiùs in caule & petiolis aculeatæ; folia oppositè bipinnata; flores spicati aut paniculati axillares & terminales; fructus plurimarum glaber, C. Mimoscoidis Lamark lanuginosus, C. echinata ejusd, ex Pisone echinatus & fortè non omninò congener.*



**GUILANDINA**, L. \* **BONDUC**, Pl. \* *Bonduc*, *Queniquier*. Calix urceolatus profundè 5-fidus subæqualis. Petala 5 sessilia subæqualia. Stamina 10, filamentis distinctis brevibus non exsertis basi lanuginosis. Germen oblongum; stylus brevis. Legumen muricatum aut læve, ovatum, ventricoso-compressum 2-valve 1-3-spermum; semina ossea subglobosa. *Arbores aut arbusculæ in caule & petiolis aculeatæ; folia oppositè bipinnata; flores spicati aut paniculati axillares & terminales. An species fructu lævi ad Casalpinam rectius compellendæ? G. dioica & G. Moringa L. genericis Gymnocladi & Moringæ nominibus supra distinctæ.*

III. Corolla subirregularis. Stamina distincta aut basi tantum coalita. Legumen uniloculare bivalve. *Arbores aut frutices: folia abruptè pinnata, aut tantum conjugata, aut simplicia.*

**TARALEA**, Aubl. \* *Tarala des Galibis*. Calix turbinatus 5-fidus inæqualis. Petala 5 inæqualia, quorum 2 inferiora carinæ similia conniventia. Stamina 10, monadelpha. Germen pedicellatum. Legumen subrotundum coriaceum crassiusculum compressum 2-valve 1-spermum. *Arbor; folia abruptè pinnata suboppositè 4-5-juga; flores oppositè paniculati axillares & terminales. Caract. ex Aubl. Guyan. t. 298.*

**PARIVOA**, Aubl. \* Calix 3-4-lobus connivens basi 2-bracteatus. Petalum 1, magnum convolutum. Stamina 10 longa exserta, basi tantum diadelphea, decimo solitario; antheræ incumbentes. Germen pedicellatum; stylus longus. Legumen latum compressum, ferè rhomboïdeum sublignosum 1-spermum. *Arbor; folia abruptè pinnata, oppositè 3-juga petiolulis tumidis; stipulæ caducæ; flores sessili terminales & axillares. Caract. ex Aubl. Guyan. t. 303. Affinis Vouapæ. An P. tomentosa Aubl. t. 304 verè congener; an affinium Acouroæ?*

**VOUAPA**, Aubl. \* Calix 4-fidus, basi 2-bracteatus. Petalum 1 unguiculatum. Stamina 3. Germen pedicellatum. Legumen coriaceum latum compressum obtusum 1-spermum semine orbiculato. *Arbores; folia conjugata; flores paniculati aut corymbosi, axillares aut terminales (an veriùs 5-petali 10-andri, petalis & staminibus quibusdam citius caducis?). Caract. ex Aubl. Guyan. t. 7. 8. Confer cum Parivoâ.*

**CYNOMETRA**, L. \* Calix 4-partitus reflexus. Petala 5 æqualia. Stamina 10 distincta, antheris apice 2-fidis. Legumen lunatum seu semisubrotundum hinc truncatum, subcarnosum, extus tuberculatum, intus 1-loculare 1-spermum semine magno solido incurvo. *Arbores; folia conjugata; pedunculi trunco aut ramis innascentes, densè aut laxè multiflori.*



**HYMENÆA**, L. \* **COURBARIL**, Pl. \* *Courbaril*. Calix turbinnatus (2-bracteatus?) coriaceus, limbo obtusè 5-partito caduco. Petala 5 subæqualia. Stamina 10 filamentis distinctis medio inflexis; antheræ magnæ incumbentes. Legumen magnum lignosum ovato-oblongum subcompressum, intus pulpâ farinaceâ plenum, polyspermum seminibus fibroso textu & pulpâ obvolutis. *Arbor; folia conjugata; flores corymbosi terminales. Hujus congener Tanroujou Madagascariensium fructus Musci nostri tuberculatus parvus, extus simillimus Cynomorio Rumph. Amb. 1. t. 63 quod Cynometra ramiflora L., intus pulposus 2-spermus & idèd à Cynometrà discrepans.*

**BAUHINIA**, Pl. L. \* Calix irregularis, apice 5-fidus, infrà 5-fidus, hinc dehiscens, deciduus. Petala 5 subæqualia unguiculata oblonga undulata. Stamina 10 inæqualia, filamentis nunc distinctis nunc basi tantum diadelphis, decimo solitario longiore & interdum unico fertili. Germen pedicellatum. Legumen pedicellatum longum compressum polyspermum; semina compressa. *Arbores aut frutices, interdum scandentes; folia simplicia 2-loba aut 2-partita; flores spicati aut racemosi, axillares aut terminales.*

**PALOVEA**. \* **PALOVE**, Aubl. \* *Paloué des Galibis*. Calix duplex, exterior urceolatus 2-lobus, interior infundibuliformis coriaceus 4-5-lobus lobo uno majore. Petala 3 (an potius 5, quorum 2 citius caduca?) laciniis calicinis alterna. Stamina 9, filamentis longis fertilibus (an decimum sterile?); antheræ oblongæ incumbentes. Germen stipitatum stipite hinc alato (alâ forsàn calici adnatâ); stylus longissimus. Legumen longum polyspermum. *Frutex; folia simplicia indivisa; flores terminales densè spicati rariores, singuli 1-bracteati; bractæ distichè imbricatæ 1-floræ, plures steriles. Caractèr ex Aubl. Guyan. t. 141 & ex flore sicco imperfecto.*

**IV. Corolla irregularis papilionacea. Stamina distincta, aut rarò basi coalita. Legumen uniloculare bivalve. Arbores aut frutices; folia simplicia aut ternata aut impari-pinnata.**

**CERCIS**, L. \* **SILICUASTRUM**, T. \* *Gainier*. Calix urceolatus obtusè 5-dentatus, infernè gibbus. Corolla unguiculata, vexillo & carinâ 2-petalâ approximatis æqualibus, alis majoribus extimis. Stamina 10 inæqualia. Germen substipitatum. Legumen oblongum compressum tenue polyspermum; semina subrotunda. *Arbusculæ; folia simplicia; flores antè folia, trunco & ramis fasciculatim innascentes, purpurei aut rariùs albi.*

**POSSIRA**, Aubl. \* Calix 4-partitus deciduus. Petalum 1 unguiculatum, receptaculo calicis insertum. Stamina plurima



(25-26) ibidem inserta distincta; horum 6-7 sterilia sub petalo posita. Germen substipitatum compressum. Legumen coriaceum oblongum compressum 3-4-spermum feminibus angulosis compressis. *Arbuseula*; *folia ternata petiolo marginato*; *flores axillares (an verè polyandri?) subpaniculati, pedicellis basi 2-bracteatis*. *Caracter ex Aubl. Guyan. t. 355, staminum in Leguminosis insolitus, corollæ & calicis iterum examinandus.*

**ANAGYRIS, T. L. \*** Calix urceolatus 5-dentatus persistens. Corolla 5-petala, alis & carinâ 2-petalâ magnis subæqualibus (carinâ longissimâ ex Linn.), vexillo brevior. Stamina 10. Legumen longum compressum, superficie inæquale, polyspermum. *Frutex*; *folia ternata*; *stipula ex imo petiolo, eidem opposita & caulem vaginans, simplex 2-fida, tandem caduca*; *flores spicati axillares, lutescentes.*

**SOPHORA, L. \*** Calix urceolatus 5-dentatus persistens. Corolla 5-petala, carina 2-petalâ & alis longitudine vexilli. Stamina 10. Legumen longum tenue polyspermum, torulosum seu ad singula semina subrotunda nodosum. *Arbores aut frutices*; *folia nunc impari-pinnata, nunc ternata, nunc rariùs simplicia*; *flores axillares aut terminales, spicati aut racemosi aut rariùs subsolitarii. Corolla diadelpharum plurimarum, sed stamina distincta. Congener Yabag Camell. ic. 251. Rai. hist. 3. Luz. p. 80.*

**MULLERA, LS. \*** Calix campanulatus 4-dentatus inæqualis persistens. Corollæ vexillum reflexum, alæ oblongæ conniventes, carina brevior 2-petala vaginans recta. Stamina 10, filamentis basi monadelphis. Legumen oblongum moniliforme seu torulosum, internodiis exilibus, torulis globosis 1-spermis. *Arbor*; *folia impari-pinnata*; *flores racemosi axillares & terminales. Caracter ex L. Suppl.*

**COUBLANDIA, Aubl. \*** Calix tubulosus 4-dentatus. Corolla 1-petala imo calici inserta, tubulosa limbo 4-fido. Stamina 25 ibidem inserta, basi coalita. Legumen Mulleræ. *Frutex*; *folia impari-pinnata foliolis oppositè bijugis*; *flores spicati axillares & terminales, singuli 1-bracteati. Caracter ex Aubl. Guyan. t. 356. An Leguminosis rectè adjecta; an verè polyandra & 1-petala?*

V. Corolla irregularis papilionacea. Stamina decem diadelphea. Legumen uniloculare bivalve. *Frutices aut herbæ*; *folia simplicia aut ternata aut rariùs digitata*; *stipulæ nunc subnullæ, nunc conspicuæ imo petiolo adnatæ aut ab eodem distinctæ.*

**ULEX, L. \* GENISTA-SPARTIUM, T. \*** *Ajone, Jomarin.* Calix profundè 2-partitus persistens, suprâ 2-dentatus, infrâ 3-dentatus. Carina



Carina 2-petala. Legumen turgidum vix calice longius; femina pauca. *Suffrutices ramosissimi, ramis & ramulis apice spinosis; folia simplicia quasi nulla, spiniformia; flores axillares aut in ramulis spicati terminales, lutei. An stamina omnia connexa?*

**ASPALATHUS**, L. \* Calix 5-fidus laciniis acutis, superiore majore. Corollæ vexillum reflexum, alæ minores, carina 2-fida. Stamina basi monadelpha. Legumen ovarum muticum sub2-spermum. *Suffrutices; folia simplicia fasciculata, sæpè linearia; flores lutei, sessiles laterales aut terminales glomerati vel spicati. A Genistâ discrepat faciliè foliis fasciculatis. An verè congeneres A. ebenus aliæque species Linnaeanæ foliis planis aut foliis ternatis quinatisve. Dorycnium T. seu Lotum Dorycnium L. huc refert D. Lamark.*

**BORBONIA**, L. \* Calix turbinatus 5-fidus subæqualis laciniis acuminatis rigidis. Corollæ carina 2-petala apice connivens. Stigma emarginatum. Legumen oblongum compressum mucronatum; femina pauca. *Frutices; folia (Rusci) rigida simplicia sessilia, sæpè multinervia; stipulæ subnullæ, pedunculi axillares aut terminales uni aut multiflori. Stamen decimum deficiens ex Linn. Genus idem cum Lipariâ ex D. Lamark.*

**LIPARIA**, L. \* Calix urceolatus 2-labiatus, suprâ 3-fidus; infrâ longior 2-dentatus aut indivisus laciniâ interdum longissimâ petaloideâ. Corollæ carina 2-petala apice connivens. Antheræ 3, cæteris brevius stipitatae in apice vaginæ staminiferæ ex Linn. Stigma simplex. Legumen ovatum; femina pauca. *Frutices glabri habitu Borboniæ aut sæpius villosi; folia simplicia sessilia, villosa aut glabra; stipulæ subnullæ; flores axillares aut terminales, solitarii aut sæpius plures. Stamen decimum non deficiens ex Linn. Genus Borboniæ adjectum à D. Lamark.*

**GENISTA**, T. L. Lamark. \* **SPARTIUM**, T. L. \* **GENISTELLA**, T. \* **GENISTA-SPARTIUM**, T. \* **CYTISO-GENISTA**, T. \* *Genest.* Calix parvus campanulatus, nunc unilobus lobo laterali 5-dentato, nunc 2-labiatus suprâ 2-dentatus & infrâ 3-dentatus. Corollæ vexillum reflexum, alæ divaricatæ, carina demissa bifida aut 2-petala, non obtegens stamina monadelpha. Stigma hinc villosum. Legumen ovatum aut oblongum, sæpè turgidum, mono aut polyspermum. *Frutices aut suffrutices, inermes aut rarius (Genista-Spartium T.) spinosi; folia in plurimis omnia simplicia interdum decurrentia (Genistella T.) suprâ caulem inde alatum; in paucioribus quædam ternata (Cytiso-Genista T.) simplicibus intermixta, in paucissimis (Spartium T.) subnulla; stipulæ minimæ aut subnullæ; flores terminales & axillares, solitarii aut sæpius spicati, plerumque lutei. Character generis ex D. Lamark Dict. qui Spartium L. Genistæ commiscet, paucis utriusque speciebus exceptis & ad Cytisum relatis. Ex Linnaeo Genistæ calix 2-labiatus & vexillum oblongum à pistillo & staminibus deorsum reflexum, Spartii*



*calix deorsum productus & filamenta germini adhærentia & stigma longitudinale supra villosum. Utriusque autem caracter in paucis speciebus rectè delineatus, observante D. Lamark in cæteris omnino aut partim evanescit confusis signis. An ideo rectè congregata genera? An cum Tournefortio species 1-spermæ Spartii nomine distinguendæ, vix foliosæ foliis & ramis interdum suboppositis?*

**CYTISUS**, T. L. Lamark. \* *Cytise*. Calix subbilabiatus supra 2-dentatus & infra 3-dentatus, nunc brevis campanulatus, nunc longior cylindricus. Corollæ vexillum reflexum; alæ & carina simplex conniventes supra stamina diadelpa. Stigma simplex. Legumen oblongum compressum polyspermum. Frutices aut suffrutices inermes, rariùs arbusculæ; folia ternata; stipulæ subnullæ aut minimæ; flores terminales aut axillares, solitarii aut sæpiùs spicati, plerumque lutei. Caracter ex D. Lamark Dict. qui generi consociat Cytisos plerosque Linnæi & Genistam 1, 2, 3 & Spartium 11, 12, 15, 16 ejusdem syst. ed. 14, designans præcipuè Cytisum foliis omnibus ternatis & genitalibus corollâ tectis, Genistam foliis simplicibus & genitalibus corollâ patente denudatis. Ex eodem C. Wolgaricus LS. Coluteæ congener.

**CROTALARIA**, T. Dill. L. \* *Crotalaire*. Calix profundè 3-fidus, laciniâ infimâ sub 3-fidâ. Corollæ vexillum alis & carinâ sæpè longius. Stamina omnia connexa cum fissurâ dorsali. Legumen pedicellatum turgidum 1-2-spermum. Caracter ex Linnæo. Herbæ aut frutices; folia simplicia aut ternata aut rariùs digitata; stipulæ subnullæ, aut conspicuæ & à petiolo plerumque distinctæ; flores sæpè spicati, nunc terminales, nunc axillares aut foliis oppositi; Legumen in plurimis breve 1-2-spermum, in quibusdam longius polyspermum. Genus certè recudendum & species nonnullæ in diversa genera refundendæ.

**LUPINUS**, T. L. \* *Lupin*. Calix 2-fidus laciniis integris aut dentatis. Carina basi 2-partita. Stamina basi monadelpa, antheris 5 subrotundis, 5 oblongis. Legumen coriaceum oblongum polyspermum. Herbæ; folia digitata, stipulis imo petiolo adnatis; flores spicati terminales, in spicâ alterni aut subverticillati, nudi aut bracteati. An L. integrifolius L. affinium Crotalaria?

**ONONIS**, L. \* **ANONIS**, T. \* *Bugrane*, Arrête-Bœuf. Calix campanulatus 5-fidus laciniis linearibus. Corollæ vexillum majus & striatum. Stamina basi monadelpa. Legumen turgidum sessile; femina pauca. Herbæ aut suffrutices; folia ternata, foliolis sæpè serrulatis; stipulæ imo petiolo adnatæ; flores lutei aut purpurei, axillares aut terminales, sessiles aut sæpiùs pedunculati, pedunculis muticis aut aristatis, uni aut multifloris. Legumen in aliis oblongum, in aliis brevissimum calici subæquale 1-2-spermum. Ononides Linnæi Capenses ad Cytisum & Lotum repellit D. Lamark.

**ARACHIS**, L. \* **ARACHIDNA**, Pl. \* Calix profundè 2-labiatus, supra 4-fidus inæqualis, infra integer. Corolla resupinata. Sta-



mina basi monadelpha, filamento decimo breviora sterili ex *Adans.* Legumen ovato-oblongum coriaceum, subtorulosum 2-spermum vix dehiscens, extus venoso-rugosum. *Herba*; folia abruptè pinnata, foliolis bijugis; stipulæ magnæ petiolo adnatæ; flores lutei, foliis inferioribus axillares solitarii longè pedunculati, plures masculi; legumen sub terrâ maturescens; semina edulia oleifera.

**ANTHYLLIS**, L. \* **VULNERARIA**, T. \* **BARBA-JOVIS**, T. \* **ERINACEA**, T. \* **EBENUS**, L. *Anthyllide*, *Vulnéraire*. Calix ventricosus 5-dentatus inæqualis persistens. Corollæ vexillum alis & carinâ longius. Stamina basi monadelpha. Legumen parvum 1-2-spermum, calice tectum. *Caulis in Vulnerariâ T. herbaceus*, in cæteris frutescens, ramis Erinaceæ numerosis suboppositis apice pungentibus; hujus folia simplicia, cæterarum ternata aut sæpius impari-pinnata; stipulæ in plurimis imo petiolo adnatæ, in paucis subnullæ; pedunculi glomeratim multiflori, axillares aut sæpius terminales. Huc refert D. Lamark Ebenum L. ab Ebena ligno diversissimum, cui calix 5-aristatus aristis plumosis corollâ paulò longioribus, alæ minimæ, semen 1 villosum, cætera Anthyllidibus frutescentibus similia.

**DALEA**. \* **PSORALEA**, L. \* Calix 5-fidus. Corolla papilionacea. Stamina tantum 5, basi monadelpha. Legumen parvum 1-spermum calice tectum. *Herbæ*; folia impari-pinnata, foliolis angustis nigro-punctatis; stipulæ lineares à petiolo distinctæ; flores densè capitati aut spicati terminales, bracteis imbricatis distincti. Affinis *Psoraleæ* sed 5-andra. Huc referantur *Psoralea Dalea* L. & forsàn aliæ ejusdem species pinnatifoliæ. Speciem habeo siccam, habitu flosculosam *Eupatorii* instar sed *Daleæ* ferè congenerem cui calix communis polyphyllus imbricatus multiflorus, calix proprius inferus 5-partitus plumosus, petala 5 subæqualia unguiculata, cætera similia.

**PSORALEA**, Royen. L. \* Calix turbinatus 5-fidus, punctis callosis aspersus. Petala venosa; carina 2-petala. Legumen compressum, calici persistenti æquale 1-spermum. *Herbæ* aut frutices; folia ternata aut rariùs simplicia vel impari-pinnata; stipulæ à petiolo distinctæ; flores spicati aut glomerati, axillares aut terminales. An species pinnatifoliæ omnes *Daleæ* congeneres & 5-andræ?

**TRIFOLIUM**, T. L. \* *Trefle*. Calix tubulosus 5-fidus persistens. Carina simplex alis & vexillo brevior. Legumen minimum vix dehiscens 1-2-spermum, calice tectum. *Herbæ*; folia ternata (digitata in T. *Lupinastro*); stipulæ imo petiolo adnatæ; flores capitati aut densè spicati, bracteati, terminales & axillares, interdum (in T. *pratensi*) monopetali petalis coalitis in tubum staminiferum. T. subterranei legumen primum & humo affixum, quasi subterraneum;



MELILOTUS, T. \* TRIFOLIUM, L. \* *Melilot.* Legumen calice longius, non rectum. *Flores laxè spicati. Cætera ut in Trifolio.*

MEDICAGO, T. L. \* MEDICA, T. \* *Luzerne.* Calix subcylindricus 5-fidus æqualis. Corollæ carina à vexillo deflebens. Legumen substipitatum incurvum polyspermum, in *Medicâ T. falcatum*, in *Medicagine T. spirale cochleatum multiforme.* *Herbæ aut rariùs frutices; folia ternata; stipulæ parvæ, imo petiolo adnatæ; pedunculi axillares & terminales uniflori, aut multiflori floribus spicatis vel glomeratis.*

TRIGONELLA, L. \* FÆNUM-GRÆCUM, T. \* *Fènu-Grec.* Calix campanulatus 5-fidus subæqualis. Alæ cum vexillo patentes & simul corollam mentientes tripetalam æqualem; carina minuta. Legumen oblongum compressum acuminatum polyspermum. *Herbæ: folia ternata, foliolis sæpè cuneatis & denticulatis; stipulæ parvæ à petiolo distinctæ; flores axillares & terminales, solitarii subsessiles aut in pedunculo mutico vel aristato spicati vel umbellati; legumen T. Fœnu-Græci L. magnum, cæterorum multò minus.*

LOTUS, T. L. \* DORYCNIUM, T. \* *Lotier.* Calix tubulosus 5-fidus æqualis persistens. Alæ vexillo longiores, seorsum conniventes. Legumen oblongum, cylindricum aut subangulosum, strictum polyspermum. *Herbæ; folia ternata petiolata foliolis sessilibus; his conformes stipulæ magnæ à petiolo distinctæ, undè folia quasi quinata; pedunculi solitarii axillares & terminales, in plurimis apice 1-phylli & uni aut umbellatim multiflori, aphylli & multiflori in Dorycnio T. seu L. Dorycnio L. digitatim 5-phyllis, à D. Lamark ad Aspalathum relato.*

DOLICHOS, L. \* PHASEOLUS, T. \* *Dolique.* Calix brevis 4-dentatus denticulo supremo emarginato. Vexillum basi intus 2-calle & alas subrè comprimens. Legumen oblongum polyspermum, formâ varium; semina reniformia aut subrotunda, hylo laterali. *Herbæ, pleraque volubiles; folia ternata petiolata, stipulis à petiolo distinctis; foliola suprâ eundem articulata petiolulo terminali infrâ 2-aristato, lateralibus 1-aristatis, aristis stipulæformibus; flores sæpè spicati axillares; legumen sæpè glabrum, rariùs villosum aut & pruriens. Corculi lobi à foliis seminalibus distincti.*

PHASEOLUS, T. L. \* *Haricot.* Calix 2-labiatus, suprâ emarginatus, infrâ 3-dentatus, sæpè basi 2-bracteatus. Vexillum reflexum; carina cum staminibus & stylo in spiram convoluta. *Cætera omninò ut Dolicho.*

ERYTHRINA, L. \* CORALLODENDRON, T. \* Calix limbo lobato inæquali aut subintegro, recto aut obliquo. Vexillum longissimum; alæ & carina 2-petala multò breviores. Stamina basi monadelphæ. Legumen longum polyspermum torulosum; semina reniformia hylo laterali. *Arbysculæ aculeatæ inermesve, aut frutices interdum subherbacci; folia ut in Dolicho ternata stipu-*



*lacea, petiolulis articulatis & aristatis seu glandulosis, rarius simplicia; flores fasciculati axillares aut spicati terminales, sæpè coccinei. Stamina E. Cristæ Galli diadelphea. Alæ & carina vexillo aquales in E. isopetalâ Lamark idè fortè non congeneri. An genere etiam distinguenda Plaso Rheed. Mal. 6. t. 16. 17, seu E. monosperma Lamark, arbuscula laccifera trifoliata cujus legumen magnum latum compressissimum apice tumido 1-spermo?*

**CLITORIA, L. \* TERNATEA, T. \*** Calix tubulosus 5-dentatus, sæpè basi 2-bracteatus. Corolla supinata, vexillo magno alas breves & carinam breviorè obumbrante. Legumen longum compressum polyspermum, sæpè lineare. *Caracter ex Linnæo. Herbae volubiles; folia ternata aut rarius impari-pinnata, foliolis ut in Dolicho articulatis & basi aristatis; stipulæ à petiolo distinctæ; pedunculi axillares 1-2-flori aut spicato-multiflori. An genere distinguendæ species ternatifoliæ?*

**GLYCINE, L. \* PHASEOLUS, T. \* ASTRAGALUS, T. \*** Calix 2-labiatus, suprâ emarginatus, infrâ 3-fidus inæqualis. Vexillum premente falcato carinæ linearis apice reflexum. Legumen oblongum aut rarius ovatum, polyspermum. *Caracter ex Linnæo, in omnibus speciebus fortè non idem. Caulis herbaceus volubilis, repens in G. subterraneâ & G. monoïcâ sub tellure fructum maturantibus, basi frutescens in G. frutescente; hujus folia impari-pinnata ut & G. Apios præterea lætescentis; cæterarum folia ternata; omnium foliola ut in Dolicho articulata, petiolulis similiter aristatis aut glandulosis; stipulæ à petiolo distinctæ; pedunculi axillares 1-2-flori aut racemoso-multiflori floribus sæpè 2-bracteatis. Legumen dictum 2-loculare in pinnatifoliis, indè forsan genere distinguendis aut Astragalo rectius consociandis. An G. monoïca verè sexu diclinis; an flores hujus subterranei potiùs hermaphroditi ut in cæteris Leguminosis similiter frugescentibus? An verè congener G. monophylla L. sola simplicifolia?*

**VI. Corolla irregularis papilionacea. Stamina decem diadelphea. Legumen uniloculare (in Astragalo & Biserrulâ biloculare) bivalve. Herbae aut frutices aut arbusculæ; folia impari-pinnata.**

**ABRUS, L. \* OROBUS, T. \*** Calix sub4-lobus lobo superiore latiore. Stamina 9 basi monadelphea, dorso hiantia (decimum nullum?). Legumen breve subcompressum; semina pauca subsphæricea. *Frutex volubilis; folia pinnata, impari abortivo (foliolis articulatis?); stipulæ à petiolo distinctæ; flores spicati axillares in spicâ sæpè secundi; semina nitida, sæpè nigro-coccinea.*

**AMORPHA, L. \*** Calix 5-dentatus. Vexillum ovatum concavum; alæ nullæ nec carina. Stamina basi monadelphea. Legu-



men minimum ovatum tuberculatum 2-spermum. *Frutex elatior; foliola ut in Dolicho articulata & basi aristata; stipulae à petiolo distinctae; flores numerosi spicati axillares & terminales. Corolla 1-petala in Leguminosis peculiaris.*

**PISCIDIA**, L. \* **PSEUDOACACIA**, Pl. \* Calix campanulatus subbilabiatus, supra emarginatus, infra 3-dentatus inæqualis. Stamina diadelpa (monadelpa ex Linn.). Legumen longum polyspermum, 4-alatum alis latis membranaceis aut coriaceis. *Arbores; foliola ut in Dolicho articulata (& basi aristata?); flores racemosi, axillares & terminales. Character ex Jacq.*

**ROBINIA**, L. \* **PSEUDOACACIA**, T. Pl. \* Calix parvus campanulatus limbo subintegro aut obsolete 4-lobo. Stigma anteriùs villosum. Legumen oblongum compressum polyspermum, seminibus compressis. *Arbores aut frutices; foliola articulata & basi aristata ut in Dolicho; stipulae à petiolo distinctae; pedunculi axillares & terminales, pauciflori aut racemoso-multiflori. Species plures recognoscendae & infra conferendae cum Dalbergiâ & Galedupâ quibus Robinia affinis, fructu oblongo polyspermo & bivalvi ab iis discrepans.*

**CARAGANA**, Royen. Lamark. \* **ROBINIA**, L. \* **ASPALTHUS**, Amm. \* *Caragan.* Calix 5-dentatus hinc sinuatus. Stigma glabrum truncatum. Legumen oblongum subcylindricum, 4-6-spermum seminibus subsphaericis. *Character ex D. Lamark. Arbusculae aut frutices; folia abruptè pinnata aut digitato-quaterna, petiolo communi ultra acuminato aut & sæpiùs spinoso; stipulae à petiolo distinctae, sæpè induratae & spinescentes; pedunculi axillares 1-3-flori. Huc refert D. Lamark Robinias 5-9 Linn. syst. ed. 14, habitu non conformes Robiniae nec impari-pinnatis.*

**ASTRAGALUS**, T. L. \* **TRAGACANTHA**, T. \* *Astragale.* Calix tubulosus 5-dentatus. Vexillum alis & carinâ longius. Legumen breve subovatum aut sæpiùs oblongum polyspermum non compressum, 2-loculare quasi geminatum loculis parallelis hinc sæpè planis & indè convexis. *Suffrutices aut sæpiùs herbæ erectae vel prostratae; folia in Astragalo T. herbaceo impari-pinnata, in Tragacanthâ T. suffrutescente abruptè pinnata petiolo communi spinæformi aceroso longo; stipulae à petiolo distinctae aut (in Tragacanthâ) adnatae, interdum in unam eidem oppositam coalitae; flores glomerati aut spicati, axillares & terminales. Legumen formâ varium, biloculare ab introflexâ suturâ inferioris depressione versus superiorem, quâ septum duplicatum conficitur.*

**ERISERRULA**, L. \* **PELECINUS**, T. \* Calix tubulosus 5-fidus. Vexillum alis & carinâ longius. Legumen oblongum planum 2-loculare polyspermum, margine utroque dentato 2-valvi, dissepimento valvis contrario; semina compressa. *Herbæ; stipulae à petiolo distinctae; flores spicati axillares & terminales.*

**PHACA**, L. \* **ASTRAGALOÏDES**, T. \* Calix tubulosus 5-den-



tatus. Vexillum alis & carinâ longius. Legumen oblongum inflatum, polyspermum semibiloculare futurâ superiore versis inferiorem depressâ & intus semiproductâ. *Herbæ; stipulæ à petiolo distinctæ; flores spicati axillares & terminales. Astragali congener ex D. Lamark, exceptâ specie geminâ; discrepat tamen futurâ non inferiore sed superiore introflexâ & suctu tantum semibiloculare.*

**COLUTEA**, T. L. \* **PHACA**, L. \* *Baguenaudier*. Calix campanulatus 5-fidus persistens. Stigma hinc villosum. Legumen magnum vesicarium membranaceum polyspermum. *Frutices aut herbæ; stipulæ à petiolo distinctæ; pedunculi 2-flori aut sæpius spicato-multiflori axillares & terminales. Hinc refert D. Lamark Phacam australem & P. alpinam L., utramque unilocularem.*

**GLYCYRRHIZA**, T. L. \* *Reglisse*. Calix tubulosus 2-labiatus, suprâ 4-fidus inæqualis, infrâ simplex linearis. Carina 2-petala. Legumen ovatum compressum 3-6-spermum. *Frutices aut herbæ; stipulæ à petiolo distinctæ; flores capitati aut spicati, axillares & terminales; legumen glabrum aut echinatum.*

**GALEGA**, T. L. \* *Lavanèse*. Calix tubulosus 5-dentatus dentibus subulatis subæqualibus. Legumen oblongum rectum subcompressum, polyspermum ad singula semina sæpè nodosum, inter eadem obliquè striatum aut transversim sulcatum. *Frutices aut sæpius herbæ, quædam tinctoriæ; stipulæ à petiolo distinctæ; flores spicati axillares & terminales.*

**INDIGOFERA**, L. \* *Indigotier*. Calix patens 5-dentatus. Carina calcare subulato utrinque notata. Legumen oblongum lineare subcylindricum polyspermum, rectum aut incurvum. *Frutices aut herbæ; folia interdum ternata, raro simplicia, plerumque imparipinnata; foliola in quibusdam articulata & basi aristata more Phaseoli; stipulæ à petiolo distinctæ; pedunculi axillares 1-2-flori aut sæpius spicato-multiflori. Legumen ovatum breve dispermum in I. eneaphyllâ. Species plurimæ tinctoriæ.*

**V I I.** Corolla irregularis papilionacea. Stamina decem diadelpha. Legumen uniloculare bivalve. *Herbæ; folia pinnata aut conjugata aut rariùs subnulla, petiolo communi in cirrhum desinente; stipulæ à petiolo distinctæ.*

**LATHYRUS**, T. L. \* **CLYMENU**, T. \* **APHACA**, T. \* **NIS-SOLIA**, T. \* *Gesse*. Calix turbinatus 5-fidus, laciniis 2 superioribus brevioribus. Vexillum alis & carinâ majus. Stylus planus, supernè latior; stigma anteriùs villosum. Legumen longum polyspermum, seminibus globosis aut subangulatis. *Folia conjugata seu petiolus 2-phyllus in Lathyro T., polyphyllus*



*foliis pinnatis in Clymeno T. cujus insuper vexillum sæpè basi 2-calle, aphyllus in Aphacâ T. cujus stipulæ magnæ folia opposita simplicia æmulantur, 1-phyllus folio gramineo non cirrhoso in Nif-foliâ T. ; caules diffusi aut erecti aut scandentes, teretes aut angulosi aut petiolis decurrentibus alati; stipulæ parvæ à petiolis distinctæ; pedunculi axillares & terminales, 1-2-flori aut multiflori pedicellis 1-bracteolatis. An genus stylo satis definitum; an Tournefortianus folii conjugati caractèr addendus, relictis aliis generibus commixtis? Præter conspicuos flores Lathyri more fructificantes, quidam alii radicales subterranei minimi hermaphroditi fructu subovato in L. amphicarpo ut & in Viciâ amphicarpâ mox memorandâ.*

**PISUM, T. L. \* OCHRUS, T. \* Pois.** Calix & corolla Lathyri. Stylus triangulus, suprâ carinatus. Stigma villosum. Legumen longum polyspermum; semina globosa, hylo subrotundo. Caulis scandens aut erectus; petioli polyphylli foliolis magnis; stipulæ majores; pedunculi bi aut multiflori axillares. Stylo & stipulis à Lathyro discrepat. Ochri T. hylus seminis oblongus & petiolus aphyllus latè marginatus, infrâ decurrens exstipulaceus, suprâ cirrhosus.

**OROBUS, T. L. \* Orobe.** Calix tubulosus, basi obtusus, limbo 5-dentatus dentibus 2 supernis brevioribus & profundioribus. Stylus linearis; stigma supernè villosum. Legumen oblongum polyspermum seminibus rotundis. Caulis sæpè erectus; folia conjugata, aut bijuga aut pinnata; stipulæ auriculatæ; flores spicati axillares & terminales.

**VICIA, T. L. \* Vesce.** Calix tubulosus 5-fidus aut 5-dentatus dentibus supernis brevioribus. Germen basi hinc glandulosum; stylus filiformis; stigma sub apice transversè barbatum. Legumen oblongum polyspermum, seminibus rotundis hylo laterali. Caulis erectus aut scandens, sæpè gracilis; folia pinnata; stipulæ parvæ; flores axillares, 1-3 sessiles aut spicati pedunculati. Flores in V. amphicarpâ quidam subterranei fructificantes ut in Lathyro amphicarpo suprâdicto.

**FABA, T. \* VICIA, L. \* Fève.** Calix 5-fidus. Vexillum alis & carinâ longius. Legumen oblongum crassum 2-4-spermum, seminibus magnis oblongis hylo terminali. Caulis erectus; folia 2-3-juga cirrho subnullo; stipulæ oblongæ; pedunculi multiflori axillares; flores albidis alis nigro-maculatis.

**ERVUM, T. L. \* LENS, T. \* VICIA, T. \* Ers, Lentille.** Calix profundè 5-fidus subæqualis, longitudine corollæ. Vexillum alis brevibus & carinâ brevior majus. Stylus simplex; stigma non barbatum. Legumen oblongum 1-4-spermum, suprâ semina tumida. Caulis erectus gracilis; folia pinnata; stipulæ parvæ; pedunculi 1-2-flori aut multiflori axillares; legumen Ervi T. oblongum torulosum seminibus globosis, Lentis T. ovatum compressum seminibus orbiculatis utrinque convexis, Viciæ T. oblongum seminibus subrotundis.



**CICER, T. L. \*** *Ciche, Pois ciche, Garvance.* Calix 5-fidus, corollæ æqualis, laciniis 4 superioribus vexillo majori incumbentibus, quintâ carinæ parvæ subiectâ. Legumen rhombeum turgidum 2-spermum. *Caulis erectus; folia impari-pinnata, foliolis dentatis; stipulæ dentatæ; pedunculi sub 1-flori axillares; semina capiti arietino conformia. An rectè consociatum præcedentibus, licet impari-pinnatum? An verè congener C. nummularium Lamark simplicifolium habitu similis Crotalaria?*

**VIII. Corolla irregularis papilionacea. Stamina decem diadelphea. Legumen articulatum articulis monospermis. Herbæ aut frutices, rariùs arbores; folia simplicia aut ternata aut sæpiùs impari-pinnata; stipulæ à petiolo distinctæ.**

**SCORPIURUS, L. \* SCORPIOIDES, T. \* Chenille.** Calix 5-fidus subæqualis. Carina internè 2-partita. Legumen oblongum coriaceum, revolutum sulcatum, articulatum articulis contractis 1-spermis. *Herbæ repentes; folia (Bupleuri) simplicia, basi stipulis marginata; pedunculi solitarii axillares longi, umbellatim 1-4-flori; legumen scorpioides, læve aut rugosum aut muricatum.*

**ORNITHOPUS, L. \* ORNITHOPODIUM, T. \* Pied-d'oiseau.** Calix tubulosus 5-dentatus subæqualis persistens. Carina minima. Legumen subulatum teres arcuatum, articulatum articulis subcylindricis. *Folia ternata aut pinnata; stipulæ parvæ; pedunculi solitarii axillares aut terminales, umbellatim 1-4-flori, leguminibus digitos avium æmulantibus. An O. tetraphyllus L. verè congener?*

**HIPPOCREPIS, L. \* FERRUM EQUINUM, T. \* Fer-à-cheval.** Calix 5-dentatus inæqualis. Legumen oblongum compressum membranaceum, rectum aut incurvum, pluriès articulatum, articulis instar Ferri equini hinc profundè emarginatis, singulis 1-spermis semine incurvo. *Herbæ; folia impari-pinnata; stipulæ parvæ; pedunculi axillares & terminales umbellatim uni aut multiflori.*

**CORONILLA, T. L. \* SECURIDACA, T. \* EMERUS, T. \* Coronille.** Calix brevis persistens 2-labiatus, suprâ 2-dentatus dentibus junctis, infrâ 3-dentatus. Vexillum vix alis longius. Legumen longum, isthmis interceptum. *Caracter ex Linnæo. Herbæ aut suffrutices; folia impari-pinnata, stipulis à petiolo distinctis; pedunculi axillares aut terminales, umbellatim multiflori; legumen in pluribus 2-valve sub 1-loculare vix articulatum, in Coronillâ T. subcylindricum seminibus oblongis, in Securidacâ T. latius compresso-planum apice subulatum seminibus subquadratis, tenue subulatum seminibus cylindricis in Emero T. cujus præterea caulis*



*frutescens & petala unguiculata & unguis vexilli basi 2-callis. An genera cum Tournefortio distinguenda & species quædam Ornithopo adjiciendæ?*

**HEDYSARUM, T. L. \* ONOBRYCHIS, T. \* ALHAGI, T. \***  
*Sainfoin. Calix 5-fidus persistens. Carina transversè obtusa. Legumen articulis subrotundis compressis. Character ex Linnæo. Herbæ aut rariùs suffrutices; folia simplicia aut gemina aut ternata aut impari-pinnata, stipulis à petiolo distinctis; ternatorum petioluli in petiolum articulati, sæpè substipulacei stipulâ filiformi; flores axillares pedunculis uni aut multifloris, aut sæpius terminales spicati vel paniculati; horum bractæ nunc majores variè constructæ, nunc parvæ aut subnullæ; legumen formâ varium, modò subcylindricum articulis truncatis, modò compressum & frequenter utrinque aut hinc tantum ad articulos contractum. Species quædam articulo unico 1-spermo, aliæ 1-3-phyllæ, aliæ plures (Onobrychis T.) pinnatifoliæ præterea distinctæ fructu cristato & ideò forsàn è genere distrahendæ additâ Onobrychide... Pluk. t. 433. f. 1. licèt simplicifoliâ. An restituendum pariter Alhagi T. (H. Alhagi L.) frutescens, cui folia simplicia vix stipulacea, spinæ longissimæ axillares interdum ramosæ & floriferæ, legumen coriaceum subcylindricum vix articulatum? H. cornutum L. similiter frutescens & spinosum, sed pinnatifolium Tragacanthæ facie. Motus in foliis H. gyrantis peculiaris.*

**ÆSCHYNOMENE, L. \* Agaty.** Calix campanulatus, limbo bilabiato suprâ 2-fido & infrâ 3-dentato. Legumen longum sæpè compressum, articulatum articulis compressis. Herbæ aut rariùs arbores; folia impari-pinnata; stipulæ parvæ; pedunculi multiflori axillares & terminales; legumen læve aut subscabrum. An verè congener Æ. Sesban cui legumen longum subcylindricum 2-valve non articulatum, & calix 5-dentatus æqualis?

**DIPHYSA, Jacq. \*** Calix campanulatus 5-fidus inæqualis. Vexillum reflexum, alis & carinâ pariter reflexis longius. Legumen oblongum compresso-planum, articulatum & transversè scissile articulis 1-spermis; utraque hujus superficies omninò testâ veficâ maximâ oblongâ inflatâ undique clausâ. *Arbuscula; folia impari-pinnata; pedunculi 2-3-flori axillares; flores flavi. Car. ex Jacq.*

**I X.** Corolla irregularis papilionacea. Stamina plerumque decem diadelphea. Legumen capsulare uniloculare submonospermum sæpè non dehiscens. *Arbores aut frutices; folia sæpiùs impari-pinnata; stipulæ à petiolo distinctæ mox deciduæ.*

**DALBERGIA, LS. \*** Calix campanulatus 5-dentatus. Vexillum majus ungue lineari; carina basi 2-partita. Stamina 8 diadelphea



filamentis 2 apice 5-fidis & 4-antheriferis laciniâ quintâ sterili, aut 9 triadelpa filamentis 2 apice 4-fidis & 4-antheriferis & tertio indiviso monandro. Legumen stipitatum membranaceum aut cartilagineum, compresso-planum tenue, subrotundum aut ligulæforme oblongum, 1-2-spermum seminibus compressis remotis. *Arbores aut frutices; folia impari-pinnata aut ternata; flores axillares racemosi aut spicati. Character ex L. Suppl.*

**AMERIMNON**, Brown. Jacq. \* Calix tubulosus subbilabiatus, supra 2-dentatus, infra 3-fidus. Carina (2-petala?) vexillo & alis brevior. Stamina 10 monadelpa. Legumen stipitatum membranaceum compressum oblongum, utroque fine attenuatum 1-2-spermum 2-valve, seminibus reniformibus compressis. *Arbustula ramis debilibus reclinatis; folia simplicia aut oppositè & impari-pinnata; flores spicati aut racemosi axillares. Character ex Brown. & Jacq. Confer cum Dalbergiâ & Robiniâ.*

**GALEDUPA**, Lamark. \* *Pongolotte*. Calix brevis cyathiformis, obliquè truncatus integer. Petala unguiculata; vexillum patens 2-lobum; alæ & carina conniventes. Stamina 10 diadelpa. Legumen ellipticum subfalcatum planum acuminatum 1-2-spermum, seminibus compressis reniformibus. *Arbor, eadem cum Caju-Galedupa Rumph. 2. t. 13 & Pungam Rheed. 6. t. 3; folia impari-pinnata foliolis oppositis 2-3-jugis; flores racemosi axillares. Character ex D. Lamark. Confer cum Amerimno. An Rumphiana arbor abruptè pinnatifolia & 2-sperma verè eadem cum Rheedianâ 1-spermâ & impari-pinnatâ?*

**ANDIRA**, Pis. Lamark. \* **ANGELIN**, Pl. \* *Angelin*. Calix urceolatus subinteger aut 5-dentatus. Alæ & carina 2-petala subæquales; vexillum majus. Stamina 10 diadelpa. Legumen stipitatum carnosum punctatum ovoïdeum hinc sulcatum, foetum testâ fibrosâ 1-spermâ. *Arbor; folia oppositè & impari-pinnata; flores racemoso-paniculati terminales & axillares. An Geoffrææ congener? Character floris ex sicco, fructus ex Plum. mss.: an tamen in Angelin Pl. fructus sessilis aut stipitatus? Hujus congener ex Aubletio Vouacapoâ ejusdem t. 373, genus imperfectum floribus non observatis, caule & foliis & dispositione fructuum simile, cui legumen ovatum aut pyriforme, acuminatum crassum hinc sulcatum, 2-valve 1-spermum, membranulâ semen obvolvente.*

**GEOFFRÆA**, Jacq. L. \* **UMARI**, Pis. \* Calix campanulatus semis-fidus subbilabiatus. Alæ & carina subæquales; vexillum majus. Stamina 10 diadelpa. Drupa ovoïdea, utrinque sulco notata, foeta nuce conformi subligneâ 2-valvi 1-spermâ. *Arbustula in trunco & ramis spinosa; folia oppositè & impari-pinnata; flores racemosi axillares graveolentes; drupæ amygdaliformes. Character ex Jacq. Confer cum Andirâ.*

**DEGUELIA**, Aubl. \* *Déguelé de Cayenne*. Calix urceolatus brevis 2-labiatus, supra integer, infra 3-fidus. Alæ & carina 2-petala



subæquales; vexillum majus declinatum. Stamina 10 diadelphea; Legumen globosum parvum 2-valve 1-spermum semine sphærico farinâ obvoluto. *Frutex ramis sarmentosis scandentibus; folia oppositè & impari-pinnata; flores spicati axillares & paniculati terminales. Character ex Aubl. Guyan. t. 300. Confer cum Geoffræâ.*

**NISSOLIA**, Jacq. L. \* Calix campanulatus 5-dentatus inæqualis. Stamina 10 diadelphea aut monadelphea cum fissurâ dorsali. Legumen stipitatum membranaceum compressum basi tumidum 1-spermum non dehiscens, suprâ tenue in alam longiorem globosam excurrent. *Arbores aut frutices ramis volubilibus; folia impari-pinnata foliolis oppositè 1-2-jugis; flores spicati aut racemosi, axillares aut terminales; fructus Aceris dimidiatus. Character ex Jacq. An verè congener N. quinata Aubl. t. 297 cui foliola alternè 4-juga, calix 2-bracteatus, carina 2-petala, legumen tomentosum, cætera similia?*

**COUMAROUNA**, Aubl. \* *Coumarou de la Guyane.* Calix coriaceus turbينات 3-lobus. Petala 5, quorum 3 superiora erecta venosa, 2 inferiora declinata minora. Stamina 8 monadelphea. Nux ovato-oblonga, extus drupacea & tomentosa, intus 1-sperma semine oblongo amygdalino. *Arbor ramosissima; folia alternè & impari-pinnata, petiolo communi canaliculato in acumen foliaceum desinente; flores racemosi axillares & terminales; semen odorum. Character ex Aubl. Guyan. t. 296.*

**ACOUROA**, Aubl. \* Calix urceolatus 5-dentatus. Petala unguiculata; carina 2-petala; vexillum majus. Stamina diadelphea. Legumen substipitatum coriaceum subrotundum compressum, hinc concavum, indè convexum, 1-spermum non dehiscens. *Arbor; folia alternè & impari-pinnata; flores racemosi terminales & axillares. Character ex Aubl. Guyan. t. 301. An congener ejusd. Vatairea t. 302, gallicè Dartrier à seminis usu medico, arbor subsimilis, legumine triplò majore utrinque convexo & infra ad margines attenuato, floribus non observatis? Utramque confer cum Pterocarpo.*

**PTEROCARPUS**, Loëfl. L. \* Calix campanulatus 5-dentatus. Vexillum unguiculatum patens, alis & carinâ majus. Stamina 10 (filamentis coalitis?). Legumen pedicellatum, subrotundum aut hinc erosum subfalcatum, compressum membranaceum, lateribus venosis varicosum, medio utrinque prominulum & 1-spermum non dehiscens. *Character ex Loëfl. & Linn. Arbores aut frutices; folia alternè & impari-pinnata; flores spicati axillares. Legumen quorundam medio echinatum. Sanguinea ex scisso P. Draconis cortice exsudat resina. An verè congener P. ecastaphyllum L. (Spartium Pl.) discrepans carinâ 2-petalâ unguiculatâ, staminum filamentis 2 membranaceis apice 5-fidis & 5-antheriferis, legumine omninò compresso & subrotundo & marginibus quasi 2-valvi, foliolis interdum subsolitariis? Huc etiam retulit Linnaeus fil. Suppl. 1<sup>o</sup>. Medicaginem Pl. ic. 201. f. 2, distinctam spinis stipularibus,*



*flaminibus basi monadelphis, legumine reniformi complanato non marginato; 2°. Moutouchiam Aubl. t. 279 cui carina 2-petala, stamina monodelpha, legumen compressum rugosum, cætera generi similia.*

**X.** Corolla irregularis (interdum nulla). Stamina decem distincta. Legumen capsulare uniloculare submonospermum, sæpius non dehiscens. *Arbores aut frutices; folia impari-pinnata aut simplicia; stipulæ à petiolo distinctæ, mox deciduæ.*

**APALATOA**, Aubl. \* Calix turbinatus 4-fidus, extus basi 2-squamosus. Petala 0. Stamina 10. Legumen latum compressum orbiculatum membranaceum, margine alato undulatum, medio tumidum 1-spermum. *Arbor; folia alternè & impari-pinnata; flores spicati axillares, singuli 1-bracteolati. Character ex Aubl. Guyan. t. 147. An congener Touchiroa ejusd. t. 148, discrepans calice non extus squamoso & foliis simplicibus? Genus utrumque Pterocarpo proximum, ideò fortè polypetalum petalis nondum observatis.*

**DETARIUM**. \* *Détar du Sénégal.* Calix 4-fidus. Petala 0. Stamina 10, alterna breviora. Drupa orbiculata crassa farinacea mollis, foeta officulo magno orbiculari compresso 1-spermo, fibris intertextis extus utrinque reticulato, ad ambitum obtuso lævi. *Arbor; folia alternè & impari-pinnata; flores racemosi axillares. Character ex D. Adans. not. mss. & ex ejusdem specimine sicco. An genus verè apetalum?*

**COPAIFERA**, L. \* **COPAIVA**, Jacq. \* *Copahu.* Calix 4-partitus patens. Petala 0 (calix 0 & petala 4 ex Jacq. & Linn.). Stamina 10 distincta; antheræ incumbentes. Germen 1; stylus 1; stigma 1. Legumen ovatum 2-valve 1-spermum, arillo baccato semen obvolvente. *Arbor trunco per incisiones balsamifluo; folia alternè & impari-pinnata, lateribus foliolorum nervo medio deflecente inæqualibus; flores racemoso-paniculati axillares. Character ex Jacq. & Linn. An genus polypetalum petalis caducis; an Terebintaceis affinius?*

**MYROSPERMUM**, Jacq. \* Calix campanulatus limbo subintegro vix 5-dentato. Corolla papilionacea 5-petala, alis & carinâ 2-petala subæqualibus angustis, vexillo majore obcordato. Stamina 10 distincta declinata, filamentis tardè caducis; antheræ incumbentes. Germen pedicellatum declinatum; stylus 1; stigma 1. Legumen oblongum, basi membranaceo-alatum compressissimum. apice tumidum 1-loculare non dehiscens 1-2-spermum, feminibus aliis paucis sæpius abortivis; semina reniformia. *Frutex; folia alternè & impari-pinnata; flores*



*racemosi subterminales; semina succo inuncta balsamifero loculum occupante, undè nomen. Character ex Jacq. Amer. Hinc referenda arbor caractere similis Saumerio dicta in Jos. Jussæi herb. Peruv., quæ Quina-Quina Peruvianorum (act. Gall. 1738. p. 237), valdè discrepans à Cinchonâ L. similiter apud Europæos vernaculè denominatâ. An congener etiam Myroxylum peruvianum LS., arbor cortice resinoso balsamum Peruvianum fundente, cui flos & fructus ferè idem, sed corolla ex Linnæo hypogyna, legumen 1-spermum (an balsamiferum?) & folia oppositè abruptèque pinnata?*

## XI. Genera Leguminosis affinia.

**SECURIDACA**, Jacq. L. \* Calix 3-partitus parvus, laciniis 2 inferioribus & 1 superiore. His interjectæ alæ 2 laterales magnæ subrotundæ patentes, intrâ quas vexillum minimum 2-petalum & carina major indivisa conduplicata apice appendiculata. Stamina 8 monadelpha intrâ carinam cum fissurâ dorsali. Germen superum; stylus 1; stigma dilatatum subdentatum. Legumen (Nissoliæ) basi ovatum tumidum 1-spermum, suprâ desinens in alam longam complanatam dilatatam obtusam. *Arbusculæ aut frutices scandentes; folia alterna simplicia (stipulacea?); flores spicati axillares aut terminales, habitu & calice subsimiles Polygalæ, sed polypetali & 1-locularem prodentes fructum capsulis Banisteriæ conformem.*

**BROWNÆA**, Jacq. L. \* Calix infundibuliformis (corolla exterior Jacq.) 5-fidus erectus, caliculo minore (calix Jacq.) turbinato 2-fido cinctus. Perala 5 unguiculata, tubo calicino inserta. Stamina 10 ibidem inserta; filamenta coalita in vaginam hinc fissam apice 10-fidam, alterna breviora; antheræ oblongæ incumbentes. Germen superum pedicellatum cujus stipes calici hinc adnatus; stylus 1; stigma 1. Legumen 1-loculare polyspermum? ... *Arbuscula ligno flavescente duro; folia opposita in singulo ramulo 2-3-juga (an potius abruptè pinnata 2-3-juga?); flores è gemmis axillaribus plures fasciculati, 11-andri in Hermesiâ Loëfl. cæterum consimili. Character ex Jacq.*

**ZYGIA**, Brown. \* Calix minimus 5-crenatus. Corolla tubulosa 5-dentata persistens. Stamina 16 infrâ coalita in tubum corollæ longiorem; antheræ subrotundæ. Germen 1; stylus 1; stigma 1. Legumen longum compressum 8-9-spermum. *Arbuscula; folia subpinnata; flores subspicati. Character ex Brown. Jam. t. 22. f. 3. Confer cum Mimosâ Bourgoni Aubl. Guyan. t. 358, fortè consimili: indè genus ulteriori examine delendum.*

**AROUNA**, Aubl. \* Calix 5-partitus parvus. Corolla o. Stamina 2 opposita, disco inserta. Germen superum, disco impositum; stylus 1; stigma 1. Capsula ovata, hinc fulcata, intus pulposa & 1-2-sperma. *Arbor ramis divaricatis alternis;*



*folia alterna stipulacea, alternè & impari-pinnata foliolis (an potius folia simplicia?) pariter stipulaceis; flores alternè racemosi axillares & terminales. Character ex Aubl. Guyan. t. 5.*

Oss. Leguminosæ unam è præcipuis in ordine Vegetantium naturali constituunt seriem nullatenus disturbandam in sincerâ methodo, licet Tournefortius arboreas ab herbaceis, Linnæus decandras & diclines à diadelphis seposuerit. Character igitur earum primarius non in caule, non in connexione staminum præcipuè consistit, nec in corollâ papilionaceâ cui regulares consociantur corollæ, sed desumendus ex calice monophyllo, ex corollæ polypetalæ staminumque definitorum perigyniâ, ex germine supero & stylo simplici, ex fructu leguminoso & unilaterali seminum insertione. Duplex ordinis phalanx præcipua, propriis utraque prodiens signis & plures complexa generum turmas. Alterius corolla regularis pentapetala & seminis membrana interior crassiuscula perispermii amula & ejusdem radícula recta & stamina plerumque distincta & folia abruptè pinnata & quædam cum præmissis Rosaceis monogynis cognatio. Numerosioris alterius corolla papilionacea sæpè tetrapetala & corculum absque perispermio & ejusdem radícula in lobos incurva & stamina sæpius coalita & diversa foliorum constructio & manifesta cum subsequentiis Terebintaceis monospermis affinitas. Utriusque sectiones aut turmæ primariò designantur staminibus distinctis aut coalitis, legumine uni aut multiloculari, bivalvi aut articulado aut non dehiscente, secundariò foliorum structurâ, ulterioribus in fructificatione deficientibus signis solidis. An tamen folia pinnata à ternatis & simplicibus verè discernenda; an habenda insuper ratio stipularum quæ à petiolo distinguuntur caducæ superstitessve, aut eidem alarum instar adnascuntur? His tamen admissis, quædam prius discerpenda Linnæi genera variè stipulata, & iterum confirmandæ species omninò congeneres ut certum denique in serie immutabili locum obtineant.

Nonnullæ insignes in Leguminosis memorandæ exceptiones, nempe 1<sup>o</sup>. Petala quædam evanida in Gleditsiâ, Tamarindo &c., unicum superstes in Amorphâ &c., nulla in Ceratoniâ, Detario &c., omnia in corollam monopetalam & staminiferam quandoque coalita in Mimosâ & Trifolio. 2<sup>o</sup>. Stamina interdum pauciora quàm decem, rarissimè indefinita, nonnunquam monadelpha filamento decimo fissuram obturante. 3<sup>o</sup>. Legumen unico exemplo bivalve valvis carinatis in Hæmatoxylo, trivalve in Moringâ, quadrivalve in quâdam Mimosâ. 4<sup>o</sup>. Semen in Arachi & Moringâ oleiferum, non farinaceum ut in cæteris. 5<sup>o</sup>. Fructus quarundam specierum subterraneus in Arachi, Glycine, Lathyro, Viciâ, Trifolio. 6<sup>o</sup>. Sexus interdum distincti in Mimosâ, Gleditsiâ, Gymnoclado, Glycine &c., 7<sup>o</sup>. Folia Moringæ impari-tripinnata, Spartii & Erinacei subopposita. 8<sup>o</sup>. Glycines unius succus lactescens.

Non omittenda foliorum seminalium à corculi lobis subtus persistentibus rara distinctio, insignis in Phaseolo & Dolicho & generibus conterminis, futurum definitæ sectionis signum. Spectabilis etiam foliorum contractio vespertina & matutina expansio, Somni nomine celebrata (Linn. amæn. 4. t. 333), non in Mimosâ tantum sed in omnibus abruptè pinnatis coordinatis, in aliis pluribus Leguminosis & in quibusdam cæteris Vegetantibus quotidiana.



## ORDO XII.

## TEREBINTACEÆ, LES TEREBINTACÉES.

**CALIX** monophyllus inferus, definitè partitus. Petala definita (rarius nulla) imo calici inserta, ejusdem laciniis numero æqualia & alterna. Stamina totidem petalis alterna, aut dupla, eidem puncto inserta. Germen superum, simplex aut definitè multiplex. Germini simplici stylus unicus (rarò nullus) cum stigmate simplici vel partito, aut multiplex cum numero stigmatum æquali; fructus capsularis aut baccatus drupaceusve, uni aut multilocularis loculis monospermis. Germini multiplici styli aut & stigmata totidem simplicia; capsula totidem monospermæ distinctæ. Semina plerumque in ossèâ nuce recondita. Corculi perispermio destituti radícula lateralis & reflexa in lobos. Caulis arborescens aut frutescens. Folia alterna, non stipulacea, simplicia aut ternata aut impari-pinnata.

I. Germen simplex. Fructus unilocularis monospermus.

**CASSUVIUM**, Rumph. Lamark. \* **ANACARDIUM**, L. \* *Acajou*. Calix 5-partitus. Petala 5 longiora. Stamina 10, filamentis 9 brevibus & antheris subrotundis, 1 longiore & antherâ oblongâ caducâ (ex *Rottboll.* 8-10 basi monadelphæ, antherâ unicâ fertili). Stylus 1; stigma 1. Nux reniformis semine conformi, insidens pedunculo ampliato pyriformi carnosio. *Arbustula* (*Anacardium occidentale* L.) *gummiifera*; folia simplicia magna, nervo unico longitudinali & cæteris transversis; flores parvi albi, paniculati terminales, fasciculatim bracteati, quidam masculi germine abortivo (an & quidam 5-andri?); nux sub cortice oleoso-resinosa; pedunculus floris spongiosus esculentus, *Pomme d'Acajou dictus*.

**ANACARDIUM**, Off. L. Lamark. \* **SEMECARPUS**, LS. \* *Anacarde*. Calix campanulatus 5-fidus. Petala 5 majora. Stamina 5, antheris oblongis. Styli 3; stigmata 3. Nux compressa cordiformis basi latior, semine conformi, insidens pedunculo incrassato



incrassato turbinato aut cupulæformi. *Arbores; folia & flores ut in Cassuvio; nux pariter resinosa; semen esculentum.*

**MANGIFERA**, L. \* *Manguier*. Calix 5-partitus. Petala 5 longiora. Stamina 5, antheris subcordatis. Stylus 1; stigma 1. Drupa oblonga subreniformis foeta nuce oblongâ compressâ extus filamentosâ; semen oblongum. Genus arboreum plures complectens species aut varietates; folia & flores ut in Cassuvio; drupa esculenta. Stamen unicum fertile ex Forsk.

**CONNARUS**, L. \* Calix 5-fidus aut 5-partitus. Petala 5. Stamina 10, filamentis basi coalitis, alternis duplò brevioribus. Stylus 1; stigma 1. Capsula oblonga gibba 2-valvis 1-sperma. *Caracter ex Linnaeo. Arbores aut frutices; folia ternata aut impari-pinnata bijuga; flores paniculati terminales. An verè congener Rhus... Burm. Zeyl. t. 89 (Linnaëana Connari species) quod in sicco vidi 5-stylum; an idem 5-gynum germine unico superstite? C. Africani Lamarck semen intra capsulam germinans radicula laterali quasi in cirrhum productâ.*

**RHUS**, T. L. \* **TOXICODENDRON**, T. \* **COTINUS**, T. \* *Sumac; Vernis, Fustet*. Calix 5-partitus. Petala 5. Stamina 5 brevia, antheris parvis. Styli 3 brevissimi aut 0; stigmata 3. Bacca parva, foeta nuce 1-spermâ. *Arbusculæ aut frutices; folia in Rhoë T. impari-pinnata, in Toxicodendro ternata, in Cotino simplicia; flores paniculati aut densè racemosi, interdum masculi hermaphroditis mixti, præcipuè in Cotino; bacca Rhoëis villosa nucleo globoso, Toxicodendri striata nucleo compresso, Cotini compressior. Species quædam verniciflua aut caustico succo interdum albido turgida.*

**ROUREA**, Aubl. \* Calix 5-partitus, extus tomentosus. Petala 5; Stamina 10. Styli 5; stigmata 5. Drupa nigra 1-sperma; semen testâ fragili tectum. *Frutex tortuosus ramis sarmentosis; folia impari-pinnata basi 2-stipulacea; flores paniculati axillares & terminales, singuli bracteolati; petala & stamina disco inserta. Character ex Aubl. Guyan. t. 187. An germen potius quintuplex & affinitas cum Cnesti infra memoratâ? An discus non calicinus sed hypogynus, & inde major cum Sapindis affinitas? An folia verè stipulacea?*

II. Germen simplex. Fructus multilocularis, loculis quibusdam interdum abortivis.

**CNEORUM**, L. \* **CHAMÆLEA**, T. \* *Caméléc*. Calix minimus 3-dentatus persistens. Petala 3 oblonga. Stamina 3 breviora, antheris parvis. Stylus 1; stigma 3-fidum. Bacca parva sicca 3-cocca coccis 1-spermis. *Frutex; folia (Oleæ) simplicia; pedunculi 1-3-flori axillares. Fructus Euphorbiarum; coraculum ut in Terebintaceis.*



**RUMPHIA**, L. \* Calix 3-fidus. Petala 3 oblonga. Stamina 3, petalis æqualia, antheris parvis. Stylus 1; stigma 3-gonum. Drupa coriacea turbinata 3-sulca, foeta nuce 3-loculari 3-spermâ. *Arbor; folia (Tiliæ) simplicia; flores racemosi axillares. An radícula corculi incurva? An Sapindis affinior?*

**COMOCLADIA**, Brown. L. Jacq. \* Calix ferè 3-partitus. Petala 3 majora. Stamina 3 breviora, antheris subrotundis. Stylus 0; stigma 1. Drupa oblonga arcuata succulenta, supernè 3-punctata, foeta nuce conformi membranaceâ 1-spermâ. *Arbores, incisione succum emittentes glutinosum, aqueum aut lacteum, contactu aëris nigrescentem; folia impari-pinnata, foliolis oppositis, hirsutis dentatis aut glabris integris; flores racemoso-paniculati axillares numerosi minimi racemis magnis, quidam 4-andri calice 4-fido; drupa olivæformis. Character ex Jacq. Congener certè Pseudo-Brasili-um P lum. mss. 6. t. 79 cujus ut & Comocladia duplex species altera glabra, altera hirsuta, utraque similiter pinnata & paniculata & drupacea 1-nuclea & succo nigrescente turgida & insuper in tincturis rubris usurpata instar ligni Brasiliæ, inde Breillet bâlard vernaculè dicta. Flores hujus à Plumerio non observati, in Desportes mss. describuntur omninò quales in Comocladia sed apetalæ. Alterum datur Pseudo-Brasili-um HRP. sed dissimile, frutescens femineum masculo nondum cognito, cujus foliola pinnarum alterna glabra integra, racemi axillares breves floribus bracteatis, calix turbinatus 5-fidus, petala 5, stigma 2-sulcum sessile germi- ni imposi- tum, fructus in sicco Suriani specimine simillimo olivæformis niger rectus testaceus absque osseo tegmine, 1-spermus semine sulcato, altero loculo & semine forsàn abortivo: à Plumerianis ergò discrepat, posthac masculo innotescente (5-andro?) alibi reponendum. His con- gener Tariri frutex tinctorius Aubl. t. 390 ex D. Lamark act. Paris. 1784.*

**CANARIUM**, Rumph. L. \* Dioicum. Calix 2-partitus. Petala 3 caliciformia. MASC. Stamina 5, antheris subsessilibus oblongis. FÆM. Stylus brevissimus; stigma capitatum 3-gonum. Drupa sicca ovata acuminata, basi cincta membranâ (calice?) crenatâ; nux oblonga 3-gona (3-locularis loculis 1-spermis, 2 sæpè abortivis, semine superstitite 6-segmentoso ex Rumph.). *Arbores; folia impari-pinnata foliolis oppositis, superiora basi 2-stipulacea stipulis cristatis deciduis; flores paniculati terminales. Character ex Rumph. & Linn.*

**ICICA**, Aubl. \* Calix 4-5-dentatus. Petala 4-5, disco inserta, basi erecta, limbo patentia. Stamina 8-10, ibidem inserta. Germen disco cinctum; stylus brevissimus; stigma capitatum 4-sulcum. Capsula coriacea, 2-4-valvis 2-4-sperma seminibus ossis pulpâ propriâ obvolutis. *Arbores resinosa aut balsamifera; folia ternata aut impari-pinnata oppositè 2-3-juga; flores sæpius paniculati axillares & terminales. Character ex Aubl. Guyan. t. 130-135.*



*Amyridis congener ex L. Suppl., discrepans petalis basi conniventibus & fructu capsulari polyspermo. An tamen genus delendum, speciebus aliis Burseriæ adjiciendis, aliis Amyridi quæ fortè rectius habenda multilocularis loculis pluribus abortivis. Huic affinis Vepris inermis seu Elemifera Commerf. arbor balsamifera trifoliata punctato-pellucida 4-petala 8-andra, brevissimè 4-styla fructu pisiformi 4-spermo.*

**AMYRIS, L. \*** Calix 4-dentatus persistens. Petala 4 patentia; Stamina 8. Stylus 1 crassus; stigma capitatum. Drupa sicca subrotunda, foeta nuce globosâ nitidâ 1-spermâ. *Caracter ex Linnæo. Frutices aut arbores; folia ternata aut impari-pinnata, in quibusdam punctato-pellucida; flores paniculati axillares & terminales. Species quædam balsamiflua. Ex Brownæo stylus subnullus, nux interdum gemina: an idcò genus polygynum? An verè congener A. Protium L. (Protium Burm. Ind.) distincta foliis oppositis pinnatis, stylo longiore, disco germinis in urceolum productiore?*

**TODDALIA. \* VEPRIS, Commerf. \* PAULLINIA, L. \*** Calix minimus 5-dentatus. Petala 5. Stamina 5. Stylus 1 brevis aut 0; stigma truncatum. Bacca pisiformis sicca 5-locularis loculis quibusdam abortivis. *Frutices Asiatici, aculeati (Paullinia asiatica L. seu Kaka-toddali Rheed. Mal. 5. 1. 41); folia ternata punctato-pellucida; flores paniculati axillares. Caracter ex Commerf. Fructus punctatus instar Aurantii: an indè quædam affinitas?*

**SCHINUS, L. \* MOLLE, T. \* Dioïca. Calix 5-partitus. Petala 5. MASC. Stamina 10, antheris subrotundis. Rudimentum germinis. FÆM. Filamenta sterilia. Germen 1; stylus 0; stigmata 3. Bacca pisiformis 3-locularis 3-sperma, feminibus globosis. Arbusculæ balsamifera; folia (Lentisci) impari-pinnata, alternè aut suboppositè multijuga, odore piperita; flores racemoso-paniculati; axillares & terminales, abortu tantum declines.**

**SPATHELIA, L. \*** Calix 5-partitus coloratus. Petala 5. Stamina 5, filamentis brevibus basi dilatatis & villosis, antheris oblongis. Stylus 0; stigmata 3. Capsula oblonga 3-gona (marginibus prominulis 3-alata ex Sloan.) 3-locularis 3-sperma feminibus triquetris. Arbuscula; folia (Sorbi) impari-pinnata, alternè multijuga, conferta terminalia; flores inter folia racemoso-paniculati terminales purpurei.

**TEREBINTHUS, T. \* LENTISCUS, T. \* PISTACIA, L. \*** *Terebinte, Lentisque, Pistachier. Dioïca. MASC. Racemus amentaceus squamis 1-floris. Calix 5-fidus minimus. Petala 0. Stamina 5, antheris subsessilibus 4-gonis. FÆM. Racemus laxior. Calix 3-fidus minimus. Petala 0. Germen 1; styli 3; stigmata 3 crassiuscula. Drupa sicca ovata, foeta nuce unicâ (2 forsâ abortivis) ossèâ 1-spermâ. Arbores aut arbusculæ, plures Terebinthinam aut Mastichen incisione emittentes; folia Terebinthi T. ternata aut impari-pinnata suboppositè 2-4-juga, Lentisci T. abruptè pinnata angustiora subalternè 4-5-juga petiolo communi mar-*



ginato canaliculato suprà acuminato; racemi axillares; semina quarundam (*Pistacia*) majora esculenta. An flos in omnibus verè apetalus?

**BURSERIA**, Jacq. L. \* *Gomart.* Calix 3-partitus parvus deciduus. Petala 3 patentia. Stamina 6. Germen 1; stylus brevissimus; stigma capitatum. Capsula sub3-gona 1-locularis 3-valvis valvis carnosiss succulentis, 1-sperma semine subcordato pelliculâ pulposâ circumdato. *Arbores balsamiferae; folia interdum ternata, sæpius impari-pinnata oppositè 2-3-juga; flores racemosi axillares & terminales, in plurimis arboribus 3-petali 6-andri &c., in quibusdam distinctis 5-petali 8-andri (10-andros dioicos dicit Brownæus) calice 5-partito & disco germen cingente & stigmate sessili sub3-fido & fructu hic maturesciente illic abortivo; fructus balsamo terebinthinaceo præprimis turgidus. Character ex Jacq. Præterea fructus in Musæo siccus drupam exhibet Pistaciæ subsimilem nunc nuce ossæ simplicis 3-gonâ 1-spermâ, nunc rariùs geminâ nuce conformi cum tertiæ rudimento fætâ, idè in exortu 3-spermam nuce 1 superstite. Burseræ igitur congeneres confirmante D. Lamarck, 1<sup>o</sup>. Colophonia Commerf. Mauritianis Bois de Colophane, arbor gratè resinosa pinnatifolia cum impari, ex Autore 3-petala 6-andra calice 3-fido & germine abortivo. 2<sup>o</sup>. Marignia ejusd. seu Colophane bâlard arbor resinosa similiter pinnatifolia & racemifera, ex descriptione 5-petala calice minimo 5-partito, 10-andra 1-gyna stigmate 1 sessili, fructu coriaceo 5-spermo seminibus ossis hinc angulatis, quibusdam abortivis & 1 interdum superstite.*

**TOLUIFERA**, L. \* *Tolut, Beaumier de Tolut.* Calix campanulatus 5-dentatus. Petala 5, quorum 4 linearia æqualia, quintum cordatum majus. Stamina 10 brevissima. Stylus 0; stigma 1. Fructus... (pisiiformis 4-locularis 4-spermus ex Mill.). Character ex Linnæo. *Arbor balsamifera; folia impari-pinnata; flores racemosi axillares. Confer cum præcedenti.*

**TAPIRIA**, Aubl. \* Calix 5-partitus. Petala 5, disco hypogyno prominenti inserta, ut & stamina 10. Stylus 0; stigmata 5. Capsula 5-sulcata 5-valvis 1-sperma; semina arillata. *Arbor; folia impari-pinnata suboppositè 3-5-juga; flores paniculati axillares & terminales. Character ex Aubl. Guyan. t. 188. An potius germina 5 & capsulæ 5 approximatae intus dehiscentes?*

**POUPARTIA**, Commerf. \* Calix minimus 5-fidus. Petala 5. Stamina 10, disco hypogyno crenato inserta. Styli 5 approximati; stigmata 5. Fructus (drupaceus?) fœtus nuce 5-loculari, loculis 1-2 abortivis. *Arbor Borbonica Bois de Poupart dicta; folia impari-pinnata (quædam simplicia intermixta) oppositè sub-4-juga; flores racemosi axillares & terminales (dielines?) Character ex Commerf.*

**SPONDIAS**, L. \* *MONBIN, Pl. \* Monbin.* Calix parvus subcampanulatus 5-dentatus deciduus. Petala 5 patentia. Stamina 10,



disco glanduloso inserta breviora, alterna breviora; antheræ parvæ. Germen 1; styli 5 distantes; stigmata 5. Drupa ovata, stylium vestigiis punctiformibus coronata, fœta nuce fibrosa 5-angulari 5-loculari 5-spermâ. *Arbores*; folia *impari-pinnata suboppositè* 5-10-juga; flores *racemosi axillares & terminales*, interdum 8-andri cum fructu 4-loculari observante D. Chanvallon; drupa flavescens esculenta. Congener *Evia* Commersf. cujus altera species eadem cum *S. Cytherea* Sonner. Ind. 2. p. 222. t. 123 nuce echinata 5-costata distinguitur, nuce lævi altera quæ *Amera* Indorum eadem fortè cum *Ambalam* Rheed. Mal. 1. t. 50 & ex Commersf. cum *Terebinthoide* Linn. Zeyl. p. 230. An genus rectè *Terebintaceis* adjunctum? Huic perispermum seminis nullum & radícula recta descendens.

### III. Germen multiplex. Fructus multicapsularis capsulis monospermis.

**SIMABA**, Aubl. \* Calix 4-5-partitus. Petala 4-5, disco inserta. Stamina 10, ibidem inserta, filamentis basi villosis latioribus. Germina 4-5 connata; stylus 1 (an potius styli 5 connati?); stigmata 4-5. Capsulæ 4-5 coriaceæ ovatæ distantes. *Frutex*; folia *ternata aut impari-pinnata* 2-juga; flores *axillares*, corymbose rariores, pedicellis basi 1-squamulosis. *Caractèr ex Aubl. Guyan. t. 153.*

**AYLANTUS**, Desfont. \* Monoïca aut rariùs hermaphrodita. Calix minimus 5-dentatus. Petala 5, basi convoluta. MASC. Stamina 10. FÆM. Germina 3-5 incurva; styli 3-5 interiores; stigmata 3-5 tumida. Capsulæ 3-5 compressæ membranaceæ, longæ linguiformes, medio tumidæ & 1-spermæ. HERM. Stamina 2-3. Cætera ut in fœminis. *Arbor Sinica*; pro *Rhoë* succedaneâ L. diù habita; folia *impari-pinnata*; flores *fasciculato-paniculati terminales*. Confer *Pongelion* Rheed. Mal. 6. t. 15, & *Arborem cœli* seu *Aylanto* Rumph. Amb. 3. t. 132. *Caractèr ex D. Desfontaines act. ac. Paris. 1786.*

**BRUCEA**, Mill. l'Herit. \* Dioïca. Calix 4-partitus. Petala 4 receptaculo inserta. MASC. Glandula 4-loba (fortè germen abortivum?) in imo flore. Stamina 4 inter ejusdem lobos receptaculo inserta. FÆM. Filamenta 4 sterilia. Germina 4; styli 4; stigmata 4. Capsulæ 4. *Frutices Abissinici* à D. Bruce allati; folia *impari-pinnata oppositè* 6-juga, conferta terminalia; flores masculi glomerati, interruptè spicati axillares. *Caractèr ex D. l'Heritier. Habitu similis & fortè congener Dodonæa Plum. ic. 118. f. 1.*





IV. Genera Terebintaceis affinia, distincta perispermio  
feminis carnosio, & indè Rhamnis contermina.

**CNESTIS.** \* Calix 5-partitus, extùs tomentosus. Petala 5 (receptaculo inserta?). Stamina 10 ibidem inserta. Germina 5 hirsuta; styli 5; stigmata 5. Capsulæ 5 (quædam abortivæ & interdum 1 superstes) leguminiformes breves coriaceæ 2-valves 1-spermæ, intus & extus villoso-prurientes. Frutices, quidam scandentes; folia alterna impari-pinnata aut rarius ternata; flores spicati axillares. Character ex siccis speciebus Commerf., alterâ Madagascariensi innominatâ, alterâ Borboniensi dictâ Pois à gratter. Utrique specimen floriferum à fructifero distinctum, sed in florifero germina conspicua: genus ergo hermaphroditum. Discrepat Rourea Aubl. t. 187 capsulâ simplici, cæteris forsân abortivis. Κνήσω scalpo.

**FAGARA, L.** \* Calix 4-5-fidus minimus persistens. Petala 4-5 patentia. Stamina 4-5. Germen 1; stylus 1; stigma 2-lobum. Fructus subpisiiformis 1-capsularis (rarius 2-5-capsularis) 2-valvis 1-spermus semine subrotundo nitido. Arbusculæ aut sæpius frutices inermes vel aculeati; folia alterna, simplicia aut ternata aut sæpius impari-pinnata petiolo communi marginato, tenuia & pellucido-punctata; flores fasciculati aut subracemosi axillares; fructus in Linæanis speciebus 1-capsularis, 2-capsularis in aliis habitu simillimis, 3-5-capsularis in *F. pentandrá* Aubl. t. 30. 5-petalâ & sub calice 5-dentato 3-bracteâtâ, 4-capsularis in *F. Evodiâ* LS. seu *Evodiâ* Forsk. t. 7 simplicifoliâ 4-petalâ 4-andrâ & intrâ discum 4-lobum 4-gynâ cum stylo & stigmate quadruplici. An verè congener *T. Octandra* L. seu *Elaphrium* Jacq. foliis conforme 4-petalum 8-andrum 1-gynum stigmate simplici, 1-capsulare 1-spermum 2-valve, *Burseræ* instar balsamo scatens præcipuè in fructu?

**ZANTHOXYLUM, L. Lamark.** \* Clavaliar. Dioicum, rarius hermaphroditum. Calix 5-partitus. Petala 0. MASC. Stamina sæpius 5. Rudimentum germinis. FÆM. Germina 5 stipitata, rarius 3-6 aut pauciora; styli & stigmata totidem. Capsulæ totidem stipitatæ, 1-loculares 1-spermæ 2-valves, semine subrotundo nitido. Arbusculæ aculeatæ aut inermes; folia alterna impari-pinnata aut rarius ternata vel simplicia, plerumque punctato-pellucida; flores axillares fasciculati aut rarius racemosi. Numerus partium abortu aut luxurie varius. *Fagara* affine sed apetalum & multicapsulare; capsulæ tamen in quibusdam *Fagaris* geminæ aut plures, cæterarum abortum in unicapsularibus indicant. Alterutri addenda generi *Macqueria* Commerf. Borboniensibus Bois de Poivrier arbor fructu conformi 1-2-capsulari, floribus spicato-paniculatis axillaribus nondum observatis, foliis impari-pinnatis, junioribus aculeatis tenuibus multijugis, vetustioribus 4-jugis inermibus majoribus. An utrique etiam coordinandæ *Toddalia* & *microcarpæ*



*Amyridis species foliis punctato-pellucidis, distinguenda tamen fructu non multicapsulari sed multiloculari; an corculum in iis pariter perispermo testum?*

**PTELEA**, L. \* Calix parvus 4-partitus. Petala 4 majora parentia. Stamina 4 petalis alterna. Germen 1; stylus brevis; stigma 2. Capsula compressa membranacea latius marginata, centro tumidusculo 2-locularis 2-sperma seminibus oblongis. *Frutices; folia alterna, ternata aut rarius impari-pinnata 2-3-juga, punctato-pellucida; flores subcorymbose axillares & terminales, interdum 5-petali 5-andri 3-stigmatosi 3-loculares, interdum etiam ex D. Medico dioici; corculum oblongum perispermo carnosum instructum ut in precedentibus. Huc refert Linnæus fil. Suppl. Blackburniam Forst. t. 6, habitu & flore similem, stigmate tamen simplici & fructu ignoto.*

V. Genera Terebintaceis affinia, perispermo carnosum destituta.

**DODONÆA**, L. \* Calix 4-partitus deciduus. Petala 0. Stamina 8 antheris ovatis subsessilibus. Germen 1; stylus 1; stigma sub3-fidum. Capsula 3-quetra 3-locularis 3-valvis, loculis 2-spermis, valvis compressis carinatis carinâ alata, margine applicitis receptaculo centrali membranaceo 3-gono stylifero, in angulis valvifero, in faciebus feminifero; semina subrotunda; corculum ut in Sapindis convolutum absque perispermo. *Frutices; folia simplicia alterna; flores subracemosi terminales & axillares, interdum 7-andri; calix quandoque 3-5-partitus; capsula Pteleæ sed 3-alata, rarius abortu 2-alata 2-locularis, structurâ & seminibus discrepans à Terebintaceis.*

**AVERRHOA**, L. \* *Carambolier, Bilimbi.* Calix 5-partitus parvus. Petala 5 basi erecta, limbo patentia. Staminum filamenta 10, basi in annulum coalita, alterna breviora, nunc omnia antherifera, nunc alterna sterilia vix conspicua. Germen 5-gonum; styli 5 persistentes; stigma 5. Bacca subovata magna 5-angula inter angulos profundè sulcata, intus pulposo-acida 5-locularis loculis 2-spermis; semina angulata membranis distincta. *Arbuseulæ; folia alterna impari-pinnata, alternè multijuga; flores racemoso-paniculati, trunco & imis ramis innascentes aut interdum axillares, parvi rubentes, plures abortivi. An semina perispermo destituta; an plura in loculis, aut plures loculi?*

**JUGLANS**, L. \* *Nux*, T. \* *Noyer.* Monoïca. MASC. Flores amentacei. Singulis calix latere pedicellatus, subtus squamâ florali instructus, suprâ planus, ellipticus 6-partitus. Corolla 0. Stamina circiter 18, disco glanduloso inserta, antheris erectis subsessilibus. FÆM. Flores 2-3 juncti sessiles. His calix superus 4-fidus. Corolla major 4-partita marcescens. Germen inferum;



styli 2 breves; stigmata 2 magna, supernè lacera. Drupa infera subovata magna, foeta nuce ossèâ sæpiùs 2-valvi, extùs rugosâ aut lævi, intùs semi-4-loculari 1-sperinâ, semine plurimùm sinuoso infra 4-lobo, dissepimentis membranaceis lobos distinguuntibus. *Arbores; folia alterna, in J. baccatâ ternata, in cæteris impari-pinnata alternè 3-7-juga; flores feminei in ramulis terminales; amenta mascula remota axillaria; drupa ferè exsucca, nigro colore inficiens; semen esculentum ex quo oleum exprimitur; huic perispermum nullum & radícula rectâ ascendens. Genus nulli ordini verè affine, habitu subsimile Terebintaceis sed discrepans germine infero & florum seminisque structurâ.*

*Obs.* Nondùm rectè definitus ordo, in plures posthàc dividendus ratione fructus & seminum &c. 1º. Castuvia distinguuntur foliis simplicibus, fructu monospermo, radiculâ seminis inferiore seu laterali incurvâ ascendente, indè subsimilia Leguminosis monospermis præcedentibus, sed discrepantia stipularum defectu & depressiori staminum insertione. 2º. Terebintaceas veras designant folia sæpiùs pinnata aut ternata, drupa nucibus quibusdam foeta monospermis, radícula seminis plerumque superior incurva descendens. Anceps in iis insertio staminum quæ, ut in nonnullis decimæ tertiæ classis ordinibus jam antea p. 230 recensitis, disco insident glanduloso inter pistillum & calicem medio & ex utriusque aut alterutrius basi oriundo. Calicina tamen hujus indoles in quibusdam generibus manifestior, analogiâ duce similis indicatur in coordinatis, persistente nihilominus ordinum suprâdictorum affinitate quæ futuram omnium recognitionem, & forsàn novæ classis insertionem ambiguâ definitæ constitutionem exigit. 3º. Zanthoxyla foliis pinnatis aut ternatis sæpiùs punctato-pellucidis, fructu multiloculari aut multicapsulari loculis aut capsulis monospermis, perispermo denique carnosio corculum rectum ambiente præprimis notabilia, indè collimant Rhamnos seminis structurâ similes & fortè Cookiam Aurantiis p. 261 consociatam. 4º. Divisionibus memoratis minis accommodantur genera quædam ordini interjecta, ignotorum ordinum fortè primordia.

## ORDO XIII.

### RHAMNI, LES NERPRUNS.

**CALIX** inferus monophyllus, limbo definitè diviso. Petala quinque, rariùs quatuor aut sex (rarissimè nulla), summo calici aut disco calicino inserta, ejusdem laciniis alterna & numero æqualia, interdùm unguiculata squamiformia, interdùm basi latiore junctâ. Stamina totidem, ibidem inserta, petalis nunc



alterna nunc opposita. Germen disco glanduloso calicino cinctum, superum; stylus unicus aut definitè multiplex; stigma unum aut multiplex. Fructus superus, nunc baccatus multilocularis aut multivulvis loculis aut nucibus monospermis, nunc capsularis multilocularis multivalvis valvis medio septiferis & loculis mono aut dispermis. Corculum planum & rectum perispermio carnosio cinctum. Caulis arboreus aut frutescens; folia stipulacea stipulis sæpè minimis, alterna aut opposita.

### I. Stamina petalis alterna. Fructus capsularis.

**STAPHYLEA**, L.\* **STAPHYLODENDRON**, T. *Staphylin*.\* Calix profundè 5-fidus concavus coloratus; disco urceolato basi tectus. Petala 5 disci margini inserta, calici concolora. Stamina 5 ibidem inserta. Germen 2-3-partitum; styli 2-3; stigmata 2-3. Fructus 2-3-capsularis, capsulis membranaceis vesicariis ad medium coalitis, apice intrus dehiscentibus 1-2-spermis; semina ossæa subglobosa, ad hylum obliquè truncata. *Arbuseulæ; folia opposita, stipulacea stipulis longis, ternata aut impari-pinnata, foliolis 1-stipulaceis; flores racemosi terminales racemulis 2-stipulaceis.*

**EVONYMUS**, T. L.\* *Fusain*. Calix 5-partitus aut 5-fidus planus, basi tectus disco peltato plano. Petala 5 disci margini extus inserta, patentia. Stamina 5 imposita glandulis 5 supra discum prominulis. Stylus 1; stigma 1. Capsula 5-angularis, 5-ocularis 5-valvis, valvis medio septiferis, loculis in pulpâ aut arillo 1-2-spermis. *Arbores aut arbuscule ramulis 4-gonis; folia opposita vix stipulacea; pedunculi axillares solitarii oppositi, uniflori aut umbellati multiflori. E. Tobiræ Thunb. Jap. seu Tobiræ Kämpf. rami alterni sublaetescens, folia alterna aut subopposita, flores citati interdum 6-petali 6-andri, capsula interdum 3-ocularis 3-valvis loculis 4-spermis, cætera similia.*

**POLYCARDIA**. \* Calix minimus 5-lobus. Petala 5 rotundata. Stamina 5, filamentis brevibus, antheris subrotundis. Germen latum, stylus 1; stigma lobatum. Capsula coriacea 5-ocularis 5-valvis (interdum 3-4-ocularis 3-4-valvis), valvis medio septiferis, septis utrinque basi seminiferis; semina pauca oblonga, ad hylum semiarillata, arillo caliciformi laciniato. *Frutex Malagascariensis (Commerfonia Commerf. herb.); folia alterna ovato-oblonga integra; pedunculi floriferi terminales aut & foliis alterni, cordato-clavi apice 3-4-flori, inde similes foliis cordatis in supremo sinu floriferis. Character ex sicco. Πολυκαρπία pluriès cordata.*



**CELASTRUS**, L. \* Calix minimus 5-lobus. Petala 5 patentia, ungue lato. Stamina 5 filamentis oblongis. Germen parvum, disco lato 10-ftriato immersum; stylus 1 brevis; stigmata 3. Capsula 3-gona 3-locularis, 3-valvis valvis medio septiferis, loculis basi 1-2-spermis; semina glabra, semiarillata arillo 4-fido. *Arbusculæ aut frutices; folia alterna; pedunculi plures axillares subdichotomè multiflori. An indè distrahenda species stylo vix manifesto quæ Sonneratia Commerf., & altera stylo longiore, antheris oblongis, fructu sæpiùs 2-loculari 2-valvi 6-spermo quæ Senacia ejusdem?*

II. Stamina petalis alterna. Fructus drupaceus aut baccatus. *Genera quædam petalis basi latâ coalitis.*

**MYGINDA**, Jacq. L. \* Calix minimus 4-partitus. Petala 4 patentia. Stamina 4, filamentis brevibus, antheris subrotundis. Styli 4 breves; stigmata 4. Drupa pisiformis foeta nuce 1-spermâ. *Frutex radice crassâ; folia opposita; pedunculi axillares bis 3-flori; flores minimi. Character ex Jacq. An genus abortu 1-spermum? Hic ex D. Smith omninò similis Rhacoma L. quæ ex Linneo discrepat corollâ 4-partitâ, stylo & stigmate simplici.*

**GOUPIA**, Aubl. \* *Goupi*. Calix minimus 5-dentatus. Petala 5, disco calicino extùs inserta, lanceolata, apice intùs appendiculata, appendice lamelliformi propendente. Stamina 5, disco imposita, filamentis brevibus, antheris 4-gonis. Stylus 0; stigmata 5. Bacca pisiformis 5-ftriata 1-locularis 3-5-sperma, basi calicis persistenti adnata. *Arbor; folia alterna nervo præcipuo paululum devio, stipulacea stipulis minimis; pedunculi solitarii axillares, umbellatim aut capitatim multiflori. Character ex Aubl. Guyan. t. 116.*

**RUBENTIA**, Commerf. \* Calix minimus 5-partitus. Petala 5 patentia, ungue lato. Stamina 5, filamentis brevibus, antheris subrotundis. Stylus brevissimus; stigma 1. Drupa olivæformis, foeta nuce 2-loculari 2-spermâ. *Arbores; rami oppositi nodosi; folia opposita, in junioribus ramulis aut arbusculis longa angustissima, in vetustioribus ovata breviora; pedunculi axillares dichotomè multiflori; semen 1 sæpè abortivum. Character ex Commerf. Rubentia à vernaculo Mauritianorum nomine Bois rouge, Bois d'Olive. Confer cum Cassine & Schreberâ.*

**CASSINE**, L. \* Calix minimus 5-partitus. Petala 5 patentia basi lata & subcoalita, undè corolla 5-partita. Stamina 5. Stylus 0; stigmata 3. Bacca 3-locularis 3-sperma, stigmatibus umbilicata. *Arbusculæ aut frutices; folia opposita aut alterna; pedunculi axillares.*



**SCHREBERA**, L. \* Calix parvus 5-partitus. Corolla infundibuliformis 5-fida. Stamina 5 fauci corollæ inserta, filamentis basi intus squamulâ ciliatâ auctis, antheris subrotundis. Germen 2-lobum; styli 2; stigmata 2. Fructus 2-locularis 2-spermus. *Frutex; folia alterna; pedunculi plures axillares multiflori. Character ex Linnaeo. Stylus interdum 1 ex Schrebero; fructus capsularis 2-locularis ex eodem. Vidi in sicco drupam olivæformem tenuem, siccatione fragilem, (abortu?) 1-spermam. An corolla verè 5-fida; an potius 5-partita? Hujus omninò congener Hartogia Thunb. LS. 4-petala 4-andra 1-styla drupacea nuce 2-spermâ. Confer cum Rubentiâ & Cassine habitu similibus.*

**ILEX**, L. \* **AQUIFOLIUM**, T. \* *Houx*. Calix minimus 4-dentatus. Corolla 4 partita, seu 4-petala petalis ungue lato coherrentibus. Stamina 4. Stylus 0; stigmata 4. Bacca parva subrotunda, fœta nucibus 4 monospermis. *Arbusculæ aut frutices; folia alterna, in quibusdam sempervirentia & dentato-spinosa; pedunculi axillares multiflori. Flores interdum 5-andri 5-spermi. Vidi drupam olivæformem 2-spermam in specie novâ Madagascariensi. An congener Macoucoua Aubl. t. 34, flore similis, fructu ignoto. Dodonæa Plum. foliis impari-pinnatis, floribus racemosis terminalibus 3-partitis 3-andris 1-2-spermis, antea Ilici adjecta à Linnaeo, dein in ejusd. syst. omissa, Terebintaceis & Bruceæ affinior.*

**PRINOS**, L. \* *Apalachine*. Calix minimus 6-fidus. Corolla 6-partita plana. Stamina 6, filamentis subulatis, antheris oblongis. Stylus brevis; stigma 1. Bacca subrotunda, fœta 6 nucibus 1-spermis. *Arbusculæ aut frutices; folia alterna, in quibusdam sempervirentia; pedunculi axillares multiflori; flores parvi, interdum 5-7-8-fidi 5-7-8-andri 5-7-8-spermi.*

### III. Stamina petalis opposita. Fructus drupaceus.

**MAYEPEA**, Aubl. \* Calix 4-fidus patens. Petala 4, inter calicis divisuras inserta, basi concava, apice in filamentum longum attenuata. Stamina 4, antheris subsessilibus in petalorum cavitate reconditis. Stylus 0; stigma crassiusculum concavum. Drupa olivæformis fœta nuce lignosâ 1-spermâ. *Arbuscula; folia subopposita aut alterna; pedunculi axillares di aut trichotomè multiflori. Character ex Aubl. Guyan. t. 31.*

**SAMARA**, L. \* Calix minimus 4-partitus. Petala 4 basi lacunosa. Stamina 4, filamentis petalorum lacunæ immerfis, antheris subcordatis. Stylus 1; stigma infundibuliforme. Drupa subrotunda 1-sperma. *Arbor ramulis apice tantum foliosis & subtus floriferis; folia alterna (opposita ex Burm. Zeyl. descr. & c. 31); flores parvi umbellati corymbosi, corymbis numerosis parvis congestis ramulos obtegentibus. Character ex Linnaeo.*



**RHAMNUS**, T. L. \* **FRANGULA**, T. \* **ALATERNUS**, T. \*  
*Nerprun, Bourgène, Alaterne.* Calix urceolatus (corolla Linn.)  
 4-5-fidus. Petala 4-5 (squamulæ Linn.) minima squamiformia,  
 rarò nulla. Stamina 4-5 sub petalis. Stylus 1; stigma 2-4-fidum.  
 Bacca 3-4-sperma. *Arbustulæ aut frutices; quorundam ramuli*  
*apice pungentes; folia subopposita aut sæpius alterna, in Alaterno T.*  
*sempervirentia lucida; flores axillares, interdum abortu dioici; bacca*  
*4-sperma tum in Rhamno T. 4-petalò 4-andro, tum in Fran-*  
*gulâ T. 5-petalâ 5-andrâ, 3-sperma in Alaterno T. 5-andrâ*  
*5-petalâ aut interdum apetalâ.*

**ZIZIPHUS**, T. \* **RHAMNUS**, L. \* *Jujubier.* Calix patens 5-fidus.  
 Petala 5 squamiformia, disco glanduloso calicino inserta.  
 Stamina 5 ibidem inserta. Germen disco cinctum; styli 2;  
 stigmata 2. Bacca ovata, foeta nuce 2-loculari 2-spermâ.  
*Arbustulæ aut frutices; folia alterna, in plurimis 3-5-nervia, sti-*  
*pulis sæpè spinescentibus; flores axillares. Drupa in paucis 1-sperma.*

**PALIURUS**, T. \* **RHAMNUS**, L. \* *Paliure, Argalou.* Calix,  
 petala, stamina & germen Ziziphi. Styli 3; stigmata 3. Fructus  
 ossæus 3-locularis 3-spermus non dehiscens, cortice suberoso,  
 hemisphæricus truncato-peltatus planus marginatus. *Arbustulæ;*  
*folia alterna, sæpè 3-nervia, spinis spinescentibus; pedunculi mul-*  
*tiflori axillares.*

I V. Stamina petalis opposita. Fructus tricoccus.

**COLLETIA**, Commerf. \* Calix urceolatus, basi intus plicis 5  
 squamiformibus instructus, limbo 5-fido patente aut reflexo.  
 Petala 6. Antheræ 5 subsessiles summo calici insertæ, inter  
 ejusdem lacinias. Germen 3-gonum; stylus 1; stigma 3-lobum.  
 Fructus 3-coccus 3-spermus parvus, basi calicis persistente infrâ  
 cinctus. *Frutices spinosissimi oppositè ramosi & ramulosi, nunc penè*  
*aphylli, nunc foliacei foliis suboppositis; ramuli omnes apice spi-*  
*nos, spinis idèò decussatim oppositis, basi 3-5-floris, floribus in-*  
*terdum 4-6-fidis 4-6-andris. Character ex Commerf. Brasil. & ex*  
*J. Juss. Peruv. Nomen à D. Collet methodi Tournefortianæ acri*  
*impugnatore, Commerf. conterraneo, qui floram Bressicam prose-*  
*cutus fuerat nondum etiam nunc evulgatam.*

**CEANOTHUS**, L. \* Calix turbinatus 5-fidus. Petala 5 squami-  
 formia longius unguiculata. Stamina 5 sub petalis. Germen  
 3-gonum; stylus 1 trifidus; stigmata 3. Bacca sicca 3-cocca  
 3-partibilis, coccis intus dehiscens 1-spermis, basi calicis  
 persistenti imposita. *Frutices; folia alterna; flores racemosi ter-*  
*minales aut axillares. An genere distinguenda Tubanthera Commerf.*  
*(eadem cum Katapa Rheed. Mal. 5. t. 47. & fortè cum C. Asia-*  
*tico L.) cui ex Commerf. petala breviter staminibus circumvoluta &*  
*reniformia, stylus subnullus, pedunculi axillares multiflori, cætera*  
*similia.*



**HOVENIA**, Thunb. \* Calix 5-fidus. Petala 5 convoluta. Stamina 5, petalis obvoluta. Stylus 1; stigmata 3. Capsula pisi-formis 3-fulca 3-locularis 3-valvis 3-sperma, basi calicis persistente infra cincta. *Arbor; folia alterna (stipulacea?); pedunculi axillares & terminales dichotomè multiflori, apice post florescentiam divaricati, incrassati & carnosè edules sapore dulci, pedicellis brevibus linearibus 1-floris; flores caduci, interdum 4-petali 4-andri. Character ex Thunb. Jap. & Kämpf. am. t. 809.*

**PHYLICA**, L. \* Calix turbinatus 5-fidus. Petala 5 squamiformia minima. Stamina 5 parva, sub petalis. Stylus 1; stigma 1. Capsula (interdum subbaccata) subrotunda 3-cocca coccis 1-spermis, intus angulatis & dehiscentibus. *Suffrutices ericæformes; folia alterna aut verticillatim conferta, plerumque non stipulacea; flores sæpius capitati terminales capitulo densè involu-crato, rariùs distincti axillares, quidam dioici, quidam 3-stigmatosi. Character Rhamnorum, habitus diversus.*

#### V. Genera Rhamnis affinia, germine sæpiùs supero.

**BRUNIA**, L. \* Flores capitati, aggregati suprà receptaculum commune paleaceum, intrà calicem communem polyphyllum. Singulis calix 5-partitus inferus, aut rariùs 5-fidus superus. Petala 5 longa angusta unguiculata. Stamina 5, petalorum unguibus inserta. Germen superum aut inferum; stylus 1, rariùs duplex; stigmata 2. Capsula minima 2-locularis 2-sperma, rariùs 1-locularis 1-sperma, non dehiscens. *Character ex Linnæo. Frutices habitu Ericæ & Proteæ; folia linearia, alterna aut confertim imbricata; capituli florum terminales. Genus dividendum ratione sitûs & numeri partium, Phylicæ partim affine.*

**BUMALDA**, Thunb. \* Calix 5-partitus. Petala 5 hypogyna. Stamina 5, unguibus petalorum inserta; antheræ dorso insertæ. Germen superum villosum; styli 2 villosi; stigmata 2. Capsula 2-locularis 2-rostris?... *Frutex densè ramosus glaber; ramuli oppositi angulati; folia opposita ternata; flores racemosi terminales. Character ex Thunb. Jap. An Brunicæ affinis; an affinium Berberidibus?*

#### V I. Genera Rhamnis affinia, germine infero distincta.

**GOUANIA**, Jacq. L. \* Calix superus turbinatus 5-fidus, intus disco vestitus membranaceo in 5 lacinias calicinis oppositas producto. Petala 5 squamiformia. Stamina 5, petalis opposita & iisdem obvoluta. Germen inferum; stylus 1; stigmata 3. Fructus triqueter 3-capsularis, capsulis 3-gonis dorso sæpius



2-alatis, 1-spermis non dehiscentibus. *Frutices sarmentosi scandentes; folia alterna stipulacea; ramuli axillares in cirrhum desinentes aut in racemum floralem cirrho conterminum; flores masculi hermaphroditis mixti, germine & stigmatibus evanidis; perispermum in semine tenuissimum aut subnullum; habitus Vitis & Paullinæ.*

**PLECTRONIA**, L. \* Calix turbinatus 5-dentatus persistens, clausus sinubus seu squamis 5 villosis. Petala 5, calicis fauci inserta. Stamina 5, filamentis brevissimis 2-antheris, obtecta squamis calicinis. Germen inferum; stylus 1; stigma 1. Bacca 2-ocularis loculis 1-spermis. *Arbor ramis 4-gonis; folia opposita integerrima; flores corymbosi axillares. Character ex Burm. & Linn.*

**CARPODETUS**, Forst. \* Calix turbinatus, germi adnatus, 5-dentatus dentibus deciduis. Petala 5 perigyna. Stamina 5 breviter perigyna. Germen semiinferum; stylus 1; stigma capitatum. Bacca semiinfera medio annulata, sphaericea sicca 5-ocularis (polyserma?). *Character ex Forstero t. 17.*

**AUCUBA**, Thunb. \* Calix 4-dentatus brevis persistens. Petala 4... MASC. Stamina 4, receptaculo inserta, petalis alterna. Receptaculum convexo-planum, medio excavatum foveâ quadratâ. FÆM. Germen inferum; stylus 1; stigma 1. Bacca stylo persistente coronata subcarnosa 1-serma. *Arbores ramis dichotomis; folia in ramulis terminalia conferta; flores paniculari terminales. Character ex Thunb. Jap. An Ericis affinior?*

**VOTOMITA**, Aubl. \* Calix turbinatus 4-dentatus superus. Petala 4, disco supero inserta. Stamina 4, antheris oblongis subsessilibus, in cylindrum ferè coalitis, apice in ligulam membranaceam productis, intus dehiscentibus. Germen inferum; stylus 1 staminum cylindro tectus; stigmata 4. Drupa calicinis dentibus coronata, 1-ocularis 1-serma semine striato. *Frutex ramis 4-gonis; folia opposita integra stipulacea; pedunculi axillares 3-4-flori pedicellis umbellatis bracteolatis. Character ex Aubl. Guyan. t. 35.*

**Obs.** Diversos inter ordines polypetalos staminum perigyniâ designatos, quidam staminibus depressius insertis præcedenti consentiunt classi ut Terebintaceæ, Sempervivæ &c.; plurimi altiore calicinâ insertionem certius definiuntur, ab invicem discrepantes germinum numero & situ, staminibus definitis aut indefinitis, perispermio seminis existente aut nullo aliisque demum secundariis signis. Ex eâ quasi secedunt serie ultimi prodeuntes Rhamni, perispermio distincti carnosio corculum planum obvolvente & inde præmissis Zanthoxylis subsimiles, affinioresque subsequenter Euphorbiis. Horum sectio duplex præcipua verè naturalis, altera staminum petalis basi latioribus alternorum quæ corollas submonopetalas polypetalas & fructus baccatos capsularibus consociat, altera staminum petalis unguiculatis oppositorum quæ drupaceos fructus tricoccis adjungit. Dispar in utraq. capsularum structura, in priore multivalvis valvis medio septiferis, in posteriore mul-



ticocca coccis intus dehiscentibus Euphorbiarum more. An inde dividendus ordo? An contra rectius coordinanda Rhamnis genera germinis infero instructa, ut Gouania, Plectronia &c.? Corolla submonopetala Ilicem & confines tantillum admovet Sapotis p. 151, habitu non prorsus dissonis.

## CLASSIS XV.

### PLANTÆ DICOTYLEDONES APETALÆ.

#### STAMINA IDIOGYNÆ,

#### SEU

#### A PISTILLO SEGREGATA.

**F**LORES nunc monoïci seu masculi foemineis mixti in eadem plantâ; nunc dioïci seu in unâ masculi, foeminei in alterâ; nunc rarissimè hermaphroditi. Calix omnibus monophyllus aut squama calicem supplens. Corolla nulla, sed interdum squamæ aut divisionis calicinæ interiores petaloïdæ. Masculis floribus stamina imo aut summo calici aut squamæ calicem supplemanti inserta, definita aut rariùs indefinita, filamentis distinctis aut rariùs coalitis in stipitem centralem è medio calice enatum. Germen foemineis simplex aut interdum multiplex, superum aut rariùs inferum; stylus unicus aut multiplex aut rarò nullus; stigma simplex aut multiplex. Fructus superus aut inferus, structurâ & loculorum numero varius.

*OBS.* Jam in decem classibus numerosa comparuit ordinum dicotyledonum series, nunc impedimentis soluta pleno decurrens tractu, nunc operosius procedens ambagibus intricata, sexibus in eodem flore conjunctis superbiens, & pauciores datis exceptionibus plantas abortu diclines complexa. Nonnulli prætereà



ordines extant femine bilobo pariter insigniti sed in sejunctis floribus sexualia retegentes organa nullo sæpius manifesto abortu, mutuae ideò sexuum positionis characterem exhibere nescii & subindè *irregulares* seu traditis insertionum regulis non obsequiosi, quos igitur necesse fuit in peculiarem & à præmissis distinctam classem compellere. Tales habentur Euphorbiæ, Cucurbitaceæ, Urticæ, Amentaceæ, Coniferæ. Perispermum Euphorbiis & Coniferis inest carnosum corculo in his cylindrico & in illis plano circumpositum, cæteris nullum datur. Flores in Coniferis & Amentaceis ferè omnes amentacei seu suprà axim communem amentiformem densè spicati & tunc caudam felinam simul æmulantes, in Urticis quidam tantùm amentacei, in Cucurbitaceis & Euphorbiis aliter dispositi : indè deducta ordinum distributio. Corolla in amentaceis floribus omninò nulla, in plerisque aliis diclinibus hùc convocatis certò etiam deficiens, in nonnullis Euphorbiarum generibus pseudo-polypetala, ad libitum pro petalis aut rectiùs analogià duce pro squamis calicinis petaloïdeis habenda. Ut in præcedenti serie nonnullas diclines hermaphroditis commixtas plantis admittit exceptio, sic in diclinium ordines quædam irrepunt hermaphroditæ consentiente aut & jubente naturâ quæ stabiliores interdùm eludit regulas, nonnunquàm instabilis ipsa aut abstrusis legibus obtemperans. Accedunt Rhamnis tricoccis Euphorbiæ plures fructu & aliis signis conformes; Atriplicibus accedunt Urticæ nonnullæ similiter apetalæ sed diclines & perispermo destitutæ : quædam igitur inter diclines & hermaphroditos ordines, inter apetalos & polypetalos jam pluriès promulgata subsistit affinitas.

## ORDO I.

### EUPHORBIAE, LES EUPHORBES.

**FLORES** monoïci aut dioïci, aut rariùs hermaphroditi. Calix singulorum tubulosus aut partitus, simplex aut duplicatus laciniis interioribus interdùm petaloïdeis. Petala nulla, nisi laciniæ supràdictæ.

Masculis



Masculis stamina definita aut indefinita, filamentis receptaculo seu calicis centro insertis, distinctis aut connatis, interdum ramosis, interdum articulatis. In quibusdam paleæ seu squamulæ staminibus interjectæ. Fœmineis germen unicum superum, sessile aut stipitatum. Aliis stylus multiplex, sæpè trinus; capsula loculis totidem mono aut dispermis. Aliis stylus unicus; stigmata tria aut plura; fructus multilocularis, loculis numero stigmatum mono vel dispermis. Omnibus loculi intus elasticè bivalves; semina semicalyptrata, axi fructûs centrali persistenti superius annexa. Corculum planum, perispermo carnosò involutum. Plantæ herbaceæ aut frutescentes aut arboreæ, quædam lactescentes. Folia alterna aut opposita (rarius nulla), stipulacea aut nuda.

I. Styli plures definiti, sæpius tres.

**MERCURIALIS**, T. L. \* *Mercuriale*. Dioïca aut rarius monoïca. Calix 3-partitus. MASC. Stamina 9-12 distincta. FÆM. Germen didymum 2-sulcum; filamenta 2 brevia sterilia, ex imis sulcis enata & appressa germi; styli 2; stigmata 4. Capsula 2-cocca 2-sperma. *Herbæ; folia opposita stipulacea; flores axillares aut terminales, spicati aut tantum fasciculati. Plantæ in Aët. Paris. 1719 duæ steriles masculæ foliis alternis capillaceis à Marchantio memorantur tanquam M. annuæ L. varietates hybridæ.*

**EUPHORBIA**, L. \* **TITHYMALUS**, T. \* **TITHYMALOÏDES**, T. \* **EUPHORBIVM**, Isn. \* *Titimale*, *Euphorbe*. Hermaphrodita. Calix 1-phyllus (corolla T.) turbinatus, limbo 8-10-dentato, dentibus alternis inflexis, alternis exterioribus (petala L.) formâ variis, crassiusculis, glandulæformibus aut petaloïdeis, nunc simplicibus, nunc 2-3-fidis aut rarius multifidis. Stamina indefinita 12 aut plura, rarius pauciora; filamenta receptaculo inserta, medio articulata, diverso tempore erumpentia; antheræ didymæ. Paleæ aut squamulæ (petala *Adans.*) staminibus interjectæ, definitæ aut sæpius indefinitæ, simplices aut sæpius ramosæ vel fimbriatæ. Germen inter stamina centrale stipitatum 3-gonum; styli 3; stigmata 6. Capsula stipite reflexo extrâ calicem nutans 3-cocca 3-sperma. *Plantæ lactescentes, herbaceæ aut fruticosæ, erectæ aut rarius repentes, aphyllæ aut sæpius foliosæ. Caulis angulatus aut tuberculatus aut sæpè cylindricus teres, inermis aut (in angularis) aculeatus castiformis, aculeis solitariis aut geminatis serie simplici in angulorum jugo su-*



perpositis. Folia nulla, aut sæpius alterna nuda, aut rariùs opposita & tunc plerumque stipulacea, aut rarissimè terna verticillata. Pedunculi in aphyllis nudi 1-3-flori; iidem in foliosis axillares, aut sæpius 2-5 pluresve umbellati terminales; singuli (interdum capitato-multiflori) sæpius 2-3-4-chotomi, inter divisuras 1-flori, ad basim & in dichotomiis bracteati bracteis pedunculorum numero, involucrium mentientibus. Euphorbium Linn. sæpius fruticosum angulatum aphyllum, aculeatum aut inerme; Tithymalus T. frutescens aut sæpius herbaceus, semper cylindricus foliosus inermis; Tithymaloides T. frutescens inermis foliosus, calice infra gibbo calceiformi. Flores in plurimis quidam masculi. Species una monoïca ex Commerf. An singula stamina utpotè articulata & stipata paleis diversoque tempore erumpentia, totidem idcirco dici queant (ut in Buxo) masculi flores 1-andri circa unicum femineum aggesti in calice seu involucro communi? Indè flos Euphorbiæ compositus, genusque monoïcum evaderet, cæteris ejusdem ordinis idè accomodatius. Alioquin à coordinatis plurimum discrepans, sui ordinis unicum fieret, in plura dein fortè dividendum ratione numeri & formæ partium.

**ARGYTHAMNIA**, Brown. \* Monoïca. Calix 4-partitus villosus. MASC. Petala 4 (an potiùs laciniæ interiores calicinæ?). Stamina 4. FÆM. Germen 3-lobum villosum; styli 3 tripartiti laciniis 2-fidis; stigmata lacera. Capsula 3-gona 3-locularis 3-sperma; semina subrotunda. Frutex albidus; folia... Character ex Brown. Jam. Huc ejusdem Ateramnium refert D. Adanson, utrumque consocians Euphorbiarum ordini, & admittens stigmata 6 ciliata, folia alterna, flores spicatos axillares, cætera characteri delineato conformia. An verè Euphorbiis affinis?

**CICCA**, L. \* Monoïca. Calix 4-partitus. MASC. Stamina 4. FÆM. Germen 1; styli 4; stigmata 8. Capsula (baccata?) rotunda depressa margine torosa 4-locularis 4-sperma. Frutices; folia stipulacea alterna, caducis inserta ramulis ut in Phyllantho extus simili; flores fasciculati axillares, aut à foliorum casu vel abortu racemosi. An affinior Averrhoæ & Terebintaceis; an corculum perispermio cinctum?

**PHYLLANTHUS**, L. \* Niruri. Monoïca. Calix 6-partitus coloratus. MASC. Stamina 3 basi approximata. FÆM. Germen basi 12-glandulosum; styli 3; stigmata 6. Capsula 3-locularis 3-sperma. Character ex Linnæo. Frutices aut arbusculæ, rariùs herbæ; ramuli alterni, basi stipulacei, interdum complanati, alternè foliosi, in foliorum axillis floriferi, cum iisdem sæpè caduci & indè folio pinnato similes; folia stipulacea simplicia (nisi foliola habeantur folii pinnati simul & floriferi, undè nomen); flores ramulis & foliis axillares (rarò terminales) solitarii aut glomerati, glomerulis monoïcis aut dioïcis. Quibusdam habitus Erythroxyli. Species una in Commerf. herb. Maurit. dioïca calice 5-partito, germine 5-glanduloso, fructu 3-loculari 6-spermo, ramulis complanatis, Xylophyllæ forsàn affinior. An & cæteræ plures simili caractere instructæ? An



genere distinguenda *P. emblica* L. cui fructus baccatus nuce 3-loculari 6-spermâ?

**XYLOPHYLLA**, L. \* Hermaphrodita. Calix 5-partitus coloratus. Stamina 5. Styli 3; stigmata lacera. Capsula 3-locularis 6-sperma. *Caracter ex Linnaeo. Frutex facie Cacti Phyllanthi* L. 3 folia (aut potius ramuli aphylli dilatati complanati foliis similes, undè nomen) simplicia alterna, utrinque dentata, stipulae simplici carinatae subvaginant axillaria; flores in foliorum dentibus conglomerati, quidam steriles & idèò masculi. Genus monoicum suspicatur Linnaeus nec immeritò. Confer *Phyllanthi* species calice 5-partito, loculis 2-spermis, ramulis complanatis similiter stipulaceis non tamen aphyllis, huc fortè referendas. In herb. Commerf. Madagasc. specimen extat *Xylophylla* simile & fortè congener, foliis seu ramulis non floridis, sed ad dentes foliosis aut ramosis, quasi proliferis.

**KIRGANELIA**. \* Monoïca. Calix 5-partitus. MASC. Stamina 5 filamentis in columnam omninò coalitis; antheræ 3 terminales, 2 laterales adnatæ. FÆM. Germen 1; styli ...; stigmata.... Bacca parva, absque nuce sub 3-locularis 6-sperma feminibus distinctis. *Frutex, Mauritanis dictus Bois de Demoiselle ex Commerf.; folia alterna, stipulacea ut & ramuli; flores axillares. Habitus Phyllanthi; fructus serè Berberidis. Caracter ex sicco. Kirganeli nomen Malabaricum Phyllanthi.*

**KIGGELLARIA**, L. \* Dioïca. Calix 10-partitus, laciniis seu foliolis interioribus petaloïdeis (petala Linn.), ad unguem 3-glandulosis. MASC. Stamina 10 (imo calici inserta?), filamentis brevibus distinctis, antheris oblongis apice perforatis. FÆM. Germen 1; styli 5; stigmata 5. Capsula globosa coriacea scabra 1-locularis 5-valvis polysperma feminibus tunicatis. *Arbusculæ; folia alterna non stipulacea; flores axillares, masculi corymbosi, feminei solitarii. Antheræ ut in Solaneis apice perforatæ. Corculum seminis tunicati perispermio carnosio inclusum, undè major cum Euphorbiis & Clutiâ affinitas, infirmanda tamen fructu 1-loculari.*

**CLUTIA**, Boerh. L. \* Dioïca. Calix 10-partitus, laciniis 5 interioribus petaloïdeis. Squamulae 5 interiores in imo calicis. MASC. Squamulae 3-partitæ, basi intus glandulosæ. Stamina 5 divaricata, filamentis medio connatis in stipitem germinis abortivi. FÆM. Squamulae 2-lobæ non glandulosæ. Germen 1; styli 3; stigmata 6. Capsula 3-locularis 3-sperma. *Frutices; folia alterna stipulacea; flores axillares.*

**ANDRACHNE**, L. \* **TELEPHIOIDES**, T. \* Monoïca. Squamulae calicis interiores, in mare & foeminâ 2-fidæ non glandulosæ. Capsula loculis 2-spermis. Cætera ut in Clutiâ. *Herba, eadem omninò cum Erachisâ Forsk.; folia alterna stipulacea; flores axillares. Habitus Telephii.*

**AGYNEJA**, L. \* Monoïca. Calix 6-partitus. MASC. Antheræ 3-4



adnatæ lateribus stipitis centralis ultrà producti. FÆM. Germen 1 superum, apice perforatum foramine 6-crenato; styli & stigmata præterea nulla. Capsula 3-cocca... *Frutices; folia alterna bifaria (stipulacea?); flores congesti axillares, masculi inferiores, fæminei superiores & majores. Character ex Linnæo. An corculum perispermio involutum? An verè Euphorbiis adscribendum genus?*

**BUXUS**, T. L. \* *Buis, Bouis*. Monoïca. Calix 4-partitus. MASC. Calix squamâ 2-fidâ cinctus. Stamina 4-5 sub rudimento germinis inserta; antheræ ovatæ. FÆM. Calix 3 squamis minoribus cinctus. Germen 1 desinens in stylos 3 persistentes; stigmata 3 obtusa hispida. Capsula 3-rostris 3-locularis 6-sperma. *Arbores aut frutices; ramuli oppositi 4-goni, bracteis 4 aut pluribus (gemmarum reliquiis) minimis persistentibus infrâ cincti; folia opposita, petiolo decurrente in ramulum indè angulatum; flores glomerati axillares subsessiles glomerulis squamosis, masculi in singulo glomerulo plures cingentes unicum fæmineum centralem. Ex Linnæo calix pro corollâ habendus: an rectius?*

**SECURINEGA**, Commerf. \* Monoïca? MASC. Calix 5-partitus. Stamina 5 (6 ex Commerf.) filamentis brevibus, basi quasi monadelphis, extus coronâ croceâ (glandulis fortè) cinctis. FÆM.... *Arbor procera securi durissima (Bois dur), undè nomen; folia alterna integerrima; flores glomerati axillares. An fæminei masculis mixti, an distincti? Character ex Commerf. mss. & ex sicco.*

**ADELIA**, L. \* Dioïca. Calix 3-5-partitus. MASC. Stamina plurima, filamentis in cylindrum connatis. FÆM. Germen 1; styli 3 aut 0; stigmata 3 lacera. Capsula 3-cocca 3-sperma. *Frutices; folia alterna (stipulacea?); flores axillares, spicati aut glomerati aut tantùm geminati. Character ex Linnæo & ex Brownæo cui Bernardia dicitur.*

**MABEA**, Aubl. \* *Mabier*. Monoïca. Calix 1-phyllus urceolatus 5-dentatus. MASC. Stamina 9-12, imo calici inserta. FÆM. Germen 1; stylus 1 longus (an potius styli 3 agglutinati?); stigmata 3 filiformia, spiraliter retorta. Capsula cortice crasso tecta, 3-locularis 3-sperma, feminibus subrotundis. *Arbusculæ lactescentes ramis sarmentosis pendentibus; folia alterna stipulacea; flores densè paniculati terminales; pedunculi fæminei inferiores 1-flori nudi, masculi superiores basi 1-bracteati & 2-glandulosi, suprâ 3-fidi 3-flori. Character ex Aubl. Guyan. t. 334.*

**RICINUS**, T. L. \* *Ricin*. Monoïcus. MASC. Calix 5-partitus. Stamina numerosissima, filamentis variè coalitis & ramosis. FÆM. Calix 3-partitus. Germen 1; styli 3; stigmata 6. Capsula echinata 3-locularis 3-sperma. *Herbæ, rarò frutices; folia alterna stipulacea, sæpiùs palmata petiolo ad apicem glanduloso; flores spicato-paniculati terminales, inferiores masculi, superiores fæminei.*



**IATROPHA**, L. \* **RICINOIDES**, T. \* *Manihot*, *Manioc*. Monoïca. Calix 5-partitus aut 5-lobus petaloïdeus, interdum in masculis caliculo 5-partito cinctus. MASC. Stamina 10, filamentis medio coalitis; horum 5 exteriora interdum breviora, interdum distincta, interdum glandulis 5 cincta. FÆM. Germen 1; styli 3; stigmata 6. Capsula 3-cocca 3-sperma. *Herbæ aut frutices; folia alterna stipulacea, sæpè palmata, interdum in apice petioli glandulosa; flores corymbosi axillares aut terminales, corymbis monoïcis. Radix quarundam tuberosa esculenta. Congener ex L. Suppl. Hevea Aubl. t. 335, Guyanensibus Caoutchouc, arbor monoïca, lactescens seu succo sæta aqueo resinoso, post concrescen-  
tiam elastico (Gomme élastique) & tunc ad usus varios usurpato; hujus rami apice foliosi, folia alterna ternata, fructus corticatus 3 coccus coccis ligneis 1-2-spermis, semina in crustâ fragili; cætera ab Aubletio non observata.*

**DRYANDRA**, Thunb. \* Dioïca. Calix 5-phyllus (corolla Th.) petaloïdeus, caliculo 2-3-lobo cinctus. MASC. Stamina 9, filamentis basi in unum coalitis. FÆM. Germen 1; styli 3-5; stigmata 6-10. Capsula magna ovata acuminata 3-5-ocularis 3-5-sperma. *Arbores; folia alterna conferta terminalia, stipulacea stipulis caducis apice petioli glanduloso; pedunculi inter folia terminales 3-4-flori. Character ex D. Thunb. Japon., ex Lamark dict. & ex specimine sicco Elæococcæ Commerçonii, vulgò Arbre d'huile dictæ, quæ eadem aut congener, sæpius 10-andra staminibus exterioribus brevioribus, & 5-sperma seminibus oleiferis. An calix fæmineus masculo similis? An genus verè dioïcum?*

**ALEURITES**, Forst. \* Monoïca. Calix 5-partitus (petala Forst.) petaloïdeus, laciniis intus basi squamulosis, caliculo 3-fido minimo cinctus. MASC. Stamina indefinita, filamentis in receptaculum conicum columnare connatis. FÆM. Germen 1; styli 0; stigmata 2 brevia. Bacca magna globosa 2-cocca 2-sperma seminibus globosis bitunicatis. *Arbor, cujus variæ partes quasi farinâ conspersæ, undè nomen. Character ex Forst. t. 56. Huc referantur Ambinux Commerf. gallicè Noix de Bancoul, eadem cum Crotone Moluccano L. cui fructus similiter 2-coccus, & farina variis partibus inspersa. Huic etiam congener aut saltem affinis Anda Pis. Bras. 148, ut & Camirium Rumph. Amb. 2. t. 58.*

**CROTON**, L. \* **RICINOIDES**, T. \* Monoïcum. Calix 10-partitus, laciniis alternis sæpè interioribus & petaloïdeis, interdum nullis. MASC. Stamina 8-15 aut plura, filamentis basi connexis. Glandulæ 5, receptaculo affixæ. FÆM. Germen 1; styli 3 divisi; stigmata 6 aut plura. Capsula 3-cocca 3-sperma. *Herbæ aut sæpius frutices; folia stipulacea, alterna aut rariùs opposita; flores axillares aut terminales plerumque spicati (interdum corymbosi), spicis dioïcis aut sæpius monoïcis, suprâ masculis, infrâ fæmineis. Genus recognoscendum.*



**ACALYPHA**, L. \* Monoïca. Calix 3-partitus, 1-bracteatus. MASC. Bractea parva squamiformis. Stamina 8-16, filamentis basi connexis. FÆM. Bractea magna cordata involucriformis. Germen 1; styli 3; stigmata 6 aut plura. Capsula 3-cocca 3-sperma. *Herbæ aut frutices; folia alterna stipulacea; flores axillares spicati, spicâ superius masculâ, inferius fœmineâ.*

**CATURUS**, L. \* Dioïcus. MASC. Calix tubulosus 3-fidus. Stamina 3. FÆM. Calix 3-partitus persistens. Germen 1; styli 3 pinnato-multifidi; stigmata simplicia. Capsula 3-cocca 3-sperma. *Caracter ex Linnæo. Arbusculæ; folia alterna stipulacea; flores spicati axillares. Extant in herb. Commerf. specimina Acalyphæ hispide Burm. Ind. seu Caturi spiciflori L. Javanensia plurima, omnia fœminea, nulla mascula. An tamen verè dioïcum genus? Confer citata Rumphii & Burmanni in Linnæo. Hinc eliminanda certè Boehmeria Jacq. affinior Urticis, & Wata-taly Rheed. Mal. 5. t. 32. cui ex Rheedio flores hermaphroditi 2-andri & bacca 1-sperma.*

**EXCÆCARIA**, L. \* Dioïca. Calix vix conspicuus (nullus ex Linn.). MASC. Stamina 3 distincta. FÆM. Germen 1; styli 3; stigmata 3. Capsula 3-cocca 3-sperma. *Caracter ex Linnæo. Arborea lactescentes; folia alterna (stipulacea?); flores axillares, masculi densè, fœminei laxè spicati.*

## II. Stylus unicus.

**TRAGIA**, Pl. L. \* Monoïca. MASC. Calix 3-partitus. Stamina 3 subsessilia. FÆM. Calix 5-partitus. Germen 1; stylus 1; stigmata 3. Capsula 3-cocca 3-sperma. *Herbæ aut suffrutices, interdum scandentes; folia alterna stipulacea; flores bracteati, masculi spicati axillares, fœminei solitarii ad basim ejusdem spicæ aut in eadem axillâ distincti. Species quædam stylis 3 & stigmatibus divisis. Genus nudò examinandum.*

**STILLINGIA**, Gard. L. \* Monoïca. Involucrum (calix Linn.) coriaceum urceolatum integrum, in masculis multiflorum, 1-florum in fœmineis. Singulis calix (corolla Linn.) tubulosus infundibuliformis limbo ciliato. MASC. Stamina 2 exserta, filamentis basi leviter coalitis. FÆM. Germen 1 (inferum ex Linn.); stylus 1 filiformis; stigmata 3. Capsula 3-cocca 3-sperma, involucri ampliato basi cincta. *Frutex lactescens; folia alterna (stipulacea?); spicæ in ramulorum dichotomiis solitariae terminales monoïcæ, suprâ masculæ, infrâ fœmineæ. Caracter ex Linnæo. Confer cum Sappia.*

**SAPIUM**, Brown. Jacq. \* **HIPPOMANE**, L. \* Monoïcum. MASC. Calix campanulatus semibifidus. Staminum filamenta 2 basi coalita, singula apice 2-antherifera, aut filamentum unicum 4-antheriferum. FÆM. Calix campanulatus brevis margine 3-dentato. Germen 1; stylus 1 brevis; stigma 3-fidum majus.



Capsula 3-cocca 3-sperma. *Arbores, quædam glutinoso-lactescentes; folia alterna stipulacea stipulis caducis, petiolo ad apicem 2-glanduloso aut interdum nudo; spicæ simplices terminales monoïcæ, supra masculæ, infra fæmineæ; flores masculi in fasciculo aggregati; fæminei distincti; iidem interdum à masculâ spicâ remoti, solitarii axillares aut terminales. Glandula gemina ad basim singuli fasciculi & singulæ fæminæ, indicium fortè folii abortivi. Ab Hippomane differt fructu 3-cocco. Huc referatur Croton febiferum L. in omnibus consimile. Confer etiam numerosas Crotonis species, quarum quædam in posterum huc revocandæ.*

**HIPPOMANE, L. \* MANÇANILLA, Pl. \* Mancenillier.** Monoïca: MASC. Calix turbinatus parvus 2-fidus. Filamentum 1, apice 4-antheriferum. FÆM. Calix 3-partitus parvus. Germen 1; stylus 1 brevis; stigmata plura, sæpè 7. Drupa carnosâ lactescens magna pyriformis; nux lignosa magna superficie inæqualis & sinuosa, loculis sæpius 7 monoispermis, vix dehiscens. *Arbores lactescentes venenosæ; folia alterna stipulacea apice petioli glanduloso; flores masculi densè fasciculati fasciculis 1-bracteatis & 2-glandulosi in spicas simplices laxas terminales alternè dispositis; fæminei in altero ramulo solitarii terminales.*

**MAPROUNEA, Aubl. \* ÆGOPRICON, LS. \* Monoïca.** Calix 1-phyllus 3-4-fidus. MASC. Filamentum 1, apice 4-antheriferum. FÆM. Germen 1 superum; stylus 1; stigmata 3 persistentia. Bacca globosa intus 3-cocca 3-locularis 3-sperma. *Arbores aut frutices; folia alterna integerrima; flores corymbo-paniculati terminales, masculi aggregati in capitula parva ovata amentiformia, fæminei in eodem corymbo distincti pedicellis 1-floris. Character ex L. Suppl. & Aubl. Guyan. t. 342, & ex specimine sicco Ægopriconi à D. Smith misso.*

**SECHIUM, Brown. \* Monoïcum.** Calix campanulatus (corolla ex Brown.) 5-fidus, denticulis (calix ex Brown.) interjectis. MASC. Filamentum 1 centrale, apice 4-fidum & 4-antheriferum. FÆM. Germen 1 superum; stylus 1; stigma 1. Pomum magnum carnosum obversè ovatum 1-spermum. *Racemi axillares. Character ex Brownæo. Huc relatum genus quia Maprounea affine. An inde pomum potius fœtum officulo 3-loculari 3-spermo?*

**HURA, Commerf. L. \* Monoïca.** MASC. Amentum densè multiflorum ovatum imbricatum squamis 1-floris. Singulis calix brevis urceolatus truncatus. Filamentum 1 incrassatum apice 2-fidum, medio tuberculatum tuberculis duplici aut triplici ordine verticillatis, singulis subtus 2-antheriferis. FÆM. Flos solitarius. Calix urceolatus, integer germini arctè circumpositus, aut maturatione 3-partitus. Stylus 1 longus infundibuliformis; stigma maximum concavo-peltatum 12-18-radiatum. Capsula lignosa orbiculata depresso, 12-18-torosa 12-18-locularis 12-18-sperma. *Arbor lactescens; folia alterna stipulacea stipulis caducis, petiolo supernè glanduloso, juniora involuta; amentum mas-*



*culum simplex, longius pedunculatum, terminale aut ramulis axillare; flos fœmineus solitarius amento proximus.*

**OMPHALEA**, L. \* Monoïca. Calix 4-partitus. MASC. Antheræ 2-3, lateribus filamenti incrassati & placentæformis immersæ. FÆM. Germen 1; stylus brevis carnosus; stigmata 3. Capsula baccata 3-locularis 3-sperma. *Frutices; folia alterna stipulacea petiolo supernè 2-glanduloso; flores axillares aut terminales, spicati aut paniculati. An omninò congener Omphalea Aubl. Guyan. t. 328?*

**PLUKENETIA**, Pl. L. \* Monoïca. Calix 4-partitus. MASC. Stamina 8, filamentis coalitis. Glandulæ 4 barbaræ (germen abortivum ex *Plum.*), ad basim staminum. FÆM. Germen 1; stylus longissimus proboscideus. Stigma peltatum 4-lobum lobis medio suprâ punctatis. Capsula depressa 4-angularis, angulis (ut in *Evonymo*) carinatis, 4-locularis 4-sperma. *Frutex volubilis; folia alterna (stipulacea?); flores masculi laxè spicati aut spicato-paniculati axillares; fœmineus in eadem spicâ unicus inferior. Habitus Tamni aut Bryoniæ.*

**DALECHAMPIA**, Pl. L. \* Monoïca. MASC. Umbella circiter 10-flora involucello 2-phyлло cincta. Calix 5-6-partitus. Stamina plura, filamentis in unum coalitis. FÆM. Involucellum 3-phyllum 3-florum. Calix multipartitus laciniis (10-12) dentatis aut ciliatis persistentibus. Germen 1; stylus 1, apice dilatatus; stigma capitato-peltatum. Capsula 3-cocca 3-sperma pedicello elongato insidens. *Frutices scandentes; folia caulina alterna stipulacea, simplicia aut 3-5-phylla; folia floralia duo involucriformia, suprâ pedunculum axillarem sessilia opposita, sæpius apice 3-fida, utraque basi 2-stipulacea, cingentia umbellam masculam centalem stipatam hinc involucri fœmineo 3-floro, inde squamis numerosissimis lateri imbricatim appressis, apice nectarifluis.*

**Obs.** Præcipuus ordinis character è corculi perispermio, staminum insertione, fructu multiloculari, elasticâ loculorum dehiscentiâ, superiori seminum nexu deducendus. Signa quædam cum *Rhamnis* habet communia, perispermum nempe carnosum & fructum sæpè multilocularem & quandoque habitum; sed discrepat insertione staminum depressiori & solitâ sexuum separatione & generaliori petalorum defectu. Hujus genera quædam hermaphrodita, ut *Euphorbia*, *Xylophylla*, *Kirganelia*; quædam fructu non elasticè dissiliente ut *Kirganelia* & *Cicca*, aut non multiloculari ut *Kiggellaria*; omnia tamen ordini pluribus signis conformia & ideo non dimovenda. Nonnulla intuper pseudo-polypetala seu squamis instructa petaloïdeis talia stant utpotè plurimis verè apetalis consociata: an tamen rectius eadem omninò polypetala dicenda sunt utpotè affinia *Rhamnis* certius polypetalis?

*Euphorbiarum* semen exquisitè catharticum: ea autem vis non perispermio tribuenda benigniori, sed soli corculo summè potenti ac ferè deleterio. Ex *Scrapiione* enim, *J. Bauhino*, *Hermannio*, *Geof-*



frax &c. corculum Ricini ( seu ut aiunt, foliolum duplex linguae avis simile in semine interius ) venenosum vehementer purgat, cum membranâ exteriori rejiciendum aut cautè ministrandum, quo sublato mitius habetur residuum semen id est perispermum, tunc etiam esculentum in Omphalcâ & Heveâ teste Aubletio Guyan. p. 845 & 872. Hunc maxima in Ricino & congeneribus explicatur seminis totius efficacia & lenior simul olei ex eodem ( nempe ex solo perispermio ) expressi virtus ; hinc ab ejusdem oleo expresso & leni plurimum dispar oleum coctione extractum, venenosâ parte commixtâ causticum ac summè potens. Nec plura juvat exempla colligere quibus constet in Euphorbiis valida corculi & mitior perispermii vis medica. Utraque prætereâ in aliis seminibus similiter constructis sæpè eadem : sic Rhamni cathartici habentur ; sic Sapota ( Diar. med. Paris. 1760. p. 229 ) renes potentiùs expurgat ; sic oleum dulce ex Olivæ drupâ expressum vitatur quandoque mixtis seminibus sub prelo contusis & acri fœtis corculo quod ipsemet stomacho grave pluriès expertus sum. Magna certè & à Medicis merienda accuratiùs efficacia corculi perispermio carnosò aut altero quolibet tecti ; magnificiendum ideò à Botanicis perispermum virtutis occultæ prænuntium. Prætereâ in seminibus perispermio destitutis, vis quædam lobis denegata, radiculae ac plumulae major inest : sic suavior paratur ex Cacao potus avulsis priùs radiculis ; sic iis intactis oleum amygdalinum ex primâ pressurâ dulce, iisdem demùm obtrititis ex magmate pejus educitur. Hæc cum præmissis nunc tantùm delibata, seorsum tractanda fusiùs & experimentis illustranda sunt quibus vera partium indoles & comparativa sistatur organorum præstantia,

## O R D O I I.

## CUCURBITACEÆ, LES CUCURBITACÉES.

**F**LORES monoïci, aut rariùs dioïci, aut rarissimè ( in Gronoviâ & Melothriâ ) hermaphroditi. Calix superus, suprâ germen coarctatus, ultrâ dilatatus quinquefidus ( corolla T. L. ) sæpè coloratus, marcescens tardè deciduus, extûs ad campanulae basim quinqueappendiculatus ( calix T. L. ) appendicibus viridantibus extimarum calicis laciniarum æmulis & cum ipso simul deciduis. Corolla nulla. Masculis stamina sæpiùs quinque, parti calicis coarctatae inserta, filamentis & antheris nunc distinctis, nunc simul aut seorsum connatis ; antheræ uniloculares oblongæ, summis infixæ filamentis, in lineam bis flexam sæpè excurrentes, quatuor plerumque geminatae & quinta



solitaria; germen abortivum aut sterile. Fœmineis filamenta sterilia aut nulla; germen inferum; stylus unicus aut rarò multiplex; stigma sæpiùs multiplex. Fructus inferus, baccatus cortice sæpiùs solido, unilocularis mono vel polyspermus, aut multilocularis polyspermus, receptaculis feminiferis lateralibus seu parieti affixis; semina cartilaginea aut crustacea; corculum planum absque perispermo. Radix plerumque tuberosa. Caulis herbaceus scandens repensve flexuosus. Folia alterna, cirrhis axillaribus instructa, simplicia cordata aut palmata aut rariùs digitata, sæpè aspera aut punctis callosis aspersa. Flores axillares, pedunculis uni aut multifloris.

### I. Stylus unicus. Fructus unilocularis monospermus.

**GRONOVIA**, Houst. L. \* Hermaphrodita. Calix campanulatus 5-fidus coloratus; squamæ 5 minimæ interiores (petala L.) ex incisuris calicis. Stamina 5, squamis alterna. Stigma 1. Bacca sicca parva subrotunda. *Herba cirrhosa scandens graveolens; folia (Bryonia) aspera prurientia; pedunculi multiflori axillares, floribus parvis. Character ex Linnæo. Stigma 2-lobum & fructus 5-costatus ex Houst. reliq. ic. An veriùs polypetala & affinium Onagris?*

**SICYOS**, L. \* **SICYOÏDES**, T. \* Monoïca. Calix campanulatus obtusè 5-fidus, extùs infrà 5-dentatus dentibus subulatis. MASC. Staminum filamenta 3 infrà coalita; antheræ 4 geminatae, 1 solitaria. FÆM. Stigma 3-fidum. Bacca ovata parva echinata. *Pedunculi breves multiflori. An congener S. edulis Jacq. Am. t. 163, cujus limbus calicis 10-foveatus, antheræ 5 distinctæ, stigma 5-fidum, fructus ovo anserino major 5-sulcatus molliter echinatus 1-spermus?*

### II. Stylus unicus. Fructus unilocularis polyspermus.

**BRYONIA**, T. L. \* *Bryone*, *Couleuvrée*. Monoïca aut rarò dioïca. Calix campanulatus, obtusè 5-fidus, extùs infrà 5-dentatus dentibus subulatis. MASC. Staminum filamenta 3 infrà coalita, 2 diandra, 1 monandrum. FÆM. Stylus 3-fidus; stigmata 3 emarginata. Bacca parva subglobosa lævis; semina pauca. *Pedunculi breves uni aut multiflori; fructus interdum sulcatus, ex Alanfonio 3-locularis loculis sæpè 2 abortivis.*

**ELATERIUM**, Jacq. L. \* Monoïcum. Calix tubulosus cylindricus, apice 5-fidus patens laciniis longis angustis acutis, den-



riculis interjectis. MASC. Stamina filamenta in columnam erectam coalita; antheræ in unam compactæ. FÆM. Stylus crassus; stigma capitatum. Capsula coriacea reniformis echinata, 2-valvis elastica, intus pulposa polysperma. *Pedunculi masculi multiflori, feminei 1-flori. Character ex Jacq.*

### III. Stylus unicus. Fructus multilocularis polyspermus.

MELOTHRIA, L. \* BRYONIA, Pl. \* Hermaphrodita. Calix supra germen tubulosus filiformis, ultra campanulatus limbo 10-fido, laciniis alternis exterioribus minimis acutis, alternis interioribus magnis coloratis subrotundis in rotam patentibus. Stamina filamenta 3 conica, quorum 2 diandra, 1 monandrum. Stylus cylindricus; stigmata 3. Bacca parva oblonga 3-locularis polysperma. *Pedunculi 1-flori; flores interdum quidam masculi.*

ANGURIA, Pl. Jacq. L. \* Angourie. Monoïca. Calix oblongus basi ventricosus, limbo patens (corolla Jacq.) obtusè 5-partitus, lacinulis 5 exterioribus (calix Jacq.) alternis. MASC. Stamina filamenta 2 brevia opposita antherifera. FÆM. Filamenta 2 similia sed sterilia. Stylus semibifidus; stigmata 2 bifida. Pomum oblongum sub4-gonum 2-loculare polyspermum. *Pedunculi masculi racemoso-multiflori, feminei 1-flori. An species quædam dioïcæ? Character ex Jacq. Confer Turiam Forsk. similem fructu 2-loculari, sed calice interiore piloso & 3 filamentis distinctam, masculis antheriferis, femineis callo annulari infra junctis.*

MOMORDICA, T. L. \* LUFFA, T. \* ELATERIUM, Boerh. \* *Pomme de merveille, Papangaye.* Monoïca. Calix supra germen magnus patens venosus, rugosus plicatusve 5-fidus, coloratus, extus infra 5-fidus laciniis minoribus angustis. MASC. Stamina filamenta 3 apice juncta, 2 diandra, 1 monandrum, antheris omnibus coalitis. FÆM. Filamenta 3 sterilia. Stylus 3-fidus; stigmata 3. Pomum siccum oblongum, elasticè diffiliens, 3-loculare polyspermum; semina compressa. *Pedunculi uni aut multiflori. Fructus Momordicæ T. verrucosus latere diffiliens seminibus arillatis superficie insculptis & margine inæqualibus, Luffæ T. lavis apice diffiliens & intus pulpâ mox evaridâ reticulato-spongiosus seminibus margine integris non arillatis, Elaterii T. minor asper elasticè à pedunculo abscedens & simul per substitutum foramen ejiciens semina. Elaterium præterea insigni exceptione non scandens repensve nec cirrhosum. An genera distinguenda?*

CUCUMIS, T. L. \* MELO, T. \* COLOCYNTHIS, T. \* ANGURIA, T. \* Concombre, Melon, Coloquinte. Monoïcus. Calix



Momordicæ, sed major campanulatus, laciniis exterioribus subulatis. MASC. Stamina Momordicæ, tegentia discum centrale 3-gonum truncatum. FEM. Filamenta 3 sterilia. Stylus brevissimus; stigmata 3 crassa bipartita. Pomum magnum, 3-loculare dissepimentis membranaceo-succosis, polyspermum feminibus gemino ordine, ovatis compressis margine acuto. *Folia Colocynthis & Anguriæ palmato-laciniata, cæterorum cordata; pedunculi breves uni aut multiflori. Fructus Cucumeris T. oblongus subcylindricus superficie inæqualis carnosus insipidus edulis, Melonis T. ovatus carnosus edulis suavior superficie sulcata aut reticulata, Colocynthis T. ovatus minor carne sicca amarâ non eduli, Anguriæ T. parvifloræ cæteris minor echinatus pulposus aquosus edulis.*

**CUCURBITA**, T. L. \* **PEPO**, T. \* **MELO-PEPO**, T. \* **ANGURIA**, T. \* *Courge, Calebasse, Pepen, Potiron, Pastèque.* Monoïca. Calix Cucumeris. MASC. Stamina Momordicæ, foveolam centalem obtegentia. FEM. Filamenta sterilia minima, infra in anulum crassiusculum coalita. Stylus brevis 3-fidus; stigmata 3 incrassata. Pomum magnum 3-5-loculare (6-loculare ex *Adanf.*) polyspermum; semina Cucumeris sed margine tumida, in plurimis integra, in *Cucurbitâ T.* apice emarginata. *Folia Anguriæ T. laciniato-palmata, cæterorum cordata; pedunculi breves subiflori; calix nunc patens albus in Cucurbitâ aut luteus in Anguriâ, nunc campanulatus luteus & (in Melo-Pepone T.) basi dilatatus limbo reflexo, aut (in Pepone T.) basi angustatus limbo erecto. Fructus carnosus (in Anguriâ succosus) plerumque edulis, Melo-Peponis spheroides, Peponis oblongus aut formâ varius, Cucurbitæ longior lævis subcylindricus aut medio coarctatus. Character ex DD. Duchesne & Lamark. Genus à præcedenti distinctum præcipuè seminum tumido margine. An auctus loculorum numerus à receptaculis seminiferis in septa productis?*

**TRICHOSANTHES**, L. \* **COLOCYNTHIS**, Pl. \* *Anguine.* Monoïca. Calix clavatus longissimus glaber subcylindricus, limbo 10-fido, laciniis 5 extimis minimis reflexis acutis, 5 intimis majoribus patentibus & plurimum ciliatis. MASC. Stamina Momordicæ. FEM. Stylus filiformis; stigmata 3 subulata. Pomum oblongum 3-loculare polyspermum loculis remotis, feminibus compressis tunicatis. *Pedunculi uni aut multiflori.*

**CERATOSANTHES**, Burm. *Adanf.* \* **ANGURIA**, Pl. \* Monoïca. Calix Trichosanthis, laciniis intimis non ciliatis, sed apice bicornibus aut bipartitis in ligulas revolutas. MASC. Stamina Momordicæ. FEM. Stylus; stigmata 3. Pomum dactyliforme oblongum 4-loculare polyspermum, feminibus compressis subrotundis. *Radix tuberosa maxima; folia palmata; pedunculi longi bi aut multiflori. Character ex Plum. ic. 24 & mss. 2. t. 34.*



IV. Styli plures. *Cucurbitaceæ dubiæ.*

FEVILLEA, L. \* NHANDIROBA, Pl. \* Dioïca. Calix campanulatus limbo patente 5-fido. Corolla monopetala rotata 5-loba, lobis convexis reflexis. MASC. Stellula duplex (fortè germinis abortivi stylus triplex persistens) corollæ faucem claudens. Staminum filamenta 10 distincta, quorum 5 fertilia antheris didymis, 5 alterna sterilia. FÆM. Stellula intrà corollam 5-lamellata (fortè stamina abortiva) lamellis cordatis. Germen semiinferum; styli 5 (3 ex *Brown.*); stigmata totidem. Bacca semiinfera sphaericea maxima cucurbitacea cortice solido, circulari limbi calicini vestigio ad ambitum exarata, 3-locularis polysperma, seminibus magnis suborbiculatis compressis suberosâ crustâ obductis; corculum magnum absque perispermio. *Car. ex Linn. Herbæ scandentes; folia alterna, cordata aut 3-loba, in axillis cirrhosa; pedunculi axillares, uni aut multiflori; flores parvi. An verè monopetali, an potius apetali calice interiore colorato ut in cæteris Cucurbitaceis quibus habitu simillimum genus? Huic aliundè fructu affinis Couroupita p. 326, diversa tamen utpotè polypetala polyantha & arborea cirrhis destituta. Conferatur etiam stellula Fevilleæ cum florali Passifloræ coronâ.*

ZANONIA, L. \* PENAR-VALLI, Rheed. \* Dioïca. Calix limbo 3-partito. Corolla 5-partita rotata patens. MASC. Staminum filamenta 5 distincta; antheræ simplices. FÆM. Germen inferum; styli 3 patentes; stigmata 3 bifida. Bacca infera cortice solido, longa magna obsolete 3-gona, basi attenuata, apice truncata & crispo limbi calicini vestigio cincta, 3-locularis loculis 2-spermis & receptaculo centrali carnosio 3-gono in faciebus seminifero, seminibus ovatis alâ foliaceâ magnâ marginatis. *Planta ramos latè spargens; folia alterna magna; cirrhi in masculo axillares ex Rheed. ic. 49; flores spicato-racemosi axillares; fructus carnosus, sapore & odore Cucumeris. Character ex Rheed. Mal. 8. t. 47-49 & ex Linnæo. Genus idem fortè cum Couratari Aubl. t. 290, & ideò Lecythi (p. 327) affine, licet non polyandrum: an indè cum Fevilleâ eliminandum è Cucurbitaceis à quibus præcipuè discrepat receptaculo centrali seminifero?*

## V. Genera Cucurbitaceis affinia, germine supero præcipuè distincta.

PASSIFLORA, L. \* GRANADILLA, T. \* Grenadille, *Fleur de Passion*. Hermaphrodita. Calix inferus, basi urceolatus, limbo 10-partito magno colorato, laciniis omnibus concoloribus simul marcescentibus, 5 exterioribus (calix T. L.) sæpè sub apice mucronatis, 5 interioribus (perala T. L.) petaloïdeis.



Corolla nulla. Corona interior (nectarium L.) ex imo calicis limbo enata sub laciniis intimis, colorata multipartita laciniis numerosis filiformibus radiantibus aut erectis; duplex intus altera corona conformis sed brevior & depressior urceolo inserta; intima sæpè circa stipitem centalem connivens. Germen superum stipiti erecto insidens; styli 3 clavati; stigmata 3 capitata. Stamina 5, summo inserta stipiti sub germine, filamentis basi breviter connatis, ultra distinctis horizontalibus; antheræ oblongæ incumbentes. Bacca carnosâ cortice interdum solido, formâ & mole varia, lævis aut rarò (in *P. rotundifolia*) pilosa, 1-locularis polysperma receptaculo seminifero triplici parietibus affixo; semina numerosa compressa, arillata arillo membranaceo pulposo; corculum planum perispermio tenui carnosio tectum. *Herbæ scandentes, interdum lignosæ; folia alterna stipulacea, simplicia, integra aut lobata aut rariùs partita (in P. heterophyllâ J. Plum. spec. 7. mss. 2. t. 21 inferiora indivisa, superiora pedata), petiolo nudo aut utrinque glanduloso; cirrhi axillares; pedunculi 1-3 axillares 1-flori (in P. holosericeâ multiflora), infra calicem plerumque articulati, involucro ad articulum sæpè 3-phylo aut 3-partito laciniis integris aut rariùs dissectis, interdum minimo aut unifolio aut nullo. Genus petaloideo calice, partium numero, receptaculis seminiferis lateralibus, habitu demum affine Cucurbitaceis, diversum foliorum stipulis & staminum germinisque situ & coronâ interiore & seminis perispermio & præprimis flore non diclini. Hujus lacinia petala à Botanicis dictæ, sed calici omninò conformes, veriùs sunt calicina. Species quædam signis nonnullis dissimiles ad Muruciâ & Tacsoniam infra relatæ. Modecca Rheed. Mal. 8. t. 20-23 Convolvuli congener ex Linnæo, sed habitu cirrhisque Cucurbitacea & fructu supero affinium Passifloræ, floribus tamen racemosis & germine sessili & fructu 3-valvi distinguitur, ulteriori examine in proximum genus erigenda. Conferatur insuper Zucca Commersf. herb. Borbon. non descripta, habitu Cucurbitacea, in axillis 1-flora, bractea magnâ concavâ calicem stipante maximum campanulatum 5-fidum coloratum, extius basi 5-appendiculatum quasi caliculatum, intus 5-andrum staminibus non stipitatis, germine nullo, idè fortè masculâ fæmineo non lecto specimine.*

**MURUCUA, T. \* PASSIFLORA, L. \*** Calix Passifloræ coloratus, urceolo præterea subtus sulcato. Corona interior non multipartita & triplex, sed simplex indivisa erecta tubuloso-conica truncata circa germinis stipitem connivens. *Cætera omninò ut in Passiflorâ. Huc P. Muruciâ L.*

**TACSONIA. \* MURUCUA, Juss. \* PASSIFLORA, Lamark. \*** Calix maximus tubulosus longus limbo 10-fido laciniis coloratis, alternis extimis sub apice mucronatis, alternis interioribus obtusis, basi cinctus caliculo urceolato distincto 3-fido involucri vicem supplente. Corona interior nulla, sed hujus loco glandulæ plurimæ in tubi fauce sessiles & rugæ 2 intimæ



circulares sub glandulosâ serie. Stipes germinis longissimus, calici æqualis. *Cætera omninò ut in Passiflorâ. Character ex iconibus & siccis Jos. Jussæi speciminibus Peruvianis Tacso & Purupuru dictis.*

**PAPAYA, T. Pl. \* CARICA, L. \* Papayer.** Dioïca. Calix minimus 5-dentatus. MASC. Corolla monopetala tubulosa infundibuliformis, limbo 5-lobo. Stamina 10, fauci corollæ inserta; alterna filamentis duplò brevioribus, calicinis laciniis opposita; antheræ erectæ oblongæ. FÆM. Corolla 5-partita. Germen superum oblongum; styli 5 breves; stigmata dilatata compressa, cristata. Bacca maxima cucumerina aut ovata, 5-fulcata oblonga, intus pulposa 1-locularis ad parietes 5-placentaris polysperma; semina numerosa arillata, arillo testam fragilem rugosam 1-spermam obvolvente. Corculum planum in perispermo compresso carnosum oleoso. *Arbores succo lactescente glutinoso, ligno fungoso lævi, trunco indiviso aut rariùs ramoso, subspinoso aut sæpiùs inermi & pristinorum foliorum vestigiis tantùm scabro; folia terminalia conferta alterna longè petiolata, digitata aut sæpiùs palmata & subtus in nervorum concursu subsquamulosa; flores axillares, masculi in longis pedunculis racemosi penduli aut erecti, fæminei pedunculo crassiori breviori & paucifloro insidentes; quidam interdum hermaphroditi in fæmineis arboribus observante Trewio, in masculis memorante Commersonio; fructus esculentus peponiformis. Genus in vivis denuò examinandum.*

**Obs.** Cucurbitaceas Botanici monopetalas dicunt à calice interiore colorato & corollæformi; sed cum germine infrà concrescens, ultra laciniis calicinis extimis omninò coagmentatus, eâdem prognatus origine & unâ marcescens simulque posthàc deciduus, calicinæ indolis veriùs particeps judicatur. In Bernardi Jussæi distributione Trianonensi & in nostrâ horti Parisiensis subsequente, Campanulaceis accedit ordo utpotè monopetalus, nunc autem ulteriori examine apetalus & præterea plerumque diclinis, indè in diclinium classem adigitur, ordinibus conterminis habitu aut caractere subaffinis. Hinc Euphorbiis quibusdam scandentibus monostylis & columnari staminum apparatu conspicuis accedit, plurimùm tamen distinctus antheris & interiore fructus seminisque structurâ; illinc mediante Papayâ genere ambiguo extis ficiformi quibusdam inter Urticas generibus quadantenus assimilatur. Cucurbitaceæ non volubiles, sed more Vitis tantùm scandentes & cirrhis injectis suspensæ; scandentes similiter Passifloræ quæ licet hermaphroditæ germine supero, ordini non immeritò approximantur. Harum floralem assimilant coronam rugæ quædam in imo Cucurbitacearum calice interiores. Staminum filamenta in his & illis basi coalita. Eadem, deficiente stipite, in Modeccâ (Rheed. 8. t. 20) intra calicem cum germine immersa, characterem Cucurbitaceo viciniorem repræsentant. Solvitur Passifloræ fructus suprâ pedunculum articulatus; idem in Cucurbitaceis, observante D. Duchesne, juxta pedunculum quasi circumscissus, ab eodem maturus sponte disjungitur.



## ORDO III.

## URTICÆ, LES ORTIES.

**F**LORES monoïci aut dioïci, rariùs hermaphroditi. Calix omnibus monophyllus divisus. Corolla nulla. Masculis stamina definita, imo calici inserta, ejusdem laciniis opposita. Fœmineis germen unicum superum; stylus nullus, aut unicus duplexve sæpè lateralis; stigmata sæpè duo. Semen unicum, crustâ fragili aut arillo inclusum, nudum aut tectum calice interdum baccato. Hujus corculum absque perispermo, rectum aut incurvum. Arbores, frutices aut herbæ, interdum lactescentes. Folia sæpiùs stipulacea, alterna aut opposita. Flores nunc solitarii aut racemosi, nunc receptaculo multifloro interdum amentæformi impositi, nunc in communi involucro monophyllo reconditi. Fructus interdum polyspermus ex seminum in involucro aut receptaculo aggregatorum coadunatione.

I. Flores in communi involucro monophyllo reconditi.

**FICUS**, T. L. \* *Figuier*. Monoïca. Involucrum basi squamulis 3 cinctum, carnosum, formâ varium, apice dentatum denticulorum multiplici serie & connivens superstitie foramine denticulis clauso, intus refertum floribus pedicellatis, propè foramen masculis superioribus, cæteris fœmineis inferioribus, internam ejusdem parietem obtegentibus. MASC. Calix 3-partitus. Stamina 3. Rudimentum pistilli. FÆM. Calix 5-partitus. Germen 1; stylus 1 lateralis; stigmata 2. Semen 1 compressum nudum, aut hinc calici semiimmersum. Fructus ex involucro seminifero ampliato interdum succulento. *Arbores aut frutices lactescentes; rami alterni; folia alterna, juniora stipulis conclusa vaginantibus in cornu terminale convolutis, sæpè mox caducis, quarum vestigia persistentia; fructus sæpè axillares, solitarii aut conferti, rariùs racemosi terminales. Species quædam in Archipelagicis insulis Caprificæ dictæ, vulgò dioïcæ: harum fecundatio difficilis (maribus in involucro proprio connivente inclusis) perfici creditur beneficio insectorum quæ in masculis involucris latentia,*



latentia, perforatâ eorundem pariete, ad fãmíneos convolant thalamos masculino polline conspersa, eosdem quâ data porta penetrant, & beneficium stigmatibus infundunt rorem quo dives fructus mox turgescit maturusque semina perfectâ profert. Huic Caprificationi favent incolæ admoventes arbori fãmíneæ ramum masculum involucris insectiferis onustum. An tamen verè dioïcæ species Caprificæ? An potius involucra, ut in cæteris, monoïca & seminifera, sed suâ sponte non pulposa nec esculenta, indè sterilia dicta? An fructuum turgescencia non à fœcundo polline, sed à solito nutritii succi defluxu in vegetantium partes insecti aculeo vulneratas?

**AMBORA.** \* **TAMBOURISSA**, Sonner. \* **MITHRIDATEA**, Commerf. \* *Tamboul*, Bois tambour. Monoïca. MASC. Involucrum primò ovatum connivens integrum, dein scissile 4-partitum patens, antheris numerosissimis intùs omninò vestitum. FÆM. Involucrum ovatum, intùs cavum, suprà umbilico pervium. Germina numerosa internis ejusdem parietibus immersa; styli & stigmata totidem. Capsulæ totidem in involucri ampliato incrassato, singulæ 1-spermæ arillatæ arillo pulposo. Involucrum maturius quandoque discissum. Arbores lactescentes; folia subopposita integra sempervirentia; flores racemosi, rariùs solitarii, trunco & imis ramis innascentes, fãmínei rariores masculis mixti. Caractèr ex siccis & ex Commerf. descript. & ex Sonner. Ind. 2. t. 134. An præterea calices proprii aut squamæ florales? Ambora nomen Madagascariense.

**DORSTENIA**, Pl. L. \* *Contrayerva*. Involucrum concavum patens crateriforme, rotundum aut angulatum, intùs tectum floribus numerosis confertis sessilibus. Singulis calix simplex seu fovea 4-angularis in involucri excavata; stamina 4; germen 1; stylus 1; stigma 1; semen 1. Involucrum maturius carnosum. Caractèr ex Linnæo. Herba foliis radicalibus; involucra in scapis solitaria terminalia. Hujus congener ex Niebuhr *Kofaria* Forsk. herba lactescens caulescensque foliis sparsis, cujus involucra conformia axillaria pedunculata 10-12-dentata, intùs carnosâ, multiflora floribus pressis pulpæ immersis & suprà verrucæformibus, verrucis conico-truncatis, aliis masculis 2-3-andris, aliis fãmíneis promiscuis 1-gynis 1-stylis 1-spermis semine intrâ pulpam delitescente. An cæteræ Dorsteniæ pariter monoïcæ, ipso suspicante Linnæo, utpotè involucri ficiformi sed expanso instructæ?

**HEDYCARIA**, Forst. \* Dioïca. Calix 8-10-fidus. MASC. Antheræ plurimæ (50) sessiles oblongæ apice barbato, fundum calicis regentes. FÆM. Germina plura in disco calicis lanati, stipitata, granulata; styli 0; stigmata... Noces 6-10, cæteris abortivis, subossæ 1-spermæ stipitatæ. Frutex foliis alternis; flores racemosi axillares. Caractèr ex Forst. t. 64 & ex L. Suppl. An Anonis aut Ranunculaceis affinior? An calix mutato nomine verum involucrum?



PEREBEA, Aubl. \* Dioïca ? MASC....FÆM. Calix tubulosus 4-dentatus. Germen 1; stylus 1; stigma 2-lobum. Semen 1, calice baccato tectum. Receptaculum multiflorum floribus sessilibus, coriaceum, extus squamosum, margine dentatum, primò concavum, expansione dein convexum & baccis deciduis nudum. *Arbor; folia alterna stipulacea, juniora stipulis involuta mox caducis, quarum vestigia ut in Ficu persistentia; receptacula axillaria. Character ex Aubl. Guyan. t. 361.*

II. Flores receptaculo communi multifloro impositi, aut squamis involucrantes capitati, aut distincti sparsi.

CECROPIA, L. \* FICUS, Pl. \* Coulekin, Ambaiba, Bois trompette. Dioïca. MASC. Amentum imbricatum floribus numerosis. His calix turbinato-angulatus obtusus apice 2-porosus. Stamina 2 intrà calicem per poros exserta. FÆM. Amentum idem. Calix ex Jacq. infundibuliformis, apice 2-fidus. Corpuscula 2 (antheræ steriles ?) minima caduca, calicis incisuris insidentia. Germen angulosum obtusum; stylus subnullus; stigma capitatum. Capsula ex Lœfl., aut bacca ex Linn. (è calice persistente nata ?) angulosa 1-sperma semine minimo. *Arbor ramis nodosis, inter nodos fistulosis; folia ad nodos alterna, juniora cooperta membranâ spathiformi lateribus dehiscente & caducâ; spathæ florum communes pedunculatæ, includentes amenta fasciculata, in masculis plurima, in fœmineis pauciora (4-5); pedunculi 1-2 axillares.*

ARTOCARPUS, Forst. LS. \* Jaquier, Rima, Fruit à pain. Monoïca. MASC. Amentum cylindricum crassum (spathâ destitutum ?) flosculis omninò tectum sessilibus quibus calix 2-valvis, stamen 1 breve. FÆM. Spadix ovatus, spathâ 2-valvi deciduâ cinctus, & numerosis onustus germinibus connatis. His calix 0 aut abortivus; stylus 0 aut 1; stigma 1-2. Fructus compositus muricatus magnus. Semina totidem quot germina, apice fetrosa seu aristata, spadici baccato immerfa, singula arillata arillo pulposo farinaceo. *Arbores lactescentes; folia alterna stipulacea, juniora stipulis involuta mox caducis quarum vestigia ut in Ficu persistentia; amenta axillaria aut terminalia; fructus in trunco & imis ramis axillares, in quibusdam speciebus apyrini. Character ex Forst. t. 51 & L. Suppl. & Commerf. cui Iridaps dicitur. Congeneres Tsjaka Rheed. 3. t. 26-28. 32, & Soccus Rumph. 1. t. 29-34, & Nanca, Camangsi Camell. apud Rai. hist. 3. Luz. p. 52. ic. 71. 168.*

MORUS, T. L. \* Meurier. Monoïca, rariùs dioïca. Flores mascululi & fœminei in amentis distinctis ovatis densè spicati sessiles. Singulis calix 4-partitus. MASC. Stamina 4, filamentis



longis antè florescentiam incurvis. FÆM. Germen 1; styli 2; stigmata 2. Semen 1, calice persistente baccato tectum; corculum incurvum. *Arbores laefcentes; folia stipulacea, alterna aut rariùs opposita; amenta solitaria axillaria, fœminea esculenta.*

**ELATOSTEMA**, Forst. \* Monoïca. MASC. Calix 5-partitus patens. Stamina 4-5, filamentis elasticè profilientibus. Flores aggregati. FÆM. Calix 0. Germen 1; stylus 1; stigmata 3 biinda. Capsula 2-valvis 1-sperma. Receptaculum commune baccatum globosum, floribus & idèò capsulis diffitis tectum. *Caracter ex Forst. t. 53.*

**BOEHMERIA**, Jacq. \* CATURUS, L. \* Monoïca. MASC. Calix tubulosus 3-fidus. Stamina 3. FÆM. Calix tubulosus integer. Germen 1; stylus 1 longus; stigma 1. Semen 1 minimum, calice persistente suprà coarctato tectum. *Arbuscula; folia alterna stipulacea, alternatim lanceolata, longè petiolata aut basi hinc auriculata breviusque petiolata, basi etiam 3-nervia nervo medio (ut in Celtide) obliquo; flores aggregati sessiles, bracteis seu paleis distincti, minimi, axillares, fœminei superiores in junioribus ramulis, masculi inferiores in vetustioribus & à foliorum casu aphyllis.* *Caracter ex Jacq. Americ. & ex sicco specimine. Genus certè diversum a Caturo.*

**PROCRIS**, Commerf. \* Monoïca aut dioïca. MASC. Flores aggregati. Calix 4-fidus. Stamina 4, calice longiora, ejusdem laciniis opposita. FÆM. Receptaculum baccatum sphæroïdeum, flosculis omninò tectum. Singulis calix... Germen... Capsula minima receptaculo incrassato semiimmerfa. *Herbæ non ramosæ; folia alterna stipulacea, nervo medio obliquo ut in Boehmeriâ; flores axillares.* *Caracter ex Commerf. mss. & herb. An congener Ponga Rheed. Mal. 4. t. 35? Confer cum præcedentibus.*

**URTICA**, T. L. \* Ortie. Monoïca, rariùs dioïca. MASC. Flores racemosi. Calix 4-partitus. Stamina 4, filamentis longis antè florescentiam incurvis. Rudimentum pistilli glandulosum. FÆM. Flores racemosi aut rariùs in capitula sphærica conglobati. Calix 2-valvis. Germen 1; stylus 0; stigma villosum. Semen 1, calice persistente membranaceo (rarissimè baccato) tectum; corculum rectum. *Herbæ, plures pungentes, rariùs frutices; folia stipulacea, opposita aut alterna; racemi axillares ut & capitula.*

**FORSKALEA**, L. \* CAIDBEJA, Forsk. \* Monoïca. Involucrum 5-6-phyllum (calix L.) lanatum turbinatum multiflorum monoïcum, floribus lanâ intertextâ arctè connexis, masculis 7-10 marginalibus, fœmineis 3-5 centralibus. MASC. Calix tubulosus (petalum L.) squamiformis, textu lanato inflexos squamæ margines copulante & sic intus perficiente tubum, limbo integro aut dentato. Stamen 1 imò calici insertum, antherâ & filamentum ut in Parietariâ elasticis. FÆM. Lanugo carminata



vicem calicis supplens. Germen 1; stylus 1; stigma 1 lanuginosum compressum; corculum erectum. *Herbæ asperæ tenaces & etiam subpungentes; folia alternata stipulacea; involucri axillaria, 3-4 conferta sessilia. Habitus Parietariæ cui aliunde affinis caractere sic delineato post repetitas præcipuè in F. minori observationes. Ex Linnæo & aliis flores hermaphroditi, calix 5-phyllus, petala & stamina 10, germina 5, styli & stigmata 5, semina 5 lanâ connexa: an rectius?*

**PARIETARIA**, T. L. \* *Pariétaire*. Involucrum multipartitum, pauciflorum (3-5), flosculo 1 fœmineo, cæteris hermaphroditis. **HERM.** Calix 4-fidus. Stamina 4, filamentis primò incurvis, dein elasticâ expansione patentibus; antheræ didymæ, elasticè dehiscentes. Germen 1; stylus 1; stigma 1. Semen 1, calice elongato & suprâ connivente tectum; corculum rectum. **FÆM.** Stamina 0. Cætera similia. *Herbæ, quædam asperæ; folia alternata aut opposita, in quibusdam non stipulacea; flores glomerati axillares. Species quædam Commersonianæ, suffrutescentes aut herbacæ, floribus subsolitariis, aut confertim paniculatis in eodem pedunculo ternis; quædam foliis 3 aut 4 verticillatis; omnes ulterius examinandæ.*

**PTERANTHUS**, Forsk. \* Calix 4-partitus, laciniis intus cavis & germi applicitis, 2 oppositis majoribus & longioribus apice compressis & quasi alatis, 2 aliis minoribus apice hamoso reflexis. Stamina 4 brevissima, filamentis basi vix coalitis. Germen 1; stylus 1; stigma 2-fidum. Semen calice persistente tectum. *Herba articulata, infra trichotoma, supra dichotoma; folia verticillata; pedunculi ex dichotomiis foliati dichotomè multiflori; pedicelli ovati compressi sub 7-flori, flore 1 centrali fertili, 3 utrinque lateralibus quorum 2 sterilia & 1 frugifer medius. Character ex Forsk. Camphorosmæ congener ex Linnæo, sed certius affinior Urticis. Semen absque perispermo.*

**HUMULUS**, L. \* **LUPULUS**, T. \* *Houblon*. Dioïca. **MASC.** Calix 5-partitus. Stamina 5, filamentis brevibus; antheræ oblongæ. **FÆM.** Calix unifolius bracteiformis, basi connivens minimus. Germen 1; styli 2; stigmata 2. Semen 1 arillatum, calice plurimum ampliato & membranaceo infra cinctum; corculum incurvum. *Herbæ lignosæ scandentes asperæ; folia opposita, superiora interdum alternata; stipulæ utrinque in unicam bisidam connatæ; flores masculi alternè & laxè paniculati, axillares & terminales; fœminei verticillati sessiles, verticillis 8-floris involucri 4-phyllis cinctis, densè spicatis, spicis brevibus ovatis pedunculatis axillaribus & terminalibus, solitariis aut pluribus paniculatis, paniculæ divisuris stipulaceis.*

**CANNABIS**, T. L. \* *Chanvre*. Dioïca. **MASC.** Calix 5-partitus. Stamina 5, filamentis brevibus, antheris oblongis. **FÆM.** Calix oblongus latere fissus. Germen 1; styli 2; stigmata 2. Capsula crustacea 2-valvis subglobosa parva, calice tecta; corculum



*incurvum. Herba erecta; folia stipulacea digitata, inferiora opposita, superiora alterna, floralia interdum simplicia; flores masculi paniculati axillares & terminales; feminei in summis ramulis & axillares sessiles, mediante ramuli junioris rudimento. Congener Cansjava Rheed. Mal. 10. t. 60-61.*

**THELIGONUM**, L.\* **CYNOCRAMBE**, T.\* Monoïcum. MASC. Calix turbinatus 2-fidus laciniis revolutis. Stamina 12 & ultra. FÆM. Calix 2-fidus minor, persistens ad latus germinis cui stylus 1, stigma 1. Capsula 1-sperma globosa coriacea; semen appendiculo calloso; corculum incurvum. *Herba; folia alterna, petiolo infra in stipulas subvaginantes dilatato; flores axillares sessiles, masculi superiores, inferiores feminei.*

### III. Genera Urticis affinia.

**GUNNERA**, L.\* Calix 0 aut superus 2-dentatus. Germen apice 2-dentatum; styli 2 inter dentes; stigmata 2. Stamina 2, epigyna extra dentes; antheræ subsessiles oppositæ. Semen 1, crustâ calicinâ corticatum. *Herba foliis radicalibus; flores in scapo amentacei terminales amento composito, ramulis bracteatis, flosculis nudis. Character ex Linnæo. Huc retulit Perpensum Burm. prod., monoïcum testante Burmanno: genus ergo fortè non hermaphroditum & idem cum Misandrâ. Hujus congener ex D. Dombey Panke Feuill. Peruv. t. 30.*

**MISANDRA**, Commerf.\* **Dicîca**. Flores in scapis racemosi terminales. MASC. Pedicelli in racemo 2-antheriferi, sub antheris 4-gonis 2-bracteolati. Calix prætereà nullus. FÆM. Pedicelli suboppositi 1-2-flori. Singulo flori germen apice marginatum & 2-appendiculatum (an indè inferum aut tectum calice suprâ 2-fido?); styli 2; stigmata 2. Capsula subbaccata 2-valvis 1-sperma. *Herba Magellanica repens; folia radicalia, alterna, stipulacea; scapi ex involucrio gemmaceo, masculi altiores, feminei humiliores. Hos forsàn seriores in unicâ Magellanicâ parte vidit Commerfonius, illos ubique: indè nomen. Character ex siccis. Confer cum Gunnerâ forsàn congeneri.*

**PIPER**, Bauh. L.\* **SAURURUS**, Pl.\* *Poivre*. Spadix cylindricus amentiformis, flosculis densè tectus, sæpè nudus, rarò spathis cinctus. Singulo flori squamula exterior. Calix nullus, nisi crusta germinis. Germen, dùm recens, inferum antheris 2 sessilibus onustum; dùm maturius, superum & iisdem ad latera rejectis stipatum; stylus subnullus; stigmata 3-4 hispida. Bacca subrotunda 1-sperma. *Caulis herbaceus aut frutescens, sæpè scandens & dichotomus, ramis quasi articulatis; folia petiolo amplexicauli, nunc alterna, nunc opposita altero sæpè caduco aut abortivo; spadices foliis oppositis axillares, alternis oppositi, plerumque solitarii nudi, rarò plures fasciculati & bracteis stipati ut in P. peltato L. & P. umbellato L. indè affinibus Cecropiæ & è Pipere forsàn.*



*eliminandis. An species cæteræ omnes verè congeneres? An quædam aut plures sexu diclines? Confer in vivis.*

**GNETUM**, L. \* **GNEMON**, Rumph. \* Monoïcum. Flores circà axim seu rachim verticillato-spicati, verticillis interruptis, singulis involucro seu calice communi multifloro integro urceolato calloso axim cingente obvolutis, suprà receptaculum commune paleaceum, paleis 1-floris, flosculis marginalibus masculis, centralibus propè rachim fœmineis. His & illis palea calicis vicem supplens. MASC. Filamentum simplex, antheris 2 connexis terminatum. FÆM. Germen 1, receptaculo immersum; stylus 1; stigmata 3. Drupa ovata, fœta nuce oblongâ striatâ. *Arbores trunco & ramis geniculatis; folia ad geniculos opposita integra; spicæ amentiformes geminæ axillares. Caractèr ex Linnæo. Vidit interdum amentum merè masculum in eâdem axillâ juxtâ involucrum simplex omninò fœmineum. Ex Rumphio genus dioïcum & species una carne fructûs pilis prurientibus intus obsitâ. Confer cum Thoâ.*

**THOA**, Aubl. \* Monoïca. Calix 0. Corolla 0. MASC. Spica nodoso-articulata, ad nodos polyandra, filamentis distinctis brevibus, antheris minimis. FÆM. Germina 2 ad basim spicæ masculæ, unum utrinque sessile. His stylus subnullus; stigmata 3-4. Capsula olivæformis, sub cortice setosa pungens, intus testacea fragilis 1-ocularis 1-sperma. *Frutex cortice gummisero, ramis sarmentosis nodosis; ramuli oppositi nodosi, apice dichotomi; folia ad nodos opposita integra; spicæ florum axillares & terminales solitariae; semina esculenta. Caractèr ex Aubl. Guyan. t. 336. Confer cum Gneto cui similis habitu.*

**BAGASSA**, Aubl. \* Bagasse. Calix... Stamina... Germen... Bacca sphæricea cortice granulato, carne internâ durâ, exteriori pulposâ intrâ quam semina plurima nidulantur ovata acuminata. *Arbor lactescens, ramis & foliis oppositis; stipulæ caducæ; fructus aurantiformis edulis; cætera desiderata. Caractèr ex Aubl. Guyan. t. 376. An bacca hæc receptaculo præcedentium asfinis, & idèò genus analogum?*

**COUSSAPOA**, Aubl. \* Calix... Stamina... Germen... Receptaculum sphæriceum seminibus onustum rotundis pulpâ involutis. *Arbores succo luteo turgidæ; folia alterna, juniora ut in Ficu stipulis obtecta convolutis mox caducis quarum vestigia persistentia; receptacula racemosa & axillaria; cætera desiderantur. Caractèr ex Aubl. Guyan. t. 362. 363.*

**POUROUMA**, Aubl. \* Dioïca. MASC.... FÆM. Calix... Germen hirsutum; stylus 0; stigma peltatum striatum. Capsula ovata subhirsuta 1-ocularis 2-valvis 1-sperma, receptaculo seminifero laterali. *Arbor; folia alterna 3-loba aut palmata; juniora stipulâ terminali spathæformi tecta, quâ mox caducâ vestigium superest; pedunculi axillares corymbofo-multiflori; masculi flores*



*nondum observati. Character ex Aubl. Guyan. t. 341, & ex Jos. Jussæi specimine Peruviano. Habitus Cecropiæ aut Ficus.*

Oss. Genera huc revocata habitus quidam dissociat, Ficum nempe, Morum, Urticam &c., character autem connectit vinculo naturali; flores enim non structura tantum similes, sed & dispositione quantenus affines. Involucrum multiflorum concavum apice connivens in Ficu, dilatatur in Amborâ, patescit crateriformis in Dorsteniâ, revolvitur in Perebeâ convexum more receptaculi. Inverso dein nomine & situ, centrale fit receptaculum floribus onustum in Artocarpo, Moro &c. His conveniunt Urticæ & Parietariæ globulifloræ, non distinguendæ à congeneribus racemosis quibus accedunt facile Humulus, Cannabis, &c. serie parum interruptâ. Amentaceis subsequenter jure adjacent Urticæ similiter apetalæ & diclines perispermo destitutæ, quarum insuper compar in nonnullis generibus florum dispositio. Affines etiam Atriplicibus p. 83, utpotè floribus apetalis monospermis interdum hermaphroditis & staminibus definitis perigynisque instructæ; discrepant tamen sexibus sæpius distinctis & perispermo nullo. Ambrosiam & congeneres rectius forsàn evocant ex dictis p. 191. Magnoliâ habitu similem æmulantur Ficus & Artocarpus tum stipularum terminalium convolutione, tum earundem caducarum vestigiis, tum & seminum aggregatione; sed flos Magnoliæ p. 281 polypetalus polygynus solitarius, flores in Artocarpo & Ficu apetalis monogyni glomerati.

Collatis generibus ordini adjectis, fortè novus posthac instituendus Piperum ordo Urticis conterminus, Artocarpum, Cecropiam, Piper, Gnetum, Thoam, Salicorniam?, Gunneram, Misandram &c. complectens, quem definient præcipuè flores minimi amentacei sæpè diclines, calix obsoletus, stamen unicum aut duplex, germen simplex superum aut tectum, stylus aut stigma simplex duplexve, semen calice subbaccato tectum &c. An Piperibus affines Aroideæ & quædam Naiades, modò has & illas germinatio bilobas comprobaverit?

## O R D O I V.

## A M E N T A C E Æ , L E S A M E N T A C É E S.

FLORES monoïci aut dioïci (rariùs hermaphroditi), omnes apetalis. Masculi dispositi in amentum instructum squamis deficiente calice staminiferis, aut calici monophyllo staminifero annexis. Stamina definita aut indefinita, filamentis distinctis. Fœminei flores amentacei aut fasciculati aut solitarii, nunc calice monophyllo nunc squamâ tantum instructi. Germen superum simplex, aut rarò definite multiplex; stylus



unicus aut multiplex; stigmata sæpius plura. Semina nuda, aut capsulae superæ, nunc coriaceæ nunc ossæ, sæpius uniloculares, totidem quot germina. Corculi perispermio destituti radícula recta. Caulis arborescens aut frutescens aut rarò suffruticosus. Folia alterna stipulacea, sæpius simplicia.

### I. Flores hermaphroditi.

**FOTHERGILLA**, L. \* Calix truncatus integer. Stamina plura. Germen apice 2-fidum; styli 2; stigmata 2. Capsula 2-loba 2-locularis loculis 2-valvibus 1-spermis, feminibus ossis. *Frutex facie Alni; flores densè spicati terminales, vernaes antè folia. Fructus Hamamelis, flos diversus.*

**ULMUS**, T. L. \* Orme. Calix campanulatus 4-5-dentatus coloratus persistens. Stamina 3-6, sæpius 4-5, antheris 4-fulcis. Germen compressum; styli 2 breves aut 0; stigmata 2. Capsula suborbiculata, plano-compressa, membranacea, medio tumida, 1-sperma femine lentiformi. *Arbores aut rariùs frutices; folia retrorsim aspera, basi hinc sæpè productiora; flores in fasciculis squamosis sæpè axillaribus sessiles aut rariùs pedunculati. Species una polygama, floribus paucis fœmineis aut hermaphroditis subsolitariis, pluribus masculis fasciculatis, fructu ovoideo non compresso, descripte D. Richard in diss. mss.*

**CELTIS**, T. L. \* **MUNTINGIA**, Pl. \* Micocoulier. Calix 5-partitus. Stamina 5, antheris 4-fulcis subsessilibus. Germen ovatum; styli 2; stigmata 2. Drupa globosa 1-sperma; corculum feminis sinuosè plicatum. *Arbores; flores axillares, subsolitarii aut racemosi, quidam masculi calice 6-partito hermaphroditis mixti aut in axillis inferioribus distincti. An & fœminei quidam rariores? Nervus foliorum præcipuus in pluribus è medio deflectens. Species una Senegalensis stigmatibus 2-fidis, altera Borbonica Andarese dicta stylis subnullis. Congener ex Bern. Jussæo Rhamnus micranthus L. (Muntingia Pl.) apetalus staminibus calici oppositis & 2-stylus & in bacca 1-spermus.*

### II. Flores dioïci.

**SALIX**, T. L. \* Saule. Amenta imbricata squamis 1-floris. Calix 0. MASC. Intrà singulam squamam stamina 2, rariùs 1-3-5, quibus anteriùs basi interjecta glandula (rudimentum germinis?) oblonga truncata parva colorata. FÆM. Germen 1; stylus 1; stigmata 2. Capsula 1-locularis 2-valvis polysperma, feminibus papposis. *Arbores aut frutices suffruticesve, quidam subherbacei; amenta axillaria aut terminalia, juniora squamâ simplici calyptræformi tecta. Species una hermaphrodita,*



**POPULUS**, T. L. \* *Peuple*, *Peuplier*. Amenta laxè imbricata, squamis 1-floris margine laceris aut palmato-ciliatis, basi unguiculatis, medio floris pedicello insertis. Calix minimus urceolatus (nectarium L.) margine obliquo integerrimo. MASC. Stamina 8, imo calici intus affixa, exserta; antheræ oblongæ erectæ. FÆM. Germen 1, basi cinctum calice; stylus 1 brevissimus aut 0; stigmata 4. Capsula 2-locularis 2-valvis polysperma feminibus papposis. *Arbores; folia plurimarum cordato-triangularia; petiolorum apex sæpè compressus & subbiglandulosus; gemmæ florales squamosæ foliis præciores, juniores in quibusdam balsamifluæ; amenta è gemmis explicatis exserta.*

**MYRICA**, L. \* **GALE**, T. \* *Galé*. Amenta ovata imbricata squamis lunatis 1-floris. Calix 0. MASC. Squama 4-andra, rariùs 6-andra. FÆM. Germen 1; styli 2; stigmata 2. Capsula parva 1-sperma, nunc sicca apice 3-loba, nunc sæpiùs drupacea globosa extus granulata. *Frutices subaromatici aut arbusculæ; folia punctis aureis minutis notata; stipulæ nullæ aut fugaces; amenta axillaria aut spicata terminalia; drupæ quarundam extus canescentes ceriferæ. An affinium Terebintaceis? Species una foliis ternatis, fortè non congener.*

### III. Flores monoïci.

**BETULA**, T. L. \* **ALNUS**, T. \* *Bouleau*, *Aune*, *Verne*. Amenta sexu distincta, imbricata squamis 3-fidis aut 3-partitis. MASC. Squama 3-flora. Calix 4-partitus. Stamina 4. FÆM. Squama 2-flora. Calix 0. Germen 1; styli 2; stigmata 2. Semen 1, viciniore approximatum sub eadem squamâ. *Arbores aut frutices; amenta axillaria, feminea in Betulâ T. cylindrica cum seminibus margine membranaceis, in Alno T. ovata cum seminibus nudis.*

**CARPINUS**, T. L. \* **OSTRYA**, Mich. \* *Charme*. Amenta sexu distincta, laxè imbricata squamis 1-floris. MASC. Squama ovata, absque calice fovens stamina 6-10 aut plura, antheris apice villosis. FÆM. Squama lanceolata villosa. Germen 1 apice denticulatum; styli 2; stigmata 2. Capsula ossea 1-sperma, quandoque striata, intrâ semiamplexantem squamæ ampliatae & scariosæ basim delitescens. *Arbores; amenta axillaria & terminalia, mascula longiora gracilia. Ex Linnæo germina 2 & corolla feminea 6 fida; ex D. Lamarck mutato nomine calix datur superus germi simplici insidens. An calicem indicant denticuli germinis; an potiùs germen nudum & ut in consinibus superum? An genere distinguenda Ostrya Mich., fortè dioïca, cujus amenta feminea densiora folliculis squamis suppletibus membranaceis compressis intus cavis & basi 1-spermis, filamenta staminum ex Scopolio ramosa & antheræ emarginatae & nux 2-locularis?*

**FAGUS**, T. L. \* **CASTANEA**, T. \* *Hêtre*, *Châtaignier*. Amentum monoïcum, floribus inferioribus foemineis paucis, cæteris su-



perioribus masculis. MASC. Calix campanulatus 5-fidus. Stamina 12 & ultrà. FÆM. Calix 4-dentatus extus muricatus. Germina 1-3; singulis stylus 1, stigma 1 penicilliforme. Capsulæ totidem coriaceæ hylo lato (quædam interdum abortivæ) 1-3-spermæ, conclusæ in calice persistente capsulæformi 1-loculari 4-valvi, spinis mollibus echinato. *Arbores; amenta axillaria, in Castaneâ T. longa cylindrica laxa cum capsulis coriaceis & seminibus farinaceis, in Fago T. ovata brevia cum capsulis cartilagineis & seminibus oleum (huile de Fêne) expressione fundentibus. An inde distinguenda genera?*

**QUERCUS**, T. L. \* **ILEX**, T. \* **SUBER**, T. \* *Chêne, Yeuse, Liege.* Amentum monoïcum, floribus inferioribus fœmineis paucis, cæteris superioribus masculis. MASC. Calix 4-5-fidus. Stamina 5-10. FÆM. Calix coriaceus hemisphæricus integer. Germen 1; stylus 1; stigmata 5. Capsula ovata coriacea 1-sperma (*Glans dicta*) non dehiscens, hylo lato, basi cincta calice (cui nomen *Cupula*) persistente, extus scabro aut muricato. *Arbores, raro frutices; cortex Suberis T. fungosus crassus, cæterorum tenuior; folia in Quercu T. decidua, in Ilice T. & Subere T. sempervirentia; amenta axillaria laxa. Gallæ insectorum puncturis productæ, formâ variæ, diversis speciebus communes, in Q. cocciferâ coccineo tingunt colore, in cæteris nigro.*

**CORYLUS**, T. L. \* *Coudrier, Noisetier.* MASC. Amentum longum cylindricum imbricatum, squamis 8-andris 3-fidis, laciniâ mediâ latiore laterales tegente. Calix 0. FÆM. Flores sessiles in gemmâ inclusi plures, à masculis remoti. Singulis calix 1-phyllus (2-phyllus ex *Linn.*) coriaceus, margine lacerus. Germen 1; styli 2; stigmata 2. Nux hylo lato, ossea 1-2-sperma, cincta calice plurimum elongato. *Arbores aut arbusculæ; amenta in ramulis terminalia; gemmæ fœmineæ axillares.*

**LIQUIDAMBAR**, CB. L. \* *Liquidambar, Copalme.* Amenta globulosa, sexu distincta. MASC. Stamina numerosa in globum densè compacta, involucri communi 4-phylllo caduco; filamenta brevissima; antheræ didymæ. FÆM. Receptaculum commune magnum sphaericum alveolis numerosis excavatum, basi pariter involucriatum. Singulo flori calix angulosus... Germen 1; styli 2; stigmata 2. Capsula oblonga alveolo immersa, suprâ stylis 2 acuminata & inter stylos 2-valvis, 1-locularis polysperma, feminibus oblongis nitidis apice membranaceo-alatis. *Arbores balsamifluæ; folia (Aceris) sinuato-palmata; florales globuli racemosi terminales, fœminei in racemo subsolitarii inferiores longius pedunculati & penduli. An verè congener L. peregrinum L. quod Myricæ affinius habitu & amentis brevibus ovatis solitariis axillaribus sessilibus?*

**PLATANUS**; T. L. \* *Platane.* Amenta sexu distincta globosa. MASC. Stamina numerosa, squamis minimis intermixta; antheræ longæ 4-gonæ, à basi adnatæ filamentis apice crassio-



ribus. Fœm. Germina numerosa pressa, squamis linearibus cincta & ab invicem distincta; singulis stylus 1; stigma aduncum. Semina totidem, basi angustiora & villosa, superius stylo persistente acuminata. *Arbores*; folia (*Aceris*) sinuato-palmata, petioli basi tumidâ cavâ gemmulam nascentem axillarem obtegente; stipula nullæ, sed vagina intrâ petiolum ramulo circumposita, limbo inæqualis & patens, in ramis decidua; globuli florales 2-3, pedunculo communi affixi sessiles penduli.

Obs. Duplicem Tournefortiana methodus in Amentacearum classe complectitur ordinem, utrumque apetalum & sexu diclinem & arbo-  
reum, Coniferas nempe & Amentaceas veras, quæ florum dispositione  
subsimiles & ab invicem plus æquo non dimovendæ, habitu tamen  
& signis propriis distinguuntur. Corculum in Coniferis cylindricum  
perispermo carnosum cinctum, in Amentaceis perispermo destitutum  
& sæpè planum. Urticas aliundè contingunt rectius Amentaceæ, utpotè  
similiter corollâ & perispermo destitutas & diclines & in generibus  
quibusdam spicifloras. An verè consentiunt ordini Liquidambar &  
Platanus?

## O R D O V.

## C O N I F E R Æ , L E S C O N I F E R E S .

FLORES monoïci aut dioïci. Masculi sæpius amen-  
tacei seu suprâ amentum congesti, singuli squamâ  
instructi, calicati aut nudi, calicibus aut squamis  
staminiferis. Stamina definita aut indefinita, filamentis  
nunc distinctis nunc in stipitem simplicem aut ramo-  
sum connatis. Fœminei solitarii aut capitati aut dis-  
positi in strobilum seu conum densè squamosum  
squamis imbricatis flores distinguuntibus. Calix aut  
squamula calici æmula. Germen superum, conicum  
aut duplex multiplexve; styli aut & stigmata totidem.  
Semina aut capsulæ totidem monospermæ. Corculum  
cylindricum, in perispermo carnosum centrale, bilobum  
lobis rariùs partitis seu palmatis, indè tunc quasi mul-  
tilobum (in Pino). Caulis arboreus aut frutescens.

## I. Calix staminifer.


EPHEDRA, T. L. \* Dioïca. MASC. Amentum minimum pauci-  
florum, squamis 1-floris. Calix 2-fidus. Stamina filamenta



coalita in columnam centralem, apice sæpius 7-andram, antheris 4 lateralibus & 3 terminalibus. F&M. Calix quintuplex, singulus monophyllus 2-partitus, alter intrâ alterum laciniis decussatis imbricatim prominulus sensimque major. Germina 2, è superiore calice enata; styli 2; stigmata 2. Semina 2 hinc plana, indè convexa, squamis tecta calicinis incrassatis baccam divisam constituentibus. *Suffrutices aphylli caulibus & ramis cylindricis nodosis, ad nodos articulatis & verticillatim aut oppositè ramosis, ramulorum articulis membranâ superne 2-fidâ vaginatis; pedunculi ex vaginis solitarii aut plures, uni aut multiflori. Amenta fortè ex articulis brevissimis facta & calices subindè pro vaginulis confertissimis habendi. Genus Equiseto affine tum habitu & articulis vaginatis, tum columnâ flaminiferâ; affinius fortè Gneto aut Salicorniæ. An corculum perispermio instructum?*

**CASUARINA**, Rumph. Forst. LS. \* *Filao de Madagascar*. Monoïca. Amenta imbricata squamis ciliatis 1-floris. M&SC. Amentum longum. Calix 2-partitus. Stamen 1, filamento longo, antherâ subdidymâ. F&M. Amentum ovatum breve. Calix 0 ex Forst., 2-fidus ex Rumph. Germen 1; stylus 1; stigmata 2. Capsula perpendiculariter 2-valvis 1-sperma; semen margine membranaceum. Strobilus ex capsulis aggregatis. *Caracter ex Forst. t. 52 & Rumph. 3. t. 57. Arbor aphylla, verticillatim ramosa & ramulosa, divisuris subius vaginatis vaginâ membranaccâ brevi ciliatâ aut dentatâ, ramulis cylindricis striatis passim articulatis & ad articulos similiter vaginatis ut in Equiseto. Ramuli alii steriles longi articulis distantibus, alii desinentes in amenta, masculiferi sterilibus ferè conformes, seminiferi articulis confertis brevitati. Amenta contractius articulata, articulis minimis vix ab invicem distinctis & è vaginâ dentatâ sinu floriferis: an dantur præterea squamæ florales & calix? An corculum perispermio instructum? An Coniferis rectè consociatum genus? Confer cum Ephedrâ & affinibus.*

**TAXUS**, T. L. \* *If.* Dioïca. Gemma floris polyphylla foliis oppositè imbricatis; calix præterea nullus. M&SC. Antheræ plures basi dehiscentes & posthac peltatæ margine 8-fido, impositæ filamentis in columnam centralem connatis. F&M. Germen 1, receptaculo minimo impositum; stylus 0; stigma 1. Nux 1-sperma ferè omninò tecta receptaculo ampliato & producto in baccam succulentam apice apertam, siccatione contabescentem & evanidam. *Arbores ramosissimæ ramis alternis; folia alterna linearia sempervirentia; florales gemmæ solitariae axillares; corculum tenuissimum, in perispermio carnosio centrale. An verè congener T. verticillata Thunb. Jap. cujus folia majora subverticillata, bacca 1-sperma non evanida nec superius aperta, sed stipitata seu calici receptaculove turbinato incrassato insidens.*





11. Calix nullus. Squamæ flaminiferæ. *Conifera veræ.*

**JUNIPERUS**, T. L. \* **CEDRUS**, T. \* **SABINA**, CB. \* *Genevrier*, *Sabine*. Dioïca, rariùs monoïca. Amenta unisexualia parva subovata, squamis suprà axim centram densè confertis stipitato-peltatis, calice præterea nullo. MASC. Squamæ ternatim verticillatæ, stipite 2-3-4-antherifero. Antheræ 1-loculares subsessiles, in squamis secundæ seu inferiori stipitis lateri insertæ (quædam rariùs à stipite distinctæ & axi centrali affixæ). FÆM. Squamæ pauciores cruciatim oppositæ. Intrà singulam germen 1, cui stylus brevissimus aut 0; stigma tubulosum hians. Capsula minima 1-sperma non dehiscens. Fructus seu strobilus ex squamarum & capsularum conniventia sphaericus, superficie interdum inæqualis, bacciformis carnosus parvus. *Arbores aut frutices suffruticesve, ramis sæpè alternis; folia in Sabinâ opposita, in cæteris 3-4 verticillata, nunc in Junipero T. patentia linearia oblonga acuminata, nunc in Cedro T. brevissima squamiformia imbricata; amenta in ramulis terminalia aut axillaria ut & baccæ.*

**CUPRESSUS**, T. L. \* *Cyprès*. Monoïca. MASC. Amentum ovatum imbricatum squamis (circiter 20) oppositis, apice peltatis, basi 4-andris; antheræ sessiles. FÆM. Conus subrotundus, squamis 8-10 oppositis peltatis. Germina sub singulis plurima minima serie simplici; his stylus 0; stigma cylindricum fistulosum apice patens. Nux angulosa parva 1-sperma, dehiscens squamis decidua. *Arbores aut frutices ramis sæpè alternis; folia C. distichæ linearia abietiformia distichè alterna decidua, C. Lusitanicæ juniperina subulata opposita, cæterarum opposita aut 3 verticillata brevissima squamiformia densè & decussatim imbricata perennia; amenta terminalia; coni terminales aut axillares.*

**THUYA**, T. L. \* Monoïca. MASC. Amentum ovatum squamis 6 trino ordine oppositis, apice obtusis, basi 4-andris; antheræ substipitatæ. FÆM. Conus subovatus squamis oblongis apice incrassatis longitudinaliter conniventibus. Sub singulis germina 2 minima, quibus stylus brevissimus; stigma concavum. Capsulæ totidem 1-spermæ margine alato. *Arbores aut frutices frondibus sæpè complanatis; folia squamiformia brevissima opposita, in T. aphyllâ distantia, in cæteris imbricatim conferta; amenta terminalia; coni terminales aut axillares, laeves aut squarrosi, in T. aphyllâ 4-valves seu 4-squamosi.*

**ARAUCARIA**. \* **PINUS**, Mol. \* **DOMBEYA**, Lamark. \* Dioïca? MASC. Squamæ numerosæ in amentum ovatum disciforme imbricatim & spiraliter suprà axim communem compactæ, filamentorum æmulæ, apice dilatatæ & in acumen oblongum reflexum desinentes, infrà angustiores complanatæ, utrinque pluribus obtectæ antheris longis adnatis parallelis, apice con-



natis, basi divaricatis emissio polline. Fœm. Germina numerosa; in strobilum maximum ovatum similiter disposita... Capsulæ totidem coriaceæ, oblongæ, infra attenuatæ subturbinatæ 1-loculares 1-spermæ semine oblongo amygdaliformi, superius latiores compressæ squamiformes, squamâ duplici (fortè stigma?), alterâ interiore angustâ brevi unguiformi, alterâ extimâ latiore suberosâ in acumen inflexum desinente. Germina quædam sterilia fertilibus intermixta, omninò squamiformia & inferius compressa. *Arbor resinosa excelsa, apud Araucanos in Chiloë indigena testante Molinâ Chil. hist. (undè nomen), Proteæ facie sed Pino similior, indè dicta Pin du Chili; rami cruciatim quaterni; folia alterna rigida sessilia squamiformia, basi lata, apice acuminato-pungentia, in octuplicem spiram confertim imbricata, perennia; amenta terminalia ut & strobili; semen esculentum. A Pino & Abiete discrepat frondescentiâ, squamis masculis polyantheris, fœmineis dorsalibus nullis, fœmineis veris non capsulam geminam obtegentibus sed ipsismet capsularibus 1-spermis. Character ex siccis amentis strobilibusque ramulo insidentibus à Dombeyo datis.*

**PINUS**, T. L. \* *Pin.* Squamæ fœmineæ interiores oblongæ clavatæ apice incrassato inæquali anguloso & extus umbilicato. *Arbores resiniferæ; folia 2-5 ex eadem vaginâ brevi cylindricâ simul prodeuntia; amenta non solitaria, sed in racemum terminalem compacta observantibus Duhamelio & Lamark; strobili terminales. Cætera ut in Abiete squamis tenuibus & amentis solitariis & foliis non vaginatis præcipuè distinctâ.*

**ABIES**, T. \* **LARIX**, T. \* **PINUS**, L. \* *Sapin, Meleze. Monica. Masc.* Squamulæ numerosæ in amentum oblongum spiraliter & imbricatim supra axim communem dispositæ, filamentorum æmulæ, breves, apice sæpius dilatato inflexæ, infra angustiores 2-antheriferæ; antheræ 1-loculares oblongæ, squamis utrinque & subtus adnatæ, in longum dehiscentes, posthac infra distinctæ & liberæ, supra connexæ ac quasi cucullatæ. Fœm. Squamulæ numerosæ minimæ unguiformes, axi communi similiter appressæ sessiles, extus alterâ obtectæ squamâ dorsali coloratâ acuminatâ sæpè majore & tunc solâ in ordiente flore conspicuâ, basi intus digynæ & 2-glandulosæ glandulis stigmatiformibus. Maturescente fructu squamæ interiores plurimum ampliatae & tunc dorsalibus multò majores, latae & rotundatae margine tenui, in strobilum ovatum aut oblongum spiraliter & imbricatim compactæ; aliæ fertiles, intus basi instructæ capsulis 2 osseis testaceisve 1-spermis membranâ propriâ superjectâ tectis, ultrâ productâ & squamam vestiente alatis; aliæ steriles intermixtæ & membranis 2 vacuis tantum vestitæ. Squamæ dorsales fertilium sæpè persistentes emarcidæ & extenuatæ, sterilium sæpius evanidæ. Corculi perispermo albido concoloris radícula descendens & lobi palmati. *Arbores aut arbusculæ, ramis alternis aut verticillatis, balsamifluæ*



aut resinifera; folia alterna linearia acuminata, plerumque semper-virentia, in Larice T. plura fasciculata, in Abiete T. singula distincta; strobili solitarii ut & amenta, in Abiete terminales, in Larice per caulem sparsi seu axillares, monente Duhamelio. Larix balsamiflua; Abietes verae balsamifluae, foliatione complanata & strobilis rectis; Abietes Piceae resiniferae, foliatione circulari & strobilis inversis. An Larix ab Abiete sejungenda? An mutatis nominibus, utriusque squamæ masculæ pro filamentis antherarum, squamæ fæmineæ dorsales in sterilibus evanidæ pro stylis, squamæ fæmineæ interiores pro germinibus in fructum bicapsularem aut bilocularem convertendis rectius habendæ, deductâ ex Araucariæ fructu analogiâ? An ideò membrana seminibus superjecta interiorem mentitur capsulæ valvam, in Abiete solubilem, in Araucariâ insolubilem & apice tantum unguiformi distinctam?

OBS. Coniferarum semen verè bilobum extat, scissurâ duplici oppositâ profundiore lobos definiente; sed iidem in germinatione partiti & radiatim patentes divisuris linearibus verticillum mentiuntur polyphyllum involucro umbellifero æmulum, undè quædam Coniferae, & præcipuè Pinus, Polycotyledones dicuntur. Ex medio autem verticillo plumula assurgit centralis ut in cæteris Dicotyledonibus & radiculæ rectâ descendenti continua. Participes igitur Dicotyledonum indolis & seminis structurâ ferè conformes, ab his nequeunt omninò dimoveri Coniferae, lobis tamen partitis ac consequente peculiari toto habitu distinguendæ & in extremâ serie reponendæ. Amentaceis subsimiles florum dispositione & propterea ipsis à Tournefortio consociatæ, pluribus dissentiant signis ex partium conformatione & numero desumptis, nec alteri inter diclines ordini propius accedunt. Aroïdæ pag. 23. ex Adansonio affines, floribus quasi amentaceis & corculo intrâ perispermum carnosum centrali cylindrico similiter instruuntur, sed diffident corculo potiùs unilobo, & organis pluribus aliter constructis & habitu diversissimo. Musci p. 10. eodem iudice contermini, foliatione subsimiles & forsàn germinatione adhuc ambiguâ, dispares habitu herbaceo & floribus tum masculis tum fæmineis nunc Hedwigiano labore illustratis. An Coniferis propius Equisetum aut ablegandæ Ephedra & Casuarina huic affines? An duplex in Coniferis veris habenda sectio, altera Juniperum cum Thuyâ & Cupresso, altera Abietem cum Araucariâ & Pino complectens?

## CLASSIUM ET ORDINUM FINIS.

Classes 15, Ordines 100, Genera 1754.



## Index methodicus Plantarum incertæ sedis.

- Monopetale.* { *germine supero* } *monogynæ* { 3-andræ. Willichia. Maba:  
4-andræ. Stilbe. Amasônia. Simbuleta. Galipaz.  
Moscharia. Penæa. Eriphia.  
5-andræ. Tapura. Bassovia. Geniostoma. Galax.  
Badula. Doræna. Porana. Moutabea. Ropourea.  
Weigela. Bladhia. Lerchea. Raputia. Monniera  
6-andræ. Saraca.  
10-andræ. Codon. Ceodes.  
*polygynæ* . . .  
*germine infero*, 1-gynæ, 1-andræ. Phyllachne. 2-andræ. Forstera.  
4-andræ. Chloranthus. 5-andræ. Pongatium.
- Polypetale.* { *germine supero* } *monogynæ* { 1-andræ. Qualea. Vochisia. 2-andræ. Dialium.  
3-andræ. Salacia.  
4-andræ. Gevuina. Orixia. Skimmia. Krameria. Do-  
bera. Azima. Schæfferia.  
5-andræ, 1-stylæ. Roridula. Sauvagesia. Lophan-  
thus. Embelia. Payrola. Catha. Calodendrum.  
Gluta. *polystylæ*. Astronium. Melicytus. Pen-  
nantia. Ruyschia. Souroubea. Commerfonia. Al-  
drovanda. Scheffera.  
6-andræ. Lindera. Soulamea. Nandina.  
8-andræ. Melicope. Saffia. Margaritaria. Clausena.  
Barbylus. Codia.  
10-andræ. Monotropa. Dionæa. Hippomanica. Ou-  
ratea. Crinodendrum. Deutzia.  
10 - 12 - andræ, 1-stylæ. Agathophyllum. Eurya.  
Apactis. Cassipourea. Crostostylis. *polystylæ*. Eu-  
clea. Aristotelia.  
*polyandré*, 1-stylæ. Soramia. Glabraria. Dolio-  
carpus. Cleyera. Calinea. Caraipa. Vantanea.  
Touroulia. Vallea. Mahurea. Houmiria. Trilix.  
Sarracenia. *polystylæ*. Caryocar.  
*polygynæ*. Temus.  
*germine infero*, *monogynæ*, 3-andræ. Aphyteia. Tontelea.  
5-andræ. Strumpfia. 6-andræ. Adenia. *Polyandré*. Begonia.
- hermaphroditæ.* { *germine supero* } *monogynæ* { 3-andræ. Meborea. 4-andræ. Cometes.  
5-andræ. Amanoa. 6-andræ. Capura.  
8-10-andræ. Scopolia. Aniba. Plegorhiza. Ana-  
vinga. Aquilaria. Samyda.  
12-20-andræ. Cassytha. Tomex.  
*polyandré*, 1-stylæ. Tounatea. Segueria. Mærua.  
*polystylæ*. Ablania. Mourera.  
*polygynæ*. Coriaria.  
*germine infero*, 1-gynæ, 1-andræ. Mniarum. 4-andræ. Catonia.  
Gonocarpus. 5-andræ. Linconia. *Polyandré*. Trewia.  
1-andræ. Ascarina. 3-andræ. Glochidion. Meryta.  
4-andræ. Trophis. Batis. 5-andræ. Antidesina.  
6-andræ. Tonina. 8-10-andræ. Siparuna.  
12-andræ. Myroxylon. Nepenthes.  
*polyandré* . . .  
*polygynæ*. Quillaja. Pandanus. Balanophora.  
*germine infero*, 1-gynæ. Cynomorium, Datisca.
- Ape-  
rta.* { *diclines.* } *germine supero* } *monogynæ* {



## PLANTÆ INCERTÆ SEDIS.

ENUMERATIS classium præcedentium generibus, quædam supersunt ordinibus descriptis non adjicienda, seu signo peculiari ab iisdem verè discrepent futura novorum ordinum primordia, seu minùs nota & in vivis nondùm definita integrum non exhibuerint observanti caracterem quo vera statuatur horum affinitas. Pauca dantur penitus perspecta & tamen non ordinata, ut Penæa, Stilbe, Badula, Monniera, Roridula, Sauvagesia, Monotropa, Sarracenia, Anavinga, Samyda, Coriaria, Pandanus, Begonia, Datisca &c., quibus insuper accedunt nonnulla dubitanter jam præmissis ordinibus in calce seorsùm addita, suadente quâdam cum ipsis cognatione. Plura nunc ambigua utpotè parùm cognita, posthàc in admissos forsàn diffundentur ordines, ulteriori examine illustrata. Has tamen omnes, licèt à cæteris diversissimas aut designatione incertas, non ideò juvat plantas prætermittere donec rectiùs innotuerint ordinibus tunc jure cooptandæ, sed easdem in methodicâ distributione terminali componere opportunum videtur, quâ facilior evadat harum disquisitio. Ea enim est systematum utilitas, non ut quærenti manifestent plantarum naturam seu integram organisationem, sed ut citiùs iis juvantibus plantæ paucis caracteribus designatæ in indice methodico reperiantur, nomine proprio mox appellandæ. Manca quidem ac circumscripta nimis scientia iis innixa, sed ideò facilior, tyronibus acceptior, & libenter admittenda in generum ordinatione quorum affinitas occultatur aut incompti manent præcipui characteres. Methodicos inter indices is præ cæteris eligendus qui naturam propiùs collimat veros minùs disturbans ordines, & indè Tournefortiana methodus systemati prævalet Linnæano licèt accuratiori. Sed ex observatis p. 93, eadem in primariis classibus corollæ præsentia & partitione definitis optima, aberrat tùm in secundariis ex formâ deductis, tùm in herbarum & arborum distinctione minimè naturali (p. 344), sectiones quasdam posthàc aptiùs designans mutuo fructûs & calicis situ. Primarii igitur delibandi hujus characteres in sequenti indice, secundariis subrogandus pistilli situs, & prætereà in ulteriori divisione ultrò mutuandus ex Linnæano systemate staminum numerus,



---

 MONOPETALÆ GERMINE SUPERO.
 

---

**WILLICHIA**, L. \* Calix 4-fidus persistens. Corolla 1-petala rotata, limbo plano 4-lobo. Stamina 3, limbi divisuris (exceptâ infimâ) inserta. Germen 1 superum; stylus 1; stigma 1. Capsula subrotunda 2-locularis 2-valvis dissepimento opposito, polysperma receptaculo globoso ex 2 hemisphæriis (dissepimento utrinque appositis?) *Herba repens; folia alterna subpeltata; pedunculi 2 axillares 1-flori. Character ex Linnæo.*

**MABA**, Forst. \* Dioica. Calix 3-fidus. Corolla tubulosa limbo 3-fido, inserta... MASC. Stamina 3 in imo flore, non epipetala. Rudimentum pistilli. FÆM. Germen... Drupa supera ovata 2-locularis loculis 2-spermis; nuclei 3-quetri. *Arbuseula glabra alternifolia; pedunculi axillares sæpè 3-flori. Calix, corolla & juniora folia villosissima sunt. Character ex Forst. t. 61 & ex L. Suppl.*

**STILBE**, Berg. L. \* Calix 5-partitus aut tubulosus 5-fidus, extus 3-bracteatus bracteis paleæformibus. Corolla hypogyna 1-petala tubulosa, fauce barbatâ, limbo 4-fido (5-partito ex Berg.) æquali. Stamina 4, fauci sub pilis inserta, laciniis alterna; antheræ parvæ. Germen 1 superum; stylus 1 filiformis; stigma 1. Semen 1 calice tectum. *Frutices Phyllicæ aut minimæ Abietis facie; folia linearia conferta, verticillatim aut spiraliter imbricata; flores supra axim tomentosum terminalem aut in ramorum dichotomiis medium dense spicati, in distincto frutice masculi ex Linnæo. Affinis Proteæ sed corollata, Phyllicæ sed 1-petala 1-sperma; affinior fortè Globulariæ aut Selagini p. 110.*

**AMASONIA**, LS. \* Calix campanulatus sub5-fidus æqualis persistens. Corolla longior tubulosa, limbo 5-fido subæquali patente. Stamina 4 didynama ascendentia exserta. Germen 1 superum; stylus 1; stigmata 2. Nux ovata 1-locularis. *Herba simplex alternifolia; flores racemosi terminales bracteati secundi, pedicellis sub3-floris. Character ex L. Suppl.*

**SIMBULETA**, Forsk. \* Calix campanulatus 5-fidus persistens. Corolla campanulata limbo 2-labiato, superius 2-fido reflexo, inferius longiore 3-lobo. Stamina 4 didynama epipetala, antheris connatis. Germen 1 superum; stylus 1; stigma capitatum. Fructus... *Herba pedalis, habitu Polygalæ; folia alterna, sparsa linearia; flores racemosi terminales, pedicellis 1-floris 1-bracteolatis. Character ex Forsk. Confer cum Veronicis & Piripæâ p. 100.*

**GALIPÆA**, Aubl. \* Calix tubulosus 4-5-dentatus. Corolla disco inserta 1-petala tubulosa, limbo profundè 4-5-fido. Stamina 4 didynama epipetala, 2 longiora fertilia antheris oblongis, 2 minora sterilia. Germen 1 superum 4-5-gonum; stylus 1; stigma 4-sulcum. Fructus... *Frutex multicaulis; folia alterna,*



*ternata petiolo marginato ; flores corymbosi axillares aut terminales. Character ex Aubl. Guyan. t. 269. Confer cum Raputia p. 121.*

**MOSCHARIA**, Forsk. \* Calix globosus villosus apice 5-dentatus persistens. Corolla membranacea hyalina, calyptræ instar apice non dehiscens. Intus antheræ 4 sessiles didymæ connatæ. Germen quadruplex ; stylus 1 ; stigma 1. Semina 4 nuda. *Herba multicaulis moschum spirans, caulibus 4-gonis ; folia opposita ; flores solitarii axillares. Character ex Forsk. Confer cum Labiatis & Dracocephalo p. 116.*

**PENÆA**, L. \* Calix 2-phyllus, foliolis oppositis bracteiformibus deciduis. Corolla duplò longior & latior, campanulata aut infundibuliformis, limbo 4-fido brevi. Stamina 4, summæ corollæ inserta & ejusdem laciniis alterna ; antheræ erectæ, non bicornes. Germen 1 superum ; stylus 1 filiformis aut 4-gonus angulis membranaceis ; stigma capitatum aut 4-lobum. Capsula 4-locularis 4-valvis, valvis medio septiferis, loculis 2-spermis, axi centrali nullo. *Frutices, infra foliorum caducorum vestigiis scabri, supra foliosi ; folia cruciatim opposita, sessilia, imbricatim approximata quadruplici serie, superiora propè florem squamiformia colorata, undè calix in quibusdam quasi polyphyllus imbricatus ; flores terminales sessiles, solitarii aut plures congesti ; fructus Acanthorum sed 4-locularis. An indè genus iisdem affine ? Character ex siccis.*

**ERIPHIA**, Brown. \* Calix ventricosus 5-dentatus. Corolla tubulosa, fauce ampliata, limbo 5-lobo parvo. Stamina 4 epipetala, filamentis conniventibus arcuatis, antheris agglutinatis ; rudimentum quinti staminis. Germen 1 superum ; stylus 1 ; stigma 2-fidum. Bacca calice tecta & coronata, globosa, lineâ utrinque exarata, 1-locularis polysperma seminibus minutissimis receptaculo centrali affixis. *Herba ; folia opposita ; flores conferti axillares. Character ex Brown. Jam. Confer cum Scrophulariis & Achimene p. 119.*

**TAPURA**, Aubl. \* Calix 6-partitus 3-bracteatus. Corolla hypogyna 1-petala 2-labiata, superius longior concava erecta, inferius brevior 2-loba latior. Stamina 5 epipetala, quorum 4 didynama sub labio superiore, 1 longissimum è basi labii inferioris. Germen superum 3-gonum ; stylus 1 longus ; stigma 3-lobum. Fructus . . . *Frutex ramosus ; folia alterna simplicia 2-stipulacea stipulis caducis ; pedunculi axillares solitarii multiflori, floribus minimis villosis. Character ex Aubl. Guyan. t. 48. Confer cum Scrophulariis aut Bignoniis p. 137.*

**BASSOVIA**, Aubl. \* Calix 5-partitus. Corolla 1-petala hypogyna, tubo brevi, limbo patente 5-partito acuto. Stamina 5 brevia, imis corollæ laciniis inserta. Germen 1 superum, disco infidens ; stylus 1 brevis ; stigma obtusum. Bacca ovata superficie inæqualis, polysperma seminibus reniformibus membranâ marginatis, in pulpâ nidulantibus. *Herba multicaulis ; folia alterna*



*magna ; flores corymbosi axillares parvi. Character ex Aubletio Guyan. t. 85.*

**GENIOSTOMA**, Forst. \* Calix turbinatus 5-fidus persistens. Corolla 1-petala tubulosa, fauce barbatâ, limbo 5-partito. Stamina 5 in fauce corollæ, ejusdem lobis alterna. Germen 1 superum; stylus 1; stigma sulcatum. Capsula oblonga 2-locularis polysperma. *Character ex Forst. t. 12.*

*Guinea*  
**GALAX**, L. \* Calix 10-partitus, laciniis alternis interioribus (petala ex Gronov.) longioribus. Corolla 1-petala (nectarium ex Gron.) tubo cylindrico, limbo 5-fido. Stamina 5 filamentis brevibus, antheris subrotundis, fauci corollæ inserta & conniventia. Germen 1 superum; stylus 1; stigmata 2 (1 ex Gron.). Capsula 1-locularis elasticè 2-valvis 2-sperma. *Character ex Linn. Caulis nudus simplicissimus; folia nulla; spica alba laxa terminalis, ex Gronovio.*

**BADULA**. \* Calix minimus 5-lobus. Corolla (hypogyna?) 1-petala tubo brevissimo, limbo 5-partito patente. Stamina 5 imis corollæ laciniis inserta, calicinis alterna; antheræ subsessiles. Germen 1 superum; stylus 1 brevissimus; stigma capitatum. Bacca pisiformis depressa, exsucca 1-sperma semine arillato, arillo pulposo striato. *Frutex diffusus; folia in ramulis conferta alterna; flores racemoso-paniculati axillares numerosi. Character ex Commerf. herb. Borbon. ubi Bois de Pintade dicitur. Confer Celtidem Plum. ic. 80, & Tinum... seu Badulam Zeylanensium Burm. Zeyl. t. 103. Congener in Suriani herb. n. 790 datur Americana species. An Embeliæ affinis p. 427?*

**DORÆNA**, Thunb. \* Calix 5-fidus. Corolla 1-petala 5-fida. Stamina 5, tubo corollæ inserta; antheræ subsessiles oblongæ inclusæ. Germen superum; stylus 1; stigma emarginatum. Capsula pisiformis 1-locularis 1-valvis polysperma. *Arbor ramis alternis; folia alterna; flores racemosi axillares. Character ex Thunbergio Japon.*

**PORANA**, Burm. L. \* Calix 5-partitus. Corolla longior 1-petala, campanulata 5-fida æqualis. Stamina 5, inter lacinias corollæ. Germen 1 superum; stylus 1 bifidus; stigmata 2 capitata. Fructus... 2-valvis. *Frutex volubilis glaber; folia alterna; flores paniculati, supernè axillares & terminales (an quidam masculi apetalii?). Character ex Burm. Ind. t. 21 & ex Linn. Confer cum Borragineis & Ehretiâ p. 128.*

**MOUTABEA**, Aubl. \* Calix tubulosus, basi ventricosus 5-fidus. Corolla 1-petala 5-partita inæqualis summo calici inserta. Filamentum unicum epipetalum latum, apice fornicatum & 5-dentatum, sub denticulis 5-antheriferum. Germen superum; stylus 1; stigma capitatum. Bacca prunitormis 3-locularis 3-sperma, feminibus (Chrysophylli) hylo inferiore notatis, arillatis & in pulpâ nidulantibus. *Frutex ramosus; folia alterna integra sub-*



coriacea; pedunculi axillares multiflori. *Caracter ex Aubl. Guyan. t. 274. An Sapotis affinis; an corculum in perispermio carnosio; an corolla verè perigyna?*

**ROPOUREA**, Aubl. \* Calix 5-partitus. Corolla hypogyna 1-petala, tubo brevissimo, limbo 5-lobo. Stamina 5 epipetala lobis alternis. Germen superum; stylus 1; stigmata 3-4. Bacca ovata magna villosa 4-locularis, loculis intus pulposis & polyspermis. *Frutex caule simplici nodoso; folia ad nodos verticillata plura, alternè & impari-pinnata, petiolo communi sub singulis foliolis aculeato; flores axillares glomerati subsessiles. Caracter ex Aubl. Guyan. t. 78.*

**WEIGELA**, Thunb. \* Calix 5-partitus laciniis subulatis. Corolla infundibuliformis, tubo intus villosa, limbo campanulato sub-5-lobo. Stamina 5, tubo inserta, antheris basi bifidis. Germen superum 4-gonum; stylus è basi germinis; stigma peltatum. Fructus... (semen nudum?). *Frutex ramis oppositis, ramulis sub-4-gonis; folia opposita; pedunculi axillares apice 2-bracteati, intra bracteas 3-flori. Caracter ex Thunb. Jap. An affinis Apocineis?*

**BLADHIA**, Thunb. \* Calix brevis 5-partitus persistens. Corolla rotata 5-partita. Stamina 5 breviter epipetala, antheris conniventibus. Germen superum; stylus 1; stigma 1. Bacca pisiformis, stylo mucronata 1-locularis 1-sperma semine arillato. *Suffrutices; folia opposita; pedunculi axillares pauciflori. Caracter ex Thunb. Jap. An affinis Apocineis?*

**LERCHEA**, L. \* Calix tubulosus 5-dentatus persistens. Corolla longior 1-petala infundibuliformis, limbo 5-partito. Stamina 5, filamentis in tubum (epipetalum?) omnino connatis. Germen superum; stylus 1, tubum trajiciens; stigmata 2-3. Capsula subglobosa 2-3-locularis polysperma. *Frutex inconditus ramulis subarticulatis; folia opposita stipulacea; spica terminalis longa filiformis, floribus remotis minutis. Caracter ex Linnæo. An Convolvulis, an Lyfimachiis affinis?*

**RAPUTIA**, Aubl. \* *Raputier*. Calix 5-fidus brevis. Corolla hypogyna tubulosa incurva, limbo erecto 5-partito inæquali subbilabiato. Staminum filamenta 5 quorum 2 superiora fertilia basi 2-squamulosa, 3 inferiora sterilia absque antheris. Germen 5-gonum, disco carnosio impositum; stylus 1; stigma crassiusculum subtrilobum. Capsulæ 5 coalitæ 1-spermæ intus 2-valves. *Frutex ramis oppositis; folia opposita, ternata, punctis pellucidis adspersa; flores spicati axillares, singuli bracteolati. Caracter ex Aubl. Guyan. t. 272. Affinis Monnieræ & Galipeæ p. 418.*

**MONNIERA**, L. \* Calix 5-partitus inæqualis. Corolla hypogyna tubulosa incurva limbo 2-labiato, suprâ integro, infrâ 4-lobo. Staminum filamenta 2, superius 2-fidum 2-andrum fertile, inferius 3-fidum 3-andrum antheris minutissimis (sterilibus?). Germen basi squamulâ stipatum, 5-lobum; stylus 1; stigma capitatum. Capsulæ 5 bivalves 1-spermæ, arillo 2-valvi



femen includente. *Herba ; folia ternata, inferiora opposita, superiora alterna ; flores cymosi terminales, in spiculis secundi. Character ex Linnæo & Aubl. Guyan. t. 293 & ex specimine sicco. An affinis Borragineis, an Spigeliæ p. 143 ?*

**SARACA**, Burm. L. \* Calix o. Corolla 1-petala infundibuliformis, faucis margine elevato, limbo 4-partito patente. Staminum filamenta 2 opposita, fauci infidentia (hypogyna ex Burm.), singula 3-partita & 3-antherifera antheris calcaneo instructis. Germen superum compressum ; stylus 1 declinatus ; stigma 1. Fructus . . . *Arbor ; folia alterna abruptè pinnata 3-4-juga ; spiculæ ovatæ in paniculam dispositæ, alternæ, bracteatæ bracteis oppositè imbricatis. Character ex Burm. Ind. & Linn. An affinis Leguminosis ?*

**CODON**, Royen. L. \* Calix 10-partitus laciniis subulatis. Corolla 1-petala campanulata basi torulosa, limbo 10-fido æquali. Stamina 10, filamentis basi 1-squamosis, squamis conniventibus ; antheræ crassæ. Germen superum ; stylus 1 ; stigmata 2. Fructus . . . *2-locularis polyspermus, seminibus hirtis in pulpâ exsuccâ coloratâ. Herba teres ramosa assurgens ; folia alterna subcoriacea glabra ; flores solitarii supræaxillares. Character ex Royen. & Linn. Fructus in specimine fructifero glutinoso & solaniformi undique aculeato à D. Banks misso capsularis ovatus acuminatus, 2-locularis polyspermus apice 2-valvis, dissepimento valvis opposito & iisdem mediis innascente. An idem cum plantâ Royeni ? An congener aut affinis Thuraria Molin. Chil., frutex multicaulis alternifolius cortice resinam thuri similem fundente, cui ex autore calix tubulosus, corollæ longior infundibuliformis integra 10-andra, styli 2, capsula 2-locularis 2-sperma ?*

**CEODES**, Forst. \* Calix o. Corolla 1-petala turbinata limbo 5-fido. Stamina 10, alterna corollæ æqualia, alterna ejusdem laciniis opposita breviora ; antheræ subrotundæ. Germen . . ; stylus 1 ; stigma dilatatum. Fructus . . . *Flores umbellati : an declines ? Character ex Forst. t. 71. An flores hermaphroditi distincti ; an germen his inferum ; an corollæ pro calice habenda ; an affinis Nyctaginibus ?*

## MONOPETALÆ GERMINE INFERO.

**PHYLLACHNE**, Forst. LS. \* Monoïca. Calix superus 3-fidus. Corolla 1-petala infundibuliformis limbo 5-fido patente. MASC. Stamen 1, filamentis inîrâ 2-glanduloso, inæ corollæ inserto. Germen inferum absque stylo, FÆM. Germen inferum ; stylus 1, basi 2-glandulosus ; stigma capitatum 4-tuberculatum. Bacca seu capsula 1-locularis polysperma. *Herba Magellanica Musci facie, densè cæspitosa ; folia minima imbricata subulata ; flores*




*terminales sessiles solitarii. Character ex Forst. t. 58. & L. Suppl. Commersonius cui Stibas dicitur, corollam vidit interdum 6-7-fidam & flores monoïcos hinc 1-andros, inde 1-gynos, cætera ignorans.*

**FORSTERA**, Forst. LS. \* Calix duplex, exterior inferus 3-phyllus lateralis, interior superus 1-phyllus 6-fidus. Corolla 1-petala (epigyna?) supera tubulosa limbo 6-partito æquali. Germen inferum; stylus cylindricus; stigmata 2 barbata. Antheræ 2 oppositæ, summò stylo sub stigmate insertæ subseffiles, singulæ squamulâ petaliformi (nectarium LS.) ad basim cinctæ. Capsula infera 1-locularis; semina numerosa scobiformia receptaculo columnari affixa. *Herba; folia imbricata integra avenia parva; pedunculi terminales solitarii 1-flori. Character ex L. Suppl. An Nyctaginibus affinis?*

**CHLORANTHUS**, Swartz L'Herit. \* **NIGRINA**, Thunb. \* Calix semisuperus, extus 1-dentatus, prætereà limbo integer non manifestus, basi 1-bracteatus. Petalum unicum minimum, medio germi hinc affixum, calicino denti superpositum, squamiforme concavum 3-lobum, lobo medio productiore 2-andro, lateralibus 1-andris. Antheræ 4 sessiles, petalo intus adnatæ, 2-valves. Germen semiinferum; stylus 0; stigma capitatum sub 2-lobum. Bacca minima sicca ovata 1-sperma, petalo & calicino dente deciduis eorum vestigio sensim elevato supra notata, ideò verè infera. *Suffrutex Sinensis procumbens multicaulis stolonifer, ramis oppositis nodosis ad nodos inferiores radicantibus; folia opposita, petiolis basi coeuntibus in vaginulam amplexicaulem utrinque 2-stipulaceam; flores oppositè paniculati terminales, in spiculis sessiles ramulo appressi, 1-bracteati bractea persistente. Genus idem cum Nigrinâ Thunb. Jap. quæ tamen ex Thunbergio 4-petala germine supero. Character ex L'Herit. sert. Angl. 35. t. 2. An affinis Rubiaceis utpotè stipulaceus; an potius Visco p. 221 quoad habitum simili?*

**PONGATIUM**. \* **PONGATI**, Rheed. \* Calix urceolatus semiinferus 5-fidus basi bracteatus. Tubus interior petaloïdeus 5-fidus minimus (medio calici insertus?). Stamina 5, tubo intus basi inserta. Germen semiinferum; stylus 0; stigma capitatum. Capsula semiinfera circumscissa 2-locularis polysperma, receptaculis seminiferis dissepimento utrinque affixis; semina minutissima. *Herba aquatica (Rheed. Mal. 11. t. 24); folia alterna; flores densè spicati terminales; horum tubus staminifer mox deciduus. Character ex sicco. Habitus Phytolacæ junioris. An affinis Samolo p. 97, aut Portulacæis?*





## POLYPETALÆ GERMINES SUPERÆ.

**QUALEA**, Aubl. \* Calix 4-partitus inæqualis coriaceus. Petala 2 hypogyna; superius infra breviter corniculatum; inferius majus. Stamen 1 hypogynum, filamentum oblongum; anthera oblonga. Germen superum; stylus 1; stigma 1. Fructus... 1-locularis polyspermus seminibus in pulpâ nidulantibus. *Arbores ramis oppositis; folia opposita integerrima (Calophylli) nervis parallelis numerosis, petioli basi 2-stipulaceâ stipulis caducis; flores trichotomè paniculati terminales divisuris 2-bracteatis. Character ex Aubl. Guyan. t. 1-2. An Guttiferis affinis?*

**VOCHISIA**. \* **VOCHY**, Aubl. \* Calix 4-lobus inæqualis. Petala 4 calici inserta & ejusdem lobis alterna inæqualia; superius magnum, basi corniculatum corniculo longo amplo; inferius magnum non corniculatum; lateralia 2 minora. Filamentum 1, imo calici (aut receptaculo?) insertum, latum membranaceum apice concavum, in cavitate 2-andrum antheris parallelis sessilibus oblongis. Germen superum 3-gonum; stylus longus carnosus; stigma hinc convexum, inde complanatum. Fructus... 3-locularis polyspermus. *Arbor ramulis oppositis 4-gonis; folia opposita integerrima, basi 2-stipulacea; flores Balsaminæ racemoso-spicati terminales pedicellis 1-floris 2-bracteolatis. Character ex Aubl. Guyan. t. 6. An petala potius hypogyna? Genus recognoscendum, nulli affine.*

**DIALIUM**, Burm. L. \* Calix 0. Petala 5 æqualia decidua. Stamina 2 ad latus germinis superius; antheræ oblongæ, quasi didymæ. Germen 1 superum; stylus 1; stigma 1. Fructus... *Arbor; folia alterna, impari-pinnata foliolis 3-jugis; flores paniculati. Character ex Burm. Ind. & ex Linn. Corticis papetarii Rumph. Amb. 3. t. 137 ab utroque pro synonymo adjecti (licet oppositifolii) fructus minimus ovatus 1-spermus nucleo lanuginoso, & habitus Weimmaniae cujus fortè congener ex Lamark.*

**SALACIA**, L. \* Calix minimus 5-partitus persistens. Petala 5. Antheræ 5 sessiles, germinis apici insidentes. Germen superum; stylus 1 brevissimus; stigma 1. Fructus... *Frutex ramis angulatis; folia (Pruni) alterna; gemmæ axillares multifloræ pedunculis 1-floris. Character ex Linnæo. Genus ex eodem affine Stilagini & ideo Antidesmæ sed polypetalum. An genus non hermaphroditum sed dioicum; an stamina non epigyna sed glandulæ in flore masculino mediæ inserta?*

**GEVUINA**, Mol. \* *Gevuin du Chili*. Calix 0. Petala 4, cruciatim disposita. Stamina 4, quorum 2 brevissima. Germen 1; stylus 1;



stigma crassiusculum. Capsula nuculæformis coriacea 1-locularis 1-sperma. *Arbor*; *folia* . . . *impari pinnata* 4-5-juga; *flores spicati-terminales*, in spicâ geminati, plurimi steriles; *fructus* *Avellanæ esculentus*, indè *Avellano Hispanis dictus*. *Caracter ex Molinâ Chil.* *Perispermum seminis à Dombeyo dati nullum*, & *capsula* *ferè Calophylli*.

**ORIXA**, Thunb. \* *Calix* 4-partitus brevis. *Petala* 4 . . . *Stamina* 4 breviora . . . *Germen* 1 superum; *stylus* 1; *stigma* capitatum. *Fructus* . . . *capsularis*? *Frutex ramis alternis*; *folia alterna integra*; *flores racemosi racemis alternis*, *pedicellis basi bracteatis*. *Caracter ex Thunb. Jap.*

**SKIMMIA**, Thunb. \* *Calix* minimus 4-partitus persistens, raro 5-partitus. *Petala* 4 minuta . . . *Stamina* 4 brevissima . . . *Germen* superum; *stylus* 1; *stigma* . . . *Bacca pisiformis umbilicata* 4-fulca sub 4-valvis, *farinaceo-pulposa* 4-sperma feminibus hinc angulatis, indè convexis. *Frutex ramis alternis*; *folia alterna conferta subverticillata sempervirentia*; *flores paniculati terminales*. *Caracter ex Thunb. Jap.*

**KRAMERIA**, Loëfl. L. \* *Calix* 0. *Petala* 4 subæqualia. *Nectarium* duplex; superius 3-partitum lineare membranaceum; inferius 2-phyllum lineare rugosum. *Stamina* 4 didynama, intrâ nectarium superius; *antheræ parvæ apice* 2-foraminulatæ. *Germen* superum; *stylus* 1; *stigma* 1. *Fructus globosus pisiformis*, undique pilis rigidis reflexis echinatus, 1-locularis non dehiscens 1-spermus semine glabro duro. *Frutex diffusè multicaulis*; *folia alterna* (*substipulacea* ?); *flores racemosi terminales*, in racemo alterni, *pedicellis basi* 1-bracteatis medio 2-squamosis. *Caracter ex Loëfl. & Linn.* In speciminis à D. Banks missi flore solitario vidi calicem 4-phyllum extûs villosum; *petala* 4 hypogyna subrotunda, 2 superiora unguiculata, 2 inferiora sessilia breviora; *stamina* 4 hypogyna quorum 2 superiora fortè sterilia filamentis approximatis & subcoalitis, 2 lateralia distincta longiora; cætera similia: an rectius? Confer in vivis.

**DOBERA**. \* **TOMEX**, Forsk. \* *Calix* urceolatus 4-dentatus. *Petala* 4, calice longiora. *Staminum filamenta* 4 subulata, basi in tubum 4-gonum connata; *antheræ erectæ*. *Squamulæ* 4 inter petala & stamina. *Germen* superum; *stylus* 1 brevis; *stigmata* 2. *Fructus ovatus tuberculofus carnosus*, intûs succoso-viscidus 1-spermus. *Arbor*, *Dober Arabum*; *folia opposita*, *petioli basi incrassatâ flavescente* (ut in *Guttiferis* ?); *flores confertim spicato-paniculati terminales*; *fructus edulis*. *Caracter ex Forsk. p. 32*, mutato nomine nunc alterius *Thunbergiani generis* 12-andri & apetalî proprio. An *Dobera Guttiferis*, an *Berberidibus*, an *Rhamnis* affinior? An *squamulæ petalis oppositæ*; an *petala & stamina hypogyna*; an *corculum perispermo instructum*?

**AZIMA**, Lamark. \* **MONETIA**, L'Herit. \* *Calix* ventricoso-



campanulatus 3-4-fidus. Petala 4 linearia, laciniis calicinis alterna, apice subreflexa. Stamina 4, receptaculo inserta, petalis alterna, filamentis incrassatis; antheræ sagittatæ incumbentes. Germen superum deflexum in stylum brevem; stigma 1 acutum. Fructus... capsularis subcarnosus pisiformis 1-locularis 2-spermus feminibus orbicularibus subcompressis, 1 sæpè abortivo. *Frutex sempervirens ramis rigidis spinosis, idem cum Monetiâ PHerit. fasc. 1. 1. & fortè cum Arbore spinosâ... Pluk. t. 148. f. 1., & habitu subsimilis Azimenæ (undè nomen) Madagascariensi; folia opposita integerrima coriacea apice acuto subpungente; utrumque basi sæpius 2 spinosum, undè spinæ 4 verticillatæ; flores axillares solitarii sessiles parvi. Fructus in sicco observatus; flos in vivo horti Parisiensis frutice sæpius florens, nunquàm frugifero, ideò fortè per abortum dioico. Character ex D. Lamark. Affinis Strychno aut Carissæ, sed polypetala.*

**SCHÆFFERIA**, Jacq. \* Dioïca. Calix 4-phyllus. Petala 4. MASC. Stamina 4, infimo germinis lateri affixa, petalis breviora; antheræ subrotundæ. Germen superum 2-fidum abortiens. FÆM. Germen superum; styli 2; stigmata 2. Bacca pisiformis 1-locularis pulposa 2-sperma. *Frutex ramis vimineis; folia in ramorum tuberculis fasciculata; pedunculi inter folia 1-flori aggregati. Character ex Jacq. Americ.*

**RORIDULA**, L. \* Calix 5-partitus persistens. Petala 5 hypogyna, calici alterna, æqualia. Stamina 5 hypogyna petalis alterna; antheræ oblongæ erectæ, apice poro gemino dehiscentes, basi infrà filamentum insertionem tuberculatæ. Germen superum, deflexum in stylum 1; stigma peltatum sub3-lobum. Capsula oblonga acuminata 3-valvis 3-locularis 3-sperma, valvis medio septiferis, receptaculo centrali gracili 3-gono, valvis mediis angulatim applicito, ad apicem seminifero; semina oblonga rugosa. *Suffrutex habitu Droseræ Lusitanicæ; folia conferta alterna semiamplexicaulia sessilia ciliata; pedunculi axillares & terminales, spicatum pauciflori, pedicellis 1-bracteatis. Character ex sicco specimine à D. Banks misso.*

**SAUVAGESIA**, L. \* Calix 5-partitus persistens erectus. Petala 5 hypogyna, calici alterna, decidua; squamulæ 5, petalis alternæ duplò minores hypogynæ, diutius persistentes, germini appositæ, extus cinctæ ciliis numerosis apice glandulosis staminiformibus hypogynis brevioribus. Stamina 5 hypogyna squamis alterna; antheræ longæ subsessiles 4-gonæ apice dehiscentes. Germen superum; stylus 1; stigma 1. Capsula oblonga 3-locularis polysperma, 3-valvis, valvarum marginibus basi intròflexis & seminiferis; receptaculum centrale nullum (aut tenuissimum junctis valvarum marginibus continuum). *Herba; folia alterna stipulacea stipulis ciliatis; pedunculi solitarii axillares 1-flori. Character ex sicco specimine.*



**LOPHANTHUS**, Forst. \* Calix tubulosus 5-fidus æqualis persistens. Petala 5 ungue tenui, hypogyna. Stamina 5 hypogyna. Germin superum villosum; stylus 1 brevis; stigma vix emarginatum. Fructus 1-spermus calice cinctus. *Florescentia subius bracteata. Genus Waltheriæ proximum. Character ex Forst. t. 14.*

**EMBELIA**, Burm. \* Calix minimus 5-fidus. Petala 5. Stamina 5. Germin 1 ... *Arbor; folia alterna; flores paniculati axillares & terminales; fructus baccatus grossularioides; cætera non observata. Nomen ex Burm. Ind. t. 23. Character ex Linn. Zeyl. n. 403 cui Ribesioides dicitur. Confer cum Badulâ p. 420.*

**PAYROLA**. \* **PAYPAYROLA**, Aubl. \* Calix 5-partitus. Petala 5 disco inserta, unguibus erectis in tubum conniventia, apice reflexa. Stamina 5 ibidem inserta; antheræ approximatae. Germin superum 2-loculare; stylus 1; stigma 2-lobum. Fructus ... *Frutex; folia alterna stipulacea; flores spicati axillares & terminales, singuli ad basim 3-glandulosi. Character ex Aubl. Guyan. t. 99.*

**CATHA**, Forsk. \* Calix crateriformis 5-dentatus. Petala 5 patentia. Stamina 5 breviora. Germin superum, basi cinctum disco cyathiformi undulato intrâ stamina prominulo; stylus brevis; stigma 1. Capsula oblonga 2-3-locularis 2-3-sperma. *Arbores ramis alternis; folia opposita aut alterna; interdum spinæ ramis axillares; pedunculi axillares solitarii dichotomè multiflori. Character ex Forsk. Confer cum Rhamnis & Evonymo.*

**CALODENDRUM**, Thunb. \* Calix 5-partitus parvus persistens, extus villoso-muricatus. Corolla 5-petala (antè explanationem 5-angularis) petalis unguiculatis undulatis villosis. Squamulæ seu petala interiora 5, apice glandulosa, receptaculo inserta. Staminum filamenta 5, 4 fertilia antheris dorso insertis, 1 sæpius sterile. Germin pedicellatum superum muricatum; stylus lateralis; stigma 1. Capsula 5-angularis muricata stipitata 5-locularis 5-valvis loculis 2-spermis, quibusdam interdum abortivis; semina pisiformia. *Arbor ramis oppositis aut ternis; folia fastigiatim opposita integra sempervirentia; flores paniculati terminales, pedunculis oppositis 1-floris; numerus partium in flore interdum varius (4-6). Character ex Thunb. diff.*

**GLUTA**, L. \* Calix membranaceus campanulatus deciduus. Petala 5, calice longiora, internè apposita stipiti germinis, supernè patentia. Stamina 5, summo eidem stipiti inserta sub germine; antheræ versatiles. Germin stipiti longo columnari insidens; stylus 1; stigma 1. Fructus ... *Arbor ramis apice foliosis; folia alterna magna nuda; panicula florum terminalis paniculata. Passifloræ affinis. Character ex Linnæo. Confer etiam cum Helictere, Sterculiâ &c., & in fructu præcipuè characterem inspicere: An 1-locularis ut in Passiflorâ; an multicapsularis ut in Helictere & aliis?*

**ASTRONIUM**, Jacq. L. \* Dioicum. Calix 5-phyllus coloratus.



Petala 5. MASC. Calix & corolla patentes. Glandulæ 5 nectareæ parvæ in disco floris. Stamina 5. FÆM. Calix & corolla conniventes ac persistentes. Germen superum; styli 3 reflexi; stigmata 3. Semen 1 lactescens, calice aucto & connivente tectum, dein eodem stellatim expanso maturius denudatum. *Arbores succo decolore terebintinaceo scatentes; folia impari-pinnata 3-juga; flores in ramulis laxè paniculati parvi; paniculæ fæmineæ longiores. Character ex Jacq. Amer.*

MELICYTUS, Forst. \* Dioïcus. Calix brevissimus 5-dentatus. Petala 5 patentia. MASC. Filamenta 5 (nectaria Forst.), petalis alterna, brevia clavata, apice excavata, latere interiore antherifera; antheræ 5, filamentis adnatæ, iis latiores & longiores. FÆM. Germen 1 superum, cinctum squamulis 5 (fortè filamenta sterilia); stylus 0; stigma 4-lobum stellatum. Fructus... (baccatus 1-locularis polyspermus?). *Character ex Forst. t. 62. An affinis Astronio?*

PENNANTIA, Forst. \* Calix 0. Petala 5 patentia. Stamina 5. Germen 1 superum 3 gonum; stylus 0; stigma peltatum sub-3-lobum. Fructus... (visio germine 2-locularis 2-spermus, altero loculo sæpius abortiente). *Flores corymbosi, in distinctâ plantâ masculi germine abortivo. Character ex Forst. t. 67. An affinis Canario? An fructus 3-locularis?*

RUYSCHIA, Jacq. \* Calix 5-phyllus parvus persistens, foliis imbricatis. Petala 5 majora. Stamina 5, filamentis planis. Germen 1 superum; stylus 0; stigma 4-angulum cruciforme. Bacca... *Suffrutex arborum parasiticus; folia alterna crassa integerrima; flores alternè spicati terminales (interdum 6-7-andri), singuli pedicellati & sub calice 3-bracteati, bracteis 2 brevibus, intermediâ longiore anterius convexâ, posterius concavâ. Character ex Jacq. Amer. t. 51. f. 2. Confer cum Souroubeâ.*

SOUROUBEA, Aubl. \* Calix 5-6-phyllus coriaceus. Petala 5 hypogyna carnosæ. Stamina 5 hypogyna, petalis opposita & incumbentia, filamentis basi latis. Germen superum 5-striatum; stylus vix ullus; stigma planum 5-radiatum. Fructus 5-locularis... *Arbuseula ramis sarmentosis; folia alterna crassa integra; flores sulphurei, alternè & laxè spicati terminales, singuli pedicellati & 1-bracteati bractea magnâ corallinâ carnosâ 3-lobâ, lobis lateralibus concavis, intermedio cylindrico tubuloso clauso. Character ex Aubl. Guyan. t. 97. An genus Ruyschiæ congener; an Rhamnis, an Berberidibus affine?*

COMMERSONIA, Forst. \* Calix 5-partitus. Petala 5, calici inserta & ejusdem lobis alterna, basi utrinque lobo inflexo dilatata. Stamina 5 brevissima, unguibus petalorum inserta. Tubus intrâ stamina 10-partitus (nectarium LS.), laciniis alternis lanceolatis, alternis filiformibus villosis. Germen 5-torulosum; styli 5 approximati; stigmata 5. Capsula globosa



setis plumosis echinata, 5-locularis loculis 2-spermis. *A bor* (eadem cum *Restiaria Rumph. Amb. 3. t. 119 ex Forst.*); folia alterna (stipulacea?); flores parvi paniculati; fructus *Spa-manniæ*. *Caracter ex Forst. t. 22 & ex L. Suppl.*

**ALDROVANDA**, Mont. L. \* Calix 5-partitus persistens. Petala 5 persistentia. Stamina 5. Germen superum; styli 5; stigmata 5. Capsula 5-gona 1-locularis 5-valvis 10-sperma, parietibus seminiferis. *Caracter ex Linnæo. Herbula aquatica; folia verticillata 6-9, subrotunda vesiculosa, petiolo cuneiformi utrinque marginato ad apicem ciliato; flores solitarii axillares. Affinis Droseræ p. 245.*

**SCHEFFLERA**, Forst. \* Calix minimus urceolatus 5-dentatus persistens. Petala 5 parva, inter calicis dentes. Stamina 5, antheris subrotundis. Germen superum; styli 8-10, radiatim patentes, persistentes; stigmata 8-10. Capsula depressa 8-10-locularis 8-10-sperma, calice tecta. *Caracter ex Forst. t. 23.*

**LINDERA**, Thunb. \* Calix 0. Petala 6. Stamina 6, germini inserta. Germen superum; stylus 1; stigmata 2. Capsula 2-locularis... *Frutex ramis & ramulis alternis; folia in ramulis conferta terminalia integra; flores inter folia umbellati terminales umbellâ simplici. Caracter ex Thunb. Jap.*

**SOULAMEA**, Lam. \* *Bouati du Bengale.* Calix minimus 3-fidus. Petala 3 hypogyna (an potius 4, diuco glanduloso inserta?); antheræ subdidymæ. Germen superum compressum; stylus 0; stigmata 2 capitata. Capsula compressa ferè plana, obcordata, margine acuto, apice inter stigmata emarginato, 2-locularis 2-sperma, seminibus oblongis; perispermum corculi nullum & radícula ascendens. *Arbuscula, foliis alternis, in ramulorum apice confertis magnis; flores minimi racemosi terminales aut axillares, racemis brevibus. Caracter ex Lamark dict. & ex Commerf. specim. sicco innominato & ex Musæi mei fructu dicto Bouati & Soulamœ seu Rex amaroris Rumph. Amb. 2. t. 41.*

**NANDINA**, Thunb. \* Calix polyphyllus sexfariam imbricatus, squamis 6 in singulâ serie, caducis. Petala 6 longiora. Stamina 6, antheris oblongis subsessilibus. Germen superum; stylus 3-gonus brevissimus; stigma 3-gonum. Bacca pisiformis exsucca 2-sperma, seminibus hemisphæricis, imposita receptaculo globoso punctato. *Frutex multicaulis; rami vaginis foliorum vestiti, apice foliosi; folia supradecomposita ternata; flores paniculati terminales. Caracter ex Thunb. Jap.*

**MELICOPE**, Forst. \* Calix 4-partitus. Petala 4. Stamina 8. Germen superum, laminulis 8 crenatis basi cinctum; stylus brevis; stigma 1. Fructus... (4-spermus?). *Caracter ex Forst. t. 28.*

**SASSIA**, Mol. \* Calix 4-phyllus patens. Petala 4. Stamina 8 brevia, antheris subrotundis. Germen 1; stylus 1; stigma 1.



Capsula ovata 2-locularis 2-sperma. *Herbæ ; folia radicalia ; scapi 1-flori aut multiflori. Species multiflora tinctoria. Character ex Molinâ Chil.*

**MARGARITARIA**, LS. \* Dioïca. Calix 4-dentatus. Petala 4, calici inserta. MASC. Stamina 8, receptaculo inserta ; antheræ subrotundæ. Germen 1 ; stylus 1 ; stigma 1. FÆM. Germen 1 superum ; styli 4-5 ; stigmata 4-5. Bacca globosa, stylis acuminata, intus 4-5-cocca coccis 2-valvibus (1-spermis?) in nucem nitidam margaritæformem compactis. *Frutices? ... ; folia in masculis opposita & Evonymo similia, in fœminis alterna ; flores masculi paniculati numerosissimi ut in Spiræâ Arunco L., fœminei solitarii axillares. Character ex L. Suppl. Ex ipso masculus frutex fœminei fortè non congener.*

**CLAUSENA**, Burm. \* Calix 4-dentatus brevis. Petala 4 sessilia. Stamina 8, filamentis basi dilatatis incrassatis intus excavatis & germen ambientibus ; antheræ versatiles. Germen superum ; stylus 1 brevis ; stigma 1. Fructus... *Frutex Javanensis ; folia alterna pinnata ; flores racemoso-paniculati minimi. Character ex Burm. Ind. 87. t. 29.*

**BARBYLUS**, Brown. \* Calix campanulatus 4-5-fidus. Petala 4-5, calicis margini interiori affixa. Stamina 8-10, è fundo calicis orta, filamentis compressis ; antheræ ovatæ. Germen superum ; stylus 1 ; stigma 1. Capsula 3-locularis, loculis 2-spermis. *Arbor Jamaïcensis cortice scabro ; folia alterna pinnata ; flores racemosi. Character ex Brown. Jam. Confer cum Trichiliâ.*

**CODIA**, Forst. LS. \* Calix 4-phyllus. Petala 4 linearia, singula basi 2-andra, undè stamina 8. Germen 1 superum parvum ; styli 2 ; stigmata 2. Fructus... (4-spermus?). Flores capitati receptaculo communi globoso villosa, involucri receptaculi 4-phyllis. *Frutex? ... ; folia opposita integra glaberrima ; capitula axillaria & terminalia. Character ex Forst. t. 30. & ex L. Suppl. An Brunie congener ; an germen verè superum?*

**MONOTROPA**, L. \* **OROBANCHOÏDES**, T. \* **HYPOPITYS**, Dill. \* Calix 4-5-phyllus coloratus. Petala 4-5 hypogyna, calici alterna & concolora, cum ipso in cylindrum conniventia & simul decidua, basi productiore 2 appendiculatâ, intus cavâ, extus gibbâ. Stamina 8-10 hypogyna ; antheræ parvæ. Germen superum ; stylus 1 cylindricus ; stigma dilatatum subpeltatum. Capsula 4-5-sulcata 4-5-locularis 4-5-valvis polysperma, valvis medio semiseptiferis, receptaculo centrali 4-5-gono valvularum septis angulatim applicito ; semina numerosissima scobiformia receptaculo affixa. *Herbæ parasiticæ radicibus arborum innascentes ; radix densè squamosa squamis imbricatis ; caulis sæpè simplex, alternè squamosus squamis distantibus, præterea aphyllus ; flores terminales, in M. uniflorâ solitarii 10-andri, in M. hypopity spicati aut spicato-paniculati, spicâ florente in-*



*flexa, maturiore recta, singuli bracteati, superiores (sape unus tantum) 10-andri 5-petali 5-loculares, inferiores 8-andri 4-petali 4-loculares aut interdum 3-loculares. Habitus Orobanthes; caracter diversus. Genus sui ordinis, nulli affine.*

**DIONÆA**, Ell. L. \* Calix 5-phyllus persistens. Petala 5. Stamina 10, antheris subrotundis. Germen superum; stylus 1; stigma patens fimbriatum. Capsula 1-locularis polysperma; semina minima, imæ capsulæ affixa. *Herba; folia alterna radicalia, petiolo marginato magno insidentia, subrotunda, supra 3-4-ciliata, sensibilia ad levem insecti appulsum mox conduplicanda & inde muscicapa; flores in scapo subumbellati terminales, singuli 1-bracteolati. Character ex Linnæo. An affinis Droseræ aut Roridulæ.*

**HIPPOMANICA**, Mol. \* Calix 5-partitus. Petala 5 ovata. Stamina 10. Germen 1; stylus 1; stigma 1. Capsula 4-locularis polysperma feminibus reniformibus. *Herba annua in pascuis noxia, multicaulis; caules 4-anguli; folia opposita simplicia integra crassiuscula; flores terminales lutei. Character ex Molinâ Chil. An Zygophyllo affinis; an folia stipulacea?*

**OURATEA**, Aubl. \* Calix 5-phyllus. Petala 5 hypogyna subrotunda. Stamina 10 hypogyna; antheræ oblongæ, in tubum stylo trajectum approximatae. Germen superum 5-angulare; stylus 1; stigma sub5-fidum. Fructus... *Arbor altissima; folia alterna stipulacea longa; flores laxè paniculati terminales odori. Character ex Aubl. Guyan. t. 152.*

**CRINODENDRUM**, Mol. Cav. \* *Patagua du Chili.* Calix 0. Petala 6 in campanam conniventia. Stamina filamenta 10, basi in tubum coalita; antheræ ovatae. Germen superum; stylus 1; stigma... Capsula coriacea 3-gona 1-locularis, elasticè 3-valvis 3-sperma. *Arbor; folia opposita; flores pedunculati sparsi, Liliæ odore. Character ex Molinâ Chil. & ex Cavan. diff. t. 158. f. 1. Capsulæ à Dombeyo data, Patagua dicta, similiter 3-valves, sed valvis medio septiferis 3-loculares loculis 2-4-spermis, corculo intrâ perispermum carnosum plano, inde Rhamnis & Evonymo affines, fortè congeneres Crinodendri rectius describendi collatis herb. Dombeyani speciminibus.*

**DEUTZIA**, Thunb. \* Calix brevis 5-fidus, rarò 6-fidus. Petala 5, rariùs 6. Stamina 10, filamentis sub apice 3-cuspidatis alternis brevioribus. Germen superum medio concavum; styli 3, rariùs 4; stigmata totidem. Capsula globosa parva perforata callosa, styliis 3-aristata 3-valvis 3-locularis, rariùs 4-locularis, loculis polyspermis. *Arbor ramosissima (ramis & ramulis alternis in descript., oppositis in icone); folia opposita scabra, poliendo ligno apta; flores paniculati terminales, in paniculis alterni. Character ex Thunb. Jap. 185. t. 24. In icone panicula pauciflora & fructus inferus depinguntur. Genus ergò recognoscendum.*

**AGATHOPHYLLUM**. \* **RAVENSARA**, Sonn. \* *Raven-tsara.* Calix 1-phyllus minimus truncatus integer. Petala 6, calici inserta



parva, intus villosa. Stamina 12, filamentis brevibus, antheris subrotundis; horum 6 calici inserta, 6 alterna & imis petalis infixa. Germen superum; stylus brevis; stigma 1. Nux drupâ tenui vestita, subsphærica infra depressa, suprâ acuminata, coriaceo-lignea intus basi semi6-locularis 1-sperma, semine magno infra 6-lobo, dissepimentis coriaceis lobos distinguentibus. *Arbores; folia alterna laurina; flores paniculati, terminales aut summis foliis axillares; fructus sæpè solitarii terminales notante Flacurtio, undè forsàn arbores frugifera à floriferis diversa. Character ex Sonner. Ind. 2. p. 226. t. 127, & ex fructu sicco. Semen instar Juglandis infra lobatum, oleosum insipidum. Sapor drupæ, corticis & præcipuè foliorum aromaticus caryophylleus, undè Madagascariensium nomen Raven-tsara, id est folium bonum, seu Αγαθοφυλλον. Affine Heisteria p. 260 utpotè polypetalum: an potius mutato perianthii nomine apetalum & affinius Lauris p. 80?*

**EURYA**, Thunb. \* Calix 5-phyllus, caliculo 2-phylo cinctus. Petala 5. Stamina 13, antheris subsessilibus. Germen 1 superum, margine purpureo infra cinctus ad basim staminum; stylus 1; stigmata 3. Capsula globosa parva, stylo persistente acuta, 5-locularis 5-valvis loculis 3-spermis; semina 3-quetra. *Frutex ramis & ramulis alternis; folia in ramulis alterna, disticha semper-virentia; pedunculi 1-3 axillares 1-flori. An flores dioici? Character ex Thunb. Jap. t. 25.*

**APACTIS**, Thunb. \* Calix 0. Petala 4. Stamina 16-20. Germen superum; stylus 1; stigma ... *Fructus ... Arbor ramosissima ramis alternis; folia in ramulis alterna; flores ibidem racemosi. Character ex Thunb. Jap.*

**CASSIPOUREA**, Aubl. \* Calix turbinatus 4-5-dentatus. Petala 5, imo calici inserta, unguiculata, oblonga, pennato-diffecta. Stamina 18, calici inserta. Germen superum; stylus longus villosus; stigma 1. *Fructus ... Arbuscula ramis oppositis; folia opposita substipulacea; flores axillares 2-bracteati. Character ex Aubl. Guyan. t. 211. An affinis Lagerstromiæ p. 331?*

**CROSSOSTYLIS**, Forst. \* Calix 4-angularis 4-fidus, imo germi adnatus, persistens. Petala 4 unguiculata, perigyna, calici alterna. Stamina circiter 20, filamentis connatis in annulum latum, interjectis totidem filamentis minimis sterilibus. Germen 1 superum; stylus 1 persistens; stigma cruciatim 4-lobum lobis 3-fidis. Bacca supera hemisphærica multistriata 1-locularis polysperma, receptaculo centrali seminifero; semina numerosa minima. *Character ex Forst. t. 44. An affinis Salicariis?*

**EUCLEA**, L. LS. \* Dioica. Calix minimus 5-dentatus. Petala 5... **MASC.** Stamina 15 breviter. **FÆM.** Germen 1 superum; styli 2; stigmata 4-dentata. Bacca 2-locularis 2-sperma. *Arbores; folia alterni integerrima perennia; flores racemosi; racemi simplices supremis foliis axillares. Character ex L. Suppl.*

**ARISTOTELIA**,



**ARISTOTELIA**, L'Herit. \* *Maqui du Chili*. Calix turbinatus, disco latiore intus vestitus, limbo 5-6-fidus. Petala 5-6, calicis alterna, ejusdem disco extus inserta. Stamina 15-18 ibidem inserta, & ternatim quinquies aux sexies calicinis laciniis opposita, petalisque alterna; filamenta brevissima; antheræ oblongæ erectæ, versus basim filamentis infixæ. Germen superum minimum; styli 3; stigmata 3. Bacca pisiformis 3-locularis, loculis 1-2-spermis, seminibus hinc convexis & inde angulatis; corculum planum in perispermio carnosio. *Frutex Chilensis ramis oppositis; folia opposita, stipulacea stipulis caducis; flores racemosi axillares & terminales, in racemis suboppositi & bracteolati. Character ex sicco specimine Dombeyano & ex D. L'Herit. fasc. t. 2, quæ antheras in vivo vidit steriles: an inde flores dioici? Baccæ edules è quarum succo peculiare in Chilensi regno vinum conficitur, teste Dombeyo. Genus affine hinc Tiliaceis aut Cistis, inde Rhamnideis & Evonymo, aut rectius Homalio & Blackwellia p. 343, forsân ideò perispermio instructis.*

**SORAMIA**, Aubl. \* Calix 5-partitus patens persistens. Petala 5 hypogyna, calicis alterna. Stamina numerosa hypogyna. Germen superum; stylus longus incurvus persistens; stigma capitatum. Bacca cerasiformis 1-sperma, semine membranâ viscosâ involuto. *Frutex sarmentosus; folia alterna; flores subcorymbosi axillares aut non axillares, pedunculis tenuibus. Character ex Aubletio Guyan. t. 219.*

**GLABRARIA**, L. \* Calix tubulosus 5-fidus. Petala 5 æqualia. Stamina 30, filamentis in 5 fasciculos senarios connexis. Setæ ex disco prodeuntes (nectarium L.) fasciculis interpositæ. Germen superum, disco impositum & basi cinctum; stylus 1; stigma 1. (Drupa pisiformis exsucca foeta nuce 1-spermâ ex Rumph.) *Arbor habitu Lauri Camphoræ; folia alterna integra; flores glomerati axillares non bracteati. Character ex Linnaeo. An affinis Styraci?*

**DOLIOCARPUS**, Rol. \* Calix 5-phyllus. Petala 3. Stamina plura hypogyna. Germen 1 superum; stylus 1; stigmata 2. Bacca 1-locularis 2-sperma. *Caulis scandens; folia alterna; pedunculi axillares 1-flori. Character ex Roland. æt. Holm.*

**CLEYERA**, Thunb. \* Calix obtusè 5-partitus persistens. Petala 5. Stamina circiter 30 breviora, germinis lateribus inserta, filamentis basi subcoherentibus, antheris didymis. Germen superum; stylus 1 filiformis; stigma emarginatum. Capsula pisiformis, calice persistente reflexo infra cincta 2-locularis 2-valvis... *Arbor glabra, eadem cum Mokokf Kæmpf. am. t. 774; rami & ramuli subverticillati; folia in summis ramulis subverticillata aut fasciculata, crassa sempervirentia; flores axillares pedunculis 1-floris. Vateriæ affinis. Character ex Thunb. Jap. An Cleyera rectè adjecta Mokokf cui ex Kæmpfero corolla 1-petala discoidea*



5-loba, stamina 40-50, fructus cerasiformis carne friabili, maturior dehiscens, 3-4-spermus seminibus reniformibus amisso pericarpio nudis, receptaculo centrali annexis? Confer utramque cum *Camelliâ*.

**CALINEA**, Aubl. \* Calix 3-partitus, extus 2-squamosus. Petala 3 hypogyna denticulata. Stamina numerosa hypogyna, antherarum loculis distinctis filamentis supra dilatato utrinque adnatis. Germen superum; stylus 1; stigma latius concavum. Fructus... (2-locularis 2-spermus?). *Frutex sarmentosus nodosus; folia alterna; flores axillares aut sparsi, pedunculis basi 2-bracteatis. Character ex Aubl. Guyan. t. 221.*

**CARAIPA**, Aubl. \* Calix 5-partitus. Petala... hypogyna. Stamina numerosa hypogyna. Germen superum... Capsula coriaceo-lignosa sub 3-gona apice acuto incurvo, 3-locularis 3-sperma, 3-valvis valvis intus nudis, receptaculo ligneo centrali magno 3-gono, in faciebus seminifero, in angulis valvifero; semina ovata compressa perispermio destituta. *Arbores; folia alterna stipulacea; flores racemosi terminales. Character ex Aubl. Guyan. t. 223, & ex fructu sicco.*

**VANTANEA**, Aubl. \* Calix 5-fidus. Petala 5 longa angusta, disco hypogyno inserta. Stamina numerosa ibidem inserta, filamentis longis, antheris subrotundis. Germen superum disco urceolari infra cinctum; stylus 1 longus; stigma 1... Fructus... (5-locularis 5-spermus?). *Arbor; folia alterna; flores corymboso-terminales magni. Character ex Aubl. Guyan. t. 229.*

**TOUROULIA**, Aubl. \* Calix turbinatus 5-dentatus, basi 2-squamosus. Petala 5 subrotunda, perigyna. Stamina numerosa perigyna; antherarum loculi basi divaricati. Germen superum; stylus 0; stigma 1. Bacca carnosa, multiftriata, sphæroïdea depressa 7-locularis 7-sperma. *Arbor; folia opposita stipulacea, impari-pinnata, foliolis oppositis in petiolum decurrentibus; flores oppositè racemosi terminales, divisuris racemi 2-bracteatis. Character fructus certò superi ex sicco, floris ex Aubl. Guyan. t. 194, qui germen dicit inferum.*

**VALLEA**, Mut. LS. \* Calix 4-5-phyllus deciduus. Petala 4-5 trifida. Stamina 30-40, sub disco inserta serie simplici; filamenta brevissima; antheræ lineares apice 2-perforatæ. Germen superum disco impositum planiusculo (nectarium Mut.) marginato, ad marginem undulato; stylus 1; stigma 4-5-fidum. Capsula 4-5-angularis 2-locularis polysperma. *Arbor; folia alterna stipulacea; panicula florum trifaria terminalis. Numerus partium sæpè quaternarius variat quinario. Character ex L. Suppl.*

**MAHUREA**, Aubl. \* Calix 5-partitus, laciniis 2 majoribus. Petala 5 hypogyna; horum 3 erecta minora. Stamina numerosissima hypogyna, antheris 4-gonis. Germen superum; stylus 1; stigma 3-gonum. Capsula membranacea, ovata,



Stylo acuminata, 3-locularis polysperma, 3-valvis valvis introflexis & margine affixis receptaculo centrali 3-gono seminifero; semina parva, incumbentia. *Arbor*; folia alterna stipulacea; flores alternè spicati terminales; pedunculis basi 3-bracteatis 1-3-floris. *Caracter ex Aubl. Guyan. t. 222.*

**HOUMIRIA**, \* **HOUMIRI**, Aubl. \* Calix 5-partitus. Petala 5 hypogyna. Stamina 20 hypogyna. Germen superum; stylus 1 longus; stigma 5-radiatum. Fructus ... (5-locularis 5-sperma?). *Arbor cacumine ramosissimo, cortice resinoso; folia alterna, sessilia semiamplexicaulia, juniora involuta; flores parvi corymbose axillares & terminales, pedunculis 1-bracteatis. Caracter ex Aubl. Guyan. t. 225.*

**TRILIX**, L. \* Calix 3-partitus persistens. Petala 3, calice minor. Stamina numerosa hypogyna, antheris subrotundis. Germen superum 5-gonum; stylus 1; stigma 1. Bacca sub5-gona 5-locularis polysperma, calice tecta. *Frutex ramosissimus; folia alterna subpeltata; flores terminales. Caracter ex Linnæo.*

**SARRACENIA**, T. L. \* Calix duplex, exterior 3-phyllus parvus, interior 5-phyllus coloratus magnus, uterque deciduus. Petala 5 hypogyna, calici interiori alterna, majora, apice subrotunda. Stamina numerosa hypogyna; antheræ subrotundæ. Germen 1 superum; stylus 1 brevis stipitiformis; stigma latissimum peltato-planum clypeiforme 5-gonum, stamina obtegens persistens. Capsula subrotunda 5-locularis polysperma (5-valvis, valvis medio septiferis, receptaculo centrali 5-gono seminifero magno ex *Catesb. 2. ic. 70*) feminibus minutis. *Herbæ paludosæ; folia alterna radicalia, basi semivaginantia, hydriæ aut tubæ instar cava & aquâ sæpè turgida, superius adaperata & hinc producta in appendicem operculiformem supra os inflexam; scapus 1-florus flore magno. Genus stigmatæ & staminibus proximum Papaveri, sed multiloculare, accedens etiam hinc Nymphææ, indè Nepenthi. An corculum verè 2-lobum; an perispermio destitutum?*

**CARYOCAR**, Allam. L. \* Calix 5-partitus deciduus. Petala 5. Stamina numerosa, antheris oblongis. Germen 1 superum; styli 4 (interdum pauciores); stigmata 4. Drupa maxima sphaericea carnosæ, foeta 4 nucibus angulatis fulcato-reticulatis 1-spermis. *Semina esculenta. Caracter ex Allamand & Linn.*

**TEMUS**, Mol. \* *Temo du Chily*. Calix 3-fidus. Petala 18 linearia longissima. Stamina 26, petalis breviora; antheræ globosæ. Germina 2; styli 2; stigmata 2. Bacca 2-cocca... feminibus arillatis. *Arbor sempervirens; folia alterna; flores pedunculati terminales. Caracter ex Molinâ Chil.*



## POLYPETALÆ GERMINE INFERO.

**APHYTEIA**, L. LS. \* **HYDNORA**, Thunb. \* Calix magnus infundibuliformis semi3-fidus persistens. Petala 3 minima, aut potius petalorum rudimenta calicinis laciniis adnata. Stamina 3, filamentis brevibus infra connatis. Germen subinferum; stylus brevis crassiusculus; stigma 3-gonum. Bacca 1-locularis polysperma, feminibus numerosis in pulpâ tenui nidulantibus. *Planta Capensis, supra radices Euphorbiæ Mauritanicæ parasitica teste D. Thunberg, aphylla & acaulis unico flore constans radicali sessili palmari coriaceo subsucculento, laciniis duplicatis intus pictis; fructus sphaericus magnus extus granulofus. Character ex L. Suppl. An Cytino affinis? Genus recognoscendum & determinanda flaminum seminumque dispositio ac structura.*

**TONTELEA**, Aubl. \* Calix urceolatus 5-fidus. Petala 5, disco urceolari subtus inserta. Stamina 3, eidem disco intus infixa. Germen 1 (inferum?) disco circumdatum; stylus 1; stigma 1. Bacca parva sphaericea 1-locularis 4-sperma. *Frutex sarmentosus ramis oppositis; folia opposita integra; flores oppositè paniculati axillares & terminales, singuli bracteati. Character ex Aubl. Guyan. t. 10.*

**STRUMPFIA**, Jacq. L. \* Calix superus minimus 5-dentatus persistens. Petala 5. Stamina 5, antheris sessilibus & coalitis in corpus ovatum 5-fulcatum, basi 5-dentatum. Germen inferum; stylus 1; stigma 1. Bacca coronata 1-locularis 1-sperma. *Frutex; folia (Rorismarini) ternâ verticillata, stipulis totidem alternantibus, utraque in infimâ ramorum parte caduca, persistentibus vestigiis articulos mentientibus; pedunculi axillares multiflori; baccae pisiformes. Character ex Jacq. Amer.*

**ADENIA**, Forsk. \* Calix tubulosus longissimus, limbo 6-fido oblongo reflexo. Petala 6, summo calici inserta, ejusdem laciniis alterna & breviora. Stamina 6, petalis alterna, ex imo enata calice, filamentis basi extus 1-squamulosis squamulâ lineari, ultra parum connatis, dein liberis; antheræ erectæ lineari-lanceolatae. Germen tubo calicino adnatum; stylus brevis; stigma emarginatum. *Fructus... Arbuscula venenatissima; folia alterna peltata palmata, petiolo glanduloso; cirrhi ex ramis lateralibus; flores fasciculato-spicati terminales fasciculis 2-3-floris; rudimentum folii glandulosum petiolatum sub singulo fasciculo. Character ex Forskalio.*

**BEGONIA**, Pl. T. L. \* Monoïca. Calix 2-partitus (petala exteriora T. L.) superus, interdum corollæ concolor. Petala 2-6 angustiora hyalina. MASC. Petala 2 (rarius 3-6) calici alterna. Stamina indefinita, filamentis brevibus basi junctis, antheris



oblongis erectis. Fœm. Petala 3, rariùs 2-4, summo calici aut pistillo imposita, inæqualia. Germen inferum sub 3-gonum angulis prominulis; styli 3 sæpè 2-fidi; stigmata 6. Capsula infera, suprâ nuda petalis cum calicino limbo deciduis, 3-gona 3-locularis, polysperma seminibus minutissimis receptaculo centrali 3-partito affixis, 3-valvis valvis carinatis dorso alatis; alæ membranaceæ, una cæteris sæpè multò major. *Plantæ paludosæ, pauciores suffruticosæ, plures herbaceæ caule folioso aut scapiformi nudo; folia harum radicalia, illarum caulina, omnium alterna 2-stipulacea, in plurimis suprâ petiolum obliqua & hinc basi sæpè productiora; pedunculi dichotomè multiflori, rariùs 1-2-flori, in scaposis terminales, in cæteris nonnunquàm axillares, dichotomiis 2-stipulaceis aut 2-bracteatis, bracteis sæpè caducis, pedicellis 1-floris, sub germine seu calice fœmineo pariter 2-bracteatis; flores masculi fœmineis mixti. Habitus & sapor Acetosæ. An perianthium potiùs omninò petalinum absque calice, aut omninò calicinum apetalum? Genus nulli verè affine.*

## APETALÆ HERMAPHRODITÆ GERMINE SUPERO.

**MEBOREA**, Aubl. \* Calix 5-fidus, laciniis basi intùs foveâ marginatâ excavatis. Corolla o. Germen 1 superum; styli 3; stigmata 3. Antheræ 3 subsessiles stylis adnatæ sub stigmatibus. Capsula 3-gona 6-locularis, primò 3-valvis, deìn iteratâ partitione 6-valvis valvis medio septiferis & utrinque 1-spermis. *Frutex; folia alterna stipulacea; flores pauci axillares aut corymbofo-paniculati terminales, pedunculis longis 1-floris & basi 1-bracteatis. Caractèr ex Aubl. Guyan. t. 323. An affinis Aristolochiis?*

**COMETES**, Burm. L. \* Involucrum 4-phyllum foliolis æqualibus ciliato-hispidis, 3-florum flosculis sessilibus. His calix (corolla Burm.) 4-phyllus æqualis. Corolla o. Stamina 4. Germen superum; stylus 1; stigmata 3. Capsula 3-cocca 3-sperma. *Herba foliis oppositis; involucria pedunculata, pedunculis solitariis axillaribus alternis aut 1-2-terminalibus. Caractèr ex Burm. Ind. t. 15 & ex Linneo.*

**AMANOA**, Aubl. \* Calix minimus 5-partitus æqualis. Corolla o. Stamina 5 hypogyna, calici alterna, antheris latis subsessilibus. Germen superum 3-gonum; stylus o; stigma 3-gonum concavum. Fructus... *Arbor cacumine ramosissimo, ramulis foliatis; folia alterna stipulacea stipulis deciduis; flores parvi in ramulorum apice flexuoso fasciculato-spicati fasciculis alternis sessilibus remotis 1-bracteatis. Caractèr ex Aubl. Guyan. t. 101.*

**CAPURA**, L. \* Calix tubulosus (corolla L.) 6-fidus laciniis



alternis angustioribus externis. Corolla o. Stamina 6, tubo inserta, antheris subsessilibus; 3 alterna superiora. Germen superum; stylus brevissimus; stigma 1. Bacca...? *Arbor; folia opposita integra; flores fasciculati axillares. Character ex Linnæo.*

**SCOPOLIA**, LS. \* Flores aggregati in calice seu involucro communi 2-phyllo foliolis concavis. Calix proprius (corolla LS.) inferus infundibuliformis 5-fidus. Antheræ 8 oblongæ, duplici ordine quaternæ, coalitæ seu conniventes in columnam interruptam, suffultam filamentis 4 epigynis. Germen superum, apice setosum cujus setæ filamentis intermixtæ; stylus o; stigma 1. Fructus... *Arbor ramis apice foliosis; folia alterna integra non stipulacea; pedunculi florales solitarii axillares aut foliis deciduis nudi. Character ex L. Suppl. An inferus calix staminibus epigynis verè consociatus; an antheræ verè connexæ; an calix in corollam restituendus? An genus affine corymbiferis & Tarchonantho p. 185, aut Thymelæis & Gnidiæ p. 77. Huic nomine conformis Scopolia Forst. t. 70, ceterum diversa & recognoscenda cui ex Forstero calix superus 5-dentatus, corolla..., stamina..., germen inferum, styli 3, stigma 3, fructus... 1-spermus, flores quidam masculi calice consimiles 5-petalis 5-andri.*

**ANIBA**, Aubl. \* Calix obtusè 6-partitus. Corolla o. Stamina 8 hypogyna. Germen superum; stylus 1 brevis; stigma 1. Fructus... *Arbor truncò citrino aromatico, cacumine ramosissimo; folia opposita aut 3-5 verticillata; flores minimi laxè racemosi, racemi pedunculo longò debili axillari. Character ex Aubl. Guyan. t. 126.*

**PLEGORHIZA**, Mol. \* *Guaicuru du Chili*. Calix 1-phyllus (corolla Mol.) limbo integro. Corolla o. Stamina 9, filamentis brevibus, antheris oblongis. Germen 1; stylus 1; stigma 1. Capsula oblonga subcompressa 1-sperma semine conformi. *Suffrutex; folia radicalia petiolata congesta, ambientia caulem basi nudum simplicem, apice ramulosum ramulis foliosis & floriferis, foliis alternis sessilibus, floribus parvis subumbellatis. Πλῆγὴ plaga, πλῆξ radix, à radice vulnerariâ. Character ex Molinâ Chil. & Pernetti it, Maclov. Confer cum Lauris aut Polygoneis.*

**ANAVINGA**, Rheed. Lam. \* **CASEARIA**, Jacq. \* **SAMYDA**, L. \* **GUIDONIA**, Pl. \* Calix 5-partitus. Corolla o. Stamina 8-10 (hypogyna?), squamulis totidem (nectarium Jacq.) interjectis brevioribus hirsutis, ibidem insertis. Germen 1 superum; stylus 1; stigma capitatum. Capsula stylo acuminata coriacea sub3-gona 1-ocularis 3-valvis intus polysperma & pulposa, valvis seminiferis. *Arbusculæ aut frutices; folia alterna (stipulacea?); flores corymbofo-racemosi aut plures aggregati pedunculis 1-floris, sæpius axillares. Character ex Jacq. Amer. p. 132. Huc referantur Samyda Loëst. p. 260, & Samyda Brown. t. 23. f. 3, & Samyda plures Linn. n. syst., & Iroucana Aubl. t. 127, & Meliastaurum. Forst. t. 72, & Anavinga Rheed. Mal. 4. t. 49. Lam. Dict. 1. p. 147, quæ tamen paululum differunt. Squamulæ in Samyda*



*Brown*, glabræ brevissimæ, in *Iroucanâ* & *Melistauro* & *Anavingâ* stipitata pennato-ciliatæ, in *Samydâ* Loëfl. & *Anavingâ* geminatae. Stamina cum squamulis hypogyna distincta in *Iroucanâ* ex *Aubl.*, perigyna distincta in *Anavingâ* & in *Samydâ* Loëfl. & *Brown.*, basi monadelphæ & invicem æqualia in *Melistauro*. *Iroucanæ* stigma 5-radiatum & folia stipulacea. Ejusdem & *Samydæ* *Brown.* capsula receptaculo seminifero centrali & valvulis liberis. Character igitur in vivis repetendus. Confer cum *Pipiræâ* p. 295 & *Tsjerou-kanneli* *Rheed. Mal. t. 50.* Affinis sequentibus, fortè etiam *Blakwelliæ* & *Homalio* p. 343.

**AQUILARIA**, Lamark. Cav. \* *Garô*, *Bois d'Aigle*. Calix turbinatus persistens, limbo 5-fidus. Corolla o. Urceolus interior corollæ æmulus, medio adnatus calici, apice inæqualiter 10-lobus; filamenta 10 brevissima, ex eodem urceolo inter lobos alternè enata; antheræ 10 oblongæ versatiles. Germen superum; stylus o; stigma 1. Capsula ampliata amygdaliformis 2-locularis 2-valvis, valvis suberosis crassis medio septiferis, loculis 1-spermis, seminibus infrà arillo spongioso semicinctis, 1 sæpè abortivo. *Arbor*; folia alterna 1-nervia (non stipulacea?); flores... Character ex *Lamark Dict. 1. p. 49* & 2. p. 610, ex *Cavan. diss. 7. t. 224.* Affinis *Samydæ* ac *Anavingæ*, & flaminifera inter urceoli lobos integros non hirsutos, ut in *Samydâ* *Brown. t. 23. f. 3.*

**SAMYDA**, Jacq. \* **GUIDONIA**, Pl. \* Calix 1-phyllus tubuloso-campanulatus 10-striatus, intus coloratus, limbo 5-fido inæquali. Corolla o. Stamina 10-18, filamentis connatis in coronam medio calici insertam 10-18-striatam & margine 10-18-dentatam dentibus antheriferis. Germen superum; stylus 1; stigma 1. Capsula coriacea 1-locularis 4-5-valvis polysperma valvis seminiferis; semina pulpâ obvoluta, basi foraminulata, *Frutices*; folia alterna stipulacea; flores axillares subsolitarii. Character ex *Jacq. Amer. p. 131.* An potius valvæ liberæ & semina receptaculo centrali affixa ut in *Plum. descr. mss. & ic. 146. f. 2.* Genus (cui sola convenit *S. ferrulata* L.) diversissimum à primâ *Samydâ* *Linn. amœn. 1. p. 128*; diversum etiam ab *Anavingâ* seu *Caseariâ* *Jacq.*, cui tamen affinis mediante *Samydâ* *Browni*.

**CASSYTHA**, L. \* Calix 1-phyllus globosus, limbo coarctatus & 6-fidus connivens, laciniis alternis interioribus (petala L.) paulò majoribus, basi 3 bracteatus (calix L.) bracteis minimis. Corolla o. Staminum filamenta 12, summo calici inserta duplici ordine; horum 6 exteriora fertilia basi nuda, calicinis laciniis opposita; 6 interiora prioribus opposita, 3 nempe pariter fertilia basi 2-glandulosa, 3 his alterna sterilia (nectarium L.) truncata tuberculiformia; antheræ fertilibus filamentis anteriùs adnatæ 2-loculares (à basi ad apicem 2-valves?). Germen superum; stylus crassiusculus; stigma obtusum (sub-3-fidum?). Capsula globosa 1-sperma, calice subbaccato connivente tecta. *Planta aphylla, volubilis filamentosa ramosa, suprà*



*frutices parasitica & papillis passim radicans ; folia nulla (quæ tamen memorat Rheedius Malab. 7. p. 83. t. 44.) , sed squamulæ raræ quibus ramuli & flores axillares ; flores in ramulis alternatim & laxè spicati sessiles rariores. Caractèr ex sicco. Habitus Cuscutæ , stamina Lauri , calix & fructus Basellæ pariter spicifloræ & volubilis : indè generis ordinatio difficilis. Huc refert D. Vahl Volu- tellam Forskalii. An verè congener C. corniculata L. species incertæ aculeis & partium dispositione diversissima ?*

**TOMEX**, Thunb. \* Involucrum 5-6-phyllum 5-6-florum per- sistens. Calix proprius 5-phyllus. Corolla o. Stamina 12 in- æqualia, 5 exteriora, 7 interiora. Germen 1 superum, squamis 5 cinctum, triquetrum; stylus o; stigma subulatum abortiens. Fructus... *Arbor ramis & ramulis tomentosis ; folia alterna inte- gerrima parallelo-nervosa ; flores axillares. Caractèr ex Thunb. Jap. qui flores fœmineos non vidit.*

**TOUNATEA**, Aubl. \* Calix turbinatus 5-fidus. Corolla o. Sta- mina numerosa hypogyna. Germen 1 superum; stylus 1 brevis incurvus; stigma 1. Capsula olivæformis 2-valvis 1-sperma femine magno infrà calyptrato, calyptrâ urceolatâ hylum fe- minis obtegente. *Arbor apice ramosa ; folia alterna, impari-pin- nata & alternè 2-juga petiolo communi marginato ; flores in ramis & ramulis spicati, singuli 1-bractæolati. Caractèr ex Aubl. Guyan. t. 218. Confer cum Copaißerâ. p. 365.*

**SEGUIERIA**, Loëfl. L. \* Calix 5-phyllus persistens (foliolis 2 exterioribus minoribus ex Jacq.) Corolla o. Stamina plurima (hypogyna?). Germen compressum, latere altero suprâ mem- branaceo tenui, altero crassiore; stylus 1 brevissimus, lateri crassiori continuus; stigma 1. Capsula oblonga, hinc crassior, indè alata, basi 3-appendiculata appendiculis alæformibus, 1-lo- cularis 1-sperma non dehiscens. *Frutex ; folia alterna ; aculei 2 recurvi ad latera petiolorum aut nulli ; flores racemosi terminales. Ca- raçter ex Jacq. & Loëfl. & Linn.*

**MÆRUA**, Forsk. \* Calix urceolatus 4-gonus, limbo 4-fido oblongo. Petala o. Setæ numerosæ compressæ, apice laciniatæ, summo calicino urceolo insertæ, conniventes in germinis stipitem centalem 4-gonum, cui summo inferuntur stamina circiter 30, filamentis subulatis, antheris incumbentibus di- dymis. Germen eidem stipiti suprâ stamina attenuato im- positum; stylus o; stigma verruciforme. Fructus... *baccatus ? Frutex ; folia alterna crassiuscula ; pedunculi terminales solitarii 1-flori. Caractèr ex Forsk. Confer cum Passiflorâ.*

**ABLANIA**, Aubl. \* Calix 4-5-partitus persistens. Corolla o. Sta- mina numerosa, hypogyna. Germen superum villosum; styli 2, apice 2-fidi; stigmata 4. Capsula ovata, pilis longis rigidis ca- ducis hirsuta sub4-gona, 1-locularis 4-valvis polysperma, fe- minibus numerosis receptaculo centrali affixis, membranâ viscosâ



obvolutis. *Arbor* ; *folia alterna* ; *flores axillares subcorymbosi*. *Caracter ex Aubl. Guyan. t. 234.*

**MOURERA**, Aubl. \* *Calix o. Corolla o. Vagina tubulosa* ; *germinis stipitem basi involvens* , *cineta 3 bracteis caducis* , *quarum 1 major cæteras obtegens*. *Stamina numerosa* , *filamentis basi latioribus* , *antheris sagittatis* , *inserta disco 12-aculeato germinis stipitem superanti*. *Germen stipiti (pedunculus ex Aubl.) longo infidens* , *disco superum* , *friatum* ; *styli 2 incurvi* ; *stigmata 2*. *Capsula ovata 8-friata membranacea 1-locularis 2-valvis polysperma* , *feminibus minutis receptaculo centrali affixis*. *Herba repens* , *caulibus & foliis asperis* ; *folia (Acanthi) alterna magna sinuata undulata* , *præcipuis nervorum commissuris subtilis aculeo instructis* ; *caules apice dilatato complanati* , *hinc convexi* , *indè canaliculati* ; *uterque canaliculi margo longâ florum serie obtektus*. *Caracter ex Aubl. Guyan. p. 233. Genus nulli affine. An vagina & bractæ pro calice habendæ ?*

**CORIARIA**, Niff. L. \* *Rédoux*. *Calix 5-partitus. Corolla o. Stamina 10 (interdum pauciora) hypogyna* , *seu disco hypogyno inserta* ; *antheræ subsessiles oblongæ erectæ* , *loculis basi distinctis*. *Germina 5 juncta* ; *styli 5 exserti* ; *stigmata 5. Glandulæ 5 (Petalæ ex Linn.) minimæ* , *germinibus interpositæ* , *è disco enatæ extrâ stamina*. *Capsulæ 5 conniventes parvæ 1-spermæ non dehiscentes* , *latere obtektæ glandulis ampliatis & incrassatis* , *undè fructus semibaccatus*. *Corculum feminis absque perispermo* ; *radicula recta assurgens. Frutices 4-goni* , *ramis & ramulis oppositis* ; *folia opposita sessilia integra sub3-nervia* , *membranulæ ciliatæ axillares* ; *flores in ramulis axillaribus basi foliaceis solitariis aut geminatis* , *spicati terminales* , *in spicâ alterni* , *singuli 1-bractæati* , *plures sexuum abortu declines* : *indè genus nunc polygamum* , *nunc monoicum aut dioicum* , *spicis aut & fruticibus sæpè unisexualibus*.

## APETALÆ HERMAPHRODITÆ GERMINE SUPERO.

**MNIARUM**, Forst. LS. \* *Calix superus 4-fidus æqualis erectus. Corolla o. Stamen 1* , *medio calici infixum. Germen inferum calice longius* ; *styli 2* ; *stigmata 2. Germen immutatum* , *calice indurato vestitum. Semen 1 oblongum. Herba Minuartiæ facie* , *dichotoma* , *undique tektæ foliis approximatis connatis acerosis* ; *flores terminales 2 subsessiles. Caracter ex Forst. t. 1, & ex L. Suppl. An potius germen superum & semen tektum ?*

**CATONIA**, Brown. *Calix superus 4-fidus. Corolla o. Stamina 4. Germen inferum globosum* ; *stylus 1* ; *stigma 1. Bacca succulenta coronata 4-sperma* , *feminibus 1-2 sæpè abortivis. Frutex* ; *folia opposita. Caracter ex Brown. Jam.*



**GONOCARPUS**, Thunb. \* Calix superus (corolla Thunb.) 4-fidus persistens. Corolla o. Stamina 4 calici inserta. Germen inferum; stylus 1; stigma... Drupa calice coronata, minima globosa 8-gona 1-sperma. *Herba caule 4-gono, facie Verbenulæ; folia opposita; flores spicato-paniculati terminales, in spicis alterni secundi. Character ex Thunb. Jap. An Thesio affinis?*

**LINCONIA**, L. \* Calix basi urceolatus, supra 5-fidus (petala L.) erectus longior laciniis paleæformibus canaliculatis (basi foveatis ex Linn.) persistentibus scariosis, extus 4-bracteatus bracteis (calix L.) gemino ordine oppositis, exterioribus minoribus. Stamina 5 calicinis laciniis alterna (perigyna?); antheræ sagittatæ. Germen semiinferum, cum urceolo calicino infra concreescens; styli 2 filiformes; stigmata 2. Capsula semiinfera 2-locularis 2-partibilis, loculis seu coccis intus dehiscens 1-spermis, semine (Lini) nitido. *Frutex abietiformis; folia linearia rigidula 3-quetra sparsa subverticillata, inferiora caduca; horum vestigia persistentia in ramis indè scabris; flores in summis ramulis laterales sessiles. Character ex unico flore à D. Smith misso. An affinis Rosaceis & Sanguisorbæ aut Cliffortiæ p. 337?*

**TREWIA**, L. \* Calix superus limbo 3-partito persistente. Corolla o. Stamina numerosa. Germen inferum; stylus 1; stigma 1. Capsula 3-quetra turbinata coronata 3-locularis 3-valvis 3-sperma, seminibus dissepimento tenui affixis. *Arbor; folia alterna magna; flores racemoso-spicati axillares, plerique in spicâ abortivi (an masculi?). Character ex Linnæo.*

## APETALÆ DICLINES GERMINE SUPERO.

**ASCARINA**, Forst. \* Dioïca. Amenta filiformia, floribus sparsis sessilibus. Singulis squamula minima calicem supplens. MASC. Stamen 1, antherâ oblongâ subsessili curvâ. FÆM. Germen 1 superum globosum; stylus o; stigma sessile sub 3-lobum. Fructus... 1-spermus. *Character ex Forst. t. 59.*

**GLOCHIDION**, Forst. \* Monoïcum. MASC. Calix 6-partitus (petala Forst.) subæqualis, laciniis 3 interioribus. Corolla o. Stamina 3, antheris subsessilibus in cylindrum connatis, singulis apice cuspidatis. FÆM. Calix 6-fidus. Germen superum 6-fulcatum; stylus o; stigmata 6 minima. Capsula rotunda depressa 12-striata 6-locularis 6-valvis 6-sperma. *Character ex Forst. t. 57.*

**MERYTA**, Forst. \* Dioïca. MASC. Flores aggregati in capitulum sessile. Calix 3-partitus. Corolla o. Stamina 3, antheris 4-fulcis. FÆM. Flores non observati. *Character ex Forst. t. 60.*

**TROPHIS**, Brown. L. \* Dioïca. MASC. Calix 4-partitus. Sta-



mina 4. FÆM. Germen calice integro arctè vestitum; stylus 2-partitus; stigmata 2. Bacca striata 1-locularis 1-sperma. *Caracter ex Linnæo. Frutices ramis alternis; folia alterna (stipulacea?); spicæ florum solitariae axillares, rarius terminales, masculæ longiores & densiores. An Bucephalon Plum. huc rectè revocatum à Linnæo? An bacca semen involvens ab immutato calice producta, indeque semen non inferum sed testum & genus Urticis affine? An cum Brownæo calix nullus fœmineus admittendus?*

**BATIS**, Brown. L. \* Dioïca. Amenta pyramidato-4-gona compacta, squamis 1-floris 4-fariam imbricatis, involuero 2-partito infra cincta. Calix nullus nisi squamula. Corolla 0. MASC. Stamina 4. FÆM. Germen 1 superum, amento adnatum; stylus 0; stigma 2-lobum. Bacca 1-locularis 4-sperma. Baccæ ejusdem amenti in fructum oblongum concretæ. *Frutices maritimi, salsissimi, ramosissimi; ramuli 4-goni oppositi; folia opposita carnosæ; amenta axillaria solitaria opposita. Caracter ex Brown. Jacq. & Linn. An cum Brownæo admittendæ vaginæ membranaceæ squamis interpositæ calicem supplentes?*

**ANTIDESMA**, L. \* Dioïca. Calix minimus 5-fidus. Discus orbicularis calici intus supereminens. Petala nulla. MASC. Stamina 5, disco inserta, filamentis longis, antheris didymis. FÆM. Germen 1, disco impositum; stylus brevissimus; stigmata 5 (aut pauciora?). Drupa parva ovata, stylo acuminata, foeta nuce 1-spermâ extus sinuosâ scabrâ. *Arbores; folia alterna stipulacea integra; flores spicati, spicis 1-3-axillaribus & terminalibus. Folia unius speciei (Nevropora Commers.) in primariis nervorum commissuris calloso-ulcerosa, observante Commers. sonio. An genus affine Grangeriæ & Hirtellæ? An petala verè nulla? Hujus congener ex D. Smith Stilago L., mascula species 3-andra calice sub3-lobo.*

**TONINA**, Aubl. \* Monoïca. MASC. Calix profundè 3-lobus. Corolla 0. Vesicula centralis apice truncata & clausa, oblonga 6-nervis, nervis ultrâ productis in 6 filamenta apice antherifera. Stylus ex mediâ vesiculâ assurgens sterilis. FÆM. Calix & corolla 0. Germen 3-striatum; stylus 1; stigmata 3. Capsula 3-valvis 1-sperma femine striato. *Herba minima sub aquis nascent; folia alterna graminea amplexicaulia; flores fasciculato-capitati, capitulis axillaribus solitariis pedunculatis; fasciculi 2-flori flosculo altero masculo 1-bracteato, altero fœmineo 3-bracteato bracteis longis, utroque pedicellato, pedicellis apice 1-squamosis, masculo longiore. Caracter ex Aubl. Guyan. t. 330. An potius calix fœmineus admittendus 3-valvis germi appressus, & idè semen calice non capsulâ testum? An vesicula maxima pro filamentorum coadunatione habenda? An semen unilobum? An genus Gramineis affine, licet foliis non vaginantibus?*

**SIPARUNA**, Aubl. \* Monoïca. Calix 4-partitus. Corolla 0. MASC. Stamina 4-6-8-10, disco calicino imposita. FÆM. Germen 1



superum; stylus striatus oblongus; stigmata 5. Fructus...  
*Frutex; folia opposita; flores subcorymbose axillares minimi, corymbis monoïcis. Character ex Aubl. Guyan. t. 333.*

MYROXYLON, Forst. \* Dioïcum. Calix 4-5-partitus patens. Corolla o. Corona minima annularis crenulata in imo calice. MASC. Stamina numerosa intrâ coronam. FÆM. Germen superum, coronâ infrâ cinctum; fructus vix ullus; stigma sub-3-fidum. Bacca? sicca ovata parva subbilocularis loculis 2-spermis. *Arbor ligno odore fragrante. Character ex Forst. t. 63.*

NEPENTHES, Breyn. L. \* Dioïca. Calix 4-partitus persistens. Corolla o. MASC. Filamentum 1 centrale stipitiforme erectum, apice tectum antheris pluribus (12) sessilibus densè capitatis. FÆM. Germen superum sessile, suprâ truncatum; stylus o; stigma peltatum sessile. Fructus... (capsularis 4-gonus oblongus truncatus 4-ocularis 4-valvis polyspermus seminibus numerosis fetaceis oblongis ex Linn.). *Herbæ ripariæ aut sylvestres umbraticæ; caulis simplex basi foliosus, apice florifer; folia (Methonica aut Flagellariæ) alterna semiamplexicaulia longa nervo medio ultra producto in urnam stipitatum erectam membranaceam oblongam, intus cavam & aquâ turgidam, superius ore hiantem rotundo & clausam valvâ operculiformi quadantenus dehiscente; flores racemoso-paniculati terminales. Character ex sicco. An corculum seminis 2-lobum? Habitus quidam Sarracenix. Genus præterea nulli affine. Hujus triplex saltem innotescit species, nempe 1°. Bandura Burm. Zeyl. t. 17; 2°. Cantharifera Rumph. Aubl. 5. t. 59; 3°. Scyphus Malacensis, herb. nostr. à D. Poivre datus.*

QUILLAJA, Mol. \* Quillaï du Chili. Monoïca. Calix 5-fidus. Corolla o. MASC. Stamina 12 (fortè plura). FÆM. Germina 5, calicis laciniis opposita; styli 5; stigmata... Fructus 5-capsularis, capsulis coriaceis 2-valvibus 1-ocularibus polyspermis; femina oblonga, apice alata latiora, imæ capsulæ infixa. *Arbor cortice saponario; folia alterna simplicia sempervirentia; flores axillares. Character ex Molinâ Chil., ex Frezier hist. p. 127 & ex fructibus à Dombeyo datis. Hujus congener videtur alter Dombeyanus arboris dioïcæ icosandræ fructus Gayo colorado dictus, idem cum Loque seu arbore 5-capsulari Peruvianâ Jos. Jussæi, cujus ramuli, ipso testante, viminei in funes contorquentur construendis provinciæ Cusco pontibus suspensis aptatos.*

PANDANUS, Rumph. 4. t. 74-81. LS. \* KAÏDA, Rheed. 2. t. 1-8. \* KEURA, Forsk. \* ATHRODACTYLIS, Forst. t. 57. \* Dioïcus. Calix o. Corolla o. MASC. Thyrsus ramosissimus, singulis pedicellis antherâ unicâ terminatis, longitudinaliter fissâ oblongâ. FÆM. Germina numerosa in capitulum aggregata sessilia angulata, basi attenuata; singulis stylus o; stigmata 2. Drupæ totidem quot germina, angulatæ cuneatæ 1-spermæ (an in quibusdam 3-loculares 3-spermæ?), aggregatæ in fructum globosum aut ovatum, magnum. *Plantæ ju-*



niores acaules *Ananassæ* facie, adultiores *Palmarum* instar caulescentes; folia in apicibus ramorum trifariam imbricata, longissima canaliculata sessilia amplexicaulia, carinâ marginibusque spinosoferratis; flores terminalis aut foliis supremis axillares, masculi racemoso-thyrsoidei 1-spathacei, foeminei capitulis simplicibus aut pluribus racemosis, singulo folio seu spathâ simplici aut quadruplici cinctis. *Caracter ex Forst. & L. Suppl. & Forsk., & ex Commers. cui Hydrorhiza dicitur. Confer Caricem arboream Rumph. 6. t. 8. f. 2. An genus Palmis affine?*

**BALANOPHORA**, Forst. \* Monoïca. Capitulum spadiceforme stipitatum, squamis pluribus spathæformibus stipitem cingentibus, tectum flosculis, masculis inferioribus majoribus distinctis 2-3-plici serie ad ambitum dispositis, foemineis numerosis superioribus supra capitulum dense appressis. MASC. Calix (corolla *Forst.*) 4-partitus patens. Filamentum 1; anthera oblongo-ovata erecta canaliculata. FÆM. Calix 0? Receptaculum minimum, germinibus minutissimis tectum 1-stylis. Fructus toridem... 1-spermi? Receptacula dense conferta, capitulum constituentia. *Caracter ex Forst. t. 50. Planta fungosa habitu Cynomorii cui fortè affinis.*

## APETALÆ DICLINES GERMINE INFERO.

**CYNOMORIUM**, Mich. L. \* Monoïcum. Spadix longus fungiformis crassus radicalis, infra vestitus squamis numerosis unguiformibus dense imbricatis, supra amentaceus omnino tectus flosculis masculis & foemineis dense commixtis & squamis rarioribus passim interpositis deciduis. MASC. Calix 4-phyllus, foliolo inferiore latiore canaliculato. Filamentum 1 exsertum; anthera didyma. FÆM. Calix 4-partitus æqualis persistens. Germen inferum; stylus 1; stigma 1. Semen nudum. *Flores quidam hermaphroditi 1-andri cæteris immixti. Caracter ex Linn. & Mich. gen. t. 12. Planta fungiformis, tota ex spadice consistans, pelago submersa, inundatis maritimarum arborum radicibus innascens. Genus in vivo recognoscendum. Confer cum Balanophorâ.*

**DATISCA**, L. \* CANNABINA, T. \* Cannabine. Dioïca. MASC. Calix 5-partitus æqualis. Corolla 0. Antheræ plures, circiter 15, sessiles longæ exsertæ. FÆM. Calix superus 2-3-dentatus. Corolla 0. Germen inferum, inter dentes calicinos prominulum; styli 3 bifidi; stigmata 6. Capsula oblonga 3-gona, apice 3-cornis, 1-ocularis polysperma; anguli persistentibus terminati stylis & dentibus calicinis extus appositis quorum 1 plerumque deficiens; receptacula feminifera 3, capsulæ parietibus inter angulos affixa; semina minuta. *Herbæ assurgentes; folia alterna impari-pinnata; flores spicato-racemosi axillares 1-brac-*



*teati. Capsula Resedæ sed infera & prætereà flos apetalus. Habitus Cannabis sed fructus inferus polyspermus.*

OBS. Præter genera ordinis indeterminati in serie præcedenti reposita, nonnulla dantur quæ, defectu observationum nondum absoluta, nulli nec ordini nec systemati accomodantur. Donec innotuerint accuratiori designatione, in extremâ operis parte nominatim absque descriptione enumerantur, disposita ratione caulis arborei aut herbacei, foliorum oppositorum aut alternorum, simplicium aut compositorum.

I. *Herba . . .*

II. *Arbores aut frutices, foliis oppositis simplicibus* : Amaïoua, *Aubl. t. 375.* Couma, *id. t. 392.* Crantzia, *Soland.* Doratium, *Ayton.* Elutheria, *Brown. p. 369.* Ipotaraguapin, *Loëfl. p. 270.* Quiina, *Aubl. t. 379.*

III. *Arbores aut frutices, foliis oppositis compositis...*

IV. *Arbores aut frutices, foliis alternis simplicibus* : Adolia, *Lamark dict. 1. p. 44.* Alicastrum, *Brown. p. 372.* Bocca, *Aubl. t. 391.* Brabyia, *Brown. p. 370.* Conami, *Aubl. t. 354.* Conceveiba, *id. t. 353.* Coupoui, *id. t. 377.* Courimari, *id. t. 384.* Erotem, *Thunb.* Ferolia, *Aubl. t. 372.* Gingko, *Kampf. ic. 813.* *Thunb. Jap. 358.* Gyrocarpus, *Jacq. Amer. 282. t. 178. f. 80.* Heberdinia, *Ayton.* Icacorea, *Aubl. t. 368.* Licaria *id. t. 121.* Managa, *id. t. 369.* Maquira, *id. t. 389.* Minquartia, *id. t. 370.* Petesioides, *Jacq. Amer. p. 17.* Piratinera, *Aubl. t. 340.* Pitumba, *id. t. 385.* Senapea, *id. t. 381.* Tampoa, *id. t. 388.* Voyara, *id. t. 383.*

V. *Arbores aut frutices, foliis alternis compositis* : Anisophyllum, *Jacq. Amer. 283. t. 380. f. 45.* Carapa, *Aubl. t. 387.* Racaria, *id. t. 382.*





## A P P E N D I X.

**G**ENERUM typographia incepta Maio 1788, absoluta fuit Aprili 1789. Plures interea observationes aut oblitæ aut recentiores supervenerunt addendæ cum nonnullis omiffis aut nuperiùs editis generibus. Horum quædam nulli ordini certò adscribenda, præcedenti generum indeterminatorum seriei inferuntur; cætera faciliùs ordinanda hìc in appendice fiſtuntur, poſthàc in ordines refundenda.

Pag. 9. MARCHANTIA... adde : *Congener ex L. Suppl. emend. Rupinia ejusdem, seu Aytonia Forst. t. 74.*

Pag. 15. MYRIOTHECA... adde : *Congener Cænopteris Berg. act. Petrop. 1782.*

Pag. 30. Poſt ANDROPOGON, adde :

THEMEDA, Fork. \* Gluma 1-valvis. Calix 2-valvis. Flores masculi plures verticillato-capitati, è quorum medio ſtipes centralis altior 3-glumis, glumâ 1 hermaphroditâ ſeffili inter 2 masculas pedicellatas. *Caracter ex Fork.*

Pag. 30. Poſt ISCHÆMUM, adde :

SEHIMA, Fork. \* Glumæ 2 geminatæ 2-valves 2-floræ; altera pedunculata floribus masculis; altera (ut in Ischæmo) ſeffilis, flore altero hermaphrodito, altero masculo. Omnibus calix 2-valvis. *Flores ſpicati. Habitus Ischæmi. Caracter ex Fork.*

Pap. 44. ERIOCAULON... *ſcapum anguloſum...* adde : *vaginâ propriâ inferiùs cinctum.*

Pag. 50. Poſt TILLANDSIAM, adde :

PUYA, Mol. \* RENEALMIA, Fevil. \* *Puya du Chili.* Calix 6-partitus, laciniis 3 interioribus majoribus fornicatis. Stamina 6, imo calici inſerta, filamentis baſi ſquamiformibus & mellifluis. Germen ſuperum 3-gonum; ſtylus...; ſtigma... Capsula 3-locularis polyſperma ſeminibus minutis (non pappoſis?). *Plantæ caudicibus craſſiſſimis erectis ſuberoſis; folia alterna vaginanta, inferiora caduca baſi perſiſtente & caudices indè ſcabros obtegente, ſuperiora in caudicibus terminalia conſertiſſima Ananæſæ inſtar longi canaliculati marginibus dentato-spinofiſ; caulis inter folia centralis altiffimus paſſim ſpathaceus, apice ramoſus florifer, floribus ſpathaceis pyramidato-paniculatiſ. Caracter ex Feuill. Chil. 3.*



t. 39. & ex *Molinâ Chil. Habitus Agaves*, sed *germen superum. Character ferè Tillandsiæ. An congener Pittcairnia L'Herit. fert. Angl.*

Pag. 52. *BASILEA...* adde : *Eadem cum Eucomi L'Herit. fert. Angl. An congener Aletris capensis L.?*

Pag. 54. *CRINUM...* adde : *Congener Mauhlia Dahl obs. bot. & Agapanthus L'Herit. fert. Angl.*

Pag. 55. *AMARYLLIS...* adde : *Congener Crinum L'Herit. fert. Angl. discrepans tubo longiore & staminibus non declinatis.*

Pag. 61. *HELICONIA...* adde : *An congener aut affinis Strelitzia, D. Banks, cujus iconem optimam ab eo accepi.*

Pag. 65. Post *KÆMPFERIAM*, adde :

*HEDYCHIUM*, Kœnig. Lamark. \* *Gandasuli. Calix longissimus tubulosus gracilis, intrâ spathas ambientes prominens, duplicatus; exterior ad limbum obliquè truncatus; interior ultrâ productus (corolla Lamark.), limbo magno 6-partito, laciniis 2 linearibus, 3 ovato-oblongis, 1 latiore obcordatâ. Filamentum tubo intus affixum, ipsi æquale; anthera longa linearis, profundè 1-fulcata. Germen inferum; stylus longissimus, suprâ immerfus antheræ sulco; stigma subcapitatum. Fructus... Folia longa; flores spicati terminales, squamis seu spathis distincti. Kämpferiæ affine & idem cum Gandasulio Rumph. Amb. 5. t. 69. f. 3. Character ex Lamark. dict. 2. p. 603.*

Pag. 77. Post *LAGETTAM*, adde :

*CANSJERA. \* TSIEROU-CANSJERAM*, Rheed. \* *Calix globose-urceolatus, 4-dentatus. Corolla o. Stamina 4, filamentis imo calici insertis; antheræ subrotundæ non exsertæ. Germen superum minimum, squamulis 4 cinctum; stylus 1; stigma capitatum. Fructus... (baccatus pisiformis 1-spermus ex Rheed. 7. t. 2.). Frutex; folia alterna; flores 1-bracteolati spicati spicis 1-4 axillaribus. Character ex sicco Sonneratii specimine à D. Lamark dato. Congener Scheru-valli-caniram Rheed. 7. t. 4.*

Pag. 81. *MYRISTICA... Bacca... 1-sperma... lege*, *Bacca... foeta nuce magnâ 1-spermâ; nux vestita membranâ fissili reticulatâ; semen magnum solidum, intus venosum & variegatum. Character ex Lamark.*

Pag. 84. *ANREDERA...* adde : *Planta eadem cum Fagopyro scandente... Sloan. Jam. 1. t. 90.*

Pag. 90. Post *NYCTAGINEM*, adde :

*ABRONIA. \* Calix tubulosus longus, basi tumidus, ultrâ coarctatus, suprâ subinfundibuliformis limbo hypocrateriformi 5-partito, laciniis obcordatis seu 2-lobis. Staminum filamenta 5, basi coalita in vaginulam hypogynam brevissimam, ultrâ agglutinata tubo calicino coarctato, suprâ libera; antheræ oblongæ*



oblongæ non exsertæ. Germen 1, vaginulâ staminiferâ infrâ cinctum, in tumidâ calicis basi; stylus 1; stigma 1. Semen 1, imo calice tectum. *Herba diffusa delicatula; folia opposita simplicia; flores 12-15 in pedunculo axillari solitario longo capitati sessiles, involucro polyphylllo cincti, tubo viridi, limbo pulchrè roseo. Habitus Valerianæ, flores Primulæ, caractèr ferè Nyctaginis limbo subintegro & involucro 1-floro distinctæ. Caractèr ex vivâ in hort. Paris. 1788, cujus semina ex Californiæ littore misit D. Colignon hortulanus pererrans mare pacificum duce D. de la Peirouse. Αβρὸς pulcher, delicatus.*

Pag. 95. LYSIMACHIA... adde: *Staminum filamenta basi coalita.*

Pag. 104. Antè NYCTANTHEM, adde:

MAYTENUS, Mol. \* *Mayten du Chili.* Calix 1-phyllus minimus 5-lobus. Corolla 1-petala campanulata integra. Stamina 2. Germen superum; stylus 1; stigma 1. Capsula parva subovata compressa, marginibus dehiscens 2-valvis, valvis medio semiseptiferis reflexis, 2-ocularis 2-sperma, seminibus ovato-oblongis imo loculo affixis; corculum planum in perispermio carnosio. *Arbuscula Phyllireæ facie; folia opposita aut alterna, sempervirentia; flores sparsi; semen 1 cum loculo sæpè abortivum. Caractèr ex Molinâ Chil. hist., & ex Feuill. Chil. 3. t. 27 & ex siccis fructibus Dombeyi cujus in herbario conferatur. An congener aut affinis Banksia Forst. t. 4, discrepans calice nullo & corollâ 4-lobâ & semine unico, Passerinae species 2-andra ex L. Suppl.*

Pag. 113. NEPETA... adde: *Byttropogon D. L'Herit. Sert. Angl., complectens N. pectinatum & Ballotam suaveolentem L. ex ipso distinguitur calice 5-aristato ad faucem barbato, lobo corollæ infimo productiore, staminibus distantibus.*

Pag. 113. Post PERILLAM, adde:

HYPTIS, Jacq. \* Calix turbinatus 5-fidus subæqualis. Corolla parva infundibuliformis paulò longior, fauce ampliata, limbo patens labiata, superius erecta 2-fida, inferius 2-loba lobo medio majore concavo. Stamina in labium inferius declinata. *Frutices suffruticesve; flores minimi, in H. verticillatâ axillares distincti subsessiles quasi verticillati; in H. capitatâ (eâdem cum Melissâ... Plum. ic. 163. f. 2. seu Clinopodio rugoso L.) capitati 1-stigmatosi axillares, capitulis solitariis longius pedunculatis involucro polyphylllo cinctis. Caractèr ex Jacq. Collect. 1. p. 101. 102, & icon. rar. 113. 114, qui corollam à staminibus declinatis resupinatam judicat & inde nomen ducit. An insuper stamina sub labio inferiore inserta, ut in corollâ Ocymi sic verè resupinatâ?*

Pag. 116. GERMANEA... adde: *Genus idem cum Plectrantho L'Herit. fasc. t. 41. 42.*



Pag. 122. LINDERNIA... adde : *An congener Ambulia Lamark Dict. 1. p. 128, quæ Manga-nari Rheed. Mal. 10. t. 6?*

Pag. 126. Post PHYSALIDEM, adde :

WITHERINGIA, L'Herit. \* Calix urceolatus sub 4-dentatus persistens. Corolla tubo brevi intus 4-foveato & mellifluo, fauce villis clausâ, limbo 4-partito patente. Stamina 4, foveolis alterna, medio tubo adnata, filamentis villosis brevibus basi utrinque appendiculatis; antheræ conniventes oblongæ, latere dehiscentes. Stylus 1; stigma capitatum. Fructus... baccatus 2-locularis polyspermus? Radices fusiformes fasciculatæ; caules herbacei; folia alterna, floralia geminata; flores axillares. Character ex D. L'Herit. Sert. Angl. 33. t. 1.

Pag. 147. ASCLEPIAS... adde : *Autoribus qui de Asclepiadum genitalibus differuere adjiciendus D. Jacquin de iis fusiùs differens in Miscell. Austr. 1. p. 1-31. t. 1-4, & structuram docens similem in Stapeliâ cujus ideò character reformandus.*

Pag. 152. SIDEROXYLUM... adde : *Congener Auzuba Plum. mss. 5. t. 125.*

Pag. 164. CAMPANULA... Corolla C. pentagoniæ rotata... adde : *huic ut & C. speculo, C. hybridæ aliisque similiter corollatis capsula oblonga prismatica 2-3-locularis apice dehiscens; has D. Durande designat nomine generico Legouziæ, D. L'Heritier in Sert. Angl. nomine Prismatocarpi. Idem C. tenellam LS. calice 5-partito, corollâ sub 5-petalâ, germine vix infero, capsulâ 3-5-valvi distinctam secernit nomine Lightfootiæ.*

Pag. 172. CARTHAMUS... adde : *C. lævis Hill. Kew. t. 5 nunc est Stokefia L'Herit Sert. Angl., genus distinctum cui calix foliaceus subimbricatus, flores flosculosi, hermaphroditi, centrales regulares, marginales irregulares radium constituentes, pappus filamentosus, regularium quaternus semine 4-gono, irregularium ternus semine 3-gono, receptaculum nudum.*

Pag. 183. Post CALENDULAM, adde :

MADIA, Mol. \* *Madi du Chili. Flores radiati, flosculis hermaphroditis, ligulis foemineis longissimis 3-dentatis. Calix simplex 8-phyllus pubescens foliolis linearibus. Semina hinc plana, inde convexa. Herbæ erectæ; folia alterna; flores terminales & axillares lutei. Oleum è semine M. sativæ expressum, in Chiloë usitatissimum. Character ex Molinâ Chil. & ex Fevill. Chil. 3. t. 26.*

Pag. 183. MATRICARIA... adde : *ex D. L'Herit. Sert. Angl. pappus obsolete dentatus 2-cornis & receptaculum favosum in M. asteroïde L. & M. Glastifoliâ Hill. Kew. t. 3, quas ideò distinguit nomine Boltoniæ.*



- Pag. 185. **ATHANASIA**... adde : *Athanasias plures cum duplici Osmitæ & Leyserâ paleaceâ L. & Zoëgeâ Capensi LS. connectit D. L'Heritier (Sert. Angl.) nomine generico Relhaniæ cui receptaculum paleaceum, pappus membranaceus multifidus vel lacerus, flores radiati, calix oblongus imbricatus squamatus scariosus.*
- Pag. 204. **PSYCHOTRIA**... adde : *An congener Viscoïdes Jacq. Amer. t. 51. f. 1. frutex parasiticus pendulus floribus conformibus oppositè corymbosis terminalibus, foliis oppositis aveniis, fructu ignoto?*
- Pag. 211. **OVIDEA**... adde : *Germen verè superum & ideò genus Viti-  
cibus contèrminum.*
- Pag. 218. **CUSSONIA**... adde : *Confer Sciodaphyllum Brown. Jam.  
p. 190. t. 19. f. 1. 2.*
- Pag. 247. **PAULLINIA**... adde : *styli 3; stigmata 3.*
- Pag. 247. **SAPINDUS**... adde : *Congener ex Linn. Suppl. Kolreuteria  
Laxm. Petrop. v. 16. p. 561. t. 17. L'Herit. Sert. Angl.,  
distincta ex D. L'Herit. calice 5-phyllo, squamis petalorum  
2-partitis, germine stipitato, stylo 3-gono, capsulâ  
3-loculari loculis 2-spermis.*
- Pag. 253. **TRIOPTERIS**... adde : *Observante Cavanillæo, stamina hujus  
ut & Banisteriæ basi monadelpha, & species insuper quædam  
4-alatæ & una 1-alatâ alâ membranaceâ magnâ capsulam  
ambiente, ab eodem in nova genera procudendæ.*
- Pag. 262. **TONABEA**... adde : *Hujus congener Arbor minor diffusa...  
Brown. Jam. t. 20. f. 3.*
- Pag. 264. **TINUS**... *Frutex Peruvianus huic adjunctus, generico Strigiliæ  
nomine designatur in Cavan. dissert. septimâ t. 201.*
- Pag. 265. **GUAREA**... *Capsula... 4-valvis, adde : valvis crassiusculis  
subcarnosis. Indè genus Meliæ accedens.*
- Pag. 277. **ASSONIA**... adde : *Congener Vahlia Dahl. obs. bot.*
- Pag. 278. **KLEINHOVIA**... adde : *Congener Arbor Judæ Luzonis  
Camell. ic. 31. Rai hist. 3. Lux. 77. n. 5.*
- Pag. 280. **DRYMIS**... adde : *Synonymon WINTERA Murr.*
- Pag. 290. **ANTICHORUS**... adde : *Hujus congener Jussîææ affinis her-  
bacea octandra.. Loëfl. p. 314.*
- Pag. 314. **CLAYTONIA**... adde : *C. Portulacaria L. nunc Portulacaria  
afra Jacq. Coll. 1. p. 162. t. 22. genus distinctum.*
- Pag. 318. **CERCODEA**... adde : *Congener Haloragis Jacq. ic. rar. 69.*
- Pag. 325. Post **CATINGAM**, adde :
- EUCALYPTUS**, L'Herit. \* *Calix truncatus integer. Petalum  
calyptræforme caducum. Stamina numerosa. Germen inferum;*



stylus 1. Capsula sub4-locularis apice dehiscens polysperma:  
*Caracter ex D. L'Herit Sert. Angl.*

Pag. 335. ROSA... adde : *Species nova simplicifolia stipulis spinæformibus, & calicinis laciniis omnibus nudis, Persica inventore D. Michaut.*

Pag. 343. HOMALIUM... adde : *Congener Arbor anonymos Plum. mss. t. 110.*

Pag. 369. CONNARUS... adde : *Species 5-styla quæ C. pentagynus Lamark. Dict. 2. p. 95, Cavan. dissert. sept. t. 223, diversa est, observante Cavanilleo, à Rhoë... Burm. Zeyl. t. 89, foliis constans 3-nervibus non 1-nervibus ut in icone Burmanni. An C. Africanus Leguminosis addendus?*

Pag. 378. RUBENTIA... adde : *An congener Elæodendrum Orientale Jacq. ic. rar. 48, Murr. syst.? Affinis etiam Peumus Molina Chil., cui ex Autore folia alterna aut rarius opposita, calix 6-partitus, petala 6, stamina 6, germen 1-stylum, drupa olivæformis, sæta nuce 1-spermâ, semine oleoso : hujus species quadruplex arborea, Peumo Chiloensis dicta.*

Pag. 381. BRUNIA... adde : *B. radiata L. & B. glutinosa L. utraque insignis interioribus calicis communis foliolis longioribus patentibus radium mentientibus, nomine Staaviæ distinguitur à D. Dahl. obs. bot.*

Pag. 387. XYLOPHYLLA... adde : *X. latifoliam L. aliter describit D. L'Herit. Sert. Angl. nomine Genesiphyllæ, distinctam floribus monoïcis, calice 6-partito, masculo 6-glanduloso 3-andro filamentis infra connatis, disco 3-gono germen cingente, stylis 3-partitis, loculis 2-spermis, inde affiniorem Phyllantho.*

Pag. 389. CROTON... adde : *An congener Colliguaja Molin. Chil. (Colliguaï du Chili), à Fevilleo 3. p. 60 Ricinoïdes dicta, frutex lactescens oppositifolius, floribus amentaceis 8-andris calice 4-fido, cæterum similis ex descr. Molinae?*

Pag. 405. GUNNERA... *Congener Panke Feuill. 2. t. 30... adde : eadem cum Panke acauli Molin. Chil. & distinctissima à Panke tinctoriâ ejusdem cui caulis 5-pedalis apice 3-4-phyllus & racemiflorus floribus intrâ calicem 4-fidum 1-petalis corollâ campanulatâ, 9-andris 1-gynis 1-stylis & in capsulâ 2-valvi 1-spermis. Huic caulescenti accedit Laupanke Feuill. 2. t. 31 similiter tinctoria & caulescens, sed ex Fevilleo 4-6-petala 4-6-andra intrâ calicem 4-6-fidum, & cum ipsâ in distincto genere sejungenda.*

Pag. 410. QUERCUS... adde : *Incautè ac quasi lapsu calami, gallis Q. cocciferi fuit adscriptus color ex ejusdem Cocco extractus;*



Obs. Dùm ultima incertæ sedis & prima Appendicis genera prelo committerentur, innotuit novissimus Gærtneri tractatus de fructibus & seminibus plantarum, in quo cursim pervoluto comparuerunt optimæ de perispermio seu, ut ait, de *Albumine* observationes, hujus tandiù neglecti præstantiam confirmanes, aliæ in præmissis ordinibus jam diffusæ, aliæ benèmultæ in iisdem desideratæ. Operi mox promulgando nequeunt adjici utpotè numerosiores, sedulò meditandæ nec ociùs excerpendæ, Hic tantùm nonnulla Gærtneri rova genera memorare juvat quæ nostris aut affinia sunt aut omninò conformia. Sic nostræ Sonneratiæ apprimè convenit *Aubletia* Gærtn. t. 78; *Badulæ Anguillaria* t. 77; *Nyctanthi Parilium* t. 57; *Calamo Sagus* t. 10; *Coryphæ Sabal Euterpe* t. 9; *Nelumbio Nelumbo* t. 19; *Euphorix Scytalia* t. 42; *Bolaci Chamitis tricuspida* t. 22; *Azorellæ Chamitis integrifolia* t. 22; *Castuvio Acajuba* t. 40; *Pongatio Sphenoclea* t. 24; *Polygono claviculato Brunnichia* t. 45. Sic etiam *Meispermio* affinis videtur *Meesia* t. 79; *Leptospermio Fabricia* t. 35; *Melaleucæ Metrofideros* t. 34; *Eugenix Greggia & Sysygium* t. 33; *Mimusopi Phlebolithis* t. 43; *Connaro Africano Omphalobium* t. 46. Dantur præterea conformes, ipso indicante Gærtnero, *Lobelia siphilitica & Rapuntium* t. 30, *Cynosurus coracanus & Eleusine* t. 1, *Phoridium tenax & Chlamydia* t. 18, *Myrica Nagi* Thunb. & *Nageia* t. 39, *Potentilla Norwegica & Pentaphyllum* t. 73, *Melicope & Entoganum* t. 68, *Coix & Lithagrostis* t. 1, *Chamærops & Chamæripes* t. 9, *Carex lithosperma* L. & *Sclerya* t. 2, *Psidium decaspermum* LS. & *Nelutris* t. 27, *Tordylium anthriscus* L. & *Torilis* t. 20, *Athamantha Cretensis* L. & *Libanotis* t. 21, *Athamantha cervaria* L. & *Cervaria* t. 21, *Daucus Visnaga* L. & *Visnaga* t. 21, *Laserpitium aquilegifolium & Siler* t. 22, *Chærophyllum aureum* L. & *Myrrhis* t. 23, *Æthusa Meum* L. & *Meum* t. 23, *Pimpinella Anisum* L. & *Anisum* t. 23, *Rhizophora corniculata* L. & *Ægiceras* t. 46, *Lippia ovata* L. & *Dalea* t. 51, *Grewia Microcos* L. & *Microcos* t. 57, *Hypericum Androsæmum & Androsamum* t. 59, *Artocarpus & Sitodium* t. 71. 72 &c. Omnia hæc in ipso tractatu recognoscenda sunt cum accuratis ejusdem iconibus corculi situm, perispermii formam, seminis nexum & fructûs dehiscenciam representantibus.

F I N I S.



# INDEX ALPHABETICUS.

ORDINUM, Generum, *Synonymorum.*

## A.

<i>Aberemoa.</i>	Pag. 284	<i>Actea.</i>	235
<i>Abies.</i>	414	<i>Acyphylla.</i>	222
<i>Ablania.</i>	440	<i>Adamboë.</i>	331
<i>Abroma.</i>	276	<i>Adansonnia.</i>	275
<i>Abronia.</i>	448	<i>Adelia.</i>	388
<i>Abrotanum.</i>	184	<i>Adelia.</i>	324
<i>Abrus.</i>	357	<i>Adenanthera.</i>	349
<i>Absinthium.</i>	184	<i>Adenia.</i>	436
<i>Abuta.</i>	286	<i>Adenostema.</i>	184
<i>Abutilon.</i>	273	<i>Adhatoda.</i>	104
<i>Acacia.</i>	346	<i>Adiantum.</i>	15
<i>Acæna.</i>	336	<i>Adonis.</i>	232
<i>Acajuba.</i>	453	<i>Adoxa.</i>	309
<i>Acalypha.</i>	390	<i>Ægiceras.</i>	453
<i>Acalypha.</i>	390	<i>Ægilops.</i>	30
<i>ACANTHI.</i>	102	<i>Ægilops.</i>	31
<i>Acanthus.</i>	103	<i>Ægiphila.</i>	107
<i>Acanthus.</i>	103	<i>Ægopodium.</i>	219
<i>Acer.</i>	251	<i>Ægopricon.</i>	391
<i>Acer.</i>	252, 253	<i>Ærua.</i>	88
<i>ACERA.</i>	250	<i>Æschinomene.</i>	362
<i>Acetosa.</i>	82	<i>Æsculus.</i>	251
<i>Achillea.</i>	186	<i>Æthusa.</i>	220, 453
<i>Achimenes.</i>	119	<i>Agapanthus.</i>	448
<i>Achras.</i>	152	<i>Agaricus.</i>	4
<i>Achras.</i>	152	<i>Agaricus.</i>	4, 6
<i>Achyranthes.</i>	88	<i>Agathophyllum.</i>	431
<i>Achyranthes.</i>	88	<i>Agave.</i>	51
<i>Achyrophorus.</i>	171	<i>Ageratum.</i>	178
<i>Acioa.</i>	342	<i>Ageratum.</i>	100
<i>Acisanthera.</i>	332	<i>Agihalid.</i>	260
<i>Acisanthera.</i>	330	<i>Agrimonia.</i>	336
<i>Acnida.</i>	85	<i>Agrimonoides.</i>	336
<i>Aconitum.</i>	234	<i>Agriphyllum.</i>	190
<i>Acorus.</i>	25	<i>Agrostemma.</i>	302
<i>Acouroa.</i>	364	<i>Agrostis.</i>	29
<i>ACOTYLEDONES.</i>	1-20	<i>Agyneja.</i>	387
<i>Acronychia.</i>	332	<i>Ahouai.</i>	149
<i>Acrostichum.</i>	15	<i>Ajovea.</i>	80



<i>Aira.</i>	31	<i>Amaryllis.</i>	55, 448
<i>Ajuga.</i>	112	<i>Amasonia.</i>	418
<i>Aizoon.</i>	316	<i>Ambalam.</i>	373
<i>Alamotou.</i>	292	<i>Ambelania.</i>	148
<i>Alangium.</i>	323	<i>Ambinux.</i>	389
<i>Alaternus.</i>	380	<i>Amblatum.</i>	102
<i>Albuca.</i>	53	<i>Ambora.</i>	401
<i>Alcea.</i>	272	<i>Ambroma.</i>	276
<i>Alchimilla.</i>	337	<i>Ambrosia.</i>	191
<i>Alchimilla.</i>	75, 314, 337	<i>Ambrosinia.</i>	24
<i>Aldrovanda.</i>	429	<i>Ambulia.</i>	450
<i>Aletris.</i>	51	<i>Amellus.</i>	190
<i>Aletris.</i>	448	<i>AMENTACEÆ.</i>	407
<i>Aleurites.</i>	389	<i>Amera.</i>	373
<i>Alga.</i>	6, 24	<i>Amerimnon.</i>	363
<i>ALGÆ.</i>	5	<i>Amethyſtea.</i>	111
<i>Algoïdes.</i>	19	<i>Ammania.</i>	333
<i>Alhagi.</i>	362	<i>Ammi.</i>	224
<i>Alisma.</i>	46	<i>Ammi.</i>	222
<i>Alisma.</i>	46	<i>Amomum.</i>	63
<i>Alkekengi.</i>	126	<i>Amorpha.</i>	357
<i>Allamanda.</i>	148	<i>Amygdalus.</i>	341
<i>Allionia.</i>	195	<i>Amyris.</i>	371
<i>Allium.</i>	53	<i>Anabasis.</i>	84
<i>Allophyllus.</i>	258	<i>Anacamperôs.</i>	307
<i>Alnus.</i>	409	<i>Anacardium.</i>	368
<i>Aloë.</i>	52	<i>Anacardium.</i>	368
<i>Aloë.</i>	51	<i>Anacyclus.</i>	185
<i>Alopecurus.</i>	29	<i>Anagallis.</i>	95
<i>Alpinia.</i>	63	<i>Anagallis.</i>	95
<i>Alfinaſtrum.</i>	300	<i>Anagyris.</i>	352
<i>Alſine.</i>	300	<i>Ananas.</i>	50
<i>Alſine.</i>	96, 299, 300, 301, 316	<i>Anapodophyllum.</i>	235
<i>Alſinoïdes.</i>	313	<i>Anaſſer.</i>	150
<i>Alſtonia.</i>	157	<i>Anaſtatica.</i>	241
<i>Aſtroëmeria.</i>	56	<i>Anaſtatica.</i>	241
<i>Alternanthera.</i>	89	<i>Anavinga.</i>	438
<i>Althæa.</i>	272	<i>Anchuſa.</i>	131
<i>Althæa.</i>	272	<i>Anciſtrum.</i>	336
<i>Alyſſoïdes.</i>	240, 241	<i>Anda.</i>	389
<i>Alyſſon.</i>	240	<i>Andareſe.</i>	408
<i>Alyſſum.</i>	240	<i>Andira.</i>	363
<i>Amanita.</i>	4	<i>Andrachne.</i>	387
<i>Amanoa.</i>	437	<i>Andromeda.</i>	160
<i>AMARANTHI.</i>	87	<i>Andropogon.</i>	30
<i>Amaranthoïdes.</i>	88	<i>Andropogon.</i>	30
<i>Amaranthus.</i>	88	<i>Androſace.</i>	96
<i>Amaranthus.</i>	88	<i>Androſace.</i>	135



<i>Androsæmum.</i>	255, 453	<i>Aporetica.</i>	247
<i>Andryala.</i>	171	<i>Aquartia.</i>	126
<i>Anemone.</i>	232	<i>Aquifolium.</i>	379
<i>Anemone.</i>	233	<i>Aquilaria.</i>	439
<i>Anethum.</i>	219	<i>Aquilegia.</i>	234
<i>Angelica.</i>	222	<i>Aquilicia.</i>	266
<i>Angelica.</i>	219, 221, 222, 223	<i>Arabis.</i>	238
<i>Angelin.</i>	363	<i>Arachis.</i>	354
<i>Anguillaria.</i>	453	<i>Arachidna.</i>	354
<i>Anguria.</i>	395	<i>Aralia.</i>	218
<i>Anguria.</i>	395, 396	<i>Aralia.</i>	218
<i>Aniba.</i>	438	<i>ARALIÆ.</i>	217
<i>Anisum.</i>	453	<i>Araliastrum.</i>	218
<i>Anoda.</i>	273	<i>Arapabaca.</i>	143
<i>Anona.</i>	283	<i>Araucaria.</i>	413
<i>ANONÆ.</i>	283	<i>Arbor anonymos.</i>	452
<i>Anonis.</i>	354	— <i>brasiliانا.</i>	339
<i>Anredera.</i>	84, 448	— <i>cæli.</i>	373
<i>Anthemis.</i>	185	— <i>judæ.</i>	451
<i>Anthericum.</i>	52	— <i>minor.</i>	451
<i>Anthericum.</i>	47, 52	— <i>palorum.</i>	248
<i>Anthistiria.</i>	30	— <i>sinensis.</i>	324
<i>Anthoceros.</i>	8	— <i>spinosa.</i>	426
<i>Antholyza.</i>	58	<i>Arbutus.</i>	160
<i>Anthospermum.</i>	197	<i>Arctium.</i>	172
<i>Anthoxanthum.</i>	29	<i>Arctium.</i>	173
<i>Anthyllis.</i>	355	<i>Arctopus.</i>	225
<i>Antichorus.</i>	290, 451	<i>Arctotheca.</i>	190
<i>Antidesma.</i>	443	<i>Arctotis.</i>	190
<i>Antirhea.</i>	204	<i>Arduina.</i>	149
<i>Antirrhium.</i>	120	<i>Areca.</i>	38
<i>Antirrhinum.</i>	120	<i>Arenaria.</i>	301
<i>Antura.</i>	149	<i>Aretia.</i>	96
<i>Apactis.</i>	432	<i>Arethusa.</i>	65
<i>Apalatoa.</i>	365	<i>Arethusa.</i>	65
<i>Aparine.</i>	196, 197	<i>Argemone.</i>	236
<i>Apeiba.</i>	291	<i>Argolafia.</i>	60
<i>Aphaca.</i>	359	<i>Argophyllum.</i>	161
<i>Aphanes.</i>	337	<i>Argythamnia.</i>	386
<i>Aphyllanthes.</i>	44	<i>Arisarum.</i>	24
<i>Aphyteia.</i>	436	<i>Aristida.</i>	29
<i>Apium.</i>	219	<i>Aristolochia.</i>	73
<i>Apium.</i>	221	<i>ARISTOLOCHIÆ.</i>	72
<i>Apluda.</i>	33	<i>Aristotelia.</i>	433
<i>APOCINÆ.</i>	143	<i>Armeniaca.</i>	341
<i>Apocinum.</i>	146	<i>Arnebia.</i>	130
<i>Apocinum.</i>	146, 147	<i>Arnica.</i>	182
<i>Aponogeton</i>	19	<i>AROIDEÆ.</i>	23



<i>Arounda.</i>	366	<i>Atropa.</i>	125, 126
<i>Arteria.</i>	224	<i>Aubletia.</i>	453
<i>Artemisia.</i>	184	<i>Aucuba.</i>	382
<i>Artemisia.</i>	184	<i>Aucuba.</i>	162
<i>Artocarpus.</i>	402, 453	<i>Avellano.</i>	425
<i>Aruba.</i>	298	<i>Avena.</i>	32
<i>Arum.</i>	24	<i>Averrhoa.</i>	375
<i>Arundo.</i>	32	<i>Avicennia.</i>	108
<i>Arundo.</i>	30	<b>AURANTIA.</b>	259
<i>Asarina.</i>	120	<i>Aurantium.</i>	261
<i>Afarum.</i>	73	<i>Auricula urfi.</i>	96
<i>Ascarina.</i>	442	<i>Auricularia.</i>	4
<i>Asclepias.</i>	147	<i>Auzuba.</i>	450
<i>Asclepias.</i>	146, 450	<i>Axyris.</i>	86
<i>Ascyrum.</i>	254	<i>Ayenia.</i>	278
<i>Ascyrum.</i>	255	<i>Aylantus.</i>	373
<i>Aspalathus.</i>	353	<i>Aytonia.</i>	264
<i>Aspalathus.</i>	358	<i>Aytonia.</i>	447
<b>ASPARAGI.</b>	40	<i>Azalea.</i>	158
<i>Asparagus.</i>	41	<i>Azedarach.</i>	265
<i>Asperugo.</i>	131	<i>Azima.</i>	425
<i>Asperula.</i>	196	<i>Azolla.</i>	17
<b>ASPHODELI.</b>	51	<i>Azorella.</i>	226, 453
<i>Asphodelus.</i>	52		
<i>Asphodelus.</i>	52		
<i>Asplenium.</i>	15		
<i>Astionia.</i>	277, 451		
<i>Aster.</i>	181		
<i>Aster.</i>	180		
<i>Asteriscus.</i>	186		
<i>Asteroïdes.</i>	186		
<i>Astragaloides.</i>	358		
<i>Astragalus.</i>	358		
<i>Astragalus.</i>	357		
<i>Astrantia.</i>	225		
<i>Astronium.</i>	427		
<i>Ateramnus.</i>	386		
<i>Athamantha.</i>	223		
<i>Athamantha.</i>	223, 453		
<i>Athanasia.</i>	185, 451		
<i>Athrodactylis.</i>	444		
<i>Atractylis.</i>	172		
<i>Atractylis.</i>	190		
<i>Atragene.</i>	232		
<i>Atraphaxis.</i>	82		
<b>ATRIPLICES.</b>	83		
<i>Atriplex.</i>	85		
<i>Atropa.</i>	125		
		<b>B.</b>	
		<i>Baccharis.</i>	180
		<i>Bache.</i>	38
		<i>Bacopa.</i>	313
		<i>Badula.</i>	420, 453
		<i>Bæa.</i>	121
		<i>Bæckea.</i>	321
		<i>Bæobotrys.</i>	162
		<i>Bagassa.</i>	406
		<i>Bagat-pat.</i>	325
		<i>Balanophora.</i>	445
		<i>Balingasan.</i>	326
		<i>Ballieria.</i>	188
		<i>Ballota.</i>	114, 449
		<i>Ballote.</i>	114
		<i>Balsamina.</i>	270
		<i>Baltimora.</i>	187
		<i>Banara.</i>	293
		<i>Banava.</i>	331
		<i>Bandura.</i>	444
		<i>Banisteria.</i>	252
		<i>Banksia.</i>	79
		<i>Banksia.</i>	77, 449
		<i>Barba capræ.</i>	332



—jovis.	355	Blæria.	160
Barbylus.	430	Blakea.	328
Barleria.	103	Blakwellia.	343
Barnadesia.	178	Blasia.	8
Barringtonia.	326	Blattaria.	124
Bartsia.	100	Blauti.	325
Basella.	84	Blechnum.	15
Basilæa.	52, 448	Blepharis.	103
Bassia.	152	Blittum.	86
Bassovia.	419	Blittum.	88
Batis.	443	Bobartia.	29
Bauhinia.	351	Bocconia.	236
Befaria.	159	Boehmeria.	403
Begonia.	436	Boehmeria.	390
Bela-modagan.	165	Boerhaavia.	91
Belharnosia.	236	Bolax.	226, 453
Belladonna.	125	Boletus.	4
Bellis.	183	Boletus.	3, 4
Bellis.	182	Boltonia.	450
Bellium.	182	Bombax.	275
Bellonia.	200	Bonduc.	350
Berardia.	172	Bontia.	127
BERBERIDES.	286	Borassus.	39
Berberis.	286	Borbonia.	353
Bergera.	260	BORRAGINEÆ.	128
Bergia.	301	Borrago.	131
Bermudiana.	57	Bosea.	84
Bernardia.	388	Bouati.	429
Bertiera.	200	Brabeium.	79
Besleria.	121	Brachyglottis.	181
Beta.	85	Brami.	333
Betonica.	114	Brassica.	238
Betonica.	114	Brathys.	254
Betula.	409	Breynia.	243
Bidens.	188	Briza.	32
Bidens.	187, 188	Bromelia.	50
Bignonia.	139	BROMELIÆ.	49
Bignonia.	136, 138, 139, 150	Bromus.	32
BIGNONIÆ.	137	Brossæa.	161
Bihai.	61	Browallia.	123
Bineetaria.	152	Brownæa.	366
Bipinnula.	65	Brucea.	373
Biscutella.	239	Brunella.	116
Bisserula.	358	Brunia.	381, 452
Bislorta.	82	Brunnichia.	453
Bixa.	293	Brunsfelfia.	127
Blackburnia.	375	Bryonia.	394
Blahdia.	421	Bryonia.	395



Bryum.	11	<i>Cakile.</i>	242
<i>Bryum.</i>	11	<i>Calamintha.</i>	112, 115
Bubon.	221	<i>Calamus.</i>	37, 453
<i>Bucephalon.</i>	443	<i>Calceolaria.</i>	120
Buchnera.	100	<i>Calceolus.</i>	65
Bucida.	75	<i>Calcitrapa.</i>	173
Budleia.	118	<i>Calea.</i>	185
Bufonia.	300	<i>Calendula.</i>	183
Buginvillæa.	91	<i>Calinea.</i>	434
<i>Buglossum.</i>	130, 131	<i>Calla.</i>	24
Bugula.	112	<i>Callicarpa.</i>	107
<i>Bulbocastanum.</i>	223	<i>Callicornia.</i>	179
Bulbocodium.	54	<i>Calligonum.</i>	83
Bumalda.	381	<i>Callisia.</i>	45
Bunias.	241	<i>Callitriche.</i>	19
Bunium.	223	<i>Callixene.</i>	41
Buphtalmum.	186	<i>Calodendrum.</i>	427
<i>Buphtalmum.</i>	185	<i>Calophyllum.</i>	258
Buplevrum.	224	<i>Caltha.</i>	234
Burmanna.	50	<i>Caltha.</i>	183
<i>Bursa pastoris.</i>	241	<i>Calumbra.</i>	285
Bursera.	372	<i>Calycanthus.</i>	342
Butomus.	46	<i>Camara.</i>	109
Butonica.	326	<i>Camangsi.</i>	402
<i>Butonica.</i>	326	<i>Cambogia.</i>	256
Buxbaumia.	12	<i>Camelina.</i>	241
Buxus.	388	<i>Camellia.</i>	262
Byssus.	6	<i>Cameraria.</i>	145
<i>Bystropogon.</i>	449	<i>Campanula.</i>	164, 450
Byttneria.	277	<i>Campanula.</i>	164
		CAMPANULÆ.	163
		<i>Camphorata.</i>	84
<i>Caapeba.</i>	285	<i>Camphorosma.</i>	84
Cabomba.	46	<i>Camirium.</i>	389
Cacalia.	178	<i>Camunium.</i>	261
<i>Cacao.</i>	276	<i>Cananga.</i>	284
Cachrys.	223	<i>Canarina.</i>	164
<i>Cachrys.</i>	222	<i>Canarium.</i>	370
Cacoucia.	320	<i>Canella.</i>	263
CACTI.	310	<i>Canephora.</i>	208
Cactus.	311	<i>Caniram.</i>	149
Cadaba.	243	<i>Canna.</i>	63
<i>Cadamba.</i>	207	<i>Cannabis.</i>	404
<i>Cadia.</i>	348	<i>Cannabina.</i>	445
Cæsalpina.	349	<i>Cannacorus.</i>	63
<i>Caidbeja.</i>	403	CANNÆ.	62
<i>Cainito.</i>	152	<i>Cansjava.</i>	405
<i>Caju-galedupa.</i>	363	<i>Cansjera.</i>	448

C.



Cantharellus.	4	Caryota.	38
Cantharifera.	444	Casearia.	438
Canthium.	204	Casia.	75
Canti.	205	Cassia.	348
Cantua.	136	Cassida.	117
Caoutchouc.	389	Cassine.	378
Capnoïdes.	237	Cassipourea.	432
CAPPARIDES.	242	Cassuvium.	368, 453
Capparis.	243	Cassytha.	439
Capraria.	118	Castanea.	409
CAPRIFOLIA.	210	Castilleja.	100
Caprifolium.	212	Casuarina.	412
Capsella.	241	Catalpa.	138
Capficum.	126	Catanance.	171
Capura.	437	Cataria.	113
Carachera.	109	Catesbea.	199
Caragana.	358	Catha.	427
Caraguata.	50	Catimbium.	62
Caraipa.	434	Catinga.	325
Caranichea.	208	Catonia.	441
Cardamindum.	269	Caturus.	390
Cardamine.	239	Caturus.	403
Cardiaca.	114	Caucalis.	224
Cardiospermum.	246	Caucalis.	224
Carduus.	173	Caucanthus.	253
Carduus.	172, 173	Ceanothus.	380
Carex.	26, 453	Cebatha.	285
Carex.	445	Cecropia.	402
Carica.	399	Cedrela.	266
Cariffa.	149	Cedrus.	413
Carlina.	172	Ceiba.	275
Carlina.	172	Celastrus.	378
Carolinea.	279	Celofia.	88
Caroxyulum.	85	Celfia.	124
Carpesium.	184	Celtis.	408
Carphalea.	198	Celtis.	420
Carpinus.	409	Cenchrus.	30
Carpodetus.	382	Cenia.	183
Carthamus.	172	Centaurea.	174
Carthamus.	190, 450	Centaurea.	173, 174
Carum.	219	Centaurium majus.	174
Carvi.	219, 221	— minus.	141, 142
Carvisolia.	223	Centella.	226
Caryocar.	435	Centunculus.	95
Caryophyllata.	338	Ceodes.	422
CARYOPHYLLÆ.	299	Cepa.	53
Caryophyllus.	325	Cephalanthus.	209
Caryophyllus.	302	Cerastium.	301



<i>Cerasus.</i>	340	<i>Chomelia.</i>	203
<i>Ceratocarpus.</i>	86	<i>Chondrilla.</i>	169
<i>Ceratoïdes.</i>	86	<i>Chondrilla.</i>	168
<i>Ceratonia.</i>	347	<i>Chondropetalum.</i>	44
<i>Ceratophyllum.</i>	18	<i>Christophoriana.</i>	235
<i>Ceratolanthus.</i>	396	<i>Chrysanthemum.</i>	183, 184
<i>Ceratosperrum.</i>	7	<i>Cbryfitrix.</i>	27
<i>Ceratostema.</i>	163	<i>Chrysobalanus.</i>	340
<i>Cerbera.</i>	149	<i>Chrysocoma.</i>	180
<i>Cercis.</i>	351	<i>Chrysogonum.</i>	188
<i>Cercodea.</i>	318, 451	<i>Chrysophyllum.</i>	152
<i>Cereus.</i>	311	<i>Chrysosplenium.</i>	309
<i>Cerithe.</i>	130	<i>Chuncoa.</i>	76
<i>Ceropegia.</i>	146	<i>Chupalon.</i>	164
<i>Cerúana.</i>	190	<i>Chuquiraga.</i>	178
<i>Cervaria.</i>	4	<i>Cicca.</i>	386
<i>Cestrum.</i>	126	<i>Cicer.</i>	361
<i>Chadara.</i>	292	<i>CICHORACEÆ.</i>	168
<i>Chærophyllum.</i>	220, 453	<i>Cichorium.</i>	171
<i>Chærophyllum.</i>	220, 223	<i>Cicuta.</i>	223
<i>Chalcas.</i>	260	<i>Cicuta.</i>	220, 221
<i>Chamæcerasus.</i>	212	<i>Cicutaria.</i>	221
<i>Chamædryas.</i>	112	<i>Cicutaria.</i>	222
<i>Chamælea.</i>	369	<i>Cienfuegosia.</i>	274
<i>Chamæmelum.</i>	183, 185	<i>Cimicifuga.</i>	234
<i>Chamænerion.</i>	319	<i>Cinchona.</i>	201
<i>Chamæpythis.</i>	112	<i>Cinchona.</i>	366
<i>Chamærhododendros.</i>	158, 159	<i>Cinara.</i>	173
<i>Chamæripes.</i>	453	<i>CINAROCEPHALÆ.</i>	171
<i>Chamærops.</i>	39, 453	<i>Cineraria.</i>	181
<i>Chamira.</i>	238	<i>Cinna.</i>	29
<i>Chamitis.</i>	453	<i>Ciponima.</i>	157
<i>Chara.</i>	18	<i>Cipura.</i>	58
<i>Cheiranthus.</i>	238	<i>Circæa.</i>	319
<i>Chelidonium.</i>	236	<i>Cirsium.</i>	172, 173
<i>Chelidonium.</i>	236	<i>Cissampelos.</i>	285
<i>Chelone.</i>	127	<i>Cissus.</i>	267
<i>Chelone.</i>	100	<i>CISTI.</i>	294
<i>Chenolea.</i>	85	<i>Cistus.</i>	294
<i>Chenopodium.</i>	85	<i>Cistus.</i>	294
<i>Cherleria.</i>	301	<i>Citharexylum.</i>	108
<i>Chimarrhis.</i>	204	<i>Citrus.</i>	261
<i>Chiococca.</i>	204	<i>Cladium.</i>	27
<i>Chionanthus.</i>	105	<i>Clandestina.</i>	102
<i>Chironia.</i>	142	<i>Clathrus.</i>	3
<i>Chlamydia.</i>	453	<i>Clavaria.</i>	5
<i>Chlora.</i>	142	<i>Clavaria.</i>	6
<i>Chloranthus.</i>	423	<i>Clausena.</i>	450



Claytonia.	314, 451	Combretum.	320
Clematis.	232	Cometes.	437
Clematitis.	232	Commelina.	45
Cleome.	243	Commerfonia.	428
Cleome.	243	Commerfonia.	326, 377
Cleonia.	117	Conocladia.	370
Clerodendrum.	106	Conferva.	6
Clethra.	160	CONIFERÆ.	411
Cleyera.	433	Conium.	223
Clibadium.	191	Connarus.	369, 452, 453
Cliffortia.	337	Conobea.	97
Clinopodium.	115	Conocarpus.	75
Clinopodium.	115, 449	Conoria.	287
Clitoria.	357	Conohoria.	287
Clusia.	256	Convallaria.	42
Clutia.	387	CONVOLVULI.	132
Clymenum.	359	Convolvulus.	133
Glypeola.	240	Conyza.	180
Cneorum.	369	Conyza.	180, 185, 190
Cnestis.	374	Conyzoides.	184
Cnicus.	172	Cookia.	261
Cnicus.	172, 173, 174	Copaïfera.	365
Cnidium.	220, 223	Copaïva.	365
Coa.	251	Coprosma.	205
Coca.	254	Corallina.	19
Coccocipfilum.	198	Corallodendrum.	356
Coccoloba.	82	Corallofungus.	5, 6
Cochlearia.	240	Coralloïdes.	5
Cocos.	38	Corchorus.	290
Codda-pana.	39	Cordia.	128
Codia.	430	Cordyline.	41
Codon.	422	Coreopsis.	188
Cænopteris.	447	Coriandrum.	220
Cofer.	157	Coriaria.	441
Coffea.	204	Corindum.	246
Coffea.	203, 204	Coris.	96
Coix.	34, 453	Cornelia.	333
Colchicum.	47	Cornucopiæ.	33
Coldenia.	130	Cornus.	214
Colinsonia.	112	Cornutia.	107
Colletia.	380	Corona imperialis.	49
Colliguaja.	452	— regalis.	52
Colocynthis.	395, 396	— solis.	188, 189
Colophonina.	372	Coronilla.	361
Colpoon.	75	Coronopus.	90
Columnea.	121	Corrigiola.	313
Colutea.	359	Cortusa.	96
Comarum.	338	Cortusa.	63



<i>Cortex papetarius.</i>	424	<i>Croton.</i>	389, 391
<i>Corylus.</i>	410	<i>Crucianella.</i>	197
<i>CORYMBIFERÆ.</i>	177	<i>Cruciata.</i>	196, 197
<i>Corymbium.</i>	176	<i>CRUCIFERÆ.</i>	237
<i>Corynocarpus.</i>	288	<i>Crucita.</i>	85
<i>Corypha.</i>	39, 453	<i>Cucubalus.</i>	302
<i>Coryspermum.</i>	86	<i>Cucumis.</i>	395
<i>Cosmia.</i>	312	<i>Cucurbita.</i>	396
<i>Costignia.</i>	248	<i>CUCURBITACEÆ.</i>	393
<i>Costus.</i>	63	<i>Cudranus.</i>	263
<i>Cotinus.</i>	369	<i>Cujete.</i>	127
<i>Cotula.</i>	184	<i>Culhamia.</i>	279
<i>Cotula.</i>	183, 185	<i>Cuminoides.</i>	227
<i>Cotyledon.</i>	307	<i>Cuminum.</i>	221
<i>Coublandia.</i>	352	<i>Cunila.</i>	111
<i>Couepia.</i>	341	<i>Cunonia.</i>	310
<i>Coumarouna.</i>	364	<i>Cupania.</i>	249
<i>Couratari.</i>	327, 397	<i>Cuphea.</i>	332
<i>Courbaril.</i>	351	<i>Cupressus.</i>	413
<i>Couroupita.</i>	326	<i>Curatella.</i>	282
<i>Coussapoa.</i>	406	<i>Curcuma.</i>	64
<i>Coussarea.</i>	203	<i>Cururu.</i>	247
<i>Coutarea.</i>	202	<i>Cuscuta.</i>	135
<i>Coutoubea.</i>	141	<i>Cussonia.</i>	218, 451
<i>Crambe.</i>	242	<i>Cyanella.</i>	53
<i>Craniolaria.</i>	140	<i>Cyanus.</i>	174
<i>Craniolaria.</i>	165	<i>Cyanus.</i>	174
<i>Crassula.</i>	307	<i>Cyathus.</i>	6
<i>Cratægus.</i>	335	<i>Cycas.</i>	16
<i>Cratægus.</i>	335	<i>Cyclamen.</i>	97
<i>Crateva.</i>	244	<i>Cydonia.</i>	335
<i>Crenea.</i>	332	<i>Cymbaria.</i>	119
<i>Crepis.</i>	169	<i>Cynanchum.</i>	147
<i>Crepis.</i>	169, 170	<i>Cynocrambe.</i>	405
<i>Crescentia.</i>	127	<i>Cynoglossoides.</i>	131
<i>Cressa.</i>	134	<i>Cynoglossum.</i>	131
<i>Crinodendrum.</i>	431	<i>Cynometra.</i>	350
<i>Crinum.</i>	54, 448	<i>Cynometra.</i>	351
<i>Crinum.</i>	448	<i>Cynomorium.</i>	445
<i>Cristaria.</i>	320	<i>Cynofurus.</i>	31, 453
<i>Crithmum.</i>	223	<i>Cynofurus.</i>	31
<i>Critonia.</i>	178	<i>CYPEROÏDEÆ.</i>	26
<i>Crocodilium.</i>	173	<i>Cyperoïdes.</i>	26
<i>Crocodilodes.</i>	190	<i>Cyperus.</i>	27
<i>Crocus.</i>	59	<i>Cyperus.</i>	27
<i>Crossostylis.</i>	432	<i>Cyphia.</i>	165
<i>Crotalaria.</i>	354	<i>Cypripedium.</i>	65
<i>Croton.</i>	389, 452	<i>Cyrilla.</i>	160



Cyrtandra.	121	Didelta.	182
Cysti-capnos.	237	Diervilla.	211
Cytinus.	73	Djerrum.	264
Cytiso-genista.	353	Digera.	88
Cytisus.	354	Digitalis.	120

## D.

Dactylis.	Pag. 31	Digitaria.	29
Dais.	77	Dilatris.	59
Dalbergia.	362	Dilivaria.	103
Dalea.	355	Dillenia.	281
<i>Dalea.</i>	343, 453	<i>Dimb.</i>	292
Dalechampia.	392	Diodia.	197
Damasonium.	46	Dionæa.	431
<i>Damasonium.</i>	46	Dioscorea.	42
Danaïs.	205	Diosma.	298
Daphne.	77	<i>Diosma.</i>	298
Darea.	15	Diospyros.	156
Datisca.	445	Diphyfa.	326
Datura.	125	DIPSACEÆ.	194
Daucus.	224, 453	Dipsacus.	194
<i>Daucus.</i>	224	Dirca.	77
<i>Decaspermum.</i>	324, 453	Disa.	65
Decumaria.	324	Disandra.	99
Deguelia.	363	Dobera.	425
Delima.	339	Dodartia.	119
Delphinium.	234	Dodecas.	323
<i>Dens canis.</i>	48	Dodecatheon.	97
— <i>leonis.</i>	169, 170	Dodonæa.	375
Dentaria.	239	<i>Dodonæa.</i>	373, 379
Dentella.	200	Dolichos.	356
Detarium.	365	Doliocarpus.	433
Deutzia.	431	Dombeya.	277
Dialium.	424	<i>Dombeya.</i>	139, 277, 413
<i>Diana.</i>	41	Donatia.	300
Dianella.	41	Doræna.	420
Dianthera.	104	Doronicum.	182
Dianthus.	302	<i>Doronicum.</i>	182
Diapensia.	135	Dorstenia.	401
<i>Dicera.</i>	259	<i>Dorvallia.</i>	320
Dichondra.	129	<i>Dorycnium.</i>	353, 356
DICOTYLEDONES.	70-415	Draba.	240
— APETALÆ.	72, 73, 86	Dracæna.	40
— MONOPETALÆ.	93, 153, 166,	<i>Dracæna.</i>	41
	193	Dracocephalum.	116
— POLYPETALÆ.	216, 228, 305	Dracontium.	24
— DICLINES.	383	<i>Dracunculus.</i>	24
Dictamnus.	297	Drepania.	169
		Drosera.	245

Dryandra.



# I N D E X.

465

Dryandra.	389	Encelia.	186
Dryas.	338	Endrachium.	133
Drymis.	280, 451	Enourea.	249
Drypis.	303	<i>Entoganum.</i>	453
<i>Duhamelia.</i>	151	Epacris.	161
Duranta.	109	Eperua.	349
Durio.	244	Ephedra.	411
Duroia.	203	<i>Ephemerum.</i>	45
		Epibaterium.	285
E.		Epidendrum.	66
<i>Ebenus.</i>	156, 355	<i>Epidendrum.</i>	65, 66
<i>Echino-melocactus.</i>	311	Epigæa.	161
Echinophora.	225	Epilobium.	319
Echinops.	175	Epimedium.	287
<i>Echinopus.</i>	175	<i>Epiphyllum.</i>	311
<i>Echioïdes.</i>	131	Equisetum.	17
Echites.	146	<i>Eraclyssa.</i>	387
Echium.	130	Eranthemum.	110
Eclypta.	187	<i>Eresia.</i>	150
Ehretia.	128	Erharta.	32
Ekebergia.	265	Erica.	160
ELÆAGNI.	74	<i>Erica.</i>	160
Elæagnus.	75	ERICÆ.	159
Elæocarpus.	258	Erigeron.	180
<i>Elæococca.</i>	389	<i>Erinacea.</i>	355
<i>Elæodendrum.</i>	452	Erinus.	100
Elais.	38	Eriocaulon.	44, 447
<i>Elaphrium.</i>	374	Erioccephalus.	186
Elate.	38	<i>Eriophorus.</i>	171
Elaterium.	394	Eriophorum.	27
<i>Elaterium.</i>	395	Eriphia.	419
Elatine.	300	Erithalis.	206
Elatostema.	403	<i>Eruca.</i>	238, 239
Elcaja.	265	<i>Erucago.</i>	241
<i>Elemifera.</i>	371	Ervum.	360
Elephantopus.	178	Eryngium.	226
<i>Elephas.</i>	101	Erysimum.	239
<i>Eleusine.</i>	453	<i>Erysimum.</i>	239
Ellisia.	129	Erythrina.	356
<i>Elodea.</i>	255	Erythronium.	48
<i>Elychrysum.</i>	179, 180	Erythroxyllum.	253
Elymus.	31	Escallonia.	321
Embelia.	427	Ethulia.	184
Embothrium.	79	<i>Ethulia.</i>	184
<i>Emerus.</i>	361	Eucalyptus.	451
Empetrum.	162	Euclea.	432
<i>Empetrum.</i>	337	<i>Eucomis.</i>	448
Emplevrum.	298	Evea.	208



Eugenia.	234, 453	Filago.	179
<i>Eugenia.</i>	326	FILICES.	14
<i>Evia.</i>	373	<i>Filicula.</i>	15, 16
<i>Evodia.</i>	374	<i>Filipendula.</i>	339
Evolvulus.	134	<i>Filix.</i>	15
Evonymus.	377	Fissilia.	260
<i>Eupatorioïdes.</i>	187	Flacurtia.	291
<i>Eupatorio-phalacron.</i>	187	Flagellaria.	41
Eupatorium.	178	Flaveria.	186
Euphorbia.	385	<i>Fluvialis.</i>	19
EUPHORBIÆ.	384	<i>Fœniculum.</i>	219, 220, 221
<i>Euphorbium.</i>	385	<i>Fœnum græcum.</i>	356
Euphoria.	247, 453	<i>Folium polypi.</i>	218
Euphrasia.	100	Fontinalis.	11
<i>Euphrasiæ affinis.</i>	140	Forgesia.	164
Eurya.	432	Forskalea.	403
Euryandra.	280	Forstera.	423
<i>Euterpe.</i>	453	Fothergilla.	408
Exacum.	142	<i>Fothergilla.</i>	320
Excæcaria.	390	Fragaria.	338
		<i>Fragaria.</i>	337, 338
F.		<i>Frangula.</i>	380
Faba.	360	Frankenia.	303
<i>Fabago.</i>	296	<i>Fraxinella.</i>	297
<i>Fabricia.</i>	453	Fraxinus.	105
Fætidia.	325	Fritillaria.	48
Fagara.	374	<i>Fritillaria.</i>	49
Fagonia.	296	<i>Fruetus 5-angulus.</i>	320
<i>Fagopyrum.</i>	82, 448	<i>Frutex flore roseo.</i>	316
Fagræa.	150	Fuchsia.	320
Fagus.	409	Fucus.	6
Falkia.	132	<i>Fucus.</i>	6, 19
Faramea.	209	Fugosia.	274
Fernelia.	199	Fuirena.	26
<i>Ferolia.</i>	342	Fumaria.	237
Ferraria.	57	FUNGI.	3
<i>Ferraria.</i>	57	<i>Fungoides.</i>	4, 6
<i>Ferrum equinum.</i>	361	<i>Fungus.</i>	4
Ferula.	222	<i>Funis musarius.</i>	284
<i>Ferula.</i>	221	— <i>uncatus.</i>	209
Festuca.	32	Fufanus.	75
Fevillea.	397		
Ficaria.	233	G.	
<i>Ficoïdea.</i>	316	Gahnia.	27
FICOIDEÆ.	315	<i>Gajanus.</i>	153
<i>Ficoides.</i>	317	Galanthus.	55
Ficus.	400	Galardia.	189
<i>Ficus.</i>	402	Galax.	420



Galaxia.	57	Glabraria.	433
Gale.	409	Gladiolus.	58
Galedupa.	363	Glaucium.	236
Galega.	359	Glaux.	333
Galenia.	84	Glaux.	333
Galeopsis.	114	Glecoma.	113
Galeopsis.	114, 117	Gleditsia.	346
Galipæa.	418	Glinus.	316
Gallium.	196	Globba.	63
Gallium.	196	Globba.	62
Galopina.	198	Globularia.	97
Galvesia.	119	Globularia.	78
Gandasulium.	448	Glochidion.	442
Garcinia.	256	Gloriosa.	48
Gardenia.	201	Gluta.	427
Gardenia.	205	Glutago.	212
Garidella.	233	Glycine.	357
Gastonia.	217	Glycyrrhiza.	359
Gaultheria.	161	Gmelina.	108
Gaura.	319	Gnaphalium.	179
Gayo colorado.	444	Gnaphalium.	185
Gelsemium.	150	Gnaphalodes.	185
Gelseminum.	150	Gnemon.	406
Genesiphylla.	453	Gnetum.	406
Geniostoma.	420	Gnidia.	77
Genipa.	201	Gnidia.	77
Genista.	353	Gomozia.	198
Genista.	354	Gomphrena.	88
Genista-spartium.	352, 353	Gonocarpus.	442
Genistella.	353	Gordonia.	275
Gentiana.	141	Gorteria.	182
Gentiana.	141, 142	Gorteria.	190
GENTIANÆ.	141	Gossypium.	274
Geoffræa.	363	Gouania.	381
GERANIA.	268	Goupia.	378
Geranium.	268	Gramen. 27, 29, 30, 31, 32, 33	
Gerardia.	119	GRAMINÆ.	28
Germanea.	116, 449	Granadilla.	397
Geropogon.	170	Grangea.	184
Geruma.	264	Grangeria.	340
Gesneria.	165	Gratiola.	121
Gethyllis.	54	Greggia.	453
Geum.	338	Grewia.	292, 453
Geum.	309	Grias.	257
Gevuina.	424	Grielum.	269
Gingidium.	221	Grislea.	331
Ginoria.	331	Gronovia.	394
Gisekia.	315	Grossularia.	310, 329



<i>Grubbia.</i>	162	<i>Hedypnols.</i>	169
<i>Guaiacana.</i>	156	<i>Hedysarum.</i>	362
<i>GUAÏACANÆ.</i>	155	<i>Heisteria.</i>	260
<i>Guaiacum.</i>	296	<i>Helenium.</i>	189
<i>Guaiacum.</i>	347	<i>Helianthemum.</i>	294
<i>Guaiava.</i>	324	<i>Helianthus.</i>	189
<i>Guanabanus.</i>	283	<i>Heliconia.</i>	61, 448
<i>Guapira.</i>	108	<i>Heliicteres.</i>	278
<i>Guapurium.</i>	324	<i>Heliicteres.</i>	279
<i>Guarea.</i>	265, 451	<i>Heliocarpus.</i>	290
<i>Guariruma.</i>	178	<i>Heliophila.</i>	238
<i>Guazuma.</i>	276	<i>Heliotropium.</i>	130
<i>Guazuma.</i>	290	<i>Helleborine.</i>	65, 66
<i>Guettarda.</i>	207	<i>Helleborus.</i>	233
<i>Guidonia.</i>	265, 438, 439	<i>Helleborus.</i>	233
<i>Guiera.</i>	320	<i>Helminthia.</i>	170
<i>Guilandina.</i>	350	<i>Helminthotheca.</i>	170
<i>Guilandina.</i>	346, 348	<i>Helonias.</i>	47
<i>Guirzim.</i>	316	<i>Helvella.</i>	4
<i>Gundelia.</i>	175	<i>Hemerocallis.</i>	54
<i>Gunnera.</i>	405, 452	<i>Hemimeris.</i>	120
<i>Gustavia.</i>	326	<i>Hemionitis.</i>	15
<i>GUTTIFERÆ.</i>	255	<i>Hemionitis.</i>	15
<i>Gymnocarpus.</i>	314	<i>Hepatica.</i>	9
<i>Gymnocladus.</i>	346	<i>HEPATICÆ.</i>	7
<i>Gynopogon.</i>	148	<i>Hepaticoides.</i>	8
<i>Gypsophyla.</i>	301	<i>Heracleum.</i>	222
		<i>Herba paris.</i>	42
		<i>Hericius.</i>	4
		<i>Hermannia.</i>	289
		<i>Hermas.</i>	225
		<i>Hermesias.</i>	366
		<i>Hermodactylus.</i>	57
		<i>Hernandia.</i>	81
		<i>Herniaria.</i>	89
		<i>Hesperis.</i>	238
		<i>Hesperis.</i>	238, 239
		<i>Heuchera.</i>	308
		<i>Hevea.</i>	389
		<i>Heymassoli.</i>	260
		<i>Hibiscus.</i>	271
		<i>Hibiscus.</i>	272
		<i>Hieracioïdes.</i>	169
		<i>Hieracium.</i>	169
		<i>Hieracium.</i>	169, 170, 171
		<i>Hillia.</i>	202
		<i>Hippia.</i>	184
		<i>Hippocastanum.</i>	251

## H.



Hippocratea.	251	<i>Hyoseris.</i>	160
Hippocrepis.	361	Hypecoum.	236
Hippomane.	391	<i>Hyperanthera.</i>	346
<i>Hippomane.</i>	390	HYPERICA.	254
Hippomanica.	431	<i>Hypericoïdes.</i>	254
Hippophae.	75	Hypericum.	255, 453
Hippuris.	18	Hypnum.	11
<i>Hirta.</i>	253	Hypochaëris.	170
Hirtella.	340	<i>Hypocistis.</i>	73
Hoitzia.	136	<i>Hypopythis.</i>	430
Holcus.	30	Hypoxis.	55
Holosteum.	299	Hypoxylum.	6
Homalium.	343, 452	Hyptis.	449
<i>Hombak.</i>	243	Hyssopus.	113
Hopea.	157	<i>Hystrophorus.</i>	191
Hordeum.	32		
Horminum.	116	I.	
<i>Horminum.</i>	111	Jaborosa.	125
Hortensia.	214	Jabotapita.	282
Hottonia.	95	Jacaranda.	138
Houmiria.	435	Jacea.	173
<i>Houmiri.</i>	435	<i>Jacea.</i>	173, 174
Houstonia.	197	<i>Jacobaea.</i>	181
Houttuynia.	25	Jacquinia.	151
Hovenia.	381	<i>Jalapa.</i>	90
Hudsonia.	162	Jambolifera.	321
<i>Humbertia.</i>	133	Jasione.	166
Hugonia.	275	JASMINEÆ.	104
Humulus.	404	<i>Jasminoides.</i>	126
Hura.	391	Jasminum.	106
Hyacinthus.	52	Jatropha.	389
<i>Hyacinthus.</i>	56, 60	Iberis.	240
<i>Hydnora.</i>	436	<i>Ibipitanga.</i>	342
Hydnum.	4	<i>Icaco.</i>	340
<i>Hydnum.</i>	4	Icica.	370
Hydrangea.	310	<i>Ignatia.</i>	149
Hydrastis.	232	Ilex.	379
HYDROCHARIDES.	67	<i>Ilex.</i>	410
Hydrocharis.	67	Illecebrum.	89
Hydrocotyle.	226	<i>Illecebrum.</i>	88, 89
Hydrolea.	134	Illicium.	280
Hydrophylax.	210	Imbricaria.	152
Hydrophyllum.	129	<i>Impatiens.</i>	270
<i>Hydrorhiza.</i>	445	Imperatoria.	210
Hymenea.	351	<i>Imperatoria.</i>	222
Hyobanche.	101	Imperialis.	49
Hyoscyamus.	124	Incarvillea.	138
Hyoseris.	169	Indigofera.	359



Inocarpus.	152	Kirganelia.	387
Inula.	181	Kleinia.	178
<i>Jonthlaspi.</i>	240	Kleinhovia.	278, 451
Ipomæa.	134	Knautia.	195
<i>Ipomæa.</i>	136	<i>Knifa.</i>	255
Iresine.	88	Knoxia.	197
<i>Iridaps.</i>	402	<i>Knoxia.</i>	107
IRIDES.	57	Kœnigia.	83
Iris.	57	<i>Kœnigia.</i>	275, 277
<i>Iroucana.</i>	438	<i>Kolreuteria.</i>	451
Ifatis.	242	<i>Komana.</i>	255
Ischæmum.	30	<i>Kofaria.</i>	401
Isnardia.	333	Krameria.	425
Isoëtes.	17	Kuhnia.	177
Isopyrum.	233		
<i>Ifora.</i>	278		
Itea.	159	LABIATÆ.	110
<i>Iti-canni.</i>	212	<i>Lachenalia.</i>	52
Iva.	190	Lachnæa.	77
<i>Ivira.</i>	278	<i>Lacryma Job.</i>	34
Juglans.	375	Lactuca.	169
<i>Juncago.</i>	47	<i>Lactuca.</i>	168, 169
JUNCI.	43	Laëtia.	293
Juncus.	44	Lagerströmia.	331
Jungermannia.	8	Lagetta.	77
Jungia.	175	Lagoëcia.	227
Juniperus.	413	Laguna.	273
Jussiaea.	319	Lagurus.	30
<i>Jussiaea affinis.</i>	451	Lanium.	113
Justitia.	104	Lampfana.	168
Ixia.	58	<i>Landia.</i>	201
Ixora.	203	Lantana.	109
<i>Ixora.</i>	204	<i>Lantana.</i>	109
		<i>Lapathum.</i>	82
		Lappa.	173
Kæmpferia.	64	<i>Lapsana.</i>	168
<i>Kahiria.</i>	184	<i>Larix.</i>	414
<i>Kaïda.</i>	444	Laserpitium.	222, 453
<i>Kaka-toddali.</i>	371	Latania.	39
<i>Kali.</i>	85	Lathræa.	102
Kalmia.	158	Lathyrus.	359
<i>Karatas.</i>	50	Lavandula.	113
<i>Kareta-valli.</i>	267	Lavatera.	272
<i>Katapa.</i>	380	Laugeria.	206
Ketmia.	273	<i>Laupanke.</i>	452
<i>Keura.</i>	444	<i>Laurembergia.</i>	319
Kiggellaria.	387	LAURI.	80
Killingia.	27	<i>Laurocerasus.</i>	340

L.

K.



Laurus.	80	Lilium.	49
Laufonia.	331	<i>Lilium convallium.</i>	42
<i>Laxmannia.</i>	188	Limeum.	314
Leæba.	285	<i>Limnopeuce.</i>	18
Lechea.	303	Limodorum.	65
Lecythis.	327	<i>Limodorum.</i>	65
Ledum.	159	<i>Limon.</i>	261
Leea.	153	Limonia.	261
<i>Leea.</i>	266	<i>Limonium.</i>	92
<i>Legouzia.</i>	450	Limofella.	96
LEGUMINOSÆ.	345	<i>Linagrostis.</i>	27
Lemma.	16	Linaria.	120
<i>Lemna.</i>	19	Linconia.	442
<i>Lens.</i>	360	Lindera.	220, 429
<i>Lentibularia.</i>	98	Lindernia.	122, 450
Lenticula.	19	<i>Lingua cervina.</i>	15
<i>Lentiscus.</i>	371	Linnæa.	211
Leontice.	287	<i>Linschottia.</i>	343
Leontodon.	170	Linum.	303
<i>Leontodon.</i>	169, 170	Liparia.	353
<i>Leontopetalon.</i>	287	Lippia.	109, 453
Leonurus.	114	Liquidambar.	410
<i>Leonurus.</i>	114	Liriodendrum.	281
Lepidium.	241	Lisianthus.	142
<i>Lepidium.</i>	240	<i>Lit-chi.</i>	248
Leptospermum.	323, 453	<i>Lithagrostis.</i>	453
Lerchea.	421	Lithospermum.	130
<i>Leucanthemum.</i>	183	<i>Lithospermum.</i>	131
Leucoïum.	55	Littorella.	90
<i>Leucoïum.</i>	238	Loasa.	322
Leysera.	179	Lobelia.	165, 453
<i>Leysera.</i>	451	<i>Lobelia.</i>	165
<i>Libanotis.</i>	453	<i>Lodoïcea.</i>	39
Licania.	340	Loëflingia.	299
Lichen.	7	Loëselia.	135
<i>Lichenastrum.</i>	8	Lolium.	31
Licuala.	39	Lonchitis.	15
Lidbeckia.	183	<i>Lonchitis.</i>	15
<i>Lightfootia.</i>	450	<i>Lonicera.</i>	203, 208, 211, 212
Ligusticum.	222	<i>Lon-gan.</i>	248
<i>Ligusticum.</i>	222	Lontarus.	39
Ligustrum.	106	Lophanthus.	427
Lilac.	105	<i>Loque.</i>	444
LILIA.	48	Loranthus.	212
<i>Liliastrum.</i>	52	Lotus.	356
<i>Lilia-asphodelus.</i>	54	<i>Lotus.</i>	353
— <i>hyacinthus.</i>	53	Lucuma.	152
— <i>narcissus.</i>	55	Ludia.	343



Ludwigia.	319	Malanea.	203
<i>Luff.</i>	395	Mallococca.	292
Lunaria.	239	Malope.	272
<i>Lunaria.</i>	239, 240	Malpighia.	253
Lupinus.	354	MALPIGHIÆ.	252
<i>Lupulus.</i>	404	Malva.	272
<i>Luteola.</i>	245	<i>Malva.</i>	272
Luziola.	33	MALVACEÆ.	271
Lychnis.	302	Malvaviscus.	273
<i>Lychnis.</i>	301, 302	Malus.	334
Lycium.	126	<i>Mamei.</i>	257
<i>Lycium.</i>	209	Mammea.	257
Lycoperdon.	3	<i>Mammea.</i>	326
<i>Lycoperdon.</i>	3	<i>Mampata.</i>	342
<i>Lycopersicon.</i>	126	Manabea.	107
<i>Lycopodioides.</i>	12	<i>Mançanilla.</i>	391
Lycopodium.	12	Mandragora.	125
Lycopsis.	131	<i>Manettia.</i>	199
Lycopus.	111	<i>Manga-nari.</i>	450
Lygeum.	33	Mangifera.	369
<i>Lygistum.</i>	199	<i>Mangium.</i>	325
Lythmachia.	95, 449	<i>Mangles.</i>	213
LYSIMACHIÆ.	95	Manglilla.	151
Lythrum.	332	<i>Mangostana.</i>	256
<i>Lythrum.</i>	331, 332	Manifuris.	34
		Manulea.	100
		Mapania.	27
		<i>Mapouria.</i>	205
Maba.	418	Maprounea.	391
Mabea.	388	Maranta.	63
Macanea.	257	Marchantia.	9, 447
<i>Macahanea.</i>	257	Marcgravia.	244
Macoubea.	257	Margaritaria.	430
<i>Macoucousa.</i>	379	<i>Marignia.</i>	372
<i>Macqueria.</i>	374	Maripa.	133
Macrocnemum.	200	<i>Marrubiastrum.</i>	113, 114
Madia.	450	Marrubium.	114
Mærua.	440	<i>Marsania.</i>	261
Mæsa.	161	Marsilea.	8, 16
Magnolia.	281	Martynia.	140
<i>Magnolia.</i>	281	<i>Martynia.</i>	165
MAGNOLIÆ.	280	Maffonia.	53
Mahernia.	290	Mataiba.	249
Mahurea.	434	Matelea.	144
<i>Majorana.</i>	115	Mathiola.	206
Malachodendrum.	275	Matourea.	119
<i>Malachodendrum.</i>	292	Matricaria.	183, 450
Malachra.	272	<i>Mauhlia.</i>	448
Malacoides.	272		

Mauritia.



Mauritia.	40	Menyanthes.	98
Mayaca.	45	Mercurialis.	385
Mayepea.	379	Merulius.	4
Mayeta.	330	Meryta.	442
Mayna.	281	Mesembryanthemum.	317
Mays.	33	Mespilus.	315
Maytenus.	449	Mispilus.	315
Meborea.	437	Messerschmidia.	121
Medeola.	42	Mesua.	258
Medica.	356	Methonica.	48
Medicago.	356	Metrosideros.	453
Medicago.	364	Meum.	220, 453
Meesia.	453	Michelia.	280
Melaleuca.	323, 453	Micrelium.	187
Melampodium.	188	Microcos.	292, 453
Melampyrum.	101	Micropus.	185
Melanium.	332	Milium.	29
Melanthium.	47	Milium.	29
Melasma.	142	Millefolium.	186
Melastoma.	329	Millieria.	187
Melastoma.	329	Millieria.	187
MELASTOMÆ.	328	Millingtonia.	138
Melhania.	277	Mimosa.	346
Melia.	265	Mimosa.	366
MELIÆ.	263	Minulus.	122
Melianthus.	297	Mimusops.	152, 453
Melica.	31	Mindium.	164
Melicocca.	248	Minuartia.	300
Melicope.	429, 453	Mirabilis.	90
Melicytus.	428	Misandra.	405
Melilorus.	356	Mitchella.	208
Melissa.	115	Mitella.	309
Melissa.	116, 449	Mitella.	293, 309
Melistaureum.	438	Mithridatea.	401
Mellitis.	116	Mnemosilla.	236
Melo.	395	Mniarum.	441
Melocactus.	311	Mnium.	11
Melochia.	274	Modecca.	398
Melodinus.	148	Mocanera.	318
Melongena.	126	Moerhingia.	300
Melo-pepo.	396	Mogorium.	106
Melothria.	395	Mokokf.	433
Memecylon.	321	Moldavica.	116
Menaïs.	128	Molinæa.	248
MENISPERMA.	284	Molle.	371
Menispermum.	285, 453	Molucca.	115
Mentha.	113	Molucella.	115
Mentzelia.	321	Mollugo.	300



Momordica.	395	Myginda.	378
Monarda.	111	Myonima.	206
Monbin.	372	Myosotis.	131
Monetia.	425	Myosotis.	301
Monniera.	421	Myosurus.	233
Monniera.	121	Myrica.	409, 453
Monilifera.	183	Myriophyllum.	18
MONOCOTYLEDONES. 21-69		Myriotheca.	15, 447
Monotropa.	430	Myristica.	81, 448
Monsonia.	269	Myrosma.	63
Montia.	313	Myrospermum.	365
Montinia.	318	Myroxylum.	444
Montira.	122	Myroxylum.	366
Moquilea.	341	Myrrhis.	220, 453
Moræa.	58	Myrsine.	152
Morina.	194	MYRTI.	322
Morinda.	209	Myrtus.	324
Morinda.	208		
Moringa.	348		N.
Morisonia.	244	Nacibea.	199
Moronobea.	257	Nageia.	453
Morsus ranæ.	67	NAIADES.	18
Morus.	402	Naias.	19
Moscharia.	419	Nalugu.	218, 266
Moschatellina.	309	Nama.	134
Mourera.	441	Nama.	134
Mouriria.	320	Nanca.	402
Mouroucoa.	133	Nandina.	429
Moutabea.	420	Napæa.	273
Moutouchia.	365	Napimoga.	344
Mucor.	3	Napus.	238
Mullera.	352	NARCISSI.	54
Munchausia.	331	Narcisso-leucoïum.	55
Muntingia.	291	Narcissus.	55
Muntingia.	408	Narcissus.	55
Murraya.	261	Nardus.	33
Murucuia.	398	Narthecium.	47
Murucuia.	398	Nassauvia.	175
Musa.	61	Nasturtium.	240, 241
MUSÆ.	61	Nastus.	34
Muscari.	52	Nauclea.	209
MUSCI.	10	Nectandra.	77
Muscus.	8, 11, 12	Nelitris.	453
Mussænda.	200	Nelumbium.	68, 453
Mussænda.	200	Nelumbo.	453
Mutisia.	178	Nemia.	100
Myagrurn.	241	Neou.	342
Myagrurn.	240	Nepenthes.	444



Nepeta.	113, 449	Oldenlandia.	198
Nephelium.	191	Olea.	105
Nerium-pulli.	267	Olyra.	33
Nerium.	145	Omphalea.	392
Nesæa.	332	Omphalobium.	453
Nevrada.	336	Omphalodes.	131
Nevropora.	443	Onagra.	319
Nhandiroba.	397	ONAGRÆ.	317
Nialel.	267	Oncoba.	292
Nicandra.	125	Onobrychys.	362
Nicotiana.	125	Onoclea.	15
Nidus avis.	65	Ononis.	354
Nigella.	233	Onopordum.	173
Nigrina.	142	Onosma.	130
Nigrina.	423	Oosterdykia.	310
Nipa.	38	Ophioglossum.	14
Nissolia.	364	Ophiorrhiza.	143
Nissolia.	359	Ophioxylum.	149
Nitraria.	316	Ophira.	321
Nolana.	132	Ophrys.	65
Nonatelia.	205	Opulus.	213
Norantea.	245	Opuntia.	311
Nostoc.	6	ORCHIDEÆ.	64
Nux.	375	Orchis.	65
Nuxia.	107	Orchis.	65
NYCTAGINES.	90	Orelia.	148
Nyctago.	90	Oreoselinum.	223
Nyctage.	90	Origanum.	115
Nyctanthes.	104, 453	Orixa.	425
Nyctanthes.	106, 207	Ornithogalum.	53
Nymphæa.	68	Ornithogalum.	53
Nymphæa.	68	Ornithopodium.	361
Nymphoides.	98	Ornithopus.	361
Nyssa.	75	Ornitrophe.	247
		Ornus.	105
O.		Orobanche.	101
Obai.	343	Orobanchoides.	430
Obolaria.	101	Orobis.	360
Ochna.	282	Orobis.	357
Ochrosia.	144	Orontium.	25
Ochrus.	360	Ortega.	299
Ocimum.	116	Ortiga.	322
Ocotea.	80	Orygia.	317
Oëdera.	189	Orygia.	312
Ænanthe.	221	Oryza.	32
Ænothera.	319	Osbeckia.	330
Ostia.	109	Osmites.	186
O lax.	153	Osmites.	451



<i>Osmunda.</i>	15	<i>Paralea.</i>	157
<i>Osteospermum.</i>	183	<i>Pardisium.</i>	190
<i>Ostrva.</i>	409	<i>Pariana.</i>	34
<i>Ostryis.</i>	75	<i>Parietaria.</i>	404
<i>Othra.</i>	288	<i>Pa ilium.</i>	453
<i>Othonna.</i>	181	<i>Parinari.</i>	342
<i>Ovieda.</i>	211, 451	<i>Parinarium.</i>	342
<i>Ouratea.</i>	431	<i>Paris.</i>	42
<i>Ourelia.</i>	100	<i>Parivoa.</i>	350
<i>Ouro paria.</i>	209	<i>Parkinsonia.</i>	347
<i>Outea.</i>	347	<i>Parnassia.</i>	245
<i>Oxalis.</i>	270	<i>Paronychia.</i>	89
<i>Oxycoccus.</i>	162	<i>Parsonia.</i>	332
<i>Oxy.</i>	270	<i>Partheniastrum.</i>	191
		<i>Parthenium.</i>	191
		<i>Paspalum.</i>	29
		<i>Passerina.</i>	77
		<i>Passiflora.</i>	397
		<i>Passiflora.</i>	398
		<i>Passoura.</i>	287
		<i>Pastinaca.</i>	219
		<i>Patabea.</i>	208
		<i>Patagonula.</i>	128
		<i>Patima.</i>	207
		<i>Pavetta.</i>	203
		<i>Pavia.</i>	251
		<i>Paullinia.</i>	247, 451
		<i>Paullinia.</i>	371
		<i>Pavonia.</i>	272
		<i>Paypayrola.</i>	427
		<i>Payrola.</i>	427
		<i>Pectis.</i>	182
		<i>Pedalium.</i>	140
		<i>PEDICULARES.</i>	99
		<i>Pedicularis.</i>	101
		<i>Pedicularis.</i>	100, 101
		<i>Peganum.</i>	297
		<i>Pekea.</i>	249
		<i>Pelargonium.</i>	268
		<i>Pelecinus.</i>	358
		<i>Peloria.</i>	120
		<i>Peltaria.</i>	240
		<i>Pemphis.</i>	331
		<i>Penæa.</i>	419
		<i>Penar-valli.</i>	397
		<i>Pennantia.</i>	428
		<i>Pentstemon.</i>	137
		<i>Pentaglossum.</i>	332
<i>Pachira.</i>	279		
<i>Pacouria.</i>	148		
<i>Pacourina.</i>	174		
<i>Pada-vara.</i>	209		
<i>Padus.</i>	340		
<i>Pæderia.</i>	205		
<i>Pæderota.</i>	120		
<i>Pæonia.</i>	234		
<i>Pagamea.</i>	209		
<i>Pagapute.</i>	325		
<i>Palava.</i>	271		
<i>Palicourea.</i>	205		
<i>Palinurus.</i>	380		
<i>Palusia.</i>	83		
<i>PALMÆ.</i>	37		
<i>Palorum arbor.</i>	248		
<i>Paloue.</i>	351		
<i>Palovea.</i>	351		
<i>Pamea.</i>	76		
<i>Panax.</i>	218		
<i>Pancratium.</i>	55		
<i>Pandacaqui.</i>	145		
<i>Pandanus.</i>	444		
<i>Panicum.</i>	29		
<i>Panicum.</i>	29		
<i>Panitsjika-maram.</i>	256		
<i>Panke.</i>	405, 452		
<i>Papaver.</i>	236		
<i>PAPAVERACEÆ.</i>	235		
<i>Papaya.</i>	399		
<i>Papiria.</i>	54		
<i>Papularia.</i>	314		



Pentapetes.	276	Phleum.	29
<i>Pentapetes.</i>	277	Phlomis.	114
<i>Pentaphylloides.</i>	338	Phlox.	136
<i>Pentaphyllum.</i>	453	Phoenix.	38
Penthorum.	308	Phormium.	52, 453
Peplis.	333	Phryma.	117
<i>Pepo.</i>	396	Phylica.	381
Perama.	109	Phyllachne.	422
Perdicium.	181	Phyllanthus.	386
Perebea.	402	Phyllirea.	106
<i>Pereskia.</i>	311	Phyllis.	198
Pergularia.	146	Phyfalıs.	126
<i>Periclymenum.</i>	212	<i>Physofpermum.</i>	222
Perilla.	113	Phyteuma.	165
Periploca.	146	Phytolacca.	84
<i>Periploca.</i>	147	Picris.	170
<i>Perpensum.</i>	405	<i>Picris.</i>	170
<i>Persica.</i>	341	Pilularia.	16
<i>Persicaria.</i>	82	Pimpinella.	219, 453
<i>Pervinca.</i>	144	<i>Pimpinella.</i>	336
<i>Petasites.</i>	181	Pinguicula.	98
Petefia.	199	Pinus.	414
Petitia.	107	<i>Pinus.</i>	413, 414
Petiveria.	84	Piparea.	191
Petræa.	108	Piper.	407
Peucedanum.	223	Pirigara.	326
Peumus.	452	Piripea.	100
<i>Pevræa.</i>	320	Piriqueta.	295
Peziza.	4	Piscidia.	358
<i>Peziza.</i>	6	Pisonia.	91
Phaca.	358	<i>Pistacia.</i>	371
<i>Phaca.</i>	359	Pistia.	69
Phacelia.	129	Pisum.	360
Phalaris.	29	<i>Pittcairnia.</i>	448
Phalangium.	52	<i>Pittonia.</i>	129
<i>Phalangium.</i>	47	Plagianthus.	274
Phallus.	3	<i>Plantaginella.</i>	96
<i>Phallus.</i>	4	PLANTAGINES.	89
Pharnaceum.	300	Plantago.	90
Pharus.	33	<i>Plantago.</i>	90
Phascum.	11	<i>Plaso.</i>	357
Phaseolus.	356	Platanus.	410
<i>Phaseolus.</i>	356, 357	<i>Platanocephalus.</i>	209
Phellandrium.	221	<i>Plectranthus.</i>	449
<i>Phelypæa.</i>	102	Plectronia.	382
Philadelphus.	325	Plegorhiza.	438
Philesia.	41	Plinia.	342
<i>Phlebolithis.</i>	453	Plukeneria.	392



PLUMBAGINES.			
Plumbago.	92	Portulaca.	312
Plumeria.	92	<i>Portulaca.</i>	312
Poa.	145	<i>Portulacaria.</i>	451
Podophyllum.	32	PORTULACEÆ.	312
<i>Pænoë.</i>	235	Posoqueria.	201
<i>Pogonatum.</i>	258	Possira.	351
Pogonia.	11	Potalia.	143
Poinciana.	65	Potamogeton.	19
POLEMONIA.	349	Potentilla.	338, 453
Polemonium.	136	Poterium.	336
Polianthes.	136	Pothos.	24
<i>Polium.</i>	56	Poupartia.	372
Polia.	112	Pourouma.	406
Polycardia.	45	<i>Poutaletsje.</i>	199, 332
Polycarpon.	377	Pouteria.	156
<i>Polycarpon.</i>	299	Praefium.	117
<i>Polycephalos.</i>	300	Premna.	107
Polycnemonum	176	Prenanthes.	168
Polygala.	84	Primula.	96
<i>Polygonatum.</i>	99	<i>Primula-veris</i>	96
POLYGONEÆ.	42	Prinos.	379
<i>Polygonifolia.</i>	82	<i>Prismatocarpus.</i>	450
<i>Polygonoides.</i>	313	Prockia.	340
Polygonum.	83	Procris.	403
Polymnia.	82, 453	Proserpinaca.	68
<i>Polymnia.</i>	187	Profopis.	348
Polypodium.	189	Protea.	78
<i>Polypodium.</i>	15	PROTEÆ.	78
Polypremum.	15	<i>Protium.</i>	371
Polyscias.	122	<i>Prunella.</i>	116
Polytrichum.	218	Prunus.	341
<i>Pometia.</i>	11	<i>Prunus.</i>	340, 341
Pommereulla.	248	Pfathura.	306
Ponga.	34	<i>Pseudo-acacia.</i>	358
<i>Pongati.</i>	403	— <i>brasiliun.</i>	370
Pongatium.	423	— <i>dictamnus.</i>	114
<i>Pongelion.</i>	423, 453	— <i>santalum.</i>	218
Pontederia.	373	Pfidium.	324, 453
Populus.	55	Pforalea.	355
<i>Populago.</i>	409	<i>Pforalea.</i>	355
Porana.	234	Ppsychotria.	204
Poraqueiba.	420	<i>Ppsychotrophum.</i>	204
Porella.	288	Psyllium.	90
<i>Porrum.</i>	12	<i>Ptarmica.</i>	186
Portesia.	53	Ptelea.	375
Portlandia.	265	Pteranthus.	404
<i>Portlandia.</i>	202	Pteris.	15
	202	Pterocarpus.	364



<i>Pterococcus.</i>	83	<i>Raputia.</i>	421
<i>Pteronia.</i>	174	<i>Ravapu.</i>	207
<i>Pterophorus.</i>	174	<i>Ravenala.</i>	62
<i>Pulmonaria.</i>	130	<i>Ravensara.</i>	431
<i>Pulmonaria.</i>	131	<i>Rauvolfia.</i>	148
<i>Pulsatilla.</i>	232	<i>Reaumuria.</i>	316
<i>Punica.</i>	325	<i>Relhania.</i>	451
<i>Pungam.</i>	363	<i>Remirea.</i>	34
<i>Purupuru.</i>	399	<i>Renealmia.</i>	50, 62, 447
<i>Puya.</i>	447	<i>Reseda.</i>	245
<i>Pyrola.</i>	161	<i>Restiaria.</i>	429
<i>Pyrostria.</i>	206	<i>Restio.</i>	44
<i>Pyrus.</i>	335	<i>Retzia.</i>	133
<i>Pyrus.</i>	334, 335	<i>Rex amaroris.</i>	429
		<i>Rhabarbarum.</i>	82
		<i>Rhacoma.</i>	378
<i>Qualea.</i>	424	<i>Rhagadioloïdes.</i>	169
<i>Quamoclit.</i>	134	<i>Rhagadiolus.</i>	168
<i>Quapoya.</i>	256	<i>Rhamnoïdes.</i>	75
<i>Quararibea.</i>	274	<i>RHAMNI.</i>	376
<i>Quaffia.</i>	282	<i>Rhamnus.</i>	380
<i>Quebitea.</i>	24	<i>Rhamnus.</i>	380
<i>Quercus.</i>	410, 452	<i>Rhaponticum.</i>	174
<i>Queria.</i>	300	<i>Rheedia.</i>	258
<i>Quillaja.</i>	444	<i>Rheum.</i>	82
<i>Quina-quina.</i>	366	<i>Rhexia.</i>	330
<i>Quinchamalium.</i>	75	<i>Rhexia.</i>	332
<i>Quinquefolium.</i>	338	<i>Rhinanthus.</i>	101
<i>Quisqualis.</i>	78	<i>Rhizophora.</i>	213, 453
<i>Quivisia.</i>	264	<i>Rhodiola.</i>	307
		<i>RHODODENDRA.</i>	158
		<i>Rhododendrum.</i>	158
<i>Racoubea.</i>	343	<i>Rhodora.</i>	159
<i>Radicula.</i>	239, 241	<i>Rhus.</i>	369
<i>Rajania.</i>	43	<i>Rhus.</i>	369, 373
<i>Randia.</i>	199	<i>Riana.</i>	287
<i>RANUNCULACEÆ.</i>	231	<i>Ribes.</i>	310
<i>Ranunculus.</i>	233	<i>Ribesfoïdes.</i>	427
<i>Ranunculus.</i>	46, 232, 233	<i>Riccia.</i>	8
<i>Rapa.</i>	238	<i>Richardia.</i>	108
<i>Rapanea.</i>	288	<i>Ricinus.</i>	388
<i>Rapatea.</i>	44	<i>Ricinoïdes.</i>	389, 452
<i>Raphanistrum.</i>	138	<i>Ricotia.</i>	239
<i>Raphanus.</i>	138	<i>Rimbot.</i>	292
<i>Raphia.</i>	38	<i>Rindera.</i>	131
<i>Rapistrum.</i>	241, 242	<i>Rinorea.</i>	287
<i>Rapunculus.</i>	165, 166	<i>Ripogonum.</i>	41
<i>Rapuntium.</i>	165, 453	<i>Rivinia.</i>	84



Robinia.	358	Sabina.	413
Robinia.	358	Saccharum.	30
Rocama.	314	Sælanthus.	267
Roëlla.	165	Sagina.	300
Rokejeka.	313	Sagitta.	46
Rolandra.	176	Sagittaria.	46
Rolofa.	316	Sagonea.	134
Ronabea.	205	Sagus.	38, 453
Rondeletia.	201	Salacia.	424
Ropourea.	421	Salicaria.	332
Roridula.	426	SALICARIÆ.	330
Roridula.	243	Salicornia.	86
Roripa.	239	Salix.	408
Rosa.	335, 452	Salsola.	85
ROSACEÆ.	334	Salvadora.	84
Rosmarinus.	111	Salvia.	111
Rossolis.	245	Salvinia.	16
Rotala.	303	Samara.	379
Rottbollia.	31	Sambucus.	214
Rouhamon.	149	Samolus.	97
Roupala.	79	Samstravadi.	326
Rourea.	369	Samyda.	439
Royena.	156	Samyda.	438
Royoc.	209	Sandoricum.	265
Rubentia.	378, 452	Sanguinaria.	236
Rubeola.	197	Sanguisorba.	336
Rubia.	197	Sanicula.	225
RUBIACEÆ.	196	Santalum.	321
Rubus.	338	Santolina.	185
Rudbeckia.	189	Santolina.	185
Ruellia.	103	Saouari.	250
Ruizia.	275	SAPINDI.	246
Rumex.	82	Sapindus.	247, 451
Rumphia.	370	Sapium.	390
Rupinia.	447	Saponaria.	302
Ruppia.	19	Sapota.	152
Ruscus.	42	SAPOTÆ.	151
Russelia.	118	Saraca.	422
Russelia.	318	Saribus.	39
Ruta.	297	Sarothra.	303
RUTACEÆ.	296	Sarracenia.	435
Ruta-miraria.	15	Saffia.	429
Ruyfchia.	428	Satureia.	112
Ruyfchiana.	116	Satyrium.	65
		Saumerio.	366
		Saururus.	19
		Sauvagesia.	426
		Saxifraga.	309

S.

Sabal.

39

Sabicea.

207



SAXIFRAGÆ.	308	Seguieria.	440
Scabiosa.	194	Sehima.	447
Scabiosa.	195	Selaginoïdes.	12
Scabrita.	105	Selago.	110
Scævola.	165	Selago.	12
Scandix.	220	Selinum.	223
Sceura.	108	Selinum.	220
Schæfferia.	426	Semecarpus.	368
Schefflera.	429	SEMPERVIVÆ.	307
Scheru-valli-caniram.	448	Sempervivum.	307
Scheuchzeria.	46	Senacia.	378
Schinus.	371	Senecio.	181
Schmidelia.	247	Senna.	348
Schoenus.	27	Senra.	274
Schotia.	347	Septas.	308
Schrebera.	379	Serapias.	65
Schwalbea.	123	Serjania.	247
Schwenckia.	123	Seridia.	173
Scilla.	53	Seriola.	171
Sciodaphyllum.	451	Seriphium.	180
Scirpoides.	26	Seriffa.	209
Scirpus.	27	Serpicula.	318
Scirpus.	27	Serpillum.	115
Sclarea.	111	Serratula.	174
Scleranthus.	314	Serratula.	178
Sclerocarpus.	186	Sesamoïdes.	245
Sclerya.	453	Sesamum.	138
Scolymus.	171	Seseli.	220
Scoparia.	118	Sesleria.	31
Scopolia.	438	Sesuvium.	316
Scorpioïdes.	361	Shaavia.	180
Scorpiurus.	361	Sheffieldia.	96
Scorzonera.	170	Sherardia.	196
Scorzonera.	171	Sibbaldia.	337
Scorzoneroïdes.	170	Sibthorpia.	99
Scrophularia.	119	Sicelium.	199
SCROPHULARIÆ.	117	Sicyoïdes.	394
Scutellaria.	117	Sicyos.	394
Scyphus.	444	Sida.	273
Scytalia.	453	Sida.	273
Sebestena.	128	Sideritis.	113
Secale.	32	Sideritis.	114
Sechium.	391	Sideroxylum.	151, 450
Securidaca.	366	Sigesbeckia.	187
Securidaca.	361	Silene.	302
Securinega.	388	Siler.	453
Sedum.	307	Siliqua.	347
Sedum.	307	Siliquaria.	243



<i>Siliquastrum.</i>	351	Soulamea.	429
<i>Silphium.</i>	188	<i>Soulamoë.</i>	429
<i>Simaba.</i>	373	Souroubea.	428
<i>Simarouba.</i>	282	Sparganium.	26
<i>Simbuleta.</i>	418	Sparmannia.	290
<i>Simira.</i>	205	<i>Spartium.</i>	353, 354
<i>Sinapi.</i>	238	Spathelia.	371
<i>Sinapis.</i>	238	Spergula.	301
<i>Sinapistrum.</i>	243	Spermacoce.	197
<i>Singana.</i>	257	<i>Spermacoce.</i>	209
<i>Sipanea.</i>	201	Sphæranthus.	176
<i>Siparuna.</i>	443	<i>Sphæranthus.</i>	184
<i>Siphonanthus.</i>	132	Sphæria.	7
<i>Sirium.</i>	321	<i>Sphæria.</i>	6
<i>Sisarum.</i>	222	Sphagnum	12
<i>Sison.</i>	221	<i>Sphenoclea.</i>	453
<i>Sisymbrium.</i>	239	<i>Sphondylium.</i>	222
<i>Sisymbrium.</i>	239	Spielmannia.	109
<i>Sisyrinchium.</i>	57	Spigelia.	143
<i>Sisyrinchium.</i>	57	Spilanthus.	187
<i>Sitodium.</i>	453	Spinacia.	85
<i>Sium.</i>	222	Spinifex.	30
<i>Sium.</i>	221	Spiræa.	339
<i>Skimmia.</i>	425	Splachnum.	11
<i>Skinnera.</i>	320	Spondias.	272
<i>Sloanea.</i>	291	<i>Staavia.</i>	452
<i>Sloanea.</i>	291	Stachys.	114
<i>Smilax.</i>	42	<i>Stachys.</i>	113
<i>Smilax.</i>	42	<i>Stæchas.</i>	113
<i>Smyrniium.</i>	219	Stæhelina.	175
<i>Soccus.</i>	402	<i>Stæhelinoïdes.</i>	187
<i>Sodada.</i>	243	Stapelia.	146
<i>Solandra.</i>	273	Staphylea.	377
<i>Solandra.</i>	127, 226	<i>Staphylodendrum.</i>	377
<b>SOLANEÆ.</b>	124	Statice.	92
<i>Solanoïdes.</i>	84	Stellaria.	301
<i>Solanum.</i>	126	<i>Stellaria.</i>	19
<i>Soldanella.</i>	97	Stellera.	77
<i>Soldanella.</i>	158	Stemodia.	188
<i>Solidago.</i>	181	Sterculia.	278
<i>Senchus.</i>	169	Steris.	134
<i>Sonchus.</i>	170	Stewartia.	292
<i>Sonneratia.</i>	325, 453	<i>Stewartia.</i>	275, 277
<i>Sonneratia.</i>	378	Stibas.	423
<i>Sophisteque.</i>	282	Stilbe.	418
<i>Sophora.</i>	352	Stilago.	443
<i>Soramia.</i>	433	Stillingia.	390
<i>Sorbus.</i>	335	Stipa.	30



Stœbe.	180	Tanibouca.	76
Stokefia.	450	Tan-roujou	351
Stramonium.	125	Taonabo.	262
Stratiotes.	67	Tapeinia.	59
Stratiotes.	95	Tapia.	244
Stravadium.	326	Tapiria.	372
Strelitzia.	448	Tapogomea.	208
Strigilia.	451	Tapura.	419
Struchium.	184	Taralea.	350
Strumpfia.	436	Taraxaconastrum.	169
Struthiola.	77	Taraxaconoides.	170
Strychnos.	149	Taraxacum.	169
Styrax.	156	Tarchonanthos.	190
Suber.	410	Tarchonanthus.	185
Subularia.	240	Targionia.	8
Suæda.	85	Tariri.	370
Suillus.	4	Tavoulou.	59
Suriana.	339	Taxus.	412
Swertia.	142	Tecoma.	139
Swietenia.	266	Tecomaxochitl.	139
Symphonia.	263	Tectona.	108
Symphoricarpos.	211	Telephioïdes.	387
Symphytum.	131	Telephium.	313
Symplocos.	157	Temus.	435
Syringa.	105, 325	TEREBINTACEÆ.	368
Sysygium.	453	Terebinthoides.	373
		Terebinthus.	371
		Terminalia.	76
		Ternatea.	357
		Ternstromia.	262
		Tetracera.	339
		Tetragonia.	317
		Tetragonia.	318
		Teucrium.	112
		Thalia.	63
		Thalictrum.	232
		Thamnochortus.	44
		Thapsia.	220
		Thapsia.	224
		Thea.	262
		Thee.	262
		Thëka.	108
		Theligonum.	405
		Thelymitra.	65
		Themeda.	447
		Theobroma.	276
		Theobroma.	276
		Theophrasta.	150

## T.

Tabernæmontana.  
Tacca.  
Tachia.  
Tachibota.  
Tachigalia.  
Tacso.  
Tacsonia.  
Tagetes.  
Talauma.  
Taligalea.  
Talinum.  
Talisia.  
Tamarindus.  
Tamariscus.  
Tamarix.  
Tambourissa.  
Tamnus.  
Tamonea.  
Tamus.  
Tanacetum.

145  
56  
142  
295  
349  
399  
398  
182  
281  
109  
312  
247  
347  
313  
313  
401  
43  
109  
43  
184

145  
56  
142  
295  
349  
399  
398  
182  
281  
109  
312  
247  
347  
313  
313  
401  
43  
109  
43  
184



<i>Thefium.</i>	75	<i>Torilis.</i>	453
<i>Thilco.</i>	320	<i>Tormentilla.</i>	337
<i>Thlaspi.</i>	241	<i>Touchiroa.</i>	365
<i>Thlaspi.</i>	240, 241	<i>Toulicia.</i>	248
<i>Thlaspidium.</i>	239, 240	<i>Tounatea.</i>	440
<i>Thoa.</i>	406	<i>Tovomita.</i>	256
<i>Thouinia.</i>	105	<i>Tournefortia.</i>	129
<i>Thryallis.</i>	251	<i>Touroulia.</i>	434
<i>Thryocephalum.</i>	27	<i>Touretia.</i>	139
<i>Thumbergia.</i>	103	<i>Toxicodendrum.</i>	369
<i>Thuraria.</i>	422	<i>Tozzia.</i>	97
<i>Thuya.</i>	413	<i>Trachelium.</i>	165
<i>Thymbra.</i>	115	<i>Trachelium.</i>	165
<i>Tbymbra.</i>	112	<i>Tradescantia.</i>	45
<i>Thymelæa.</i>	77	<i>Tragacantha.</i>	358
<i>THYMELÆÆ.</i>	76	<i>Tragia.</i>	390
<i>Thymus.</i>	115	<i>Tragopogon.</i>	170
<i>Thymus.</i>	112	<i>Tragopogon.</i>	170
<i>Thyffelinum.</i>	223	<i>Tragopogonoïdes.</i>	170
<i>Tiarella.</i>	309	<i>Tragoselinum.</i>	219
<i>Tibouchina.</i>	329	<i>Trapa.</i>	68
<i>Ticorea.</i>	264	<i>Tremella.</i>	6
<i>Tigarea.</i>	339	<i>Trewia.</i>	442
<i>Tigridia.</i>	57	<i>Trianthema.</i>	314
<i>Tilia.</i>	292	<i>Tribulastrum.</i>	337
<i>TILIACEÆ.</i>	289	<i>Tribuloïdes.</i>	68
<i>Tillandsia.</i>	50	<i>Tribulus.</i>	296
<i>Tinus.</i>	264, 451	<i>Trichilia.</i>	265
<i>Tinus.</i>	213, 420	<i>Trichogamila.</i>	260
<i>Tithonia.</i>	189	<i>Trichomanes.</i>	16
<i>Tittius.</i>	108	<i>Trichomanes.</i>	15
<i>Tithymaloïdes.</i>	385	<i>Trichosanthes.</i>	396
<i>Tithymalus.</i>	385	<i>Trichostema.</i>	116
<i>Tobira.</i>	377	<i>Tridax.</i>	190
<i>Tococa.</i>	330	<i>Trientalis.</i>	96
<i>Tocoyena.</i>	201	<i>Trifolium.</i>	355
<i>Toddalia.</i>	371	<i>Trifolium.</i>	356
<i>Toluiifera.</i>	372	<i>Triglochin.</i>	47
<i>Tomex.</i>	440	<i>Trigonella.</i>	356
<i>Tomex.</i>	425	<i>Trigonia.</i>	253
<i>Tonabea.</i>	262, 451	<i>Trigonis.</i>	248
<i>Tonina.</i>	443	<i>Trigonis.</i>	248
<i>Tontanea.</i>	199	<i>Triguera.</i>	125
<i>Tontelea.</i>	436	<i>Trilix.</i>	435
<i>Topobea.</i>	329	<i>Trillium.</i>	42
<i>Tordylium.</i>	224	<i>Triopteris.</i>	253, 451
<i>Tordylium.</i>	224, 453	<i>Triosteum.</i>	211
<i>Torenia.</i>	122	<i>Triplaris.</i>	83



Triplicum.	30		
Trisetaria.	30		
Tristemma.	329		
Triticum.	32		
Triumfetta.	290		
Trollius.	233		
Tropæolum.	269		
Trophis.	442		
Tsjaka.	402		
Tsjeria-samstravadi.	326		
Tsjerou-cansjeram.	448		
Tsjeru-kara.	205		
Tsubakki.	262		
Tubanthera.	380		
Tuber.	3		
Tulbagia.	54		
Tulipa.	48		
Turia.	395		
Turnera.	313		
Turræa.	264		
Turritis.	238		
Turritis.	238, 239		
Tussilago.	181		
Typha.	25		
TYPHÆ.	25		
U.			
Ulex.	352		
Ulmaria.	339		
Ulmus.	408		
Ulva.	6		
Umari.	363		
UMBELLIFERÆ.	218		
Unjala.	218		
Uniola.	32		
Unona.	283		
Unxia.	186		
Urena.	272		
Urospermum.	170		
Urtica.	403		
URTICÆ.	400		
Usubis.	247		
Utricularia.	98		
Uvaria.	284		
Uvaria.	284		
Uva ursi.	160		
Uvularia.	48		
		V.	
		Vaccinium.	162
		Vahlia.	318
		Vahlia.	451
		Valantia.	197
		Valdia.	211
		Valeriana.	195
		Valerianella.	195
		Vallea.	434
		Valli.	267
		Vallisneria.	67
		Vallisnerioides.	67
		Vandellia.	122
		Vangueria.	206
		Vanilla.	66
		Vanrhedia.	258
		Vantanea.	434
		Varronia.	129
		Vatairea.	364
		Vateria.	258
		Vatica.	259
		Velezia.	302
		Vella.	241
		Vepris.	371
		Veratrum.	47
		Verbascum.	124
		Verbascum.	124
		Verbena.	109
		Verbena.	109
		Verbesina.	188
		Vermoneta.	343
		Veronica.	99
		Veronica.	105
		Vesicaria.	240, 241
		Viburnum.	213
		Vicia.	360
		Vicia.	360
		Vinca.	144
		Viola.	294
		Virecta.	200
		Virga aurea.	180, 181
		Virola.	81
		Viscoïdes.	451
		Viscum.	212
		Visnaga.	453
		Visnea.	318



VITES.	267	Xeranthemum.	179
Vitex.	107	Xerophyta.	50
VITICES.	106	Xilopia.	284
Viris.	267	Ximenia.	259
Vitis.	267	Xiphidium.	59
Vitis idæa.	162	Xiphion.	57
Vochisia.	424	Xylon.	274
Vochy.	424	Xylophylla.	387, 452
Vohiria.	141	Xylosteon.	212
Volkameria.	107	Xyris.	44
Volkameria.	264		
Volutella.	440	Y.	
Votomita.	382	Yabag.	352
Vouacapoua.	363	Yucca.	49
Vouapa.	350		
Voua-rana.	247	Z.	
Vulneraria.	355	Zacintha.	169
		Zaleya.	314
		Zaluzania.	200
W.		Zamia.	16
Wachendorfia.	59	Zanichellia.	19
Wachendorfia.	59	Zanonia.	397
Waltheria.	289	Zanthorhiza.	234
Watsonia.	58	Zanthoxylum.	374
Watta-taly.	390	Zea.	33
Wedelia.	189	Zinnia.	188
Weigela.	421	Zizania.	33
Weissia.	11	Zizania.	33
Weinmannia.	309	Ziziphora.	111
Willichia.	418	Ziziphus.	380
Wintera.	451	Zoëgea.	174
Winterania.	263	Zoëgea.	451
Witheringia.	450	Zostera.	24
Wirsenia.	59	Zucca.	398
Wulsenia.	120	Zygia.	366
Wurmbea.	47	Zygophyllum.	296
X.			
Xanthium.	191		



## INDEX GALLICUS.

## A.

<i>Abricotier.</i>	341	<i>Amourette.</i>	32
<i>Absinte.</i>	184	<i>ANANAS.</i>	49
<i>Acacie.</i>	346	<i>Ananas.</i>	50
<i>Acajou.</i>	368	<i>Ancolie.</i>	234
— à planches.	266	<i>Andromède.</i>	160
— meuble.	266	<i>Androselle</i>	96
<i>ACANTES.</i>	102	<i>Anemone.</i>	232
<i>Acante.</i>	103	<i>Aneth.</i>	219
<i>Ache.</i>	219	<i>Angelin.</i>	363
<i>Acomat.</i>	343	<i>Angelique.</i>	222
<i>Aconit.</i>	234	<i>Angolan.</i>	323
<i>ACOTYLEDONES.</i>	1, 2	<i>Angourie.</i>	395
<i>Adonide.</i>	232	<i>Anguine.</i>	396
<i>Agaric.</i>	4	<i>Anone.</i>	283
<i>Agati.</i>	362	<i>ANONES.</i>	283
<i>Agripaume.</i>	114	<i>Anserine.</i>	85
<i>Ahouaï.</i>	149	<i>Anthyllide.</i>	355
<i>Aigremoine.</i>	336	<i>Apalachine.</i>	379
<i>Aigrette.</i>	320	<i>Apocin.</i>	146
<i>Ail.</i>	53	<i>APOCINÉES.</i>	143
<i>Ajonc.</i>	352	<i>ARALIES.</i>	217
<i>Aiouvé.</i>	80	<i>Aralie.</i>	218
<i>Airelle.</i>	162	<i>Arbousfier.</i>	160
<i>Alaterne.</i>	380	<i>Areque.</i>	38
<i>Alcée.</i>	272	<i>Argalou.</i>	380
<i>Alchimille.</i>	337	<i>Argan.</i>	151
<i>ALGUES.</i>	5	<i>Argemone.</i>	236
<i>Aliboufier.</i>	156	<i>Argoussier.</i>	75
<i>Alisier.</i>	335	<i>Arguse.</i>	129
<i>Aloës.</i>	52	<i>Aristolochie.</i>	73
<i>Amandier.</i>	341	<i>ARISTOLOCHES.</i>	72
<i>Amarante.</i>	88	<i>Armarinte.</i>	223
<i>AMARANTES.</i>	87	<i>Armoise.</i>	184
<i>Amaranthine.</i>	88	<i>Armoselle.</i>	180
<i>Ambaïba.</i>	402	<i>AROIDES.</i>	23
<i>Ambrette.</i>	174	<i>Arrête-bœuf.</i>	354
<i>Ambrosic.</i>	191	<i>Arroche.</i>	85
<i>AMENTACÉES.</i>	407	<i>ARROCHES.</i>	83
<i>Ammi.</i>	224	<i>Artichaut.</i>	175



<i>Asaret.</i>	73	<i>Bermudienne.</i>	57
<i>Asperge.</i>	41	<i>Bette.</i>	85
<i>ASPERGES.</i>	40	<i>Betoine.</i>	114
<i>Asphodele.</i>	52	<i>Bicorne.</i>	140
<i>ASPHODELES.</i>	51	<i>Bignone.</i>	139
<i>Aster.</i>	181	<i>Bihai.</i>	61
<i>Astragale.</i>	358	<i>Bilimbi.</i>	375
<i>Astrance.</i>	225	<i>Bistorte.</i>	82
<i>Athamante.</i>	223	<i>Blattaire.</i>	124
<i>Aubepin.</i>	335	<i>Bled de vache.</i>	101
<i>Aubifoin.</i>	174	<i>Blète.</i>	86
<i>Averon.</i>	32	<i>Bluet.</i>	174
<i>Aulnée.</i>	181	<i>Boccone.</i>	236
<i>Aune.</i>	409	<i>Bois à boutons.</i>	209
<i>Avoine.</i>	32	— <i>d'aigle.</i>	439
<i>Aurone.</i>	184	— <i>de campêche.</i>	348
<i>Azalée.</i>	158	— <i>de colophane.</i>	372
<i>Azedarach.</i>	265	— <i>de demoiselle.</i>	387
<i>AZEDARACHS.</i>	263	— <i>de dentelle.</i>	77
<i>Azerolier.</i>	335	— <i>d'éponge.</i>	217
<i>Azier.</i>	205	— <i>de guitare.</i>	108
<i>Azoreille.</i>	226	— <i>d'huile.</i>	254
		— <i>de losteau.</i>	204
		— <i>de merle.</i>	247
<i>Baccante.</i>	180	— <i>de natte.</i>	152
<i>Bacille.</i>	223	— <i>de nêfle.</i>	324
<i>Badamier.</i>	76	— <i>d'olive.</i>	378
<i>Badiane.</i>	280	— <i>de perdrix.</i>	260
<i>Bagasse.</i>	406	— <i>de perroquet.</i>	260
<i>Baguenaudier.</i>	359	— <i>de pintade.</i>	420
<i>Balifier.</i>	63	— <i>de poivrier.</i>	374
<i>Ballote.</i>	114	— <i>de poupart.</i>	372
<i>Balsamine.</i>	270	— <i>de quivi.</i>	264
<i>Bananier.</i>	61	— <i>de rat.</i>	206
<i>BANANIERS.</i>	61	— <i>de riviere.</i>	204
<i>Baobab.</i>	275	— <i>de rongle.</i>	254
<i>Barbaut.</i>	174	— <i>de senteur bleu.</i>	277
<i>Bardane.</i>	173	— <i>de source.</i>	266
<i>Bardottier.</i>	152	— <i>de tek.</i>	108
<i>Bareliere.</i>	103	<i>Bois jacot.</i>	324
<i>Baselle.</i>	84	— <i>puant.</i>	325, 326
<i>Basilic.</i>	116	— <i>rouge.</i>	265, 378
<i>Beauxmier de Tolut.</i>	372	— <i>tambour.</i>	401
<i>Belladone.</i>	125	— <i>trompette.</i>	402
<i>Ben.</i>	348	<i>Bonduc.</i>	350
<i>Benoite.</i>	338	<i>BORRAGINÉES.</i>	128
<i>Beole.</i>	121	<i>Bouati.</i>	429
<i>Berce.</i>	222	<i>Boucage.</i>	219
<i>Berle.</i>	222		



<i>Boulet de canon.</i>	327	<i>CAMPANULACÉES.</i>	163
<i>Bouis.</i>	388	<i>Campanule.</i>	164
<i>Bouleau.</i>	409	<i>Campêche.</i>	348
<i>Bouquetine.</i>	170	<i>Camphrée.</i>	84
<i>Bourgène.</i>	380	<i>Canche.</i>	31
<i>Bourrache.</i>	131	<i>Canillée.</i>	19
<i>Bragalou.</i>	44	<i>Cannabine.</i>	445
<i>Bresillet.</i>	349	<i>Canne.</i>	30
<i>Bresillet bâtard.</i>	370	<i>Canneberge.</i>	162
<i>Broualle.</i>	123	<i>Canti.</i>	204
<i>Brunelle.</i>	116	<i>Cantu.</i>	136
<i>BRUYÈRES.</i>	159	<i>Caoutchouc.</i>	389
<i>Bruyère.</i>	160	<i>Capillaire.</i>	15
<i>Bryone.</i>	394	<i>Caprier.</i>	243
<i>Bugle.</i>	112	<i>CAPRIERS.</i>	242
<i>Buglosse.</i>	131	<i>Capucine.</i>	269
<i>Bugrande.</i>	354	<i>Caragan.</i>	358
<i>Buis.</i>	388	<i>Carambolier.</i>	375
<i>Buis de la Chine.</i>	261	<i>Cardamome.</i>	63
<i>Buleje.</i>	118	<i>Cardiaire.</i>	194
<i>Buplevre.</i>	224	<i>Cardon.</i>	173
<i>Busserole.</i>	160	<i>Carline.</i>	172
<i>Butome.</i>	46	<i>Carmantine.</i>	104
<i>Butonic.</i>	326	<i>Carnillet.</i>	302
		<i>Carotte.</i>	224
		<i>Caroubier.</i>	347
<i>Cabaret.</i>	73	<i>Carthame.</i>	172
<i>Cabrillet.</i>	128	<i>Carvi.</i>	219
<i>Cacalie.</i>	178	<i>CARYOPHYLLÉES.</i>	299
<i>Cacao.</i>	276	<i>Cassé.</i>	348
<i>Cacaoyer.</i>	276	<i>Cassis.</i>	310
<i>Cachiment.</i>	283	<i>Cataire.</i>	113
<i>Caëte.</i>	311	<i>Catalpa.</i>	138
<i>CACTES.</i>	310	<i>Catimban.</i>	62
<i>Cadelari.</i>	88	<i>Caucalide.</i>	224
<i>Caffé.</i>	204	<i>Centauree.</i>	174
<i>Caffeyer.</i>	204	<i>Centaurelle.</i>	141
<i>Caillelait.</i>	196	<i>Centenille.</i>	95
<i>Caimitier.</i>	152	<i>Cépe.</i>	4
<i>Calac.</i>	149	<i>Cephalante.</i>	209
<i>Calament.</i>	115	<i>Ceraïste.</i>	301
<i>Calceolaire.</i>	120	<i>Cercifis.</i>	170
<i>Calebasse.</i>	396	<i>Cerfeuil.</i>	220
<i>Calebassier.</i>	127	<i>Cerisier.</i>	340
<i>Calumet des hauts.</i>	34	<i>Cestreau.</i>	126
<i>Camélée.</i>	369	<i>Céterach.</i>	15
<i>Cameline.</i>	241	<i>Chalef.</i>	75
<i>Camomille.</i>	185	<i>CHALEFS.</i>	74



<i>Chambreule.</i>	114	<i>Coignassier.</i>	335
<i>Champac.</i>	280	<i>Colasseau.</i>	103
<i>Champignon.</i>	4	<i>Colchique.</i>	47
<i>CHAMPIGNONS.</i>	3	<i>Colophane bâtard.</i>	372
<i>Chanterelle.</i>	4	<i>Coloquinte.</i>	395
<i>Chanvre.</i>	404	<i>Comaret.</i>	338
<i>Charagné.</i>	18	<i>Commeline.</i>	45
<i>Chardon.</i>	173	<i>Concombre.</i>	395
<i>Charme.</i>	409	<i>Condori.</i>	349
<i>Chataignier.</i>	409	<i>Conserve.</i>	6
<i>Chausse-trape.</i>	173	<i>Conielle.</i>	111
<i>Chelidoine.</i>	236	<i>CONIFÈRES.</i>	411
<i>Chêne.</i>	410	<i>Consoude.</i>	131
<i>Chenille.</i>	361	<i>Conyse.</i>	180
<i>Chervi.</i>	222	<i>Copahu.</i>	365
<i>CHEVREFEUILLES.</i>	210	<i>Copalme.</i>	410
<i>Chevrefeuille.</i>	212	<i>Coquelicot.</i>	336
<i>CHICORACÉES.</i>	168	<i>Coquemollier.</i>	150
<i>Chicorée.</i>	171	<i>Coqueret.</i>	126
<i>Chicot.</i>	346	<i>Coriandre.</i>	220
<i>Chionanthe.</i>	105	<i>Corise.</i>	96
<i>Chondrille.</i>	169	<i>Cormier.</i>	335
<i>Choin.</i>	27	<i>Corneille.</i>	95
<i>Chou.</i>	238	<i>Cornouiller.</i>	214
<i>Chrysène.</i>	183	<i>Cornuelle.</i>	68
<i>Chrysocome.</i>	180	<i>Coronille.</i>	361
<i>Chunco du Maragon.</i>	76	<i>Corossol.</i>	283
<i>Ciche.</i>	361	<i>Cortusé.</i>	96
<i>Ciclane.</i>	97	<i>CORYMBIFÈRES</i>	177
<i>Cierge.</i>	311	<i>Cotylet.</i>	307
<i>Cigue.</i>	223	<i>Coudrier.</i>	410
<i>Cimicaire.</i>	234	<i>Couepi.</i>	342
<i>CINAROCÉPHALES.</i>	171	<i>Couis.</i>	127
<i>Cinoglosse.</i>	131	<i>Coulekin.</i>	402
<i>Circée.</i>	319	<i>Couleuvrée.</i>	394
<i>CISTES.</i>	294	<i>Coumarou.</i>	364
<i>Ciste.</i>	294	<i>Courbaril.</i>	351
<i>Citronelle.</i>	115	<i>Courge.</i>	396
<i>Citronier.</i>	261	<i>Cranfon.</i>	240
<i>Clandestine.</i>	102	<i>Crassule.</i>	307
<i>Clathre.</i>	3	<i>Crepide.</i>	169
<i>Clavaire.</i>	5	<i>Cresson.</i>	239
<i>Clavaliér.</i>	374	<i>Crête de coq.</i>	101
<i>Clematite.</i>	232	<i>Cretelle.</i>	31
<i>Clinopode.</i>	115	<i>Croisette.</i>	197
<i>Cochène.</i>	335	<i>Crotalaire.</i>	354
<i>Cocotier.</i>	31	<i>Crucianelle.</i>	197
<i>Cocotier de mer.</i>	35	<i>CRUCIFÈRES.</i>	237
<i>Cocrête.</i>	101	<i>Crustolle.</i>	103



<i>CUCURBITACÉES</i>	393	<i>Fenugrec.</i>	356
<i>Cumin.</i>	211	<i>Fer à cheval.</i>	361
<i>Cupidone.</i>	171	<i>Ferule.</i>	222
<i>Cuscute.</i>	135	<i>Fétuque.</i>	32
<i>Cypres.</i>	413	<i>Févier.</i>	346
<i>Cytise.</i>	354	<i>Fève.</i>	360
		<i>Ficoïde.</i>	317
<i>D.</i>		<i>FICOIDES.</i>	315
<i>Dartrier.</i>	364	<i>Figuier.</i>	400
<i>Dattier.</i>	38	<i>Filao.</i>	412
<i>Deguelé.</i>	363	<i>Filaria.</i>	106
<i>Dentaire.</i>	239	<i>Flambe.</i>	57
<i>Dentelaire.</i>	92	<i>Fleche d'eau.</i>	46
<i>Detar.</i>	365	<i>Flechière.</i>	46
<i>DICOTYLEDONES.</i>	70	<i>Fleur de la passion.</i>	397
<i>Digitale.</i>	120	<i>Fluteau.</i>	46
<i>DIPSACÉES.</i>	194	<i>Fougère.</i>	15
<i>Dolique.</i>	356	<i>FOUGÈRES.</i>	14
<i>Dorine.</i>	309	<i>Fragon.</i>	42
<i>Doronic.</i>	182	<i>Fraisier.</i>	338
<i>Dracocephale.</i>	116	<i>Framboisier.</i>	338
<i>Drave.</i>	240	<i>Frangipanier.</i>	145
<i>Droüe.</i>	32	<i>Fraxinelle.</i>	297
<i>Durion.</i>	244	<i>Fresne.</i>	105
		<i>Fritillaire.</i>	48
<i>E.</i>		<i>Fromager.</i>	275
<i>Ebenier.</i>	156	<i>Froment.</i>	32
<i>Echinope.</i>	175	<i>Fruit à pain.</i>	402
<i>Eclaire.</i>	236	<i>Fusain.</i>	377
<i>Egilope.</i>	30	<i>Fustet.</i>	369
<i>Eglantier.</i>	335		
<i>Endrach.</i>	133	<i>G.</i>	
<i>Eperviere.</i>	169	<i>Gainier.</i>	351
<i>Epilobe.</i>	319	<i>Galane.</i>	137
<i>Epinars.</i>	85	<i>Galanga.</i>	64
<i>Epine-vinette.</i>	286	<i>Galar dienne.</i>	189
<i>Erable.</i>	251	<i>Galé.</i>	409
<i>ERABLES.</i>	250	<i>Galéope.</i>	114
<i>Erinace.</i>	4	<i>Galiet.</i>	196
<i>Ers.</i>	360	<i>Gandasuli.</i>	448
<i>Eupatoire.</i>	178	<i>Garence.</i>	197
<i>Euphorbe.</i>	385	<i>Garou.</i>	439
<i>EUPHORBES.</i>	384	<i>Garou.</i>	77
<i>Euphraise.</i>	100	<i>Garvance.</i>	361
		<i>GATTILIERS.</i>	106
<i>F.</i>		<i>Gattilier.</i>	107
<i>Faux buis.</i>	199	<i>Gayac.</i>	296
<i>Fenouil.</i>	219	<i>Genest.</i>	353



Genevrier.	413	Hellébore.	233
Genipayer.	201	Hellébore blanc.	47
Gentiane.	141	Helleborine.	65
GENTIANES.	141	Heliotrope.	130
Gentianelle.	142	Helianthème.	294
Geraine.	268	Hepatique.	9
GERAINES.	268	HEPATIQUES.	7
Geranion.	268	Herniole.	89
Germandrée.	112	Herse.	296
Gesse.	359	Hêtre.	409
Gevuen du Chili.	424	Hipociste.	73
Gingembre.	63	Hoitzit.	136
Ginseng.	218	Houblon.	404
Giroflier.	324	Houx.	379
Giroflée.	238	Hyssope.	113
Girofelle.	97		
Girouille.	224		
Glaivane.	59	Icaque.	340
Glauciene.	236	If.	412
Glayeul.	58	Igname.	42
Glinole.	316	Illipé.	152
Globulaire.	97	Impératoire.	220
Glouteron.	173	Impériale.	49
Gnaphale.	179	Indigotier.	359
Gnavelle.	314	Iris.	57
Gomart.	372	IRIS.	57
Gommier.	226	Ivette.	112
Gouet.	24	Ivroye.	31
Goupi.	378		
Goyavier.	324		
GRAMINÉES.	28	Jacée.	173
Grassette.	98	Jaborose.	125
Gratteron.	196	Jacinte.	52
Gremillet.	131	Jacobée.	181
Grenadier.	325	Jaquier.	402
Grenadille.	397	Jasmin.	106
Grignon.	75	JASMINES.	104
Groselier.	310	Jasminoïde.	126
Guapuru.	324	Jerose.	241
Guaïcuru.	438	Jomarin.	352
Guede.	242	Jonc.	44
Guittarin.	108	JONCS.	43
Guttier.	256	Jonc fleuri.	46
GUTTIERS.	255	Joubarbe.	307
		JOUBARBES.	307
		Jujubier.	380
		Julienne.	238
		Jusquiame.	124
Hantol.	265		
Haricot.	356		

H.

I.

J.



## L.

Lotier.

356

Lunaire.

239

Lupin.

354

Luserne.

356

Lycopode.

12

## M.

Mabier.

388

Mabouia.

244

Maceron.

219

Mâche.

195

Mâcre.

68

Madi du Chili.

450

Magnolier.

281

MAGNOLIERS.

280

Maguey.

51

Malpighie.

253

MALPIGHIES.

252

MALVACÉES.

271

Mamei.

257

Mancenilier.

391

Mancienne.

213

Manglier.

213

Manglille.

151

Mangoustan.

256

Manguier.

369

Mani.

257

Maqui du Chili.

433

Marjolaine.

115

Marronnier d'Inde.

251

Marrube.

114

Massette.

25

MASSETTES.

25

Matricaire.

183

Mauve.

272

Mayten du Chili.

449

Melanpire.

101

Melaſtome.

329

MELASTOMES.

328

Meleze.

414

Méliante.

297

Melilot.

356

Melinet.

130

Melique.

31

Melisse.

115

Meliffot.

116

Melon.

395

Melongène.

126

LABIÉES.

110

Laiche.

26

Laitron.

169

Lagetto.

77

Laitue.

169

Lamier.

113

Lampourde.

191

Lampsane.

168

Larme de Job.

34

Larmille.

34

Langue de serpent.

14

Laser.

222

Latanier de l'île de Bourbon.

39

Lavande.

113

Lavanèse.

359

Laurelle.

145

Laureole.

77

Laurier.

80

LAURIERS.

80

Laurier cerise.

340

— rose.

145

— tin.

213

Laurose.

145

LEGUMINEUSES.

345

Lentille.

360

Lentille d'eau.

19

Lentisque.

371

Liciet.

126

Licope.

111

Liège.

410

Lierre.

214

Lierre, terrestre.

113

Lila.

105

Limon.

261

Limoselle.

96

Linaire.

120

Liquidambar.

410

Lisimachie.

95

LISIMACHIES.

95

Lis-asphodèle.

54

Lis.

48

Lis.

49

Liseron.

133

LISERONS.

132

Livèche.

222

Lontar.

39



<i>Meniantz.</i>	98	<i>Neriette.</i>	319
<i>Menisperme.</i>	285	<i>NERPRUNS.</i>	376
<i>MENISPERMES.</i>	284	<i>Nerprun.</i>	380
<i>Menthe.</i>	113	<i>Nigelle.</i>	233
<i>Mercuriale.</i>	385	<i>Niruri.</i>	386
<i>Meurier.</i>	402	<i>Noisetier.</i>	410
<i>Micocoulier.</i>	408	<i>Noix de ben.</i>	348
<i>Millefeuille.</i>	186	<i>Noix vomique.</i>	149
<i>MILLEPERTUIS.</i>	254	<i>Nopal.</i>	311
<i>Millepertuis.</i>	255	<i>Nostoc.</i>	6
<i>Mogori.</i>	106	<i>Noyer.</i>	375
<i>Moissiffure.</i>	3	<i>Nyctage.</i>	90
<i>Moldavie.</i>	116	<i>NYCTAGES.</i>	90
<i>Molène.</i>	124	<i>Nympheau.</i>	98
<i>Molucelle.</i>	115		
<i>Monacelle.</i>	4	<b>O.</b>	
<i>Monbin.</i>	272	<i>Obier.</i>	213
<i>MONOCOTYLEDONES.</i>	21	<i>Æillet.</i>	302
<i>Morelle.</i>	126	<i>Æillet d'Inde.</i>	182
<i>Morgeline.</i>	300	<i>Oignon.</i>	53
<i>Morille.</i>	4	<i>Olivier.</i>	105
<i>Morine.</i>	194	<i>OMBELLIFÈRES.</i>	218
<i>Morrène.</i>	67	<i>Onagre.</i>	319
<i>MORRENES.</i>	67	<i>ONAGRES.</i>	317
<i>Mosambé.</i>	243	<i>Onoporde.</i>	173
<i>Moschatelle.</i>	309	<i>Ophioglosse.</i>	14
<i>Mouron.</i>	95	<i>Ophrisé.</i>	65
<i>Mouron d'eau.</i>	97	<i>ORANGERS.</i>	259
<i>Mouroucou.</i>	133	<i>Oranger.</i>	261
<i>MOUSSES.</i>	10	<i>ORCHIDÉES.</i>	64
<i>Moutarde.</i>	238	<i>Orchis.</i>	65
<i>Mufflier.</i>	120	<i>Oreille d'ours.</i>	96
<i>Muguet.</i>	142	<i>Orge.</i>	32
<i>Muscadier.</i>	81	<i>Origan.</i>	115
<i>MYRTES.</i>	322	<i>Orme.</i>	408
<i>Myrte.</i>	324	<i>Orme d'Amérique.</i>	277
<i>Myrtille.</i>	162	<i>Ormin.</i>	111
		<i>Ornitogale.</i>	53
		<i>Orobanche.</i>	101
		<i>Orobe.</i>	360
		<i>Orpin.</i>	307
		<i>Ortie.</i>	403
		<i>ORTIES.</i>	400
		<i>Orvalle.</i>	111
		<i>Oseille.</i>	82
		<b>P.</b>	
		<i>Pagapate.</i>	325

## N.

<i>NAIADES.</i>	18
<i>Naïade.</i>	19
<i>NARCISSES.</i>	54
<i>Narcisse.</i>	55
<i>Natte.</i>	152
<i>Navet.</i>	238
<i>Néflier.</i>	335
<i>Nelumbo.</i>	68
<i>Nenuphar.</i>	68



<i>Pain de pourceau.</i>	97	<i>Piment.</i>	126
<i>Paletuvier.</i>	213	<i>Pimprenelle.</i>	336
<i>Paliure.</i>	380	<i>Pin.</i>	414
<i>Palmier évantail.</i>	39	<i>Pin du Chili.</i>	414
<i>PALMIERS.</i>	37	<i>Pissenlit.</i>	169
<i>Paloué.</i>	351	<i>Pistachier.</i>	371
<i>Pamier.</i>	76	<i>Pitte.</i>	51
<i>Panais.</i>	219	<i>Pivoine.</i>	234
<i>Panarine.</i>	89	<i>Plantain.</i>	90
<i>Panicaut.</i>	226	<i>Plantain d'eau.</i>	46
<i>Panis.</i>	29	<i>PLANTAINS.</i>	89
<i>Papangaye.</i>	395	<i>PLAQUEMINIERS.</i>	155
<i>PAPAVERACÉES.</i>	235	<i>Plaquéminier.</i>	156
<i>Papayer.</i>	399	<i>Platane.</i>	410
<i>Pâquerette.</i>	183	<i>Plumeau.</i>	95
<i>Pariétaire.</i>	404	<i>Podagraire.</i>	219
<i>Parinari.</i>	342	<i>Poinçillade.</i>	349
<i>Pariset.</i>	42	<i>Poireau.</i>	53
<i>Parkins.</i>	347	<i>Poirée.</i>	85
<i>Passerage.</i>	241	<i>Poirier.</i>	335
<i>Passerine.</i>	77	<i>Pois.</i>	360
<i>Pastel.</i>	242	<i>Pois ciche.</i>	361
<i>Pasteque.</i>	396	<i>Pois à gratter.</i>	374
<i>Patagua du Chili.</i>	431	<i>Poire.</i>	405
<i>Patience.</i>	82	<i>POLEMOINES.</i>	136
<i>Patte d'oye.</i>	85	<i>Polemoine.</i>	136
<i>Paturin.</i>	32	<i>Politric.</i>	15
<i>Pavot.</i>	236	<i>Polypode.</i>	15
<i>Pécher.</i>	341	<i>Pomme de merveille.</i>	395
<i>Pediculaire.</i>	101	<i>Pommier.</i>	334
<i>PEDICULAIRES.</i>	99	<i>Pongelion.</i>	373
<i>Pekea.</i>	249	<i>Pongolotte.</i>	363
<i>Pepon.</i>	396	<i>Populage.</i>	234
<i>Perce-neige.</i>	55	<i>Portecollier.</i>	183
<i>Percepier.</i>	337	<i>PORTULACÉES.</i>	312
<i>Persicaire.</i>	82	<i>Potentille.</i>	338
<i>Perfil.</i>	219	<i>Potiron.</i>	396
<i>Pervenche.</i>	144	<i>Pourpier.</i>	312
<i>Pesise.</i>	4	<i>Prêle.</i>	17
<i>Pesse.</i>	18	<i>Primevere.</i>	96
<i>Petasite.</i>	181	<i>Protée.</i>	78
<i>Petite centauree.</i>	141	<i>PROTÉES.</i>	78
<i>Peuple.</i>	409	<i>Prunier.</i>	341
<i>Peuplier.</i>	409	<i>Pulicaire.</i>	90
<i>Pied de lion.</i>	337	<i>Pulmonaire.</i>	130
<i>Pied d'oiseau.</i>	361	<i>Pulsatille.</i>	232
<i>Pigamon.</i>	232	<i>Putier.</i>	340
<i>Pilulaire.</i>	16	<i>Puya du Chili.</i>	447



Pyrole.

Q.

Quassi.

Quatelè.

Queniquier.

Quinchamali.

Quillai.

Quina-quina.

Quinquina.

Quintefeuille.

Quivi.

R.

Radis.

Ragadiole.

Raifort.

Raisinier.

Ramontchi.

Rapette.

Rapontic.

Raputier.

Rave.

Ravenal.

Raven-tsara.

Redoux.

Reglisse.

RENONCULAGÉES.

Renoncule.

Renouée.

Reseda.

Rhubarbe.

Rima.

Riz.

Rocou.

Romarin.

Ronce.

Rondier.

ROSACÉES.

Rosage.

ROSAGES.

Rose de Jéricho.

— du Japon.

Roseau.

Rosier.

Rossolis.

Rotang.

Rouvet.

161

Royoc.

RUBIACÉES.

Rue.

RUTACÉES.

282

327

350

75

444

366

201

338

264

Sabine.

Sabot.

Safran.

Sagoune.

Sainbois.

Sainfoin.

Salicaire.

SALICAIRES.

Salicorne.

Saligot.

Salsepareille.

Salsifis.

Samole.

Sangdragon.

Sanguisorbe.

Sanicle.

Santoline.

Sanve.

Sapan.

Sapin.

Sapotillier.

SAPOTILLIERS.

Sarrafin.

Sarrette.

Sarriette.

Sassafras.

Satirion.

Satyre.

Sauge.

Saule.

Savonier.

SAVONNIERS.

Sauvevie.

Saxifrage.

SAXIFRAGES.

Saxifrage dorée.

Scabieuse.

Sceau de notre-Dame.

Sceau de Salomon.

Scille.

Sclarée.

Scolopendre.

209

196

297

296

S.

413

65

59

134

77

362

332

330

86

68

42

170

97

40

336

225

185

238

349

414

152

151

82

174

112

80

65

3

111

408

247

246

15

309

308

309

194

43

42

53

111

15

Scorpione



<i>Scorpione.</i>	131	<i>Tan-rouge.</i>	309
<i>Scorzonère.</i>	170	<i>Tanroujou de Madagascar.</i>	351
<i>Scrophulaire.</i>	119	<i>Tarala des Galibis.</i>	350
<b>SCROPHULAIRES.</b>	117	<i>Tarconante.</i>	185
<i>Sebestier.</i>	128	<i>Tariri.</i>	370
<i>Seigle.</i>	32	<i>Tavoulou.</i>	56
<i>Sené.</i>	348	<i>Tek.</i>	108
<i>Seneçon.</i>	181	<i>Temo du Chili.</i>	435
<i>Sensitive.</i>	346	<b>TEREBINTACÉES.</b>	368
<i>Serpentaire.</i>	24	<i>Terebinte.</i>	371
<i>Serpolét.</i>	115	<i>Terre-noix.</i>	223
<i>Sesame.</i>	138	<i>Terrette.</i>	113
<i>Seseli.</i>	220	<i>Thapsie.</i>	220
<i>Sigaline.</i>	347	<i>Thé.</i>	262
<i>Simarouba.</i>	282	<i>Thim.</i>	115
<i>Singane.</i>	257	<i>Thlaspi.</i>	241
<i>Sison.</i>	221	<b>THYMELEES.</b>	76
<b>SOLANÉES.</b>	124	<i>Tillée.</i>	307
<i>Soldanelle.</i>	97	<i>Tilleul.</i>	292
<i>Soleil.</i>	189	<b>TILIACÉES.</b>	289
<i>Sorbier.</i>	335	<i>Titymale.</i>	385
<i>Souchet.</i>	27	<i>Tolut.</i>	372
<b>SOUCHETS.</b>	26	<i>Tomate.</i>	126
<i>Souci.</i>	183	<i>Toque.</i>	117
<i>Soude.</i>	85	<i>Tormentille.</i>	337
<i>Spargoute.</i>	301	<i>Tovomite.</i>	256
<i>Sparte.</i>	33	<i>Tourretie.</i>	139
<i>Spic.</i>	113	<i>Trefle.</i>	355
<i>Staphylin.</i>	377	<i>Trientale.</i>	96
<i>Stellaire.</i>	301	<i>Trique.</i>	307
<i>Stœchas.</i>	113	<i>Troène.</i>	106
<i>Sumac.</i>	369	<i>Truffe.</i>	3
<i>Superbe.</i>	48	<i>Tubéreuse.</i>	56
<i>Sureau.</i>	214	<i>Tulipe.</i>	48
<i>Surelle.</i>	270	<i>Tulipier.</i>	281
<i>Suron.</i>	223	<i>Tupelo.</i>	75
<i>Syringa.</i>	325	<i>Turquette.</i>	89
		<i>Turrete.</i>	238
		<i>Tussilage.</i>	181

## T.

<i>Tabac.</i>	125
<i>Tachigali de Cayenne.</i>	349
<i>Taligale.</i>	109
<i>Tamarinier.</i>	347
<i>Tamaris.</i>	313
<i>Tamboul.</i>	401
<i>Taminier.</i>	43
<i>Tanaïsie.</i>	184
<i>Taniboucier.</i>	76

## U.

<i>Urchin.</i>	4
<i>Utriculaire.</i>	98
<i>Uvulaire.</i>	48

## V.

<i>Valeriane.</i>	195
<i>Vanguier.</i>	206



<i>Vanille.</i>	66	<i>Violette.</i>	294
<i>Varaire.</i>	47	<i>Viorne.</i>	213, 232
<i>Varec.</i>	6	<i>Viperine.</i>	130
<i>Verge d'or.</i>	181	<i>Voa-Vanguier de Madagascar.</i>	206
<i>Verne.</i>	409	<i>Vomique.</i>	149
<i>Vernis.</i>	369	<i>Wampi de la Chine.</i>	261
<i>Véronique.</i>	99	<i>Vulnéraire.</i>	355
<i>Verveine.</i>	109		
<i>Vesce.</i>	360	Y.	
<i>Vesseloup.</i>	3	<i>Yeble.</i>	214
<i>Vigne.</i>	267	<i>Yeuse.</i>	410
<i>VIGNES.</i>	267		
<i>VINETTIERS.</i>	286	Z.	
<i>Vinettier.</i>	286	<i>Zedoaire.</i>	64

F I N I S.



# E R R A T A.

Pag.	xv. lin.	8. feminalis	<i>lege</i> :	feminalem
	xvii.	33. immerit		immeritò
	lii.	36. nter		inter
	liii.	31. decima		undecima

Pag.	4. lin.	39. URICULARIA	<i>lege</i> :	AURICULARIA.
	29.	21. calice		glumâ
	29.	23. calice		glumâ
	29.	26. calici		glumæ
	29.	37. calice		glumâ
	48.	26. METHONICA		METHONICA T.
	81.	11. tria ut		tri aut
	84.	23. 4 partitus		4-partitus
	90.	4. trichtomus		trichotomus
	91.	11. squa-		squamis
	91.	17. racemosi-		racemoso-
	105.	14. HP.		L.
	105.	22. V. decussatæ L.		Veronicæ decussatæ
				HRP.
	124.	11. oppositis		appositis
	138.	23. incogniti		vix cogniti.
	145.	37. bilocularis		bifollicularis.
	153.	22. pentandrus		pentander
	163.	6. infero		supero
	170.	14. phyllo		5-phyllo.
	179.	36. T.		F.
	180.	13. STÆBE		STØBE
	180.	39. radiati		flosculosi
	190.	10. Αρπια		Αρπια
	198.	16. frutescens		aut frutescens.
	204.	10. usurpantur... dicta		usurpatur... dicta
	222.	23. piicis		plicis
	232.	22. au		aut
	251.	34. capsulæ		capsulæ 3
	279.	43. corollâ		coronâ
	285.	39. Forsk.		Forst.
	319.	26. calicinis		calicis
	333.	32. uaut rceolari		aut urceolari
	347.	44. idem		eadem
	365.	2. t. 279		t. 299
	441.	32. SUPERO		INFERO.
	460.	Caryophyllus p. 325		p. 324
	461.	Chelone 127		137
	479.	Raphanus 138		238
	484.	post Tigridiam	<i>adde</i> :	Tillæa p. 307







*Histoire Naturelle, Médecine, Anatomie, Chirurgie, Pharmacie, Chymie, &c. &c.*

- A**CADÉMIE Royale de Chirurgie (Mémoires.) *Par. 5 v. in-4. avec fig. 701.*  
*N. B. Chaque vol. se vend séparément, 141.*  
 Les mêmes Mémoires. *Paris, avec fig. 15 vol. in-12. 451.*  
*N. B. Chaque volume in-4. étant réduit en 3 volumes in-12. on ne sépare ces derniers que par collection de 3 volumes, qui se vendent séparément, au prorata de la collection complète, 91.*  
 Recueil des Pièces qui ont concouru pour le prix de l'Académie Royale de Chirurgie. *Par. 4 tomes rel. en 5 v. in-4. 501.*  
*N. B. Les 3 premiers vol. se vendent séparément à raison de 10 l. — Le tome 4 relié en deux volumes, 20 l.*  
 Le même Recueil. *Paris, 13 vol. in-12. 32 l. 10 f.*  
*N. B. Les deux premiers volumes se vendent séparément 5 l. les volumes 3, 4 & 5, séparément, 7 l. 10 f. les 6, 7 & 8, séparément, 7 l. 10 f. les volumes 9 à 13, séparément, 12 l. 10 f.*  
 Mémoire sur les Ciseaux à incision, par M. Percy, couronné par l'Académie Royale de Chirurgie, en 1785. *Paris, 1785, in-4. avec fig. br. 3 l. 12 f.*  
 Mémoire sur les Stylets ou Sondes solides, & sur les Sondes cannelées; couronné par l'Académie Royale de Chirurgie, en 1784. *Paris, 1784, in-4. br. 1 l. 16 f.*  
 Séances publiques de l'Académie Royale de Chirurgie, où l'on traite de diverses matières intéressantes, & particulièrement de la Section de la Symphyse des Os pubis. *Paris, 1779. in-4. br. 3 l. 12 f.*  
 Règlement pour l'Académie Royale de Chirurgie, du 18 Mars 1751. *in-4. br. 12 f.*  
**A**DANSON, Histoire Naturelle du Sénégal. *Paris, 1757, in-4. avec 20 pl. 18 l.*  
 La même, *in-4. gr. pap. fig. 24 l.*  
 Allaitement (de l') & de la pr. éducation des enfans. *Geneve, 1782, in-12. br. 12 f.*  
 Anarchie médicale, ou la Médecine considérée comme nuisible à la société, par Gilibert. *Neufchatel, 1772, 3 vol. in-12. 7 l. 10 f.*  
 Agronome (l'), Dictionnaire portatif du Cultivateur. *Par. 1764, 2 v. p. in-8. 9 l.*  
 Anciens (les) & Généralogistes du Royaume de France, avec des notes par Gobet. *Paris, 1779, 2 vol. in-8. 12 l.*  
 Andry, l'Orthopédie, ou l'art de prévenir & de corriger dans les enfans, les difformités du corps. *Paris, 1741, 2 vol. in-12. avec fig. 6 l.*  
 Andry, de la génération des vers dans le corps de l'homme, de la nature & des espèces de cette maladie; des moyens de s'en préserver & de s'en guérir, troisième édit. *Paris, 1741, 2 vol. in-12. fig. 6 l.*  
 Arbuthnot, Essai des effets de l'air sur le corps humain, traduit de l'Anglois, avec des notes, par Boyer de Pebrandier. *Paris, 1742. in-12. 2 l. 10 f.*  
 Arconville, Essai pour servir à l'Histoire de la Putréfaction. *Paris, 1766, in-8. 6 l.*  
 Arthaud, Dissertation sur la dilatation des artères & sur la sensibilité, appuyées de plusieurs expériences faites sur les animaux vivans. *Par. 1771, in-8. br. 1 l. 4 f.*  
 Astruc, de Morbis venereis Libri. *Parif. 1740, 2 vol. in-4. 18 l.*  
 Bagieu, examen de plusieurs parties de la Chirurgie, d'après les faits qui peuvent y avoir rapport. *Par. 1756, 2 v. in-12. 6 l.*  
 Baglivi, Traité des maladies, traduit du Latin, avec des remarques & des observations, par d'Aignan, D. M. *Paris, 1757, in-12. 3 l.*  
 Barbeau Dubourg, le Botaniste François. *Paris, 1767, 2 vol. in-12. 6 l.*  
 Barker. Voyez Lorry.  
 Basin, Observations sur les plantes, & leur analogie avec les insectes. *Strasb. 1741, in-8. br. 2 l. 5 f.*  
 Beaumé, Manuel de Chimie, ou Exposé des opérations de la Chimie & de leurs produits, sec. éd. *Par. 1766, in-12. 3 l.*  
 Beaumé, Chimie expérimentale & raisonnée. *Paris, 1773, 3 v. in-8. avec fig. 18 l.*  
 Beaumé, Mémoire sur la meilleure manière de construire les Alambics & Fourneaux propres à la distillation des vins pour en tirer les eaux-de-vie. *Par. 1778, in-8. br. 1 l. 16 f.*  
 Bell, Traité théorique & pratique des Ulcères, suivi d'une Dissertation sur les tumeurs blanches des articulations, & précédé d'un Essai sur le traitement chirurgical de l'inflammation & de ses suites; trad. de l'Anglois sur la quatrième & dernière édition, augmenté de quelques notes, & de Recherches sur la teigne, par M. Bosquillon. *Paris, 1788, in-8. avec fig. br. 5 l.*  
 Bellamy, Observation intéressante sur un accouchement. *Paris, 1780, in-8. br. 8 f.*  
 Bertrandi, Traité des opérations de Chirurgie, nouvelle édit. *Paris, 1784, in-8. avec fig. 6 l.*  
 Bienville, la Nymphomanie, ou Traité de la fureur utérine, nouv. édit. *Amst. 1778, in-12, 2 l. 10 f.*



- Boerhaave**, Aphorismes de Chirurgie , commentés par Van-Swieten. Nouvelle trad. avec des notes , par M. Louis. *Paris* , 1768 , 7 vol. in-12. 211.
- N. B. Les tomes VI & VII se vendent séparément, 61.
- Boerhaave**, Aphorismes de la connoissance & de la cure des maladies , commentés par Van-Swieten , traduits par Moublet. *Lyon* , 1766 , 2 vol. in-12. 51.
- Boerhaave**, (Traité des Fievres). *Lyon* , 1770 , 6 vol. in-12. 151.
- Boerhaave**, Institutiones Medicæ , *Parisi*. 1747 , in-12. 31. 12 f.
- Boerhaave**, Aphorismi de cognoscendis & curandis morbis & libellus de materia medica. Edit. noviss. *Parisi* , 1745 , in-12. 31. 12 f.
- Boerhaave**, De cognoscendis & curandis morbis Aphorismi unâ cum ejusdem de materia medica & remediorum formulis libello ad singulos Aphorismos digesto. Accedit ejusdem Auctoris Tractatus de lue venerea. *Lovanii* , 1765 , in-8. 41. 10 f.
- Boerhaave**, Aphorismi de cognoscendis & curandis morbis. *Lugd. Bat.* 1742 , in-8. br. 21. 10 f.
- Boerhaave**, Libellus de materie medica & remediorum formulis quæ serviunt aphorismis de cognoscendis & curandis morbis. *Lugd. Bat.* 1740 , in-8. br. 21. 10 f.
- Boerhaave**, Prælectiones Academicæ de morbis nervorum. *Lugd. Bat.* 1761 , 2 vol. in-8. 91.
- Boerhaave**, De Morbis Oculorum , cum fig. æneis. *Parisi*. 1748 , in-12. 21. 10 f.
- Bomare**, Minéralogie , ou Nouvelle Exposition du regne minéral. *Paris* , 1774 , 2 vol. in-8. 121.
- Bonnet (Ch.)**, Œuvres d'Histoire Naturelle & de Philosophie. *Neufchatel* , 1779 à 1783 , 8 tomes 10 vol. in-4. avec fig. brochés, 871.
- Bordeu**, Recherches sur le pouls par rapport aux crises. *Par.* 1779 , 4 v. in-12. 121.
- Bordeu**, Recherches anatomiques sur la position des glandes & sur leur action. *Paris* , 1751 , in-12. 31.
- Bordeu**, Recherches sur les maladies chroniques , leurs rapports avec les maladies aiguës , leurs périodes , leur nature. *Paris* , 1775 , in-8. 61.
- Bordeu**, Traité de Médecine théorique & pratique , extrait des Ouvrages de Bordeu par M. Minvielle. *Paris* , 1774 , in-12. 31.
- Bourgelat**, Matière médicale raisonnée , ou Précis des médicamens considérés dans leurs effets , avec les formules médicales de l'Ecole Vétérinaire. *Lyon* , 1771 , in-8. 51.
- Bourgu**, Observations & recherches médicales , par une Société de Médecins de Londres , traduites de l'Anglois. *Paris* , 1764 , vol. I , in-12. avec fig. 31. La suite sous presse.
- Bourru**, Utilité des voyages sur mer pour la cure de différentes maladies , & notamment de la consommation , avec un Appendix sur l'usage des bains dans les fievres , traduit de l'Anglois de Gilchrist. *Paris* , 1770 , in-12. 31.
- Bourru**, Des moyens les plus propres à éteindre les maladies vénériennes. *Par.* 1771 , in-8. br. 15 f.
- Burrows**, Nouvel Essai de Médecine-pratique sur les cancers. *Londres* , 1767 , in-12. br. 11. 4 f.
- Burton**, Système nouveau & complet de l'Art des Accouchemens , tant théorique que pratique , avec la description des maladies particulières aux femmes enceintes , aux femmes en couche , & aux enfans nouveaux-nés , traduit de l'Anglois par M. le Moine , avec 18 fig. *Paris* , 1771 & 1773 , 2 vol. in-8. 141.
- Le Tome II se vend sépar. 71.
- Camus**, Médecine de l'esprit , nouvelle édition , revue , corrigée & augmentée. *Paris* , 1769 , 2 vol. in-12. 61.
- La même , *Paris* , 1769 , in-4. 101.
- Camus**, La Médecine - Pratique rendue plus simple , plus sûre & plus méthodique. *Paris* , 1769 , 3 vol. in-12. 91.
- La même. *Paris* , 1769 , in-4. 121.
- Cartheuser**, Fundamenta materiæ medicæ tam generalis quam specialis , editio nova , præcedente emendatio ac longè auctior , curante Desessartz. *Parisi*. 1769 , 4 vol. in-12. 121.
- Cat (1e)**, Cours abrégé d'Ostéologie. *Rouen* , 1768 , in-8. avec fig. 31.
- Celse**, Traduction de ses Ouvrages sur la Médecine , par Ninnin. *Paris* , 1753 , 2 vol. in-12. 61.
- Chabert**, Observations de Chirurgie-pratique. *Paris* , 1724 , in-12. 31.
- Cheynæi** Tractatus de infirmorum sanitæ tuenda , vitæque producenda. *Parisi* , 1742 , in-12. 31.
- Le même , traduit en françois , avec des remarques intéressantes & un abrégé des propriétés des alimens. *Paris* , 1755 , in-12. 31.
- Chomel**, Abrégé de l'histoire des Plantes usuelles , dans lesquelles on donne leurs noms différens tant françois que latins ; la manière de s'en servir ; la dose & les principales compositions de pharmacie dans lesquelles on les emploie. *Paris* , 1782 , in-8. 61.
- Col de Villars**, Cours de Chirurgie dicté aux Ecoles de Médecine de Paris. *Paris* , 1752 , 6 vol. in-12. 181.



- Col de Villars, Dictionnaire François-Latin des termes de Médecine & de Chirurgie, avec leur définition, leur division & leur étymologie. *Paris*, 1760, in-12. 2 l. 10 f.
- Consultations choisies de plusieurs Médecins célèbres de l'Université de Montpellier sur des maladies aiguës & chroniques, tomes IX & X, 2 vol. in-12. en feuilles, 5 l.
- Coste, Traité des maladies du poulmon. *Paris*, 1767, in-12. broché, 1 l. 4 f.
- Coste, Traité-pratique de la Goutte, où l'on indique les moyens de guérir cette maladie; troisième édition, beaucoup augmentée. *Par.* 1768, in-12. br. 1 l. 16 f.
- Coste, Méthode générale d'Analyse, ou Recherches physiques sur les moyens de connoître toutes les Eaux minérales, trad. de l'Ang. *Par.* 1767, in-12. 2 l. 10 f.
- Courtois, le Dentiste Observateur, ou Recueil d'Observations, tant sur les maladies qui attaquent les Gencives & les Dents, que sur les moyens de les guérir, &c. *Par.* 1775, in-12. av. fig. br. 2 l. 10 f.
- Cullen, Physiologie traduite sur la troisième édition, par M. Bosquillon. *Paris*, 1786, in-8. broch. 2 l. 8 f.
- Cullen, Elémens de Médecine-pratique, traduits de l'Anglois, avec des notes, dans lesquelles on a refondu la Nosologie du même Auteur, par M. Bosquillon. *Paris*, 1785-1787, 2 vol. in-8. 14 l.
- D'Arcet, second Mémoire sur l'action d'un feu égal, violent & continué pendant plusieurs jours sur un grand nombre de terres, de pierres & de chaux métalliques, &c. *Paris*, 1771, in-8. br. 1 l. 16 f.
- D'Arcet, Discours en forme de Dissertation sur l'état actuel des montagnes des Pyrénées, & sur les causes de leur dégradation. *Par.* 1776, in-8. br. 1 l. 16 f.
- Deleurye, Traité des Accouchemens en faveur des Elèves, seconde édition considérablement augmentée. *Paris*, 1777, in-8. 6 l.
- Deveaux, l'Art de faire les rapports en Chirurgie, où l'on enseigne la pratique, les formules & le style le plus en usage parmi les Chirurgiens commis aux rapports. *Paris*, 1746, in-12. 3 l.
- Dienert, Introduction à la matière médicale, en forme de Thérapeutique. *Par.* 1753, in-12. 3 l.
- Dictionnaire Botanique & Pharmaceutique, contenant les principales propriétés des minéraux, des végétaux, & des animaux d'usage, avec les préparations de Pharmacie internes & externes les plus usitées en Médecine & en Chirurgie. *Paris*, 1768, in-8. 5 l.
- Dictionnaire du Diagnostique, ou l'Art de connoître les maladies, & de les distinguer exactement les unes des autres, par M. Hélian. *Paris*, 1771, in-12. 3 l.
- Dictionnaire des Prognostics, ou l'Art de prévoir les bons ou mauvais événemens dans les maladies. *Paris*, 1770, in-12. 3 l.
- Didelot, Avis aux gens de la campagne, ou Traité des maladies les plus communes. *Nancy*, 1772, in-12. 2 l. 10 f.
- Didelot, Précis des maladies chroniques & aiguës. *Nancy*, 1774, 2 vol. in-12. 5 l.
- Dionis, Dissertation sur le Toenia ou ver plat, dans laquelle on prouve que ce ver n'est pas solitaire. *Paris*, 1749, in-12. 2 l. 10 f.
- Douglas, nouvelle manière de faire l'opération de la taille; on y a ajouté ce que Rouffet, Chefelden & Pietre ont écrit sur ce sujet. *Paris*, 1724, in-12. avec fig. 2 l. 10 f.
- Dran (le), Observations de Chirurgie, auxquelles on a joint plusieurs Observations. *Paris*, 1731, 2 vol. in-12. 6 l.
- Dran (le), Traité ou Réflexions tirées de la Pratique sur les plaies d'armes à feu, sec. éd. *Paris*, 1759, in-12. 2 l. 10 f.
- Dran (le), Abrégé économique de l'Anatomie du corps humain. *Paris*, 1768, in-12. avec fig. 3 l.
- Dran (le), Parallele des différentes manières de tirer la pierre hors de la vessie. *Paris*, 1730, in-8. avec fig. 6 l.
- Ducoudray, Abrégé de l'Art des Accouchemens, sixième édition, avec fig. en couleur. *Paris*, 1785, in-8. 7 l. 4 f.
- Delius, Traité sur la Science de l'exploitation des mines par théorie & pratique, traduit par Schreiber. *Paris*, 1778, 2 vol. in-4. avec fig. 30 l.
- Dufieu, Dictionnaire raisonné d'Anatomie & de Physiologie. *Paris*, 1766, 2 vol. in-8. 10 l.
- Duhamel, Avis pour le transport par mer des arbres, des plantes vivaces, des semences & de diverses autres curiosités d'Histoire Naturelle, seconde édition. *Paris*, 1753, in-12. br. 1 l. 4 f.
- Duverney, Myotomologie ou Dissertation raisonnée des muscles. *Paris*, in-12. 2 l. 10 f.
- Eloy, Dictionnaire historique de la Médecine ancienne & moderne, ou Mémoires disposés par ordre alphabétique, pour servir à l'Histoire de cette Science, &c. *Mons*, 1778, 4 vol. in-4. 48 l.
- Essais & Observations de Médecine de la Société d'Edimbourg, traduits de l'Anglois. Les tomes IV, V, VI, VII, in-12.



- Essais & Observations physiques & littéraires de la Société d'Edimbourg, trad. par M. Demours. *Par.* 1759, in-12. 31.
- FABRE, Traité des Maladies vénériennes, quatrième édition revue, corrigée, & augmentée par l'Auteur. *Paris*, 1782 & 1786, in-8. 7 l. 10 f.
- Fabre, Lettres à M. D\*\*\* pour servir de Supplément au Traité des Maladies vénériennes. *Paris*, 1786, in-8. br. 1 l. 10 f.
- Fabre, Recherches sur différens points de Physiologie, de Pathologie & de Thérapeutique. *Paris*, 1783, 2 vol. in-8. br. 6 l. 12 f.
- Fabre, Réflexions sur la chaleur animale, pour servir de suite aux recherches, &c. in-8. br. 12 f.
- Freind, Opera omnia medica. *Parisiis*, 1735, in-4. 14 l.
- Freind, Emmenologia in qua fluxus muliebris, menstrui phœnomena, periodi, vitia, cum medendi methodo, ad rationes mechanicas exiguntur. *Parisi*. 1727, in-12. 2 l. 10 f.
- Fulleri, Pharmacopœia extemporanea, editio castigatior curante Baron. *Parisiis*, 1768, in-12. 4 l.
- Gaubii Institutiones Pathologiæ medicinalis. *Lug. Bat.* 1775. in-12. 3 l.
- Gaubius, Pathologie, traduite par M. Sue, nouv. édit. revue, corrigée & augmentée par le traducteur, sur les dernières éditions de Leyde & de Nuremberg. *Paris*, 1788, in-8. 6 l.
- Geoffroi, Traité de la matière médicale, ou de l'Histoire des vertus, du choix & de l'usage des remèdes simples. *Paris*, 1757 & années suiv. 17 vol. in-12. 51 l.
- Table générale alphabétique des seize vol. de la mat. médicale, in-12. 3 l. 10 f.
- Goulard, Œuvres de Chirurgie, 1778, 2 vol. in-12. 5 l.
- Grant, Recherches sur les fièvres, traduites par M. Lefebvre de Villebrune. *Paris*, 1773, 3 vol. in-12. 9 l.
- Le Tome troisième se vend sépar. 3 l.
- Haen (*Ant.*), Ratio medendi in nosocomio practico. *Parisiis*, 11 vol. in-12. 33 l.
- Haller, Collection de Theses Medico-Chirurgicales, sur les points les plus importants de la Chirurgie théorique & pratique. *Paris*, 1760, 5 vol. in-12. 15 l.
- Haller, Elémens de Physiologie, &c. Sous presse.
- Haller, Mémoires sur la Nature sensible & irritable des parties du corps animal. *Lausanne*, 1756, 4 vol. in-12. 10 l.
- Halleri Opera minora, emendata, aucta & renovata. *Lausannæ*, 1762, 3 v. in-4. 36 l.
- Halles, la Statique des végétaux & celle des animaux, traduites en François. *Paris*, 1779, in-8. avec fig. 9 l.
- Hartman, Traité des Haras, auquel on a ajouté la manière de ferrer, hongrer, marquer & angloiser les poulains; des remarques sur quelques-unes de leurs maladies; des observations sur le poulx, sur la saignée & sur la purgation; avec un Traité des mulets; trad. de l'Allemand, revu & publié par M. Huzard. *Paris*, 1788, in-8. avec fig. br. 5 l.
- Hecquet, Traité des Dispenses du Carême, dans lequel on fait voir le rapport des alimens maigres avec la nature de l'homme; troisième édition, avec deux Dissertations sur les macreuses & sur le tabac. *Paris*, 1741, 2 vol. in-12. 5 l.
- Heisteri Compendium Institutionum, sive fundamentorum Medicinæ. *Amst.* 1764, in-8. br. 1 l. 16 f.
- Heisteri Compendium Medicinæ practicæ. *Amst.* 1762, in-8. 6 l.
- Heisteri Compendium Anatomicum, totam rem Anatomicam brevissimè complectens, figuris ænæis ornatum. *Amst.* 1748, in-8. 6 l.
- Henkel, Introduction à la Minéralogie, ou Connoissance des eaux, des fucs terrestres, des fels, des terres, des pierres, des minéraux & des métaux, avec une description abrégée des opérations de Métallurgie. *Par.* 1756, 2 v. in-12. 5 l.
- Histoire & Mémoires de la Société Royale de Médecine, pour les années 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 5 vol. in-4. 70 l.
- Hippocratis Aphorismi, Gr. & Lat. *Vide Lorry.*
- Hippocrate, Aphorismes, traduits d'après la collation de vingt-deux Manuscrits & des Interpretes Orientaux, par M. Lefebvre de Villebrune. *Paris*, 1786, in-18. br. 1 l. 10 f.
- Hoffmanni consultationum & responsorum medicinalium centuriæ. *Francof.* 1734, 2 vol. in-4. 12 l.
- Home, Principes de Médecine; traduits en François; auxquels on a joint un extrait des expériences & observations de Médecine du même Auteur, par M. Gastelier. *Paris*, 1772, in-8. 5 l.
- Huxam, Essai sur les fièvres, auquel on a ajouté deux dissertations sur les maux de gorge & sur la colique. *Paris*, 1765, in-12. 3 l.
- Janin, Mémoires & Observations anatomiques; physiologiques & physiques sur l'œil & sur les maladies qui affectent cet organe, avec un précis des opérations & des remèdes qu'on doit pratiquer pour les guérir. *Lyon*, 1772, in-8. 6 l.
- Janin, Réflexions sur le triste sort des personnes qui, sous une apparence de



- mort, ont été enterrées vivantes, & sur les moyens qu'on doit mettre en usage pour prévoir une telle méprise. *Paris*, 1772, in-8. br. 1 l. 4 f.
- Ingen-Houfz, expériences sur les végétaux, spécialement sur la propriété qu'ils possèdent à un haut degré, soit d'améliorer l'air quand ils sont au soleil, soit de le corrompre la nuit ou lorsqu'ils sont à l'ombre; auxquelles on a joint une méthode nouvelle de juger du degré de salubrité de l'atmosphère; seconde édition, revue, corrigée & augmentée. *Par.* 1787, in-8. avec fig. 6 l.
- Ingen-Houfz, nouvelles expériences & observations sur divers objets de Physique. *Paris*, 1785, in-8. avec fig. 6 l.
- Klein, Tentamen Methodi Ostracologicæ sive dispositio naturalis Cochlidum & Concharum in suas classes, genera & species, iconibus singulorum generum æri incisus illustrata. *Lugd. Bat.* 1753, in-4. 14 l.
- Les 58 planches du Cours d'Hyppiatrique, de M. Lafosse, en un vol. in-fol. br. en carton. 30 l.
- Lambfma, Ventris fluxus multiplex ex antiquis & recentiorum monumentis propositus. *Amst.* 1756, in-8. 5 l.
- Lamotte, Traité complet de Chirurgie, contenant des Observations & des Réflexions sur toutes les maladies chirurgicales & sur la manière de les traiter; troisième édition, revue, corrigée, & augmentée de Notes critiques, par M. Sabatier. *Paris*, 1771, 2 vol. in-8. 12 l.
- Langhans, Essai sur les maladies auxquelles sont sujettes les personnes qui vivent à la Cour & dans le grand monde. *Paris*, 1772, in-12. 2 l. 10 f.
- Lassus, Essai ou Discours historiq. & critique sur les découvertes faites en Anatomie par les Anciens & par les Modernes. *Paris*, 1783, in-8. br. 3 l. 12 f.
- Lavoisien, Dictionnaire portatif de Médecine, d'Anatomie, de Chirurgie, de Pharmacie, de Chymie, d'Histoire Naturelle, de Botanique & de Physique, qui contient les termes de chaque Art, leur étymologie & leur explication, tirée des meilleurs Auteurs; avec un Vocabulaire Grec & un Latin; Nouv. éd. corr. & aug. *Par.* 1781, in-8. 6 l.
- Lefebure de Saint-Ildephonse, Le Médecin de soi-même, ou Méthode simple & aisée pour guérir les Maladies vénériennes, avec la recette d'un Chocolat aphrodisiaque, aussi utile qu'agréable; nouvelle édition, augmentée des Analyses raisonnées & instructives de tous les ouvrages qui ont paru sur le mal vénérien depuis 1740, & de la traduction de la Dissertation de Boehm. *Par.* 1775, 2 vol. in-8. br. 10 l.
- Lefebure de Saint-Ildephonse, Remède éprouvé pour guérir radicalement le Cancer occulte & manifeste ou ulcéré. *Paris*, 1775, in-8. br. 12 f.
- Lemery, Pharmacopée universelle, contenant toutes les compositions de Pharmacie qui sont en usage dans la Médecine, tant en France que dans toute l'Europe; leurs vertus, leurs doses, les manières d'opérer les plus simples & les meilleures, avec un Lexicon pharmaceutique. *Par.* 1763, 2 v. in-4. 22 l.
- Lemery, Dictionnaire Universel des drogues simples, contenant leurs noms, origine, choix, principes, vertus, étymologies, & ce qu'il y a de particulier dans les animaux, dans les végétaux & dans les minéraux. *Paris*, 1759, in-4. avec fig. 22 l.
- Lemery, Traité des Alimens, où l'on trouve la différence, le choix qu'on en doit faire, &c. troisième édit. revue, corrigée & augmentée, par J. J. Bruhier D. M. *Paris*, 1755, 2 vol. in-12. 6 l.
- Levacher de la Feutrie, Traité du Rachitis, ou l'Art de redresser les enfans contrefaits. *Paris*, 1772, in-8. 6 l.
- Levret, Art des Accouchemens, démontré par des principes de physique & de mécanique, troisième édition. *Paris*, 1766, in-8. avec fig. 6 l.
- Levret, Observations sur les causes & les accidens de plusieurs accouchemens laborieux, avec des remarques sur ce qui a été proposé & mis en usage pour les terminer, &c. *Paris*, 1780, in-8. avec fig. 6 l.
- Levret, Essai sur l'abus des regles générales, & contre les préjugés qui s'opposent aux progrès de l'Art des Accouchem. *Par.* 1766, in-8. av. fig. 4 l. 10 f.
- Levret, Observations sur la cure radicale de plusieurs polypes de la matrice, de la gorge & du nez; troisième édition. *Paris*, 1771, in-8. avec fig. 6 l.
- Lieutaud, Précis de la Médecine-Pratique, contenant l'Histoire des maladies, & la manière de les traiter; avec des Observations & des Remarques critiques sur les points les plus intéressans. *Par.* 1776, 2 vol. in-8. 10 l.
- Lieutaud, Précis de la matière médicale, contenant ce qu'il importe de savoir sur la nature, les propriétés & les doses des médicamens, tant simples qu'officinaux; avec un grand nombre de formules. *Paris*, 1781, 2 vol. in-8. 11 l.
- Lieutaud, Anatomie historique & pratique, nouvelle édition, augmentée par M. Portal. *Par.* 1776, 2 v. petit in-8. 9 l.



- Lieutaud *Synopsis universæ praxeos medicæ. Parisiis*, 1770, 2 vol. in-4. 24 l.
- Lind, *Essai sur les maladies des Européens dans les pays chauds, & les moyens d'en prévenir les suites, suivi d'un Appendice sur les fievres intermittentes; trad. & augm. de notes par M. Thion de la Chaume. Par. 1785*, 2 v. in-12. 6 l.
- Lorry, *Essai sur les Alimens, nouvelle édition. Paris*, 1781, 2 vol. in-12. 6 l.
- Lorry *Tractatus de morbis cutaneis. Par. 1777*, in-4. 14 l.
- Lorry de *Melancholia & morbis Melancholicis. Paris. 1765*, 2 v. in-8. 10 l.
- Lorry, *Hypocratis Aphorismi, Gr. & Lat. Hypocratis & Celsi locis parallelis illustrati, studio & curâ Janfonii ab Almelo-veen, quibus accessit Lud. Verhoofd index locupletissimus, loca parallela ex Boerhavii Commentariis, notulas addidit, editionem curavit A. C. Lorry. Parisiis*, 1784, in-12. v. d. f. tr. 4 l.
- Sanctorii de *Medicina statica Aphorismi. Commentaria notasque addidit A. C. Lorry. Parisiis*, 1770, in-12. 3 l.
- Lorry, *Essai sur la conformité de la Médecine ancienne & moderne, dans le traitement des maladies aiguës, par Barker, traduit en François. Paris*, 1768, in-12. 3 l.
- Manuel des *Pulmoniques; Traité complet des maladies de la poitrine, où l'on trouve la théorie la plus naturelle, les regles de pratique les plus simples & les plus sûres pour combattre les maladies de cette cavité; on y a joint une méthode de reconnoître ces mêmes maladies par la percussion du thorax, trad. du latin d'Avenbrugger, par M. de Rofiere de la Chaffagne. Par. 1770*, in-12. 3 l.
- Mead (R.), *Opera, ex interpretatione A. C. Lorry. Parisiis*, 1751, 2 v. in-8. cum fig. æneis, 14 l.
- Machride, *Essais d'expériences sur la fermentation des mélanges alimentaires sur la nature & les propriétés de l'air fixe, &c. &c. &c. traduit par Abbadie. Paris*, 1766, in-12. 3 l.
- Macquer, *Plan d'un cours de Chymie expérimentale & raisonnée, avec un discours historique sur la Chimie. Paris*, 1757, in-12. 2 l. 10 f.
- Macquer, *Dictionnaire de Chymie, contenant la Théorie & la Pratique de cette Science, son application à la Physique, à l'Histoire naturelle, à la Médecine, & aux Arts dépendans de la Chymie. Paris*, 1778, 4 vol. in-8. 20 l.
- Le même. *Paris*, 1778, 2 vol. in-4. 30 l.
- Mauduyt, *Mémoires sur les différentes manieres d'administrer l'Electricité, & Observations sur les effets qu'elles ont produits, avec le Précis des Journaux tenus pour les malades qui ont été électrisés pendant l'année 1785. Paris*, 1784 & 1786, in-8. br. 3 l.
- Mauduyt, *Précis des Journaux tenus pour les malades qui ont été électrisés pendant l'année 1785, &c. in-8.* 12 f.
- Merian, *Histoire générale des insectes de Surinam & de toute l'Europe. Paris*, 1771, 4 vol. in-fol. br. 120 l.
- Médecine (la) & la Chirurgie des pauvres, qui contiennent des remèdes choisis, faciles à préparer & sans dépenses, pour la plupart des maladies internes & externes. *Paris*, 1758, in-12. 2 l. 10 f.
- Navier, *contre-poison de l'Arfenic, du Sublimé corrosif, du Verd-de-gris & du Plomb, suivis de trois Dissertations. Paris*, 1777, 2 vol. in-12. 5 l. 10 f.
- Necker, *Traité sur la Mycitologie, ou Discours historique sur les champignons en général. Manheim*, 1783, in-8. avec fig. br. 2 l. 8 f.
- Nicolas, *Manuel du jeune Chirurgien, dans lequel on trouve, en abrégé, toutes les vérités anatomiques, physiologiques & pratiques, dont la connoissance constitue le véritable Chirurgien, auquel on a joint un Précis de Pharmacie chirurgicale, quelques formules des plus communes de remèdes internes, & les doses des médicamens simples & composés. Paris*, 1770, 2 v. in-8. 9 l.
- Palissy (Œuvres de Bernard de), *revues sur les Exemplaires de la Bibliothèque du Roi, avec des notes par M. Faujas de Saint-Fonds, & des additions par M. Gobet. Paris*, 1777, in-4. 15 l.
- Paris, *Mémoire sur la peste. Avignon*, 1778, in-8. br. 1 l. 4 f.
- Pharmacopœia collegii regalis medicorum Londinensis. *Parisiis*, 1788, in-8. br. 2 l. 8 f.
- Pharmacopée du collège royal des Médecins de Londres, traduite de l'Anglois sur la seconde édition donnée avec des Remarques, augmentée de plusieurs Notes & Observations, & d'un nombre de procédés intéressans, avec les vertus & les doses des médicamens. *Paris*, 1771, 2 vol. in-4. 24 l.
- Plenck, *Pharmacologie chirurgicale, ou Science des médicamens externes & internes, requis pour guérir les maladies chirurgicales; suivie d'un Traité de Pharmacie relatif à la préparation & à la composition des médicamens. Par. 1786*, in-8. 6 l.
- Pomologie, ou Description des meilleures sortes de pommes & de poires, par



- J. H. Knoop. *Amsterd.* 1771, in-fol. avec fig. enlum. 45 l.
- Portal, Précis de Chirurgie-pratique, contenant l'Histoire des maladies chirurgicales, & la maniere la plus en usage de les traiter, avec des Observations & Remarques critiques sur différens points. *Par.* 1768, 2 v. in-8. av. fig. 10 l.
- Pott (Percival), Œuvres chirurgicales traduites de l'Anglois. *Paris*, 1777, 2 vol. in-8. 12 l.
- Pott, Dissertations chimiques, recueillies & traduites par M. Demachy. *Par.* 1759, 4 vol. in-12. 12 l.
- Préfontaine, Maison rustique à l'usage des Habitans de Cayenne. *Paris*, 1763, in-8. avec fig. 6 l.
- Prevost, Principes de Jurisprudence sur les visites & rapports judiciaires des Médecins, Chirurgiens, Apothicaires & Sages-femmes. *Par.* 1753, in-12. 3 l.
- Priestley, Expériences & Observations sur différentes especes d'air, & sur différentes branches de la Physique, traduites de l'Anglois par M. Gibelin. *Par.* 1777 & années suiv. 9 vol. in-12. rel. 31 l. 4 f.
- Pringle, Observations sur les maladies des armées dans les camps & dans les garnisons, seconde édit. revue, corrigée & augmentée sur la septieme édit. Angloise. *Paris*, 1771, 2 vol. in-12. 6 l.
- Pujol, Essai sur la maladie de la Face, nommée le Tic douloureux. *Paris*, 1787, in-12. br. 2 l.
- Pyraux, Traité de la Pharmacie moderne. *Paris*, 1751, in-12. 2 l. 10 f.
- Quarin, Animadversiones practicæ in diversos morbos. *Viennæ*, 1786, in-8. br. 3 l.
- Quesnay, Essai physique sur l'économie animale. *Par.* 1747, 3 v. in-12. 10 l. 10 f.
- Raulin, des maladies occasionnées par les prompts & fréquentes variations de l'air, considéré comme atmosphere terrestre. *Paris*, 1752, in-12. 2 l. 10 f.
- Raulin, Traité des maladies occasionnées par les excès de chaleur, de froid, d'humidité, & autres intempéries de l'air, avec la méthode de les guérir. *Paris*, 1756, in-12. 2 l. 10 f.
- Raulin, Observations de Médecine, où l'on trouve des Remarques qui tendent à détruire le préjugé où l'on est sur l'usage du lait dans la pulmonie. *Paris*, 1754, in-12. 3 l.
- Raulin, Instructions succintes sur les Accouchemens en faveur des Sages-femmes des Provinces, faites par ordre du Ministère; seconde édit. *Paris*, 1770, in-12. avec fig. 2 l.
- Raulin, Traité des maladies des femmes en couche, avec la méthode de les guérir; fait par ordre du Ministère. *Paris*, 1771, in-12. 2 l. 10 f.
- Raulin, Traité analytique des Eaux minérales en général, de leurs propriétés, & de leur usage dans les maladies; fait par ordre du Gouvernement. *Paris*, 1772, 1774, 2 vol. in-12. 5 l.
- Le Tome second se vend sépar. 2 l. 10 f.
- Ravaton, Chirurgie d'Armée, ou Traité des plaies d'armes à feu & d'armes blanches, avec des Observations sur ces maladies; les formules des remèdes qui ont le mieux réussi, &c. &c. *Paris*, 1768, in-8. avec fig. 6 l.
- Rebours, Avis aux meres qui veulent nourrir leurs enfans; troisieme édit. revue & considérablement augmentée. *Paris*, 1783, in-12. 2 l. 8 f.
- Recueil d'observations d'Anatomie & de Chirurgie, pour servir de base à la théorie des lésions de la tête par contre-coup, par M. Louis. *Paris*, 1766, petit in-8. 2 l. 10 f.
- Richter, Traité des Hernies, trad. de l'Allemand sur la seconde édit. par M. Rougemont, 1788, in-4. br. 4 l. 10 f.
- Roche (de la), Analyse des fonctions du système nerveux. *Geneve*, 1778, 2 vol. in-8. 9 l.
- Roussel, Dissertatio de variis herpetum speciebus, causis, symptomatibus, morbis ab herpetica lue oriundis, &c. &c. *Cadomi*, 1779, in-8. br. 2 l. 8 f.
- Roi (le), Mélanges de Physique & de Médecine. *Paris*, 1771, in-8. 6 l.
- Roux (le), Observations sur les pertes de sang des femmes en couches, & sur le moyen de les guérir. *Dijon*, 1776, in-8. 4 l. 10 f.
- Sabatier, Traité complet d'Anatomie, ou Description de toutes les parties du corps humain, nouvelle édition. *Paris*, 1781, 3 vol. in-8. 13 l. 10 f.
- Sanchès, Observations sur les maladies vénériennes, publiées par M. Andry, D. M. *Paris*, 1785, in-12. br. avec le portrait de l'Auteur, 2 l. 8 f.
- Sanctorius, *vide* Lorry.
- Saviard, Recueil d'observations chirurgicales, commentées par M. le Rouge. *Paris*, 1784, in-12. 3 l.
- Saucerotte, Examen de plusieurs préjugés & usages abusifs, concernant les femmes enceintes, celles qui sont accouchées, & les enfans en bas âge. *Nancy*, 1777, in-12. br. 1 l. 10 f.
- Saussure, Voyages dans les Alpes, précédés d'un Essai sur l'Histoire Naturelle des environs de Geneve. *Neuchâtel*, 1779, & *Geneve*, 1786, 2 vol. in-4. avec fig. br. 24 l.



- Sauvages**, Nosologie méthodique, dans laquelle les maladies sont rangées par classes, suivant le système de Sydenham & l'ordre des Botanistes. *Paris*, 1770, 3 vol. in-8. 15 l.
- Senac**, Traité des causes, des accidens, & de la cure de la peste. *Paris*, 1744, in-4. 12 l.
- Simons**, Observations sur le traitement de la Gonorrhée, trad. de l'Anglois. *Paris*, 1783, in-12. br. 15 f.
- Smellie**, Traité de la théorie & pratique des accouchemens, traduit de l'Anglois par M. de Preville, auquel on a joint le secret de Roonhuisen dans l'art d'accoucher. *Par.* 1771, 4 v. in-8. avec fig. 21 l.
- Statuts & Réglemens généraux pour les Maîtres en Chirurgie des Provinces du Royaume**; cinquième édit. *Paris*, 1772, in-4. 21. 8 f.
- Sydenham**, Médecine - Pratique, avec des notes, traduite par Jault. *Paris*, 1784, in-8. 7 l.
- Thion de la Chaume**, Tableau des maladies vénériennes. *Paris*, 1773, in-12. 21. 10 f.
- Tissot**, l'Onanisme, Dissertation sur les maladies produites par la masturbation; 5<sup>e</sup> édit. *Laus.* 1778, in-12. 21. 10 f.
- Tissot**, Traité des Nerfs & de leurs maladies. *Paris*, 1778, 6 vol. in-12. 15 l.
- Tissot**, Traité de l'Épilepsie, in-12. 21. 10 f.
- Tissot**, Gymnastique médicinale & chirurgicale, ou Essai sur l'utilité du mouvement, ou des différens exercices du corps & du repos dans la cure des maladies. *Paris*, 1780, in-12. 21. 10 f.
- Turner**, Traité des maladies de la peau en général, traduit de l'Anglois. *Paris*, 1743, 2 vol. in-12. 5 l.
- Valentin**, Recherches critiques sur la Chirurgie moderne, avec des Lettres à M. Louis. *Par.* 1772, in-12. 21. 10 f.
- Vacher**, Dissertation sur le cancer des mamelles. *Besang.* 1740, in-12. 21. 10 f.
- Van-Swieten**, Description abrégée des maladies qui regnent dans les armées, avec la méthode de les traiter; nouvelle édition. *Par.* 1777, in-12. 21. 5 f.
- Van-Swieten** Commentaria in Hermanni Boerhaave Aphorismos de cognoscendis & curandis morbis. *Parisiis*, 1769, 5 vol. in-4. 60 l.
- Vicat**, Matière médicale, tirée de Halleri *historia stirpium indigenarum Helvetiae*; avec nombre d'additions fournies par l'Auteur, quelques observ. du Traducteur, & les usages économiques des mêmes plantes. *Berne*, 1776, 2 vol. in-8. 71. 10 f.
- Vicat**, Histoire des Plantes vénéneuses de la Suisse. *Yverdun*, 1776, in-8. avec fig. br. 31. 12 f.
- Vicq d'Azyr**, Essai sur les lieux & les dangers des sépultures. *Paris*, 1778, in-12. 21. 10 f.
- Viter**, Matière médicale réformée, ou Pharmacopée - Medico-chirurgicale. *Lyon*, 1780, in-4. 12 l.
- Underwood**, Traité sur les ulcères des jambes, précédé de Remarques en forme d'introduction, sur le procédé de l'ulcération & l'origine du pus louable; suivi d'une méthode de traiter certaines tumeurs scrophuleuses, &c. &c. *Paris*, 1784, in-12. 21. 10 f.
- Underwood**, Traité des maladies des enfans (du premier âge), auquel on a joint les observations - pratiques de M. Armstrong, & celles de plusieurs autres Médecins. *Paris*, 1786, in-8. 6 l.
- White**, Avis aux femmes enceintes & en couches, ou Traité des moyens de prévenir & de guérir les maladies qui les affligent dans ces deux cas. *Paris*, 1774, in-12. avec fig. 3 l.
- Whytt**, Traité des maladies nerveuses, hypocondriaques & hystériques, trad. de l'Anglois; nouv. édit. *Paris*, 1777, 2 vol. in-12. 6 l.
- Whytt**, Essai sur les vertus de l'eau de chaux pour la guérison de la pierre, traduit de l'Anglois. *Par.* 1757, in-12. 3 l.
- Winslow**, Exposition anatomique de la structure du corps humain; nouvelle éd. *Par.* 1776, 4 v. in-12. avec fig. 12 l.
- Wintringham** notationes & observationes in Richardi Mead monita & præcepta medica. *Paris*, 1773, in-8. 5 l.
- Zimmermann**, Traité de la Dyssenterie, trad. de l'Allem. par M. Lefebure de Villebrune; nouv. édit. revue & corrigée par le traducteur. *Par.* 1787, in-12. 31.
- Zimmermann**, Traité de l'expérience générale, & en particulier dans l'art de guérir, trad. de l'Allemand, par le même. *Paris*, 1774, 3 vol. in-12. 91.

On trouve chez le même Libraire un assortiment considérable de Livres d'Histoire Naturelle, Médecine, Anatomie, Chirurgie, Pharmacie, Chymie, &c. Latins, François, & Anglois.























